







ANTONII BERTOLONII

EQ. AUR. ET ORD. SABAUD. MED. DOCT.

IN ARCHICYMNASIO BONONIENSI BOTANICES PROFESS. EMÉR.
PRÆSIDIS COLLECII MEDICOR. ET CHIRURGOR. BONON.
E XL. VIRIS SOCIETAT. ITAL. ACAD. SCIENT. INSTIT. BON.
GEORG. BON. ACAD. GEN. REG. TAUR. NAT. SCRUT. HELV. ET
HALENS. NAT. CUR. SOC. ORDIN. SOCIET. LINNÆAN. LOND.
BOT. EDINB. MEDICO-BOTAN. LONDIN. HORT. CULT. HOLM.
LUDOVIG. AMER. MEDICO-CHIR. BONON. ACADEM. SCIENT.
MUTIN. ATHEN. BRIX. SOC. HONOR. SOCIETAT. LINNÆAN.
PARIS. ET LUCD. HORTOR. CULT. LONDIN. ET PARIS. BOT.
RATISB. LYC. NOV. YORK. ACAD. SCIENT. BRUXELL. NEAP.
PANORM. CIOEN. LUCENS. ARET. AGRAR. PISAUR. ET PERUS.
LYNCÆOR. FILERG. FOROLIV. TIBER. MEDICO-CHIR. FERRAR.
INSTIT. NEAPOL. AD HIST. NAT. AUG. &C. SOC. CORRESP.

FLORA ITALICA

SISTENS

PLANTAS IN ITALIA ET IN INSULIS CIRCUMSTANTIBUS
SPONTE NASCENTES.

Terra, quæ cælum ipsum clarius faceret.
Plin.

VOL. V.



BONONIÆ MDCCCXLII.
EX TYPOGRAPHÆO HÆREDUM RICHARDI MASHI
SUMPTIBUS AUCTORIS.

CLASSIS XI. DODECANDRIA.

ORDO I. MONOGYNIA.

ASARUM.

Lin. Gen. p. 235. Tourn. Inst. 3. tab. 286. Juss. Gen. p. 73. Lamck. Ill. 4. t. 394. Vent. Tabl. 2. p. 227. Gærtn. De fruct. 1. p. 47. t. 14. Smith. Engl. Fl. 2. p. 342. Endlich. Gen. p. 344. n. 2160.

Perigonium monosepalum, coriaceum, inferne adhærens, superne liberum, trifidum. Stamina duodecim, disco epigyno inserta. Filamenta subulata, ultra antheram longe producta. Anthera medio filamentum hærens, bilocularis, loculis connectivo sejunctis. Stylus sulcatus, staminibus brevior. Stigma peltatum, lobatum, sulcatum, demum sexpartitum. Capsula adhærens, sexlocularis, limbo persistente perigonii coronata, extus indehiscens, dissepimentis ad axem solutis. Semina obovata, in quovis loculo pauca, longitudinaliter crista pallente arillata.

Habitus. Radix repens, sursum emittens gemmas surculiferas. Folia geminata, reniformia, vel cordata, longe petiolata. Flos solitarius inter folia, brevissime pedunculatus.

Ord. nat. Sarméntaceæ *Lin. Ord. nat. n. XI., et Præl. p. 294. Aristolochiæ Juss. Gen. p. 72. Smith. Gram. p. 85. Rich. Famill. nat. in Élém. de bot. éd. 5. p. 111. Schultz. Nat. syst. p. 336. Asaroidæ Vent. Tabl. 2. p. 226. Asarineæ Bartl. Ord. nat. p. 81.*

1. *ASARUM europæum*: foliis geminatis, reniformibus, obtusis, ciliatis; perigonio extus subvillosa.

A. europæum Sp. pl. p. 633. Smith. Engl. Fl. 2. p. 342., et Engl. bot. v. 16. t. 1083. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 215. Fl. Dan. t. 633. Svens. bot. v. 1. t. 31. Alb. Fl. med. 2. p. 5.

- t. 62. *Bull. Pl. ven.* t. 69. *Plenck. Ic. pl. med.* 4. p. 59. t. 358. *All. Ped.* 2. p. 213. n. 2069. *Balb. Taur.* p. 75. *Re Tor.* 1. p. 250. *Bir. Acon.* 1. p. 158. *Coll. Herb. Ped.* 5. p. 99. n. 1. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 214., et 381. *Comoll. Prodr.* p. 90., et *Com.* 3. p. 241. *Pollin. Ver.* 2. p. 91. *Suffr. Foroj.* p. 143. *Vitm. Sagg.* p. 13., et 29. *Bert. Amæn. Ital.* p. 369. n. 148. *Sav. Mat. med.* p. 38. t. 19., et *Bot. Etr.* 1. p. 140. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 279.* *Sang. Cent.* p. 67. *Ten. Nap.* 1. p. 253., et *Syll.* p. 230. n. 1. *De Cand. Franç.* 3. p. 349. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 2. heft. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 368. *Koch. Syn.* p. 625. *Reich. Exc.* 2. p. 183. n. 1116. *Host. Austr.* 1. p. 262. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 328. *Gaud. Helv.* 3. p. 262.
- A. n. 1547. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 252.
- Asaro Mutth. Valgr.* 1585. tom. 1. p. 40. fig. *Dur. Herb. Rom.* 1585. p. 48. fig. *Calz. Viag. di mont. Bald.* p. 10.
- Asarum Cæalp. De pl. lib.* 9. cap. 36. p. 389. *Segui. Ver.* 1. p. 79.
- Asaro, ovvero Baccara delle specierie, da alcuni detto Nardo rusticano *Pon. Mont. Bald.* p. 152.
- Ital. Asara baccara. Asara bacchera. Asaro. Baccara. Bacchero. Baccarella da capo. Cariophyllata salvatica. Erba renella. Renella. Nardo salvatico. Spigo salvatico* *Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 27.
- Offic. Asari radix, folia, semina* *Lin. Mat. med.* p. 75. n. 219.
- Perenn. Legi in alpihus Apuanis humilioribus ad fontes Frigidæ, et in Apennino Regioni prope Ceretem alpium ad tabernam di Montecampelli. Filius attulit ex Apennino Bononiensi in sylvis di Castiglione dei Pepoli præsertim in monte Barbabianca. Habui ex Acquafredda in Apennino Ligustino ab hortulano Durattiano, ex provincia Novariensi in sylvis vallis Intrasca a Prof. DE NOTARIS, ex Insubria a Porto sasso a Rev. ODESCALCHIO, ex Baldo a BARBIERIO, ex oris Benaci a Vesio, ex Valsugana a Pontorso, ex Tyroli meridionali in districtu di Riva a Ballin, et supra Bolzano a Birkerbruck a FACCHINIO, ex sylvis S. Michaelis d'Angarano in districtu Bassanensi a MONTINIO, ex Lippizza prope Tergestum a TOMMASINIO, ex Piceno a Amatricio ab ORSINO, ex Apennino Pistoriensi prope Maresca a Prof. PETRO SAVIO, Senis in sylva del Mattioli a Prof. GIULIO. Floret a Majo in Julium secundum loca.*

Radix repens, articulato-nodosa, aromatica, deorsum fibras crassiusculas, ramulosas, sursum gemmas emittens; a quibus prodeunt surculi breves, teretes, glabri, vel pilosi. Squamæ gemmarum grandiusculæ, ovatæ, obtusæ, concavæ, ciliatæ, reticulato-venosæ, deciduæ. Folia in apice surculorum duo, opposita, longe petiolata, subcoriacea, reniformia, sinu profundo excavata, obtusissima, et quandoque etiam retusa, rarius obtusa cum apiculo in medio, integerrima, ciliata, glabra, vel pilis raris adspersa, reticulato-venosa, nitidula, supra plus minus saturate virentia, subtus pallidiora, et subinde purpurantia. Petioli supra canaliculati, pilosi, et interdum fere lanati, demum glabrati. Flos solitarius inter folia, breviter pedunculatus, reflexus. Pedunculus nudus, pilosus, rarius glaber, circiter longitudine floris, aut paulo longior. Perigonium extus subvillosum, basi, et interdum apice luride virens, reliqua parte fusce rubens, subinde etiam totus fusce rubens, intus glaber, atrosanguineus; ejus segmenta ovata, aut ovato-lanceolata, acuta, vel acuminata, apicibus inflexis, Stamina perigonio breviora. Antheræ roseæ. Reliqua genitalium pars sanguineo-rubens. Semina obovata, dorso transverse rugosa, supra planiuscula, arillo pallente cristata. Cætera generis. Pili plantæ confervoidei. Odor radices valerianæus.

Usus. Laudatur in melancholia. Vis purgans, vomitoria, errhina.

Observ. Sunt, qui putant, hoc esse baccar Virgilianum, sed erronee, ut jam monstravi in Fl. Ital. v. 2. p. 403. Nunc addo, baccar olim in coronis adhibitum

baccare frontem

Cingite

Virg. Eccl. 7. v. 27.

dum Asarum a coronis excludebatur. Quare Plinius: "Asaron invenio vocitari, quoniam in coronas non addatur,, Nat. hist. lib. 21. cap. 6.

PEGANUM.

Lin. Gen. p. 239. Juss. Gen. p. 297. Lamck. Illustr. 5. tab. 401. Vent. Tabl. 3. p. 228. Gærtn. De fruct. 2. p. 87. tab. 95. De Cand. Prodr. 1. p. 712.

Harmala Tourn. *Inst. rei herb.* 2. tab. 133.

Calyx perianthium liberum, pentaphyllum, persistens, foliolis linearibus, simplicibus, vel inferne parce pinnatis. Corolla pentapetala, patens, petalis oblongis, calyci subæqualibus. Stamina duodecim-quindecim, filamentis subulatis, basi dilatatis, antheris linearibus, adnatis, bilocularibus. Receptaculum discoideum, glandulosum. Ovarium subrotundo-trigonum, depressum, umbilicatum. Stilus filiformis, longitudine staminum. Stigma clavato-triquetrum. Capsula trilocularis, trivalvis, dissepimentis medio valvarum affixis. Semina pyramidata, minute scrobiculato-reticulata, horizontaliter affixa margini interno incrassato dissepimentorum.

Habitus. Planta perennis, aut suffruticosa. Caulis dichotomus. Folia multifida, laciniis linearibus. Pedunculi uniflori. Flores grandiusculi. Petala albo-viridula.

Ord. nat. Multisiliquæ β Linn. *Ord. nat. n.* XXVI., et *Præl. p.* 376. Rutacæ Juss. *Gen. p.* 296. Smith. *Gramm. p.* 157. Vent. *Tabl. 3. p.* 223. Bartl. *Ord. nat. p.* 389. Schultz. *Nat. syst. p.* 489. De Cand. *Prodr. 1. p.* 709. Rich. *Famill. in Él. éd. 5. p.* 161.

1. PEGANUM *Harmala*.

P. Harmala Sp. pl. p. 638. Sibth. et Smith. *Fl. Græc. prodr. 1. p.* 319., et *Fl. Græc. 5. p.* 43. t. 456. Lamck. *Ill. 5. t.* 401. Bull. *Herb. t.* 343. Ten. *Nap. 1. p.* 254., et *Syll. p.* 230. n. 1. Desf. *Atl. 1. p.* 371. De Cand. *Prodr. 1. p.* 712. n. 1. a. Reich. *Exc. 3. p.* 767. n. 4818., et *Cent. 15. p.* 12. t. 158. fig. 4818. Host. *Austr. 1. p.* 564. *Ruta salvatica* Harmala Matth. *Valgr. an.* 1585. tom. 2. p. 778. fig.

R. salvatica Anguill. *Sempl. p.* 208.

R. silvestre seconda Dur. *Herb. Rom.* 1585. p. 404. fig.

Harmel Constantinopolitanum Cæsalp. *De pl. lib.* 15. cap. 12. p. 573.

Ital. Armel. Ruta salvatica Targ. Tozzett. *Diz. bot. 2. p.* 163.

Perenn. Suffr. Habui ex Apulia al Tavoliere, ubi commune, ab Eq. Gussoneo. Floret Junio.

Radix fusiformis, lateraliter fibroso-ramulosa. Caulis erectus, vel adscendens, cespitosus, teres, flexuosus, dichotomus, uni-bipedalis. Folia carnosula, multifida; lacinii linearibus, acutis, aut acuminatis, remotis, simplicibus, vel divisis, supra planis, dorso convexulis. Pedunculi uniflori, solitarii, alii terminales, alii oppositifolii, nudi, crassi. Foliola calycina linearia, acuminata, simplicia, vel inferne una, alterave pinna brevi aucta. Petala oblonga, obtusa, striata, albo-viridula, præsertim in medio. Stamina corollæ subæqualia. Capsula subrotundo-trigona, obtusa, polysperma, thecaphoro brevissimo suffulta. Reliqua generis. Tota planta glabra. Odor herbæ intense rutaceus, ingratus. Habui quoque ex herbidiis Tauriæ, ubi vulgatissimum, a Brunnero, et ex oris Euphratis sub N.º 134. ab illustr. Societate Hortorum culturæ Londinensi. Allionius indicavit Nicææ Ped. 2. p. 101. n. 1652., sed erronee.

PORTULACA.

Linn. Gen. p. 240. excl. spec. caps. trivalv. Tourn. Inst. 2. tab. 118. Juss. Gen. p. 312. Lamck. Ill. 5. t. 402. Vent. Tabl. 3. p. 259. Gærtn. De fruct. 2. p. 212. t. 128. De Cand. Prodr. 3. p. 353. Endlich. Gen. p. 949. n. 5174.

Calyx perianthium inferne adhærens, limbo bipartito, segmentis compresso-carinatis, diu persistentibus, at cum operculo capsulæ maturæ deciduis. Petala quinque, libera, aut ima basi connata, post nuptias conniventia, lenteque marcescentia, et sic intra segmenta calycina clausa diu perdurantia. Stamina duodecim, lusu sex-sedecim. Filamenta subulata. Antheræ didymæ, incumbentes. Stilus brevissimus, crassiusculus. Stigmata quinque, profunde secta. Capsula inferne adhærens, superne conoidea, obtusa, unilocularis, circumscissa. Semina plura, reniformia, striis concentricis instructa, granulato-scabra, suffulta funiculo umbilicali longo, e placenta basilari profecto.

Habitus. Herbae succulentæ, humiles. Caulis ramosus. Folia carnosa, simplicia, opposita, vel alterna, in axillis nuda, aut pilifera, suprema circa flores involucrentia. Corollæ luteæ, vel rubræ. Flores evigilant ab hora nona ad meridiem, vix ultra.

Ord. nat. Succulentæ γ *Lin. Ord. nat. n. XIII., et Præl. p. 315.* Portulacæ *Juss. Gen. p. 312. Smith. Gram. p. 164. Vent. Tabl. 3. p. 258. Bartl. Ord. nat. p. 303. Schultz. Nat. syst. p. 438. De Cand. Prodr. 3. p. 351. Rich. Famill. in Él. éd. 5. p. 198.*

1. *PORTULACA oleracea*: caule decumbente, prostrato; foliis cuneatis, sessilibus; floribus terminalibus, congestis.
- P. oleracea* *Sp. pl. p. 638. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 320., et Fl. Græc. 5. p. 44. t. 457. Plinck. Ic. pl. med. 4. p. 61. tab. 361. De Cand. Pl. grass. t. 123. All. Ped. 2. p. 106. n. 1678. Balb. Taur. p. 76. Re Seg. p. 39., et Tor. 1. p. 250. Bir. Acon. 1. p. 158. Coll. Herb. Ped. 2. p. 458. n. 1. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 215., et 381. Comoll. Prodr. p. 90., et Com. 3. p. 243. Lanf. Mant. in Conf. e Brug. Gior. dec. 2. t. 10. p. 284. Pollin. Ver. 2. p. 92. Ruch. Ven. p. 116. Moric. Ven. 1. p. 208. Nacc. Ven. 3. p. 42. Suffr. Foroj. p. 143. Sav. Pis. 1. p. 443. Seb. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 160. Ten. Nap. 1. p. 255., et Syll. p. 537. n. 1. Ab Ucr. Hort. Pan. p. 192. Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 532., et Sup. 1. p. 144. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 402., et Prodr. 3. p. 353. n. 1. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 369. Koch. Syn. p. 252. Reich. Exc. 3. p. 575. n. 3716. Host. Austr. 1. p. 564. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 329. Gaud. Helv. 3. p. 263. α.*
- P. n. 968. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 1. p. 416.*
- Portulaca domestica, et Portulaca salvatica Matth. Valgr. ann. 1585. tom. 1. p. 502. fig., et p. 503. fig. Dur. Herb. Rom. 1585. p. 375. fig.*
- Portulaca Cæsalp. De pl. lib. 6. cap. 61. p. 263.*
- P. sylvestris, angustifolia Cup. Sup. alt. p. 73.*
- P. sylvestris Castell. Hort. Mess. p. 43.*
- P. angustifolia, sive sylvestris Zannich. Ist. p. 218. t. 262. Segui. Ver. 1. p. 414.*
- Ital. Andracne. Erba da porci. Erba grassa. Erba Porcellana. Erba Porcacchia. Porcellana. Porcellana salvatica. Porcacchia. Procaccia. Procaccia Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 174.*

Offic. Portulacæ herba, semina Lin. Mat. med. p. 91. n. 260. *Ann.* Vulgaris in viis, ruderatis, hortis, campisque cultis Italiz. Legi Sarzanæ, Bononiz. Habui ex viciniis Tridenti, et ex *Fiemme* prope *Val-Floriana* a FACCHINIO, ex incultis Bassanensibus a FACCHINIO. Floret Julio, Augusto.

Radix fusiformis, lateraliter fibrillosa. Caulis teres, succulentus, decumbens, vel prostratus, articulatus, opposite, aut alterne ramosus, a palmo ad pedem, et etiam paulo ultra longus, nitidulus, in aprico rubescens, inferne, dum luxuriat, insigniter crassus. Folia opposita, vel alterna, carnosa, cuneiformia, obtusa, integerrima, sessilia, nitidula, supra plus minus saturate viridia, subtus pallentia, et fere glaucescentia, vel etiam purpurantia. Flores sessiles, congesti in apice, et in ala ramorum cxtimorum, duo-octo, rarius solitarii, involucrati foliis duobus oppositis, vel quatuor cruciatis. Evigilant ab hora nona ad meridiem, vix ultra. Calycis laciniz compresso-carinata, acutæ, inæquales, majore apice incurva, virides, in anthesi patentes, post anthesim auctæ, et conniventes, corollam subcolliquescentem tegentes, demum delabentes una cum operculo capsulæ circumscissæ. Petala lutea, oblonga, obtusa, emarginata. Stamina sex-duodecim. Stylus brevissimus, simplex. Stigmata filiformia, elongata. Semina fusca. Reliqua generis.

Nulla essentialis differentia est inter plantam spontaneam majorem, vel minorem.

Usus. Folia præstant in acetariis. Succus laudatur ut refrigerans in ardoribus vesicæ, in hæmorrhagiis, et in febribus inflammatoriis. Herba suisbus grâtissima.

LYTHRUM.

Lin. Gen. p. 240. Juss. Gen. p. 332. Lamck. Ill. 5. t. 408. Vent. Tabl. 3. p. 302. Gærtn. De fruct. 1. p. 296. t. 62. Smith. Engl. Fl. 2. p. 343. De Cand. Prodr. 3. p. 80.

Salicaria Tourn. Inst. 2. t. 129.

Calyx perianthium monophyllum, liberum, tubulosum, vel campanulatum, striatum, sex-duodecimdentatum, plerumque dentibus alternis longioribus, et angustioribus, intus receptaculo tenui;

expanso vestitum. Petala quatuor-sex, oblonga, obtusa, ungue tenui inserta ori tubi calycinalis, dentibus calycis longiora. Stamina sex-duo-decim, subinde plus minus ab hoc numero abundentia, filamentis filiformibus, antheris subrotundis, bilocularibus, incumbentibus. Stilus filiformis. Stigma capitatum. Capsula matura calyce arcte cincta, oblonga, vel cylindracea, membranaea, bilocularis, apice dehiscens. Placenta crassa, septo utrinque adnata. Semina numerosa, minuta, obovata.

Habitus. Plantæ annuæ, vel perennes. Caulis angulatus, oppositus, aut alterne ramosus. Folia oblonga, lanceolata, vel linearia, integerrima, opposita, terna, quaterna, aut alterna. Flores in racemo terminali, spicæformi, aut axillares. Petala violacea, dentibus calycinis semper plus minus longiora.

Obs. Genus *Peplidi* valde proximum, a qua sejungitur habitu, et corolla multo grandiore, aliter colorata.

Ord. nat. Calycanthemæ *Lin. Ord. nat. n. XVII., et Præl. p. 332. Vent. Tabl. 3. p. 298. Salicariæ Juss. Gen. p. 330. Smith. Gram. p. 170. Rich. Famill. nat. in Él. éd. 5. p. 215. Lythraires Juss. in Dict. des scienc. nat. tom. 27. p. 453. De Cand. in Soc. de phys. et d' hist. nat. de Gen. tom. 3. part. 2. p. 65. Lythraræ De Cand. Prodr. 3. p. 75. Bartl. Ord. nat. p. 316. Lythraræ Schultz. Natürl. syst. p. 439.*

* *Racemo spicæformi.*

1. *LYTHRUM Salicaria*: erectum; foliis cordato-lanceolatis; racemo terminali, densifloro.

L. Salicaria Sp. pl. p. 640. Smith. Engl. Fl. 2. p. 343., et Engl. bot. v. 15. t. 1061. Curt. Lond. ed. Grav. v. 1. t. 60. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 216. Fl. Dan. t. 671. Svens. bot. v. 4. t. 256. Plenck. Ic. pl. med. 4. p. 62. t. 362. All. Ped. 2. p. 167. n. 1913. Balb. Taur. p. 76. Re Seg. p. 39., et Tor. 1. p. 251. Birol. Acon. 1. p. 159. Coll. Herb. Ped. 2. p. 398. n. 1. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 215., et 381. Comoll. Prodr. p. 90., et Com. 3. p. 245. Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec. 2. tom. 10.

- p.* 284. *Pollin. Ver.* 2. *p.* 92. *Ruch. Ven.* *p.* 116. *Moric. Ven.* *p.* 208. *Nacc. Ven.* 3. *p.* 42.* *Suffr. Foroj.* *p.* 143. *Bert. Amæn. Ital.* *p.* 370. *n.* 149. *γ. Sav. Pis.* 1. *p.* 444., et *Mat. med.* *p.* 10. *t.* 29. *Seb. et Maur. Fl. Rom. prodr.* *p.* 161. *Ten. Nap.* 4. *p.* 254., et *Syll.* *p.* 230. *n.* 1. *Ab Ucr. Hort. Pan.* *p.* 193. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. *p.* 533.,* et *Sup.* 1. *p.* 144. *b.* Presl. Fl. Sic.* 1. *p.* XXV. *β. Moris. Stirp. Sard. el. fasc.* 1. *p.* 19.* *De Cand. Franç.* 4. *par.* 2. *p.* 409. *α. β., et Prodr.* 3. *p.* 82. *n.* 13. *α. β. γ. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. *p.* 371. *Koch. Syn.* *p.* 247. *Reich. Exc.* 3. *p.* 640. *n.* 4116. *Host. Austr.* 1. *p.* 565. *Scop. Carn. ed.* 2. *tom.* 1. *p.* 329. *Gaud. Helv.* 3. *p.* 264. *α. β. γ.*
- L. Salicaria* $\frac{1}{2}$ *tomentosum Jan. El.* *p.* 7. *n.* 1.*
- L. n.* 854. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 1. *p.* 378.
- Un'altra *Lisimachia Matth. Valgr.* 1585. *t.* 2. *p.* 1000. fig.
- Lisimachia Dur. Herb. ed. Rom. an.* 1585. *p.* 263. fig.
- Lysimachia floribus purpureis Casalp. De pl. lib.* 6. *cap.* 55. *p.* 261.
- La II. Lisimachia del Matthioli, ovvero come dice il Lobelio Lisimachia porporea, et forse Pliniana Pon. Mont. Bald.* *p.* 142.
- Lysimachia spicata purpurea, forte Plinii Cup. Hort. Cath.* *p.* 120.
- L. trifolia spicata, purpurea Bocc. Mus. di piant.* *p.* 167. *t.* 120.
- Salicaria vulgaris, flore intense violaceo Ponted. Comp.* *p.* 114. *Zannich. Opusc. posth.* *p.* 81.
- S. vulgaris, purpurea, foliis oblongis Zannich. Ist.* *p.* 231. *tab.* 158. *Manett. Virid. Flor.* *p.* 78. *n.* 917. *Segui. Ver.* 1. *p.* 515. *n.* 1.
- S. trifolia, caule hexagono Manett. l. c. n.* 918. *Segui. Sup.* *p.* 206.
- S. vulgaris Hort. Rom.* 4. *t.* 59.
- Ital. Riparella. Salcerella. Salicaria. Sparzola. Stirpa marina. Verga rossa dei fossi Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. *p.* 139.
- Perenn. Frequens in paludosis Italiæ, nec respuat loca montana sicca. Legi Sarzanæ in fossis al Corso, et sub monte Caprione, in Lunensium lapidicinis di Mischia prope i Fanti scritti inter marmora. Habui ex Baldo a Prof. JANIO, ex Tyroli Italico al Castello di Fiemme a FACCHINIO, ex districtu Bassanensi ad margines fossarum a MONTINIO, et alle Grotte d'Oliero ab Eq. PAROLINIO, ex agro Tergestino in aquosis*

circa *Cedas* a TOMMASINIO, ex eodem agro, et ex Istria in marginibus rivulorum a BIASOLETTO, ex ora Veneta a *Brondolo* a Prof. NACCARIO, ex fossis Patavinis ab Eq. TREVISANO, ex districtu Faventino prope *Salarolo* a TASSINARIO, Senogalliâ *alle Grazie* a SALVATORIO, Anconâ in pratis *della Baraccola* a MARZIALETTO, ex agro Firmano ad ripas fluminis *Tenna* a Prof. OCTAVIANO, ex Hetruria in palustribus *di Livorno* a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTO, et in planitie *di Monterchi* ab AMIDEO, ex fossis, et stagnis Siciliæ ab Eq. GUSONIO, ex paludosis Sardinie ab Eq. Prof. MORISIO, ex Corsica a *Calvi* a SOLEIROLIO. Floret ab Junio in Augustum.

Radix fusiformi-ramosa. Caulis erectus, acute tetragonus, vel hexagonus, prout instruitur foliis oppositis, aut verticillato-ternis, fistulosus, in paludosis orgyalis, in siccis multo brevior, subinde rubens, simplex, vel ramosus, ramis strictis, oppositis, ternis, alternis. Folia lanceolata, basi cordata, acuta, aut acuminata, integerrima, sessilia, semiamplexicaulia, insigniter nervoso-venosa, nunc latiora, nunc angustiora, supra late viridia, subtus pallentia, suprema successive breviora. Racemus terminalis, spicæformis, densus, longus, acutus, bracteatus, semiverticillatus; ludit subinde laxus præsertim inferne. Bractææ ovato-lanceolatæ, apice attenuato-acuminatæ, imæ plerumque æquant, aut superant flores, reliquæ breviores. Flores plures, semiverticillati in sinu cujusvis bractææ. Pedicelli brevissimi, basi bracteola setacea instructi. Calyx cylindræceus, striatus, duodecimdentatus, dentibus alternis longioribus, subulatis, plus minus villosus. Corolla violacea, plus minus saturate. Petala sex, lusu quinque, oblonga, vel oblongo-lanceolata, obtusa, margine undulata, tres-quinque lineas longa, et totam longitudinem calycis semper superantia. Stamina duodecim, quorum sex longiora. Antheræ rubentes, polline et viridi flavo. Stylus stamina longiora æquans, aut superans. Stigma capitatum, flavo-viridulum. Capsula oblonga. Tota planta ludit glabra, pubescens, tomentosula. Datur etiam caulis polygonus, cum folia sunt verticillato-quaterna, sed ego nondum vidi.

**** Floribus axillaribus.**

2. *LYTHRUM Grafferi*: foliis inferioribus elliptico-oblongis, superioribus lanceolato-linearibus; floribus

solitariis, dodecandris; petalis longitudini calycis æqualibus.

L. Græfferi Ten. *Nap.* 4. p. 255. tab. 142., * et *Syll.* p. 230. n. 3.* *Guss. Pl. rar.* p. 188., * et *Fl. Sic. prodr.* 1. p. 534., * et *Sup.* 1. p. 145.* *Fior. in Gior. de' Lett. scienz. Pisa* 1828. tom. 17. p. 12.* *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 399. n. 4. *De Salis. in Bot. zeit. ann.* 1834. p. 50. *De Cand. Prodr.* 3. p. 82. n. 11.

L. Preslii Guss. *Pl. rar.* p. 188., * et *Fl. Sic. prodr.* 1. p. 533., * et *Sup.* 1. p. 144.*

L. Gussonii Presl. *Del. Prag.* p. 55.

L. alatum Presl. l. c.

L. acutangulum Lag. *Gen. et spec.* p. 16. n. 211. in herb. Matrit. ex Guss.

Polygonum aquaticum majus Barrel. *Ic.* 773. fig. 1.

Salicaria cretica, *Punicæ folio* Tourn. *Coroll. p.* 18. herb. ex Guss.

Ital. *Correggiola sdraiata. Erba spargolina maggiore.*

Perenn. Habui ex monte Argentario a Prof. GIULIO, Româ, ubi vulgare in aquosis, a Prof. MAURIO, in monte Malo a MAJERO, alla Valle dell'inferno, et ex viciniis Ostiæ a BARBIERO, ex collibus Velitrensibus a VANDERLINDENIO, Terracinâ a FLORINIA-MAZZANTIA, ex regno Neapolitano in humentibus prope Lauria ab Eq. Prof. TENORIO, a Caserta ab ORSINO, ex Sicilia præsertim ad salinas ab Eq. GUSSONIO, in viciniis Messanæ ab ORANGERO, ex Corsica a Bonifacio a SOLEIROLIO. Floret Majo, Junio, et subinde iterum autumno.

Caulis decumbens, inferne repens, acute tetragonus, fistulosus, in imo oppositus, reliqua parte alterne ramosus, raro simplex, palmaris-pedalis. Rami patuli, superiores breviores. Folia sessilia, integerrima, ima opposita, reliqua alterna, inferiora latiora, elliptico-oblonga, vel oblongo-lanceolata, obtusa, aut acutiuscula, superiora, et ramea angustiora, lanceolato-lineararia, vel lineararia, acuta. Flores solitarii, axillares, folio multo breviores, breviterque pedunculati. Pedunculi ad medium, vel paulo supra medium instructi bracteolis duabus, lineari-subulatis, albidis. Calyx tubuloso-tubæformis, sive inferne tenuis, superne sensim sensimque latior, striatus, tres lineas circiter longus, duodecimdentatus, dentibus alternis longioribus, lanceolatis, acutis, patulis, aut recurvis, reliquis brevioribus, latioribus, ovatis, acutis, incurvis, utroque

latere membranaceis. Corolla grandiuscula, hexapetala, violacea, unguibus albis. Petala ovato-oblonga, obtusa, totam longitudinem calycis æquantia, margine subundulata. Stamina duodecim, quorum sex breviora. Stilus variat staminibus longioribus brevior, æqualis, aut longior. Stigma capitatum. Capsula oblongo-cylindracea. Tota planta glabra.

3. *LYTHRUM Hyssopifolia*: caule adscendente, erectove; foliis superioribus lanceolato-linearibus; floribus solitariis, hexandris; petalis longitudine calycis brevioribus.

L. Hyssopifolia *Sp. pl.* p. 642. *Jacq. Austr.* 2. p. 20. t. 133. *All. Ped.* 2. p. 168. n. 1914. *Re Seg.* p. 39., et *Tor.* 1. p. 251. *Bir. Acon.* 1. p. 139. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 216. et 381. excl. *Barrel. Pollin. Ver.* 2. p. 93. *Moric. Ven.* 1. p. 209. *Nacc. Ven.* 3. p. 43.* *Morett. in Mem.* 1. p. 266. *Sav. Pis.* 1. p. 445. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 161.* *Ten. Nap.* 4. p. 254., et *Syll.* p. 230. n. 2. *Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 193. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. p. 534.,* et *Sup.* 1. p. 145.* *Moris. et De Not. Capr.* p. 54. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 410., et *Prodr.* 3. p. 81. n. 6. α. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 373. *Koch. Syn.* p. 248. *Reich. Exc.* 3. p. 640. n. 4113. *Host. Austr.* 1. p. 566. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 330. *Gaud. Helv.* 3. p. 265. excl. *Barrel.*

L. hyssopifolium *Smith. Engl. Fl.* 2. p. 344., et *Engl. bot.* v. 5. tab. 292. *Ruch. Ven.* p. 117. *Suffr. Foroj.* p. 144. *De Sal. in Bot. zeit. ann.* 1834. p. 50.

L. n. 855. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 1. p. 378.

Salicaria Hyssopi folio latiore *Rupp. Jen. ed. Hall.* p. 147. t. 6. fig. bona.

Hyssopifolia sive *Gratiola minor* *C. B. Prodr.* p. 108. fig. mala quoad flor.

H. aquatica *J. Bauh. Hist. pl.* 3. lib. 38. p. 792. fig. rud. *Ital. Correggiola de' fossi. Correggiola ritta. Erba Spargolina* *Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 139.

Ann. Legi Sarzanæ in fossis secus viam Romanam. Habui ex Liguria orientali ad montem S. Jacobi secus viam, quæ Segestâ Tiguliorum Clavarum ducit, a TURIO, Genuâ ab Eq. Prof. VIVIANIO, Albâ Pompejâ in udibus a BERTERO, Mantuâ alla Rotta di Luzzara prope Padum a BARBIERO, Vicetiâ a Montecchio Precalzin ab Eq. PAROLINIO, ex insula de' Brioni ad Istriam a TOMMASINIO, ex humentibus litoris Veneti a Prof. NACCARIO, et a MONTINIO, ex pineto Ravennati a Prof. ANTONIO

TARGIONIO-TOZZETTIO, ex Piceno ad Asculum ab ORSINO, Carrariâ secus viam, quæ ducit ad lapidicinas ab EQ. NARDUCCIO, Volaterris *al Fonte all'Agnello* ab AMIDEO, ex aquis Ostiæ, et Romæ a Prof. MAURIO, in *Valle dell' inferno*, et in via inter Romam, et Albanum a BARBIERO, ex Calabria, Sicilia, Cosyra, et Ustica ab EQ. GUSSONIO. Floret Junio.

Radix fusiformis, aut fusiformi-ramosa. Caulis erectus, vel ascendens, fistulosus, acute tetragonus, a spithama ad sesquipedem longus, inferne ramosus, ramis imis sæpe oppositis, reliquis alternis, omnibus paturis, rarius simplex. Subinde caulis superior perit, remanentibus ramis inferioribus, qui caulem decumbentem referunt. Folia quam in præcedente specie angustiora, sed ejusdem formæ; differunt tantum, quia basi paululum angustata, et fere petiolata. Flores exigui, solitarii, axillares, et quandoque supraaxillares, breviter pedunculati. Bracteolæ duæ, lineari-subulatæ, oppositæ, albidæ, sitæ in apice pedunculi statim sub calyce. Calyx ut in præcedente, sed multo tenuior. Corolla pallide violacea, aut rosea. Petala obverse lanceolata, obtusa, margine subundulata, longitudinem dimidiam calycis, vel tertiam partem ejus æquantia. Stamina sex, vix dentes calycinos superantia. Stylus staminibus brevior. Stigma capitatum. Capsula oblongo-cylindræcea, obtusa. Tota planta glabra. Flores interdum ludunt calycibus decemdentatis, petalis, et staminibus quinque.

Linnaeus in sistenda hac specie adhibuit vocabulum *Hysso-pifolia* substantivo modo, ut indicaret plantam illam, quæ a veteribus, et præsertim a Bauhinis dicta fuerat *Hysso-pifolia*; quare parum apte recentiorum nonnulli substantivum hoc in adjectivum *hyssopifolium* converterunt.

4. *LYTHRUM Thymifolia*: caule erecto; foliis alternis, obverse lanceolato-linearibus, petiolatis; racemulis axillaribus, foliolosis; calycibus tenuissimis, scabris; corollis tetrapetalis.

L. Thymifolia Sp. pl. p. 642. All. Ped. 2. p. 168. n. 1915. Coll. Herb. Ped. 2. p. 400. n. 6. Barb. Agg. p. 31.* Guss. Pl. rar. p. 189.* et Fl. Sic. prodr. 1. p. 535.* Moris. Stirp. Sard. el. fasc. 2. p. 3.* De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 410., et Prodr. 3. p. 81. n. 2. a. β. Reich. Exc. 3. p. 640. n. 4112.

L. thymifolium Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 321.

L. tribracteatum Ten. Nap. 4. p. 255., et Syll. p. 230. n. 4. B. pl. luxur.

L. dibracteatum Guss. Sup. 1. p. 145.* pl. luxur.

Lysimachia purpurea, palustris *Hyssopi folio* multo angustiori, minima Cup. Hort. Cath. p. 121.

Polygonum aquaticum minus Barrel. Ic. 773. fig. 2.

Hyssopifolia minor, vel potius *Thymifolia maritima* J. Bauh. Hist. pl. 3. lib. 38. p. 792. fig. pl. macrior.

Ital. *Timifoglia*.

Ann. Habui ex agro Mantuano a Luzzara prope Padum a BARBERIO, ex agro Pisano a Prof. PÉTRO SAVIO, ex Calabria a Cotrone ab Eq. GUSSONIO, ex Sardinia ab Eq. Prof. MORISIO. Floret Aprili, Majo.

Radix præcedentis. Caulis erectus, tetragonus, palmaris-spathamalis, oppositus, vel alterne ramosus, ramis divaricatis, aut patenti-adscendentibus, inferioribus longioribus. Hic quoque caulis superior subinde perit, remanente parte ima cum ramis divaricatis, quæ simulat caulem prostratum. Folia obverse lanceolato-linearum, obtusa, breviter petiolata, glabra, aut scabrida. Flores exigui, siti in racemulis axillaribus, brevibus, foliolosis per longum caulis, et ramorum tractum. Racemuli isti revera sunt ramuli abortivi, instructi foliis multo angustioribus, et brevioribus, plus minus scabris, cæterum reliqua folia referentibus. Flores hujusmodi foliolis axillares, solitarii, sessiles, aut subsessiles, basi instructi bracteolis duabus obovatis, vel obverse lanceolatis, scabris, nunc obtusis, nunc mucronulatis. Calycis tubus valde gracilis, tres-quinque lineas longus, striatus, scaber, anbiunde purpurascens, octo-duodecimdentatus, dentibus incurvis, alternis minimis vix rudimentalibus. Corolla exigua, et multo minor, quam in præcedente. Petala quatuor, vel sex, pallide violacea, ungue albo, sesquilineam, aut duas lineas longa. Genitalia intra calycem inclusa. Stamina duo.

Planta grandior, a qua ortum duxit *Lythrum bibracteatum* Salz., est ipsamet species luxurians, ut videre est etiam in De Candollei Prodr. 3. p. 81. Quæ dixi de nomine specifico *Lythri Hyssopifolia* valent quoque de hoc.

5. *LYTHRUM geminiflorum*: foliis alternis, lanceolato-linearibus; pedunculis axillaribus, geminis, unifloris; calycibus campanulatis; stilo brevissimo.

Ital. *Correggiola Santoreggia*.

Ann. Habui ex agro Mantuano alla Rotta di Luzzara juxta aggerem della Tagliata a BARBIERO. Floret Augusto, Septembri.

Radix gracilis, fusiformi-ramulosa. Caulis erectus, vel adscendens, tetragonus, simplex, aut inferne parce, et alterne ramosus, palmaris-dodrantalis, subinde purpurascens. Folia angusta, lanceolato-linearia, acuta, basi in petiolum brevem attenuata, alterna, integerrima; majora quatuor-quinque lineas longa, supra læto viridia, subtus glaucescentia. Flores parvi, axillares per totum fere caulem, geminati, pedunculati. Pedunculi uniflori, calyci subæquales, at folio multo breviores, ad medium, aut paulo infra medium instructi bracteolis duabus, oppositis, lanceolatis, utroque latere albido-membranaceis. Calyx campanulatus, vix lineam longus, striatus, interdum purpurascens, octo, aut duodecimdentatus; dentibus omnibus erectis, alternis longioribus, lanceolatis, acutis, reliquis latioribus, apiculatis. Petala admodum parva, violacea, obverse lanceolata, obtusa, totam longitudinem calycis æquantia. Stilus brevissimus. Stigma capitatum. Capsula oblonga, obtusa, fere longitudine calycis, bilocularis, apice purpurascens. Semina minutissima, obovata, lævia. Tota planta glaberrima.

ORDO II. DIGYNIA.

AGRIMONIA.

Lin. Gen. p. 241. *Tourn. Inst. 2. t.* 155. *Juss. Gen. p.* 336. *Lamck. Ill. 4. t.* 409. *Vent. Tabl. 3. p.* 342. *Gartn. De fruct. 1. p.* 347. *t.* 73. *Smith. Engl. Fl. 2. p.* 345. *De Cand. Prodr. 2. p.* 587. *Endl. Gen. p.* 1243. *n.* 6368.

Calyx perianthium monophyllum, liberum, basi bracteolis duabus calyculatum, instructum tubo coriaceo, campanulato, sulcato, fructigero turbinato, intus receptaculo adhærente vestito, ore a substantia receptaculi clauso, extus superne glochidibus hamatis hispido, limbo foliaceo, quinquefido, in anthesi patulo, in fructu connivente. Corolla pentapetala, calyce longior, petalis
Flor. Ital. T. V.

obovatis, ad rimas limbi calycini insertis. Stamina duodecim, vel plura, circa ostium tubi calycini e receptaculo claudente orta, corollā breviora, filamentis filiformibus, antheris didymis, incumbētib. Ovaria duo. Stili duo, perforantes fornicem tubi calycini. Stigmata obtusa. Nuculæ duæ, membranacæ, monospermæ, intra tubum calycinum induratum oclusæ, stilo sublaterali terminatæ.

Habitus. Plantæ perennes, villosæ, aromaticæ. Caulis erectus. Folia interrupte pinnata cum impari, foliolis ovatis, dentatis. Petioli basi utrinque stipula foliacea adnata auriculati. Racemus terminalis, spicæformis, bracteatus. Corolla flava.

Ord. nat. Senticosæ *Linn. Ord. nat. n. XXXV.*, et *Prael. p. 444.* Rosacæ *Juss. Gen. p. 334.* *Smith. Gram. p. 172.* *Vent. Tabl. 3. p. 340.* *De Cand. Prodr. 2. p. 587.* Dryadeæ *Baril. Ord. nat. p. 401.* Sanguisorbæ *Schultz. Nat. syst. p. 507.*

1. *AGRIMONIA Eupatoria*: hirsuta; foliis abrupte pinnatis, foliolis ovatis, dentatis, impari petiolulato; racemo spicæformi, elongato, fructifero interrupto.
- A. Eupatoria Sp. pl. p. 643.* *Smith. Engl. Fl. 2. p. 346.*, et *Engl. bot. v. 19. t. 1335.* *Curt. Lond. ed. Grav. v. 1. t. 61.* *Hook. Brit. Fl. edit. 2. p. 216.* *Fl. Dan. t. 588.* *Svens. bot. v. 2. t. 99.* *Plenck. Ic. pl. med. 4. p. 63. t. 364.* *Bull. Herb. de la Franc. t. 229.* *Lamck. Ill. 5. t. 409. fig. 1.* *Allion. Ped. 2. p. 74. n. 1542.* *Balb. Taur. p. 76. Re Seg. p. 40.*, et *Tor. 1. p. 252.* *Bir. Acon. 1. p. 159.* *Coll. Herb. Ped. 2. p. 329. n. 1.* *Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 225.*, et 383. *Com. Prodr. p. 90.*, et *Com. 3. p. 247.* *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec. 2. tom. 10. p. 284.* *Pollin. Ver. 1. p. 94.* *Ruch. Ven. p. 117.* *Moric. Ven. p. 210.* *Nacc. Ven. 3. p. 44.* *Suffr. Foroj. p. 144.* *Bert. Pl. Gen. p. 163.*, et *Aman. Ital. p. 151. n. 132.* *Sav. Pis. 1. p. 447.*, et *Mat. med. p. 11. t. 7.* *Ors. in Cap. Op. p. 278.** *Ten. Nap. 1. p. 237.*, et *Syll. p. 231. n. 1.* *Ab Ucr. Hort. Pan. p. 194.* *Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 536.**, et *Sup. 1. p. 145.** *De Cand. Frang. 4. par. 2. p. 450.*, et *Prodr. 2. p. 587. n. 1.* *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 375.* *Reich. Exc. 3. p. 611. n. 3944.* *Host. Austr. 1. p. 566.* *Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 331.* *Gaud. Helv. 3. p. 266.*

- A. *Eupatorium* *Seb. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 161.* Koch. Syn. p. 220.*
 A. *odorata* *Sang. Cent. p. 67.* Ten. Nap. 1. p. 257., et Syll. p. 231. n. 2. Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 537.,* et Sup. 1. p. 145.**
 A. n. 991. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 1. p. 423.*
Eupatorio Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 1068. fig. Ang. Sempl. p. 258.
 E. di Diosc. *Dur. Herb. Rom. 1585. p. 176. fig. Imp. Hist. nat. ed. Ven. p. 656. (err. 654.) fig.*
Agrimonia Casalp. De pl. lib. 8. cap. 4. p. 319. Castell. Hort. Mess. p. 1.
Eupatorium Dioscoridis Column. Ecphr. 1. p. 138. sine figur.
Agrimonia inodora, seu minus odora Cup. Hort. Cath. p. 4.
Agrimonium odoratum Barrel. Ic. 611.
Agrimonia flore luteo vulgaris Agost. De re bot. p. 120. d.
A. officinarum Zannich. Ist. p. 5. t. 234. Segui. Ver. 1. p. 504.
A. odorata Camer. Hort. p. 7. sine fig.
 Ital. *Acrimonia. Agrimonia. Agrimonia aspra. Agrimonia vera. Erba da andata. Erba Guglielmo. Erba Vettonica. Eupatorio. Santonica* Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 9.
 Offic. *Agrimoniae herba* Lin. Mat. med. p. 76. n. 221.
Perenn. Frequens in sepibus, pascuis, sylvisque Italiae. Legi Sarzana in marginibus agrorum, Genus in colibus al Zerbino, Bononiae in sylvis di Gaibolla, et Zolla predosa. Habui ex Tyroli Italico a Predazzo di Fiemme a FACCHINIO, ex incultis Bassanensibus ab Eq. PAROLINIO, et a MONTINIO, ex districtu Tergestino ad S. Cantianum a TOMMASINIO, ex Sasso Feltrio in subapennino Ariminensi ab AZEABOLIO, Senogallia ad sepes a SALVATORIO, ex Piceno ad portum S. Elpidii ab Eq. NARDUCCIO, et a Montefortino a MAREIALETTO, ex Ducatu Lucensi a Prof. PUCCINELLIO, ex Hetruria in Mugello, in agro Florentino, et ad balnea S. Philippi a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, ex agro Viterbiensi a CAMILLIO, et a Canino a Rev. Fratre MAURITIO DE BRIKIA, Romae a Prof. MAURIO, ex oris Acherusiae ab ORSINO, ex insula Caprearum a Prof. GIRALDIO, Panormo ab Eq. GUSSONIO, ex Igilio ab Eq. BARDIO. Floret a vere in serum autumnum.
Radix fusiformis, aut fusiformi-ramosa, rubido-fusca, lateraliter crasse fibrosa. Caulis erectus, obscuro

angulatus, hirsutus villis patentibus, simplex, vel superne parce, et alterne ramosus, a pollice ad duos pedes longus. Folia interrupte pinnata cum impari, alterna, supra pilosa, et saturate viridia, subtus villosa, aut tomentosa, et insuper tecta granulis glandularibus minutissimis, magis conspicuis in pagina minus villosa, pallentia. Foliola ludibunda, scilicet obovata, ovata, oblonga, oblongo-lanceolata, obtusa, vel acuta, grosse dentata, dentibus e rotundo acutis, terminale petiolulatum, basi æqualiter cuneatum, huic proxima basi oblique cuneata, lateralia omnia sessilia, opposita, vel alterna, interrupta ramentis foliaceis, exiguis, inæqualibus, bi-tridentatis, aut integris, descendendo decrescencia. Petiolus communis hirsutus villis patentibus, basi utrinque auriculatus stipula foliacea, adnata, plus minus grandi, amplexicauli, semicordata, grosse, et acute dentata, rarius integra. Racemus terminalis, spicæformis, simplex, vel basi uno, alterove ramo auctus, demum elongatus, et præsertim inferne laxiflorus. Rachis hirsuta. Bractea parva sub quovis pedicello, hirsuta, trifida, laciniis lanceolato-linearibus, acuminatis; ludit bifida, vel integra. Pedicelli brevissimi, apice cum calyce articulati. Dux aliz bracteolæ ovatæ, acuminatæ, integræ, vel subdentatæ, multinerviæ stant in apice pedicellorum, tubum calycinum amplectuntur, et fere tegunt. Calycis tubus in anthesi brevior, campanulatus, hirsutus, levius sulcatus, in fructu quidquam elongatus, turbinatus, profundius sulcatus, sulcis apice, latioribus, subinde fere calvescens, superne echinatus glochidibus uncinatis, magis, vel minus numerosis, patentibus, et inferioribus sæpe declinatis. Laciniæ limbi calycini ovatæ, acutæ, trinerviæ, concavæ, in fructu conniventes. Corolla flava, toto calyce duplo longior. Petala obovata, integra, aut leviter emarginata, in anthesi patentia, post anthesim recurvata. Stamina primum erecta, exploso polline, inflectuntur. Antheræ crocæ, vel croceo-rubidæ. Stili crassiusculi, divergentes, staminibus breviores. Stigmata obtusa, papillosa. Calyces fructiferi refracto-recurvati, tuncque glochides induratæ facile hærent corporibus admotis, et calyces a pedicello suo erecto-patulo auferruntur. Herba odoris grati, fere citrati, seu melissoides. Characteres, quibus auctores distinxerunt *Agrimoniæ* odoratam ab *Agrimonia Eupatoria* sunt prorsus artificiales,

cum magnitudo partium, et forma foliorum sint res in hac specie valde ludibundæ. Odor gratus herbæ omnibus formis solemnis est, licet nunc magis, nunc minus intensus.

Usus. Herba adhibetur a medicis in profluviis, in hæmaturia, in calculo, et in obstipationibus viscerum, et profecto usu frequentiore digna.

AREMONIA.

Neck. El. 2. p. 100. n. 768. De Cand. Prodr. 2. p. 588. Endl. Gen. p. 1243. n. 6369.

Agrimonia species Lin. Gen. p. 241.

Agrimonoïdes Tourn. Inst. 2. t. 155.

Spullanzania Poll. Hort. et prov. Ver. pl. nov. fasc. 1. p. 10. tab. fig. 1.

Calyx duplex, unusquisque monophyllus, persistens, exterior faciens involucrium completum, octo-duodecimfidum, laciniis lanceolatis, inæqualibus, interior sistens perianthium tubo oblongo, inermi, limbo quinquefido, laciniis linearibus, corolla brevioribus. Receptaculum vestit faciem internam tubi calycini, osque ejus fornice obturat. Petala quinque, obovata, ungue brevissimo, contra rimas limbi calycini inserta. Stamina quinque-decem, e receptaculo in ambitu fornicis orta, corolla breviora, filamentis filiformibus, antheris subrotundis, bilocularibus, incumbentibus. Ovaria duo. Stili duo, terminales, perforantes fornicem, staminibus breviores. Stigmata depressa, orbicularia. Nuculæ duæ, membranaceæ, monospermæ, intra tubum calycinum fornice clausum, et induratum retentæ, altera subinde abortiva.

Habitus. Planta perennis, humilis. Folia radicalia interrupte pinnata cum impari, longe petiolata, caulina ternata, breviter petiolata. Stipulæ integræ, vel bifidæ. Corymbus terminalis, pauciflorus. Petala lutea. Planta habitu recedens a



præcedente genere, quamvis fructificatione conveniat.

Ord. nat. Ut in *Agrimonia* p. 17.

1. *AREMONIA Agrimonoides*.

A. *Agrimonoides* De Cand. Prodr. 2. p. 588. n. 1. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. p. 468.* *Koch. Syn.* p. 221. *Reich. Exc.* 3. p. 611. n. 3946.

Agrimonia Agrimonoides Sp. pl. p. 643. *Sibth. et Smith. Fl. Græc. Prodr.* 1. p. 322., et *Fl. Græc.* 5. p. 45. t. 458. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 225. *Marz. El.* p. 32. *Ten. Nap.* 1. p. 258. *Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 194. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 378. *Wulf. in Jacq. Coll.* 2. p. 208. *Host. Austr.* 1. p. 566. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 331.

Spallanzania Agrimonoides Pollin. Hort. et prov. Ver. pl. nov. fasc. 1. p. 10. tab. fig. 1.* et *Viag. al lag. di Gard.* p. 96.* et *Fl. Ver.* 1. p. 509.* *Ten. Syll.* p. 194. n. 1. *Spr. Syst. veg.* 2. p. 245.

Agrimonoides Column. Ecphr. 1. p. 145. tab. p. 144. *Tit. It. in calc. Hort. Maur.* p. 25. non numer.

A. sem. glabro *Barrel. Ic.* 612.

Agrimoniae similis C. B. P. p. 321. n. 6. *Cup. Sup. alt.* p. 6.

Ital. *Agrimonoides*.

Perenn. Habui ex Apennino Liguriæ orientalis a *Gambaro* a *TURIO*, ex Baldo a *POLLINIO*, et a *RAINERO*, ex Tyrol meridionali in monte *Tremals di Val di Ledro* in finibus *Brixien*sibus ad *Benacum* a *FACCHINIO*, ex districtu *Bassanensi* in sylvis *di Val di Saccon* prope *i Collalti* a *MONTINIO*, ex *Prätutiis* in monte *Acuto alle Pezze*, et in monte *San Bernardo* ab *Onesimo*, tum in sylvis *della Costa di Rutigliano* a *CACCHETTO*, ex sylvis *Nebrodim* in Sicilia ab *Eq. Gussone*. Floret a fine Maji ad Julium.

Radix fusiformis, aut fusiformi-ramosa, plus minus crassa, lignosa, rubido-fusca, collo squamis membranaceis, villosis tecta. Caules solitarii, vel duo-tres ex eadem radice, decumbentes, ascendentes, simplices, palmares-spithamales, sinuosi, parce foliosi, villis patulis hirsuti. Folia radicalia longe petiolata, interrupte pinnata cum impari, foliolis obovato-cuneatis, obtusis, obtusiuscule, aut vix acute dentatis, villosis, supra læte viridibus, subtus pallidioribus, terminalibus majoribus, ternatis, subsessilibus, medio insigniter

cuneato, lateralibus obliquatis, reliquis descendendo minoribus. Sæpe inter hæc foliola habetur unum, alterumve ramentulum foliaceum; parce dentatum, vel integrum. Petioli longi, hirsuti villis patentibus, basi utrinque aucti stipula ovata, aut lanceolata, acuta, integra, vel bifida, hirsuta. Folia caulina pauca, unum-duo, ternata, breviter petiolata, cæterum radicalibus similia, sed minora, et quandoque foliolis magis oblongis. Flores in corymbo terminali, paucifloro. Bractea ad divisiones corymbi bifida, vel trifida. Uterque calyx turbinatus, hirsutus, ejusdem longitudinis, interior tubo decemstriatus. Petala calyce duplo longiora, obovata, emarginata, flava. Reliqua generis.

ORDO III. TRIGYNIA.

RESEDA.

Lin. Gen. p. 242. Tourn. Inst. 2. t. 238. Juss. Gen. p. 245. Lamck. Ill. 4. t. 410. Vent. Tabl. 3. p. 122. Gærtn. De fruct. 1. p. 368. t. 76. Trist. in Ann. du Mus. d'hist. nat. tom. 18. p. 393. t. 21. fig. n. 2. Smith. Gram. t. 1. fig. 17., et Engl. Fl. 2. p. 346. Endl. Gen. p. 896. n. 5011.

Luteola, et Sesamoides Tourn. Inst. 2. t. 238.

Astrocarpus Neck. El. bot. 2. p. 243. n. 992.

Calyx perianthium liberum, quadri-sexpartitum, persistens, laciniis angustis, patentibus, inferiore a reliquis recessa. Petala quatuor-sex, decidua, ungue lato, coriaceo, concavo, mellifero, dorso carinato, carina infra apicem unguis laminifera, supremo, majore, reliquis decrescentibus, lamina superiorum tri-plurifida, inferiorum bifida, vel indivisa. Nectarium squama crassa, colorata, papillosa, in regione superiore floris protensa, semicircularis, vix in regione inferiore apparens, sita inter petala, et stamina, persistens. Stamina undecim-viginti, inter ovarium, et basim nectarii orta, plerumque reclinata, filamentis subulatis, antheris oblongis, bilocularibus, inenubentibus. Ovarium tri-quadricorne, vel quinqu-

-sexpartitum. Stili nulli, aut subnulli. Stigmata tot, quot apices ovarii, obtusa, papillosa. Capsula vel oblonga, unilocularis, angulata, vesicosa, basi angustior, apice tri-quadricornis, initio clausa, postea apice dehiscens, apertura per latus internum cornuum extensa, vel quinquelocularis, loculis sejunctis, basi attenuatis, corpori centrali communi, pedicellato affixis, stellatim patentibus, apice gibbere farcto auctis, infra gibberem latere interno stiligeris, inter stilum, et basim suam scissura ciliato-lacera dehiscens, monospermis, semine placenta parietali affixo. Semina reniformia, scabra, vel lævia.

Habitus. Plantæ annuæ, biennæ, aut perennes, sed vitæ brevis, glabræ, aut papilloso-scabræ. Caulis angulatus, fistulosus. Folia alterna, integra, pinnatifida, aut pinnata, decurrentia, sæpe undulata, basi utrinque dente aucta. Racemus spicaformis, simplex, conicus, demum laxiflorus. Ungues petalorum viriduli, nectaroides. Lamina alba, vel ochroleuca.

Ord. nat. Miscellanæ a *Lin. Ord. nat. n. LIV.*, et *Præl. p.* 594. Genera Capparidibus affinia *Juss. Gen. p.* 244. *Smith. Gram. p.* 140. *Vent. Tabl. 3. p.* 122. Resedacées *De Cand. Théor. élém. p.* 214. Resedacæ *Rich. Fam. nat. in Élém. éd. 5. p.* 189. *R. Brown. in Denh. and Clapp. trav. p.* 234. *Barl. Ord. nat. p.* 258. *Schultz. Nat. syst. p.* 442.

* *Capsula uniloculari.*

1. *RESEDA Luteola*: foliis lanceolato-linearibus, integris, dente baseos subulato; calycibus quadrifidis.
- R. Luteola Sp. pl. p.* 643. *Smith. Engl. Fl. 2. p.* 374., et *Engl. bot. v. 5. t. 320. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p.* 216. *Fl. Dan. t.* 864. *Svens. bot. v. 2. t. 82. All. Ped. 2. p.* 91. *n.* 1614. *Birol. Acon. 1. p.* 160. *Coll. Herb. Ped. 5. p.* 136. *n. 2. Nocc. et Balb. Ticin. 1. p.* 216., et 382. *Comoll. Com. 3. p.* 250. *Barb. Agg. p.* 32.* *Pollin. Ver. 2. p.* 95. *Sav. Pis. 1. p.* 448. *Ors. in Cap. Opus. p.* 286.* *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p.* 161. *Ten. Nap. 4. p.* 256., et *Syll. p.* 231. *n. 1. Ab. Ucr. Hort. Pan. p.* 194. *Guss.*

- Fl. Sic. prodr.* 1. p. 536., et *Sup.* 1. p. 146. *Presl. Sic.* 1. p. 112. *Moris. Sard.* 1. p. 192. *Desf. Atl.* 1. p. 373. *De Cand. Franc.* 4. par. 2. p. 725. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 380. *Koch. Syn.* p. 89. *Reich. Exc.* 3. p. 696. n. 444a., et *Cent.* 12. p. 22. tab. 99. fig. 444a. *Host. Austr.* 1. p. 567. *Gaud. Helv.* 3. p. 268. *R.* n. 1058. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 12. *Luteola Ard. Mem. ed osserv.* 1. p. 83. tav. 16. *Sturthio falso Matth. Valgr.* 1585. tom. 1. p. 619. fig. *Guadarella Casalp. De pl. lib.* 9. cap. 35. p. 388. *Reseda tinctorum*, *Salicis folio*, *Luteola dicta Cup. Hort. Cath.* p. 189. *Lutea Plinii Castell. Hort. Mess.* p. 14. *Pseudostruthium Camer. Epit.* p. 356. fig. *Ital. Bietola gialla. Biondella. Erba gialla. Erba guada. Erba guada maggiore. Guaderella de' tintori. Guaidone. Luteola spontanea. Luteolo. Luteolo salvatico. Molardina. Pannella Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 199. *Ann. Bienn. Legi Sarzanæ in colle di Sarzanello*, in alveo torrentis *Calcandola*, et in arvis ad *Macram*, Bononiæ prope *la Crovara*. Habui ex *Castiglione de' Pepoli* in Apennino Bononiensi a *MATTHEJO*, ex monte di *Bibbianello* in districtu Regiensi, et ex agro Mantuano in valle di *Sermide* a *BARBIERIO*, ex *Bormio* in *Valtellina*, ex Tyrolî meridionali in viciniis di *Merano*; et in valle *Venosta* a *FACCHINIO*, ex agro *Basanensi* ab *Eq. PAROLINIO*, ex *Sasso Feltrio* in subapennino *Ariminensi* ab *AZZAROLIO*, ex monte *S. Marini* a *Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTO*, *Anconâ* ad murum oppidi a *MARCHISIA*, ex *Piceno* a *S. Angelo* in *Pontano* a *MARZIALETTO*, ex monte *Cornu Prætoriorum* a *Forca di valle* ab *ORSINO*, ex *Hetruria* a *S. Donato* in *Polverosa*, in alveo *Arni alle Cascine*, a *Camaldoli*, et in *Montamiata* a *Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTO*, ex *Sardinia* occidentali in montanis di *Seneghi* a *Prof. DE NOTARIS*, ex *Corsica* a *Calvi* a *SOLEJROLIO*. Floret Majo, Junio. *Radix fusiformis*, aut *fusiformi-ramosa*, crassa, alba. *Caulis erectus*, striatus, vel *sulcatus*, fistulosus, simplex, aut superne ramosus, ramis alternis, a spithama ad tres pedes longus. Folia lanceolato linearia, obtusa, sessilia, sparsa, crebra, integerrima, plana, vel leviter undulata, basi utrinque instructa dente subulato, acuto, longiusculo. Racemus terminalis, spiciformis, simplex, initio brevior, densus, postea

elongatus, laxiusculus præsertim inferne. Flores brevissime pedicellati, plures glomerati in axilla bracteam linearis. Calyx quadrifidus, laciniis oblongis, obtusis, margine membranaceis. Petala tria-quinque, luteola, quorum superius majus, calyce paulo longius, habelato-laciniatum, laciniis quinque-sex, lineari-oblongis, obtusis, huic lateralia duo paulo minora, trifida, inferiora duo, ubi adsunt, minima, indivisa. Nectarium squamæforme, viridulum. Stamina circiter viginti, luteola. Ovarium tricorne. Stigmata sessilia in apice cornuum. Capsula parva, inferne ovoidea, apice tricornis, cornibus erectis, crassis, acutis. Semina reniformia, tumidula, lævissima, nitida, matura fusca. Tota planta glabra.

Usus. Decoctio herbæ inficit lanas colore luteo, vel mixta cum Indigofera dat colorem viridem.

2. *RESEDA crispata*: foliis lanceolato-linearibus, repando-undulatis, glandula baseos exigua, subrotunda; petalo superiore laciniis calycinis triplo longiore.

R. crispata Link. *En. alt.* 2. p. 8. n. 52. *Ten. Nap.* 4. p. 256., et *Syll.* p. 232. n. 4. *Guss. Fl. Sicul. prodr.* 1. p. 537.* et *Sup.* 1. p. 146.*

R. luteola β *Moris. Sard.* 1. p. 192. *Moris. et De Not. Capr.* p. 17.

Luteola Lusitanica, pumila, crispa *Tourn. Inst.* p. 424.

L. Lusitanica, minor, undulato folio *Tourn. Herb. in Mus. hort. Paris. ex Guss.*

Ital. Guaderella crespa.

Ann. Bienn. Habui ex Sicilia a *Boccadifalco* ab Eq. Gussone. Floret Majo, Junio.

Distinguitur a præcedente, cui valde proxima, herba glaucescente, caule jam inferne ramoso, foliis exquisite repando-undulatis, basi utrinque instructis glandula exigua, subrotunda, acuta, petalis duplo grandioribus, capsulis profundius tricornibus, cornibus tenuioribus.

3. *RESEDA lutea*: foliis inferioribus simplicibus, obverse lanceolatis, superioribus trifido-subbipinnatis, decurrentibus; calycibus sexpartitis; petalis superioribus trifidis; capsulis leviter tricornibus.

R. lutea *Sp. pl.* p. 645. *Smith. Engl. Fl.* 2. p. 348. excl. syn. *Lob., et Engl. bot. v.* 5. t. 321. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 216. *Jacq. Austr.* 4. p. 28. t. 353. *Bull. Herb. de la Franc.* t. 281. *Lamck. Ill.* 5. t. 410. fig. 1. *All. Ped.* 2. p. 91. n. 1615. ex synon., et loco, non ex herb. *Balb.*

- Taur.* p. 76. *Re Seg.* p. 40., et *Tor.* 1. p. 252. *Birol.*
Acon. 1. p. 160. *Coll. Herb. Ped.* 5. p. 137. n. 4. *Nocc.*
 et *Balb. Tic.* 1. p. 216., et 382. *Comoll. Prodr.* p. 91.
 et *Com.* 3. p. 251. *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn.*
dec. 2. t. 10. p. 285.* *Pollin. Ver.* 2. p. 95. *Ruch. Ven.*
 p. 118. *Moric. Ven.* 1. p. 211. *Nacc. Ven.* 3. p. 45. *Suffr.*
Foroj. p. 144. *Bert. Pl. Gen.* p. 63., et *Amæn. Ital.*
 p. 152. n. 133., et *Lucubr.* p. 14. n. 71. *Sebast. et Maur.*
Fl. Rom. prodr. p. 161.* *Ten. Nap.* 4. p. 256., et *Syll.*
 p. 232. n. 3. *A. B. C. Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 195. *Guss.*
Fl. Sic. prodr. 1. p. 538. a. b.*, et *Sup.* 1. p. 147.* *Presl.*
Sic. 1. p. 113. *Moris. Sard.* 1. p. 189. a. β. γ. excl. syn.
Lob. et Bocc. Desf. Atl. 1. p. 374. *De Cand. Franc.* 4.
par. 2. p. 727. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3.
 p. 380. *Koch. Syn.* p. 89. *Reich. Exc.* 3. p. 696. n. 3446.,
 et *Cent.* 12. p. 22. t. 100. fig. 4446. *Host. Austr.* 1. p. 568.
Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 332. excl. syn. *Ard. Gaud.*
Helv. 3. p. 269.
R. mucronata Tin. Cat. pl. hort. reg. Pan. ann. 1827.,
 p. 212., et 280.* pl. macrior.
R. mucronulata Guss. Sup. 1. p. 147.*
R. n. 1056. a. *Hall. Hist. Stirp. ind. Helv.* 2. p. 11.
Sesamoides alterum Cæsalp. De plant. lib. 9. cap. 34.
 p. 388.
Reseda vulgaris Cup. Hort. Cath. p. 189. *Segui. Ver.* 2.
 p. 113. n. 1.
R. Phyteuma dicta major et incisiori folio Bonann. Panph.
tab. 40. bona.
R. vulgaris, seu major Thalii Zannich. Opusc. posth.
 p. 15.
R. lutea Lugd. Hist. 2. p. 1199. fig.
R. massiliensis foliis latioribus crispis Pluk. Phyt. t. 55.
 fig. 4. excl. syn. *Bocc.*
Ital. Guaderella crociata.
Ann. Bienn. Perenn. Legi Sarzanæ in viis circa oppidum,
 et sub *Vezzano*, in provincia Lunensi a *Calice* in ad-
 scensu di *Giovagallo*, Genuæ extra portam del *Zer-*
bino, Bononiæ in collibus di *Casalecchio*. Habui ex mu-
 ro oppidano Bergomi a *BERGAMASCHIO*, Mantuæ a *Por-*
to a *BARBIERIO*, ex Tyroli Italico a *Predazzo di Fiem-*
me, et a *Capriana* a *FACCHINIO*, et a *MENECHINIO*,
 et in viis prope *Cavallese* ab Eq. *PAROLINIO*, ex alveo
 torrentis *Scillan alle Marchesane d'Angarano* a *MON-*
TINIO, ex ruderatis circa *Tergestum* a *BIASOLETTO*, et
 a *TOMMASINIO*, ex agro Ariminensi a *MASQUILLIERIO*,

ex monte *Pelio* in districtu Urbinati a *BIANCONIO*, Senogalliâ in pratis a *SALVATORIO*, Anconâ prope oppidum a *MARCHISIA*, ex Piceno ad S. Elpidium a *Rev. Fratre MAURITIO DE BRIXIA*, et in muro oppidano *Maceratæ* a *Prof. UTILI*, ex Prætutiis *alle Figliole* ab *ORSINO*, ex Hetruria in viciniis *di Livorno* a *Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO*, in alveo fluminis *Cecina* ab *AMIDEO*, in sylva *del Mattioli*, et *della Monaca* prope *Senas* a *Prof. GIULIO*, et ad balnea S. Philippi in *Montamiata* a *Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO*, *Viterbio*, Româ, et a *Nemi* a *Prof. MAURIO*, iterum Româ in ruderatis a *MAJERO*, ex Sicilia a *Rivera* ab *Eq. GUSSONIO*, ex Ilva a *Portolongone* a *Prof. PETRO SAVIO*, ex Corsica a *Calvi* a *SOLEIROLIO*. Floret a Majo in æstatem.

Radix ut in *Reseda Luteola*, sed gracilior. Caulis decumbens, adscendens, sæpe cæspitosus, angulatus, albens, spithamalis-bipedalis, simplex, vel alterne ramosus. Folia radicalia, et caulina ima simplicia, obverse lanceolata, acutiuscula, vel obtusa, longe petiolata, reliqua pariter longe petiolata, trifida, laciniis modo simplicibus, modo iterum divisis, scilicet media denuo bi-trifida, lateralibus bifidis, vel simplicibus, omnibus decussive decurrentibus, modo angustis, linearibus, longis, modo latoribus, brevioribus, lanceolatis, planis, leviter, aut exquisite undulatis, sæpe margine papilloso-scabris, obtusis, vel acutiusculis, subinde etiam acutis, et setula mucronatis. Petiolorum ala basi cuneata, et denticulo calloso utrinque aucta. Racemus spicæformis, terminalis, initio brevior, densus, conicus, postea elongatus, laxiflorus præsertim inferne. Bractea sub quovis pedicello linearis, angustâ, illum æquans, aut paulo superans, lateribus albo-membranacea, medio viridis, cito diffusa. Pedicelli tennes, longiusculi. Calyx sexpartitus, laciniis anguste linearibus, in fructu non auctis, et pedicello multo brevioribus. Petala sex, pallide lutea, tria superiora calyce paulo longiora, trifida, laciniis lateralibus majoribus, semilunatis, subcrenatis, media minore, lineari, integra; petala duo proxima calyce breviora, bifida, lacinia altera semilunata, altera lineari, paulo breviora; petalum imum lineare, indivisum. Stigmata sessilia. Capsula oblonga, basi angustior, apice brevissime tricornis, et fere truncata, trigona, trilatæra, papilloso-scabra, calyce ter-quater-quinq̃ies longior. Semina reniformia, scu

potius conduplicato-pyriformia, crusculo radicellari longiore, glabra, nitida, matura nigra. Herba hio illio papilloso-scabra.

Passim affertur ad hanc speciem *Reseda Plinii neoterico-rum* Lob. Adv. p. 76. fig., quæ foliis ab imo ad summum longa serie pinnatis, nec longe petiolatis trifidis, evidenter pertinet ad *Resedam suffruticulosam* L. Idem dicatur de *Reseda crispa gallica* Boec. Sic. p. 77. fig. p. 76. tab. 41., quæ eandem *Resedam suffruticulosam* foliis exquisitè undulatis representat.

4. *RESEDA gracilis*: caulibus cæspitosis, decumbentibus, ramosissimis; foliis trifido-subbipinnatis, laciniis linearibus angustissimis, mucronulatis; capsulis profunde tricornibus.

R. *gracilis* Ten. Nap. 4. p. 257. tab. 230. fig. 2.* et Syll. p. 232. n. 5.* Reichenb. Cent. 12. p. 22. t. 102. fig. 4446. b.

Ital. *Guaderella sottile*. Ann. Perenn. Habui ex Lucania prope Castelluccio ad sepes ad Eq. Prof. TENORIO, ex eodem loco, et ex Calabria ab Eq. GUSONIO. Floret. Majo, Junio.

Habitus præcedentis, sed multo gracilior. Caules cæspitosi, decumbentes, ramosissimi, subpedales. Foliorum laciniæ angustissimæ, lineares; apice setula mucronulata. Flores vere exigui. Capsula multo minor, et profunde tricornis. Reliqua simillima.

5. *RESEDA suffruticulosa*: canle erecto; foliis ab imo pinnatis, planis, undulatisve; petalis omnibus trifidis, floribus tetragynis.

R. *suffruticulosa* Sp. pl. p. 645. Smith. in Rees's Cycl. v. 30. n. 7. Hook. Brit. Fl. ed 2. p. 217., et Engl. bot. sup. v. 1. t. 2628. Jacq. Ic. rar. 3. p. 5. t. 474. Ten. Nap. 4. p. 257.* et Syll. p. 232. n. 8. A. B.* Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 537. a. b. c.* et Sup. 1. p. 146. a. b. c.* Host. Austr. 1. p. 567. Reich. Exc. 3. p. 696. n. 4449., et Cent. 12. p. 22. t. 101. fig. 4449.

R. *alba* Sp. pl. p. 645. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 323., et Fl. Græc. 5. p. 46. t. 459. Smith. in Rees's Cycl. v. 30. n. 8. Boiss. Voyag. en Esp. p. 75. n. 216. All. Ped. 2. p. 91. n. 1616. Coll. Herb. Ped. 5. p. 138. n. 6. correct. syn. Pollin. Ver. 2. p. 97. Ruch. Ven. p. 118. Nacc. Ven. 3. p. 45. Ors. in Cap. Opusc. p. 286.* Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 162.* Moris. Sard. 1. p. 190. α. β.* Desf. Atl. 1. p. 374. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 726.* et 5. p. 599. β.* Reich. Exc. 3. p. 696. n. 4448., et Cent. 12. p. 22. t. 101. fig. 4448.

- R. undata* *Ab Ucr. Hort. Pan. p. 195.* non Linn. *Sebast. Rom. pl. fasc. 2. p. 66. Ten. Nap. 4. p. 257. A. B.**, et *Syll. p. 252. n. 6.* Presl. Sic. 1. p. 112. excl. syn. Columb., et Bonann. De Cand. Franç. 4. part. 2. p. 726. Host. Austr. 1. p. 568. Reich. Excurs. 3. p. 696. n. 4447., et Cent. 12. p. 22. t. 101. fig. 4447.*
- R. myriophylla* *Ten. Nap. 4. p. 258., et Syll. p. 232. n. 7. pl. fol. planis.*
- R. foliolis alternis integerrimis, fructibus tetragynis* *All. in Misc. Taur. 1. p. 100.*
- Sesamoides cubitalibus ramis &c. Casalp. De pl. lib. 9. cap. 34. p. 388.*
- Reseda minor incisus foliis* *Barrel. Ic. 587.*
- R. crispa gallica* *Bocc. Sic. p. 77. fig. p. 76. tab. 41. fig. III.*
- R. vulgaris, major, flore candido, foliis crispis latioribus* *Cup. Hort. Cath. p. 189.*
- R. folio Calcitrapæ flore albo* *Moris. Hort. reg. Bles. p. 176.*
- R. Plinii neotericorum* *Lob. Adv. p. 76. fig., et Ic. p. 222. pl. macrior.*
- R. maxima* *Lob. Obs. p. 110. fig. pl. luxur.*
- R. candida* *Lugd. hist. 2. p. 1199. fig.*
- Ital. Erba ruchetta.*
- Ann. Suffruticul.* Legi in Campania felici in ruinis Pompejorum, et ai Ponti Maddaloni. Habui Genuâ agli Angeli a Prof. SASSIO, ex *Paise dell'Adige* a FACCHINIO, ex agro Regiensi in alveo torrentis Lenza, et ex litore Adriatico al Cesenatico a BARBIERIO, ex litore Ariminensi a Prof. ANT. TARGIONIO TOZZETTIO, Anconâ a MASQUILLIERIO, ex litore ad Cupram maritimam a PASSERINIO, ex portu ad S. Elpidium, et a *Recanati* ab Eq. NARDUCCIO, ex Prætutiis ad Juliam novam, et *Pescara* ab ORSINO, Româ, ubi vulgaris in maceris, a Prof. MAURIO, et in rudibus amphitheatri Flavii a BARBIERIO, Terracinâ a FIORINIA-MAZZANTIA, Neapoli in muris a GASPARRINIO, et a BRUNERO, Puteolis a VANDERLINDENIO, ex Apulia ad Barium ab Eq. Prof. TENORIO, et al *Tavoliere* ab Eq. GUSSONIO, et in cultis di *Fiesti* a GASPARRINIO, ex Sicilia ad salinas, et ex Cosyra ab Eq. GUSSONIO, ex insula Caprearum a Prof. GIRALDIO, ex maritimis Sardinie ab Eq. Prof. MORISIO, et ad sepes Calaritanas a Prof. DE NOTARIS, ex Corsica a Bonifacio a SOLEXOLIO. Floret a Majo in autumnum.
- Radix præcedentium, interdum valde crassa. Caulis erectus, vel ascendens, angulatus, striatus, fistulosus,

mire ludens longitudine, scilicet a spithama ad tres pedes, modo solitarius, modo plures ex eadem radice, cæspitosi, simplex, vel alterne ramosus, subinde inferne valde crassus, et persistens. Folia radicalia cæspitosa, caulina sparsa, crebra, ludunt plana, aut leviter, aut exquisite undulata; omnia ab imo ad summum pinnata cum impari, pinnis numerosis, oppositis, alternisve, horizontalibus, vel recurvis, decurrentibus, margine cartilagineo-scabris, lateralibus subæqualibus, aut interrupte minoribus, nunc angustis, linearibus, acutiusculis, vel acutis, nunc latioribus, ovatis, obovatis, lanceolatis, obtusis, vel acutis, impari modo elongato, sive lateralibus proximis circiter duplo longiore, modo æquali, aut brevior, et interdum quoque cæteris latiore. Denticulus callosus, acutus utrinque in basi foliorum. Racemus terminalis, spicæformis, conicus, initio brevior, densus, et sæpius crassus, postea elongatus, laxatus, præsertim inferne. Bractea linearis, vel lanceolato-linearis, acuta, aut acuminata sub quovis pedicello, cui subæqualis, vel longior, margine membranacea. Pedicelli longitudine calycis, aut longiores, erecto-patuli, subinde nutantes. Calyx quinquepartitus, raro, et in valde luxuriantibus plantis tantum vidi sexpartitum, laciniis lanceolato-linearibus, acutis, margine membranaceis. Petala quinque, alba, calyce longiora, trifida, laciniis obtusis, nunc latiuscule, nunc anguste linearibus, præsertim media. Stamina undecim-quatuordecim, corolla paulo breviora. Ovarium plerumque quadricorne, rarius tricorne. Stigmata sessilia, tot, quot cornua ovarii, quibus insident. Capsula formæ ludibundæ, nunc brevior, obovata, nunc oblongata, acute tetragona, rarius trigona, lateribus undulatis; dum longior, calycem quater, et quinquies excedit, sed passim brevior occurrit; cæterum glabra, recta, vel lusu arcuata, apice breviter quadricornis, rarius tricornis, cornibus recta patulis, aut recurvis. Semina reniformia, atris concentricis, granulato-scabris instructa, flavida. Tota planta glabra.

Hæc forte est planta illa, de qua sic ait Plinius: "Circa Ariminum nota est herba, quam Resedam vocant," Nat. hist. lib. 27. cap. 12. Profecto Resedæ species solennis est universæ oræ Adriaticæ nostræ. Lobelius eam observavit a litore Ravennati ad Pisaurense, descripsitque in Adv. p. 76. dans figuram plantæ macrioris foliis

planis, quam cum exhibeat foliis ab imo ad summum pinnatis, facile evincit, se agere de *Reseda suffruticulosa*, non de *Reseda lutea* L., ut haecenus perperam putarunt. Rem confirmavit in Observ. p. 110., ubi figuram ejusdem plantæ luxuriantis suppeditavit. Foliis pari pacto ab imo ad summum pinnatis gaudet *Reseda crispa gallica* Bocc. Sic. p. 77.; quare hæc quoque refert *Resedam suffruticulosam* L., sed foliis exquisito crispatis, neque lusui *Resedæ luteæ* attribui potest cum Linnæo, Smithioque, botanicis Galliæ hac de re silentibus.

Stirps valde ludibunda; quare non judicandum de ea ab individuo, sed a pluribus individuis simul conlatis. Idem enim cæspes suppeditat formam *Resedæ suffruticulosæ* L., et *Resedæ albæ* L. Hinc est, quod Gussoneus videtur in herbario Linnæano exemplaria sub hisce nominibus vix discrepantia inter se, ut monet in Sup. i. p. 146. At *Reseda undata* L. differt quam certissime a *Reseda suffruticulosa*, neque in Italiâ occurrit, cum Hispaniæ tantum sit solemnis. Eadem distinguitur floribus minoribus, ochroleucis, subsessilibus: "Flowers smaller than in either of the last (*R. fruticulosa* L., et *R. alba* L.), and of a less pure white, composing very long clusters, or rather spikes; for each flower is nearly sessile", Smith. in Rees's Cycl. v. 30. Res. n. 9. Insuper Gussoneus in exemplari Linnæano vidit, capsulam ejus esse fere obovato-truncatam, et dimidio minorem, quam rem animadvertit quoque Smithius, qui, cum Linneus in Sp. pl. p. 645. dixerit, capsulam esse forte hujus generis maximam, suspicatus est, id ex alia specie fuisse desumptum: "We have great doubts, whether the specimen from which Linnæus took his remark of the great size of the capsules really belongs to this species.", Cæterum huic *Resedæ undatæ* L. mihi omnino respondere videtur *Reseda Gayana* Boiss. Voyag. bot. en Esp. i. p. 76. tab. 21., melius quam *Reseda undata* ejusdem l. c. p. 75. tab. 20. Quod si ita se habet, tunc novissima hæc dicenda erit *Reseda Barrelieri*, cum *Reseda minor alba dentatis foliis* Barrel. Ic. 588. ad eam evidenter pertineat.

Indubium est, caulem *Resedæ suffruticulosæ* quandoque inferne perennare, idque bene novit Linnæus, et indicavit in Sp. pl. l. c. Quare Smithio adsentiri nequeo, qui in Rees's Cycl. vol. 30. Res. n. 7. putat, Linnæum errore suffruticulosam pro fruticulosa dixisse speciem.

Hæc planta occurrit quoque in ora maritima Dalmatiæ, unde obtinui a Biasoletto, aliisque.

6. *RESEDA* *Phyteuma*: foliis simplicibus, trifidisve; calycibus sexpartitis, in fructu maximis.

R. Phyteuma *Sp. pl.* p. 645. *Jacq. Austr.* 2. p. 20. tab. 132. *All. Ped.* 2. p. 92. n. 1617. *Re Seg.* p. 40. *Coll. Herb. Ped.* 5. p. 137. n. 3. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 217., et 382. *Pollin. Ver.* 2. p. 96. *Suffr. Foroj.* p. 144. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 286. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 162. *Ten. Nap.* 4. p. 256., et *Syll.* p. 231. n. 2. *Presl. Sic.* 1. p. 113. *Desf. Atl.* 1. p. 375. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 727. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 381. *Koch. Syn.* p. 89. *Reich. Excurs.* 3. p. 696. n. 4423., et *Cent.* 12. p. 22. t. 99. fig. 4445. *Host. Austr.* 1. p. 568. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 332. *Gaud. Helv.* 3. p. 270. *R. n.* 1057. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 12.

Sesamoides tertium Casalp. De pl. lib. 9. cap. 34. p. 388.

Erucago *Apula* trifida, et quinquefida *Column. Ecphr.* 1. p. 267. fig. p. 269.

Fiteuma d'alcuni appresso il *Dalecampio* *Pon. Mont. Bald.* p. 132.

Reseda *Phyteuma* dicta *Cup. Hort. Cath.* p. 189.

R. minor, vulgaris, foliis integris. *Phyteuma* quorundam

Zannich. Opusc. posth. p. 86. *Segui. Ver.* 2. p. 113. n. 1.

Phyteuma quorundam, *Dalechampii* *Lugd. hist.* 2. p. 1198. fig.

Resedæ affinis *Phyteuma* *C. B. P.* p. 100. n. 6., et *Prodr.* p. 42. fig.

Phyteuma *J. Bauh. Hist. pl.* 3. lib. 29. p. 386. fig.

Ital. Reseda salvatica.

Ann. Copiosa in collibus Bononiensibus, ubi legi a *S. Rusfello*, in monte *Donato* ad gypsa, a *Barbiano*, et in monte *Paderno*. Habui ex Liguria occidua a *Sestri di ponente* a *GRIOLETO*, Veronâ in vallo a *RAINERO*, et a *POLLINIO*, ex saxosis agri Tarvisini ad vallem *S. Zibii* a *MAJERO*, ex Euganeis prope *Battaglia* a *MONTINIO*, et a *Prof. VISIANIO*, ex agro Maceratensi ad *Cilentum* ab *Eq. NARDUCCIO*, ex oris Fucini a *Pescina*, et *Paterno* ab *Eq. GUSSONIO*, ex agro Pisano ab *Eq. Prof. SAVIO*, Volaterris ab *AMIDEO*, ex provincia Senensi a *Pitigliano* a *Prof. GIULIO*, et ad balnea *S. Philippi* a *Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO*, ex agro Viterbiensi a *CAMILLIO*, et a *Canino* a *Rev. Fratre MAURITIO DE BRILIA*, ex Ciminis, et Româ a *Prof. MAURIO*, ex rudibus Fori Romani, et Amphitheatri Flavii,
Flor. Ital. T. V.

ubi copiosa, a BARRIERTO, ex Ilva ai Magazzini a Prof. PETRO SAVIO. Floret Majo, Junio, et etiam autumnio. Radix fusiformis, aut fusiformi-ramosa, modo gracilis, modo crassa. Caules sæpe e radice plures, cæspitiosi, rarius solitarii, decumbentes, ascendentes, vel erecti, angulati, simplices, aut inferne ramosi, spithamales-dodrantaes. Folia modo omnia indivisa, obverse lanceolata, obtusa, vel acutiuscula, modo inferiora indivisa, superiora trifida, rarissime quinquefida, segmento medio grandiore, ovato, aut lanceolato, lateralibus angustioribus, et brevioribus; cæterum omnia folia undulata, vel plana, inferiora in petiolum longum cuneata, superiora sessilia, aut subsessilia. Flores in racemo terminali, simplici, initio densiusculo, præsertim apice, mox toto laxifloro. Pedicelli longiusculi, floriferi erecto-patuli, fructiferi nutantes. Sub quovis pedicello bractea linearis, obtusa, ipso brevior, persistens, margine albo-membranacea. Calyx sexpartitus, raro quinquepartitus, laciniis quidquam inæqualibus, lanceolato-spathulatis, obtusis, patentibus, in fructu insigniter auctis, maximis. Corolla alba, calyce brevior. Petala sex, quatuor superiora majora, multifida, laciniis anguste, et obverse lanceolato-linearibus, acutis, duo inferiora simplicia, angustissima. Ovarium breviter tricorne, cornibus acutis, stiloque brevissimo terminatis. Capsula turbinato-ovoidea, grandior quam in reliquis speciebus nostris, inflata, hexagona, angulis subinde scabridis, ex cornibus brevissimis hiantibus fere truncata. Semina reniformia, ruguloso-scabra. Tota planta lævis, vel caulis, et pedicelli hic illic corpusculis callosis scabri. Facies *Reseda odorata* L., sed flores non ita grate olentes, et calyces in fructu maximi cito distinguunt.

**** Capsulæ loculis quinque, sejunctis.**

7. *RESEDA sesamoides*: foliis indivisis, lanceolatis, linearibusve; fructibus stellatis.
R. sesamoides Sp. pl. p. 644. All. Ped. 2. p. 92. n. 1618. t. 88. fig. 3. Coll. Herb. Ped. 5. p. 136. n. 1. Moris. Sard. 1. p. 193.* De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 725.* et 5. p. 599.* et Ic. pl. Gall. rar. p. 12. t. 40.*
Astrocarpus sesamoides β De Sal. in Bot. zeit. ann. 1834. p. 73.
A. sesamoides Reich. Exc. 3. p. 695. n. 4441., et Cent. 12. p. 22. t. 99. fig. 444r.

Phyteuma Monspel., et Sesamoidea quorundam *Gesm. Op. bot. ed. Schm. p. 125. n. 66. fig. ar. sculpt. tab. 8. fig. 66.*

β foliis omnibus subrotundo-spathulatis, obtusissimis.

Reseda sesamoides β *Moris. Sard. i. p. 193.**

Astrocarpus sesamoides α *De Sal. in Bot. zeit. ann. 1834. p. 73.*

Ital. *Sesamoide. Reseda stellata.*

Perenn. Legi in Liguria occidua in alpibus della *Scaggia* retro *Pegli*, ubi copiosa, et in montibus dell' *Acquasanta* retro *Voltri*. Habui ex Liguria orientali in monte *Biscia* districtus *Clavarensis*, et in Apennino inter *le Cabanne*, et *Resoagni* a *TURIO*, ex collibus Sardinie ab Eq. Prof. *MORISIO*, ex Corsica a *Portovecchio*, et in monte *Coscione* a *SERAFFINIO*, in monte *Grosso* a *SOLEIROLIO*. Varietatem β accepi ex collibus siccis Sardinie inter *Domus novas*, et *Flumini* ab Eq. Prof. *MORISIO*. Floret Majo, Junio.

Radix ut in præcedente, longa, alba. Caules e radice plures, cespitosi, decumbentes, ascendentes, vel erecti, tenues, striati, ab uno, aut duobus pollicibus ad dorantem longi, simplices, vel basi ramosi. Folia radicalia rosulata, longe petiolata, lanceolata, aut oblongo-spathulata, obtusa, in macrioribus individuis lanceolato-linearibus, caulina sessilia, sparsa, numerosa, linearia, apice latiusculo, subspathulato, vel obverse lanceolata, obtusa, aut acutiuscula; omnia crassiuscula, integerrima, plana, vel undulata. Racemus spiciformis, terminalis, initio densiflorus, conicus, postea elongatus, laxiflorus. Bractea ovata, vel oblonga sub quovis pedicello, acuta, aut obtusa. Calyx sexpartitus, subinde quinquepartitus, laciniis oblongis, obtusis, inæqualibus, patentibus, demum reflexis. Corolla alba, calyce duplo, et etiam paulo ultra longior. Lacinie petalorum obverse lanceolatae, obtusae. Stamina decem-duodecim, antheris flavis. Ovarium pedicellatum, quinquepartitum, segmentis erectis, apice gibbis, infra gibberem stiligeris. Capsula thecaphoro cylindraceo, crassiusculo suffulta, quinquelocularis, loculis distinctis, monospermis, latere interno valvis ciliato-laceris dehiscentibus, circa apicem thecaphori stellatim patentibus. Semina reniformia, turgidula, minutissime granulato-scabra, maturata nigra. Tota planta glabra.

Varietas β distinguitur foliis omnibus subrotundo-spathulatis, obtusissimis, segmentis calycinis obovatis.

Figura Allionii superius allata bene exhibet plantam luxuriantem, foliis omnibus lanceolatis præditam, quo in statu mihi raro occurrit. Figura vero De Candollii sistit lusum foliis angustissimis, linearibus. Profecto hujusmodi folia passim habentur in caule, non vero circa radicem, et, si recte video, quæ folia in figura pro radicalibus data sunt, ad ramulos steriles, non ad folia radicalia pertinent.

Reseda odorata L. passim colitur in hortis Italiæ ob gratum florum odorem, sed planta advena est.

EUPHORBIA.

Lin. Gen. p. 243. Juss. Gen. p. 385. Lamck. Ill. 5. t. 411. Vent. Tabl. 3. p. 486. Smith. Engl. Fl. 4. p. 58. Roep. En. Euph. p. 11. 12. Endl. Gen. p. 1108. n. 5766.

Tithymalus Tourn. Inst. 2. t. 18. Gærtn. De fruct. 2. p. 115. t. 107.

Perigonium (calyx *Linn.*) simplex, monophyllum, campanulatum, octo-decemfidum, laciniis alteruis terminatis nectario (petalum *Linn.*) horizontali, polymorpho, sæpe lunulato, subinde nudis, tuncque nectarium scyphiforme in dorso perigonii. Receptaculum paleaceo-ciliatum. Stamina duodecim-plura, successive evolvenda, filamentis articulatis, antheris didymis, et veluti bicorporeis, loculis subrotundis, conjectivo sejunctis. Ovarium stipitatum, rarius subsessile. Stili tres, bifidi. Stigmata obtusa, simplicia. Capsula thecaphoro suffulta, subrotundo-trigona, tricocca, coccis elastice bivalvibus, in latus declinata; rarius subsessilis, erecta, subindehiscens. Semina in quovis loculo solitaria, ovoidea, aut subglobosa, rarius tetragona, prope insertionem funiculi umbilicalis sæpe instructa arillo crasso, carunculoso, sessili, vel stipitellato.

Habitus. Plantæ polymorphæ, annuæ, perennes, suffrutescæ, frutescæ, omnes turgidæ lacte albo, acri, gummoso-resinoso, aliæ carnosæ, exoticæ, aliæ lignosæ, vel herbacæ, quarum plures nostrates.

Caulis prostratus, decumbens, adscendens, erectus, simplex, vel ramosus. Folia simplicia, opposita, vel alterna, sparsa. Flores in aliis solitarii, terminales, et alares, in aliis corymboso-capitati, in aliis, imo in majori numero, spurie umbellati, umbellæ radiis plerumque decompositis. In umbellatis foliola involucri universalis sequuntur numerum radiorum, ideo tria-plura, involuella numerum radiolorum, ideo di-triphylla. Nectaria lutescentia, alba, dilute, vel saturate purpurea, evidenter glandularia, et ab insectis circumvolitantibus continuo depasta. Capsula ludit lævis, muricata, verrucosa, glabra, vel villosa. Semina lævia, aut tenuissime granulata, vel rugulosa, vel foveolis scrobiculata, sæpe velo albo-cinereo obducta. Flores passim hermaphroditi, subinde nonnulli unisexuales his immixti.

Observ. Jussæus Gen. p. 386. ob stamina articulata, seu stipitata, successive evolvenda, et paleis stipitata dubium movit, an singulum stamen habendum esset pro flore masculino, monandro circa unicum fœmineum intra involucrum commune, ita ut genus hoc pertineat ad classem monoeciam. Sententiam hanc recentiores fere omnes amplexi sunt, puto novitatis causa; non enim juxta consuetum naturæ ductum se habet.

Ord. nat. Tricoccæ *Lin. Ord. nat. n. XXXVIII., et Præl. p. 474.* Euphorbiæ *Juss. Gen. p. 384. Smith. Gramm. p. 184. Tithymaloideæ Vent. Tabl. 3. p. 483.* Euphorbiacæ *R. Brown. in Flind. Voy. 2. p. 555. Bartl. Ord. nat. p. 369. Schultz. Nat. syst. p. 244. Rich. Famill. in Nouv. él. éd. 5. p. 225. Roep. En. Euph. p. 10.*

* *Dichotomæ, floribus solitariis, vel corymbulosis. Chamesycæ.*

1. *EUPHORBIA trinervis*: caule ascendente, erectove; foliis oblongis, serrulatis, oblique cordatis; corymbulis dichotomis, contractis; nectariis integris; seminibus tetragonis, transverse rugosis.

E. maculata Mant. alt. p. 392. non Sp. pl. Willd. Sp. pl. 2. par. 2. p. 896. excl. Jacq. Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec. 2. tom. 10. p. 285.* Pollin. Viag. al lag. di Gard. p. 126.* et Ver. 2. p. 98.* Reich. Exc. 3. p. 755. n. 4752., et Cent. 15. p. 2. t. 131. f. 4752. pl. macra, excl. fig. perig. et caps.

E. androsæmifolia Presl. Del. Prag. p. 57., et Fl. Sic. 1. p. XL.

E. Preslii Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 539.* et ibid. in add. p. 11.* et Sup. 1. p. 147.* Ten. Nap. 4. p. 258., et Syll. p. 233. n. 2. Fior. in Giorn. de' letter. Pis. ann. 1828. tom. 17. p. 120.*

E. hypericifolia Jan. El. p. 7.

Ital. Peglio macchiato.

Ann. Legi Romæ in villa Albani, unde habui quoque a FIORINIA-MAZZANTIA. Accepi ex agro Mantuano a Valleggio a BARBIERIO, ex agro Veronensi, ubi vulgatissima inter segetes, a POLLINIO, et in campis d' Avesa a RAINERO, ex arvis Patavinis a MONTINIO, ex cultis Panormitanis ab Eq. GUSSONIO. Floret ab Julio in Octobrem.

Radix fusiformis, vel fusiformi-ramosa, flexuosa. Caulis adscendens, aut erectus, teres, alterne ramosus, luxurians superne dichotomus, a palmo ad pedem, et etiam quidquam ultra longus, glaber, vel in latere pubescens, in apice fusce rubens. Folia opposita, brevissime petiolata, oblique cordata, ovato-oblonga, obtusa, extus in toto margine, intus in margine tantum superiore serrulata, trinervia, et subinde quinquenervia, nervo utrinque externo brevissimo, supra late viridia, et juniora macula fusco rubente notata, subtus pallidiora, glabra, vel pilosa, modo tota opaca, modo crebre pelucido-punctata, interdum subfalcata. Utrinque inter petiolos stipula brevis, triangularis, acuta, ciliata. Flores in corymbulis terminalibus cauli, ramisque, abbreviatis, dichotomis, ad divisiones foliolatis, foliolis angustis, semilanceolatis, serrulatis. Perigonium admodum parvum. Nectaria exigua, subrotunda, integra, alba, vel una cum perigonio purpureo-rubella. Capsula acute trigona, lævis, glabra. Semina ex ovoideo tetragona, lateribus transverse rugulosa, nigrescentia cum velo cinereo, ecarunculata.

Retinui nomen specificum, quo olim, et ante alios distinxi hanc plantam, atque ad botanicos misi. In tabula Reichenbachii superius allata figuræ perigonii, et

capsulæ auctæ, et seorsim positæ a Jacquino mutuatæ sunt, et pertinent ad veram *Euphorbiam maculatam* Sp. pl. p. 652. Jacq. Hort. Vind. 2. p. 87. t. 186., quæ longe distat ab *Euphorbia trinervi* nostra caule prostrato, ramosissimo, toto quanto, ut Jacquini verbis utar, telluri pressissime incumbente, et ut habet Torreyus in Comp. of the Flor. of the north. and. middl. stat. p. 331. "spreading flat on the ground,,. Insuper folia ejus sunt longe angustiora, et fere linearia, flores axillares, capsulæ pilosæ, patria America septentrionalis. *Euphorbia trinervis* multo magis appropinquat *Euphorbiam hypericifoliam* L., ut jam monui in Misc. bot. tert., quæ Academiæ scientiarum Institutii Bononiensi anno superiore decedente obtuli, et quæ mox in Commentariis novis ejusdem Academiæ prodibunt. Attamen Linnæi planta differt a nostra caule crassiore, foliisque glaberrimis, stipulis lanceolatis, floribus magis conglobatis, perigoniiis, capsulisque dimidio minoribus.

2. *EUPHORBIA Chamæsyce*: caule prostrato, dichotomo; foliis subrotundis, crenulatis, basi obliquatis; floribus solitariis; nectariis tridentatis.

E. Chamæsyce Sp. pl. p. 652. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 324., et Fl. Græc. 5. p. 48. t. 461. All. Ped. 1. p. 283. n. 1030. A. B. Birol. Acon. 1. p. 160. Coll. Herb. Ped. 5. p. 119. n. 4. Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Gior. dec. 2. tom. 10. p. 285. Pollin. Ver. 2. p. 99. Morett. in Mem. 1. p. 267. Ruch. Ven. p. 118. Moric. Ven. 1. p. 378. Nacc. Ven. 3. p. 46.* Sav. Pis. 1. p. 450. Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 162.* Ten. Nap. 1. p. 260., et Syll. p. 233. n. 3. A. B. C. Ab Ucr. Hort. Pan. p. 197. Guss. Fl. Sic. prod. 1. p. 539. a. b.*, et Sup. 1. p. 147.* De Cand. Franç. 3. p. 330. Rosp. En. Euph. p. 58. n. 1. α. β. Koch. Syn. p. 627. Reich. Exc. 3. p. 755. n. 4750., et Cent. 15. p. 2. t. 131. f. 4750. Host. Austr. 2. p. 556.

E. canescens Sp. pl. p. 652. Jacq. Collect. Sup. p. 115. t. 2. f. 3. Cav. Ic. et descr. 1. p. 46. t. 63. All. Auct. p. 19. Nocc. et Balb. Tic. 1. in add. p. 408. Barb. Agg. p. 32. Pollin. Ver. 2. p. 98. Nacc. Ven. 3. p. 47. Reich. Cent. 3. p. 755. n. 4751., et Cent. 15. p. 2. t. 131. f. 4751. Host. Austr. 2. p. 555.

E. perforata Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 540.*

Chamæsyce Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 1324. sine fig. Ang. Sempl. p. 195. ex loco in agr. Bonon.

Chamæsyce Casalp. De pl. lib. 9. cap. 17. p. 379. Cord. in Gesn. Op. bot. ed. Schmied. p. 6. ex loco Bonon., et

- Gesn. ibid. p. 122. icon. lign. t. 17. f. 153. Dod. Pempt. p. 377. fig. Clus. Hist. pl. lib. 6. p. CLXXXVIIJ. fig.*
Tithymalus exiguus, procumbens Chamæsyce dictus
Cup. Hort. Cath. p. 214.
Chamæsyce Matthioli Cast. Hort. Mess. p. 7.
Tithymalus exiguus, glaber, Nummulariæ folio Zannich.
Ist. p. 261. Segui. Ver. 1. p. 160.
Ital. Erba da pondi. Erba pondina. Fico per terra Targ.
Tozz. Diz. bot. 2. p. 98.
Ann. Legi Sarzanæ, et Bononiæ, ubi copiosissima in hortis, et in arvis. Habui ex districtu Veronensi in campis vallis d' Avesa a MANGANOTTO, et a RAINERO, ex hortis Bassanensibus a MONTINIO, ex rudcratis, et litoribus Venetis ab Eq. PAROLINIO, a MONTINIO, et a ZANARDINIO, Fossâ Clodiâ a Prof. NACCARIO, ex agro Faventino alla Cartara a TASSINARIO, ex litore Firmiano a MARZIALETTO, ex agro Pisano in hortis a Prof. PETRO SAVIO, ex viciniis Florentiæ a SESTINIO, Pistorio in campis ad S. Georgium a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, Româ in ambulacris villarum a Prof. MAURIO, et a FIORINIA-MAZZANTIA, ex Sicilia in maritimis di Lentini, et Panormitanis ab Eq. GUSSONIO. Floret ab Junio in Octobrem.
Radix fusiformis, gracilis, longa, simplex, vel bifida, lateraliter parce fibrillosa. Caules ex eadem radice plures, toti prostrati, in orbem rosulati, teretes, tenues, dichotomi, a pollice ad spithamam longi. Folia parva, opposita, brevissime petiolata, subrotunda, vel ovata, obtusa, basi obliquata, nunc toto margine, nunc antice crenulata, rarius integerrima, supra saturate viridia, subtus pallidiora, opaca, aut punctis pellucidis adpersa. Stipula setacea, utrinque una in basi pctioli. Flores exigui, solitarii, terminales, et alares, brevissime pedunculati, sub quibus folia duo, opposita, cæteris multo minora. Lacinia perigoniales oblongæ, obtusæ. Nectaria lata, sed brevissima, alba, vel rubentia, antice tridentata. Capsula exigua, trigona, lævis, ludit glabra, pilosa, aut hirsuta, uti tota planta. Semina transverse rugosa, ecarunculata. Villi plantæ, ubi adsunt, canescentes. Stirps in aprico undique late rubens.
 3. *EUPHORBIA Peplis*: glabra; caule prostrato, dichotomo; foliis semicordato-ovatis, integris; floribus solitariis; nectariis integerrimis.
E. Peplis Sp. pl. p. 652. Smith. Engl. Fl. 4. p. 59., et Engl. bot. v. 28. t. 2002. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 381.

All. Ped. 1. p. 283. n. 1031. *Coll. Herb. Ped.* 5. p. 120. n. 5. *Poll. Ver.* 2. p. 99. *Ruch. Ven.* p. 119. *Moric. Ven.* 1. p. 378. *Nacc. Ven.* 3. p. 47. *Suffr. Foroj.* p. 144. *Bert. Pl. Gen.* p. 63., et *Amæn. Ital.* p. 152. n. 134., et p. 242. n. 47. *Sav. Pis.* 1. p. 451. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 282.* *Seb. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 162. *Ten. Nap.* 1. p. 260., et *Syll.* p. 233. n. 6. *Ab. Ucr. Hort. Pan.* p. 198. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. p. 540.*, et *Sup.* 1. p. 147.* *Desf. Atl.* 1. p. 377. *De Cand. Franç.* 3. p. 330. *Roep. En. Euph.* p. 59. n. 2. *Koch. Syn.* p. 627. *Reich. Exc.* 3. p. 755. n. 4753., et *Cent.* 15. p. 2. t. 131. f. 4753. *Host. Austr.* 2. p. 556.

Tithymalus Peplis Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 340.

Peplio Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 1322. fig. tantum.

Dur. Herb. Rom. 1585. p. 344. fig. tantum.

Peplio Matth. l. c. p. 1322. descr. excl. figura. *Dur. l. c.* p. 345. descr., excl. fig.

Peplium Cæsalp. De pl. lib. 9. cap. 16. p. 378.

Peplis verns Dioscor. Donat. Tratt. de' sempl. p. 76. fig.

P. maritima, repens, rubra et alba Cast. Hort. Mess. p. 42.

Tithymalus maritimus, folio obtuso, aurito, rubro, perinde ac caule *Zannich. Ist.* p. 260. t. 68., excl. t. 199.

Peplis Clus. Hist. pl. lib. 6. p. CLXXXVIJ. fig.

Ital. Peglio. Peplide Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 99.

Ann. *Vulgaris* in litoribus marinis Italiæ. Legi in litore Lunensi alla *Marinella*, in Liguria occidua a *Sestri di Ponente*, Venetiis in insula *Lio*, in litore Ravennati, et Pisaurensi. Habui ex maritimis Nicænsibus ab Eq. Prof. MORISIO, ex litore di *Monfalcone* a BERINIO, et a TOMMASINIO, et ex litore di *Sestiana* prope Duinum ab eodem TOMMASINIO, ex oris Venetis ab Eq. PAROLINIO, tum a *Murano*, et *Chioggia* a MORTINIO, ex maritimis Ravennatibus a Gozzio olim discipulo meo præstanti, ex districtu Ariminensi alla *Catolica* ab AZZAROLIO, ex Piceno ad Cupram maritimam a PASSERINIO, et a *Pedaso* ab ORSINO, ex *Castellone* a FIORINIA-MAZZANTIA, Syracusis a BRUNNERO, Panormo, et ex Lopa-dusa ab Eq. GUSSONIO, Capreis a Prof. GIRALDIO, ex Ilva sub arce la *Stella* a Prof. PETRO SAVIO, ex Corsica a *Calvi* a SOLEIROLIO. Floret ab Julio in autumnum.

Radix fusiformis, aut fusiformi-ramosa, longa. Caules plures ex eadem radice, toti prostrati, in orbem expansi, et sabulo marino arctissime adpressi, teretes, dichotomi, ramosissimi, a sesquipollice ad spithamam longi.

Folia opposita, breviter petiolata, carnosula, valde semicordato-obliquata, obtusissima, et subinde retusa, integra, rarius hic illic subcrenata. Stipula utrinque una in basi petioli, membranacea, bi-tripartita, laciniiis subulatis, decidua. Flores solitarii, alares, et terminales, breviter, et tenuiter pedunculati. Nectaria lata, brevissima, rotundata, obtusissima, integerrima, rubescentia. Capsula grandiuscula, lævissima. Semina ovoidea, lævia, velo cinereo obducta, ecarunculata. Tota planta glaberrima, glauco-virens, et sæpe pulchre rubens.

**** *Spurie umbellatæ, involucellis liberis.***
Alternifoliæ. Tithymali.

4. **EUPHORBIA** *Peplus*: foliis obovatis, petiolatis, integerrimis; umbella trifida; nectariis semilunatis; seminibus foveolatis.
- E. Peplus* *Sp. pl.* p. 653. *Smith. Engl. Fl.* 4. p. 60., et *Engl. bot.* v. 14. t. 959. *Curt. Lond. ed. Grav.* v. 3. t. 79. *Hook. Brit. Fl. ed. 2.* p. 383. *Bull. Pl. ven. de la Franc.* t. 79. *Fl. Dan.* t. 1100. *All. Ped.* 1. p. 283. n. 1033. *Balb. Taur.* p. 77. *Re Seg.* p. 40., et *Tor.* 1. p. 253. *Biol.* *Acon.* 1. p. 160. *Coll. Herb. Ped.* 5. p. 120. n. 6. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 217., et 382. *Comoll. Prodr.* p. 91. *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec.* 2. tom. 10. p. 285. *Pollin. Ver.* 2. p. 99. *Ruch. Ven.* p. 119. *Moric. Ven.* 1. p. 379. *Nacc. Ven.* 3. p. 48. *Suffr. Foroj.* p. 144. *Sav. Pis.* 1. p. 452. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 282. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 162. *Ten. Nap.* 1. p. 261. *A., et Syll.* p. 233. n. 7. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. p. 541. *Moris. et De Not. Capr.* p. 118. *Desf. Atl.* 1. p. 378. *De Cand. Franc.* 3. p. 331. *a. Roep. En. Euph.* p. 67. n. 25. *Koch. Syn.* p. 633. *Reich. Exc.* 3. p. 759. n. 4773., et *Cent.* 15. p. 4. t. 140. f. 4773. *Host. Austr.* 2. p. 556. *Gaud. Helv.* 3. p. 272. *Tithymalus* n. 1049. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 9. *Peplo Matth. Valgr.* 1585. tom. 2. p. 1323. descr. excl. fig. *Dur. Herb. Rom.* 1585. p. 344. descr. excl. fig. *Ang. Sempl.* p. 295. *Calz. Viag. di Mont. Bald.* p. 10. *Peplio Matth. l. c.* p. 1323. figura tantum, non descr., quæ figura exhibet umbellam acaulem *Dur. l. c.* p. 345. fig., quæ ex Matth., excl. descr. *Tithymalus* rotundis foliis, non crenatis *Segui. Ver.* 1. p. 158. n. 8. *Peplus Camer. Epit.* p. 969. fig. *Esula folio rotundo Riv. Tetr. irr.* t. 118.

β planta omnibus partibus minore.

Euphorbia Peplus β Mant. alt. p. 393. De Cand. Franç. 3. p. 331. β . Gaud. Helv. 3. p. 272. β .

E. Peplus B Ten. Nap. 1. p. 261.* Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 541. b.* et Sup. 1. p. 147. b.*

E. peploides All. Ped. 1. p. 283. n. 1032. De Cand. Franç. 5. p. 358. Link. En. alt. 2. p. 12. n. 116. Reich. Exc. 3. p. 759. n. 4774., et Cent. 15. p. 5. t. 140. f. 4774.

E. rotundifolia Ten. Nap. 4. p. 259.* et Syll. p. 233. n. 8.* Lois. Del. Not. p. 75. t. 5. f. 1., et Gall. ed. 2. tom. 1. p. 338. t. 29.

Tithymalus petrinus, exiguus, pumilio, Portulacæ foliolis Cup. Hort. Cath. p. 214. Bonann. Panph. t. 144.

Ital. Calenzola piccola. Centonchio salvatico. Fico d' inferno. Peplo. Porcellana lattaria Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 99.

Ann. Legi Sarzanæ in campis prope il Romito in via Illicina, Bononiæ in hortis. Habui ex Tyroli meridionali in viciniis Tridenti, et ex Tyroli Italico in Fassa a FACCHINIO, ex districtu Bassanensi in Valsugana ab Eq. PAROLINIO, et in marginibus viarum ad S. Eusebium d' Angarano a MONTINIO, Tergesto in hortis, et vineis a TOMMASINIO. Varietatem β accepi ex incultis di Pove prope Bassanum a MONTINIO, ex Istria in senticosis inter Polam, et Veruda a TOMMASINIO, ex Ducatu Lucensi in olivetis di Pozzuolo a Prof. PUCINCINELLO, ex agro Viterbiensi a CAMILLIO, Romæ, et Puteolis a MAJERO, ex Apulia ab Eq. Prof. TENORIO, ex Calabria ultra, ex Sicilia ad Segestam, et in herbis Panormitanis ab Eq. GUSSONIO, ex Corsica a Bonifacio a SERAFFINIO, et a Calvi a SOLEIROLIO. Floret a vere in æstatem.

Radix præcedentis, sed tenuior, brevior, alba. Caulis teres, erectus, vel adscendens, palmaris-pedalis, simplex, aut inferne ramosus. Folia alterna, sparsa, obovata, obtusa, et subinde leviter retusa, longiuscule petiolata, integerrima, tenuia, supra læte viridia, subtus glaucescentia, inferiora minora. Umbella terminalis, triradiata, radiis dichotomis, modo brevibus, modo elongatis. Pedunculi dichotomi, solitarii, axillares in foliis supremis sæpe comitantur umbellam. Flores solitarii, terminales, et alares, brevissimo pedicellati. Involucrum universale triphyllum, foliolis oblongo-obovatis, vel elliptico-oblongis, obtusis, breviter petiolatis, plerumque paulo grandioribus folio caulino

proximo. Involucella diphylla, subcordato-ovata, aut rhombeo-ovata, obtusa, integerrima, subsessilia. Nectaria quatuor, exigua, luteola, semilunata, cornibus setaceis. Capsula lævis, glabra, coccis carina dorsali approximate bialatis, alis angustissimis, subinde crispulis. Semina angulata, nebula cinerea obducta, foveolata, foveolis numero variis vel intra eandem capsulam, superioribus duabus proximis sulcos longitudinales parallelosistentibus. Herba tenera, tota glabra, pallide virens, in aprico hic illic rubens.

Varietas β adeo lævis lusus est, ut vix mereatur distinguui; dantur enim individua intermedia, quæ ducunt ad typum speciei. Caulis in hac varietate ab uno ad quatuor, vel quinque pollices longus; dum brevior est, quandoque decumbit. Folia parva, subrotundo-obovata; earum lamina sine petiolo a sesquilinea ad quatuor lineas longa. Umbella plerumque abbreviata.

5. *ΕΥΡΗΘΥΛΙΑ pterococca*: foliis sessilibus, obovatis, serrulatis; umbella subquinquefida; nectariis subrotundis, integerrimis; seminibus reticulatis.

E. pterococca Spr. Syst. veg. 3. p. 799. n. 178. Guss. Pl. rar. p. 192.* et Fl. Sic. prodr. 1. p. 541.* et Suppl. 1. p. 148.*

E. pterococca Brot. Lus. 2. p. 312. t. 76. Duby. Bot. Gall. ed. 2. tom. 1. p. 413.

E. bialata Link. En. alt. 2. p. 13. n. 134.

E. stellulata Salzmann. ex Roep. En. Euph. p. 59. sub n. 3., non Lois.

Ital. *Calenzola alata*.

Ann. Habui ex herbis collium di Val di Mazzara in Sicilia ab Eq. Gussoneo, ex Sardinia a Badaroc. Floret Aprili, Majo.

Radix fusiformis, tenuis. Caulis teres, striatus, erectus, vel adscendens, sæpe crassiusculus, bipollicaris-spithamalis, simplex, aut basi ramosus. Folia alterna, sparsa, obovato-spathulata, vel obverse oblongo-cuneata, obtusa, crebre serrulata præsertim in margine superiore, tenuia, subtus pallidiora, inferiora minora, velut in petiolum attenuata, superiora successive majora, sessilia. Umbella terminalis, potius brevis, quinquefida, et in macris individuis tri-quadrifida, radiis dichotomis. Pedunculi solitarii, axillares in foliis supremis, dichotomi, aut trifidi, bifidi sæpe umbellam comitantur. Flores ut in præcedente. Foliola involucri universalis sequuntur numerum radioꝝ umbellæ, oblongo-obovata,

obtusa, sessilia, serrulata. Involucella sessilia, opposita, rhombeo-ovata, obtusa, vel acutiuscula, serrulata. Nectaria quatuor, exigua, subrotunda, integerrima, luteola. Capsula parva, laevis, glabra, coccis convexis, obtusis, unoquoque instructo alis duabus angustis, inter se, et a carina dorsali insigniter distantibus, crispulis, subinde purpurantibus. Semina subrotundo-compressiuscula, venis tenuibus, prominulis reticulata, areolis polygonis, rufo-ferruginea. Herba tenera, glabra, pallide virens.

6. *EUPHORBIA cuneifolia*: foliis obovato-cuneatis, emarginatis, serrulatis; umbella quinquefida; capsula coccis biseriate muricatis; seminibus granulato-scabris.

E. cuneifolia Guss. *Pl. rar.* p. 190. tab. 38.* , et *Fl. Sic. prodr.* 1. p. 542.* *Ten. Nap.* 4. p. 259., et *Syll.* p. 234. n. 11. *De Sal. in Bot. zeit. ann.* 1834. p. 4.

E. stellulata Lois. *Deslongch. Nouv. not.* p. 23.* , et *Gall. ed.* 2. tom. 1. p. 346. n. 49.* excl. Salzm.

Ital. *Calenzola crestatata*.

Ann. Habui ex *Bosco di Persano* in Principatu citeriore regni Neapolitani, et ex Sicilia ad Drepanum ab Eq. Gussoneo, ex Sardinia a Badaruo, ex Corsica a Portovecchio a Soleriolio. Floret Aprili, Majo.

Simillima praecedenti. Differt notis sequentibus. Folia obovato-cuneata, plerumque emarginata, sessilia, amplexicaulia, magine superiore serrulata, vel crenata, inferne integra. Foliola involucri universalis caulinis similia. Involucella rhombeo-subrotunda, obtusa cum, vel sine mucronulo, superne crenulata, vel integra. Pedunculi axillares infra umbellam vix ulli. Capsula aculeis herbaceis muricata, qui aculei series duas in quovis cocco inter se, et a carina dorsali quidquam recessas sistunt. Semina ovoideo-compressiuscula, sub vitro granulis minutis, punctiformibus scabra, castaneo-ferruginea.

Obtinui hanc eandem speciem etiam ex Corcyra in Joniis ab egregio Talbotio.

7. *EUPHORBIA verrucosa*: foliis obovato-cuneatis, serrulatis; umbella subquinquefida; involucris, involucellisque rhombeis; capsula globosa, nucamentacea, sparsa, remoteque muricata, nudave; seminibus laevibus.

E. verrucosa Mant. *alt.* p. 393. herb. Linn. ex Guss. (non Sp. pl.).

E. akenocarpa Guss. *Cat. pl. in Boctadifal. ann.* 1821. p. 75.* , et *Fl. Sic. prodr.* 1. p. 550.* , et *Sup.* 1. p. 150.*

Spreng. System. veget. 3. p. 797. n. 160. (error. achano-carpa).

E. muricata *Smith. Engl. Fl.* 4. p. 65. in observ. ad *Euphorbiam strictam*.

E. sphærococca *Salzm. Pl. sicc. ex Guss.*

E. rigida *Thieb. in herb. De Cand. ex Guss., non Marsh., nec De Salis.*

Tithymalus sculus polycoccus *Portulacæ folio Bocc. Sic. p. 39. tab. 19. in pag. 38. fig. D-G. h. i. rudit.*

Ital. Calenzola coriandolina.

Ann. Habui ex campis argillosis di Brancaleone in Calabria ultra, et ex Sicilia a Regalmuto, et Alia ab Eq. Gussonio. Floret Aprili, Majo.

Radix gracilis, fusiformis, longa, flexuosa, lateraliter fibrillosa. Caulis teres, erectus, vel adscendens, simplex, aut basi parce ramosus, palmaris-pedalis, glaber. Folia alterna, sparsa, obovato-cuneata, acutiuscula, vel inferiora obtusa, margine superiore minute serrulata, pilosa, vel glabra. Umbella terminalis, tri-quinquefida, dichotoma, vel major bifida. Flores solitarii, terminales, alares, et centralis in umbella, breviter pedicellati. Pedunculi laterales nulli. Involucrum, et involucella foliolis subæqualibus, rhombeis, acutiusculis, glabris, margine superiore serrulatis. Perigonium tenue, membranaceum, campanulatum, pallens, glabrum, vel pilosum, decemdentatum, dentibus alternis nudis, ovatis, obtusis, ciliatis, reliquis nectariiferis, turgescente capsula discissum, et demum deciduum, remanente annulo circa pedicellum. Nectaria transverse ovalia, integerrima, luteola. Stili tres, basi connati, emarginati. Stigmata simplicia. Capsula subsessilis, perpetuo erecta, globosa, glabra, nunc spinulis herbaceis, raris, sparsis muricata, nunc omnino lævis, trilocularis, nucamentacea, seu nunquam, aut difficillime dehiscens, diu in planta persistens. Semina lævia.

Hæc est sola planta, quæ remanet pro sistenda *Euphorbia verrucosa* L.; quam enim Linnæus ita vocavit in *Sp. pl.* p. 658., eadem est cum *Euphorbia pilosa* *Sp. pl.* p. 659., ut suo loco videbimus.

8. *EUPHORBIA helioscopia*: foliis obovato-cuneatis, emarginatis, serrulatis; umbella quinquefida, trifida, bifida; capsula trigona, lævi; seminibus reticulatis.

E. helioscopia *Sp. pl.* p. 658. *Smith. Engl. Fl.* 4. p. 63., et *Engl. bot. v. 13. t. 883. Curt. Lond. ed. Grav. v. 3. t. 80. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 381. Fl. Dan. t. 725. Sc.*

bot. v. 1. t. 70. *Plenck. Ic. pl. med.* 4. p. 66. t. 369. *All. Ped.* 1. p. 287. n. 1047. *Balb. Taur.* p. 77. *Re Seg.* p. 40., et *Tor.* 1. p. 255. *Birol. Acon.* 1. p. 161. *Coll. Herb. Ped.* 5. p. 124. n. 14. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 219., et 382. *Comoll. Prodr.* p. 91. *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec.* 2. tom. 10. p. 285. *Pollin. Ver.* 2. p. 104. *Ruch. Ven.* p. 120. *Moric. Ven.* 1. p. 380. *Nacc. Ven.* 3. p. 49.* *Suffr. Foroj.* p. 145. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 282. *Sav. Pis.* 1. p. 456. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 164. *Ten. Nap.* 1. p. 268., et *Syll.* p. 234. n. 16. *Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 198. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. p. 550. a. b. c.* et *Sup.* 1. p. 150.* *Moris. Stirp. Sard. el. fasc.* 1. p. 40.* *Desf. Atl.* 1. p. 382. *De Cand. Franc.* 3. p. 335. *Roep. En. Euph.* p. 59. n. 3. *Koch. Syn.* p. 527. *Reich. Exc.* 3. p. 755. n. 4754., et *Cent.* 15. p. 2. t. 132. f. 4754. *macra. Host. Austr.* 2. p. 563. *Gaud. Helv.* 3. p. 277.

Tithymalus helioscopius Scop. Carn. ed 2. tom. 1. p. 337. *T.* n. 1050. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 10.

Tithymalo Helioscopio Matth. Valgr. 1585. *tom.* 2. p. 1314. *fig. haud exacta Ang. Sempl.* p. 293. *Calz. Viag. di mont. Bald.* p. 7. *Pon. Mont. Bald.* p. 237.

Tithymalus Helioscopius Cæsalp. De pl. lib. 9. *cap.* 14. p. 378. *Cast. Hort. Mess.* p. 46. *Segui. Ver.* 1. p. 159. n. 9. *Fuchs. Hist. pl.* p. 811. *fig. bona.*

T. subrotundis foliis, maior, crenatis Cup. Hort. Cath. p. 213.

T. rosaceus, purpureus, nanus, Portulacæ folio, serrato Cup. l. c. p. 214. *pl. macrior.*

Esula rotundifolia serrata carnosior Barrel. Ic. 212.

Ital. Erba Calenzola. Erba de' Calenzoli. Erba da volatiche. Erba diavola. Erba montanella. Erba rognà. Fico d' inferno. Rogna. Titimalo elioscopio. Tortomaglio elioscopio. Tortomaglio girasole Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 98.

Ann. Ubique in hortis, viis campestribus, et herbidis Italiæ. Legi Sarzanæ, et Bononiæ. Habui ex campis, et hortis Bassanensibus a MONTINIO, ex cultis Tergestinis a TOMMASINIO, Fossâ Clodiâ a Prof. NACCARIO, Senogallia ad sepes secus Senam a SALVATORIO, ex Piceno a Montefortino a MARZIALETTO, ex Canino in districtu Viterbiensi a Rev. Fratre MAURITIO DE BRIxia, ex Sicilia in cultis Panormitanis ab Eq. GUSONIO, ex Sardinia in viis, et sepibus Calaritanis ab Eq. Prof. MORISIO, et a Prof. DE NOTARIS. Floret hyeme decedente, et vere in æstatem usque,

Radix fusiformis, lateraliter fibrillosa. Caulis teres, decumbens, adscendens, erectus, simplex, aut basi ramosus, a duobus, tribusve pollicibus ad dodrantem, et pedem longus, in imo glaber, superne pilosus, sæpe rubens. Folia alterna, sparsa, obovato-cuneata, sæpius emarginata, margine superiore crebre serrulata, glabra, læte, aut saturate viridia, ima minora, et in petiololum longum angustata, reliqua sessilia. Umbella terminalis, plerumque quinquefida, trifida, bifida, patens, rosulata, solisæqua. Radii pilosi. Involucra, et involucella forma omnino similia foliis caulinis, sessilia, sed foliola involucri reliquis omnibus majora, involucella contra minora, subinde inæqualia, viridia, aut e viridi flavicantia. Nectaria transverse ovalia, integerrima, luteola. Capsula obtuse trigona, lævis, glabra. Semina obverse ovoidea, undique reticulato-rugosa, velo cinereo facile detergendo obducta, sub quo fuscescunt. Herba valde lactescens, magnitudine partium mirimode varians.

9. *EUPHORBIA falcata*: foliis obverse lanceolatis, superioribus, involucrisque mucronato-aristatis; umbella subquinquefida, dichotoma; capsulis lævibus; seminibus transverse sulcatis.

E. falcata *Sp. pl.* p. 654. *Jacq. Austr.* 2. p. 13. t. 121. *All. Ped.* 1. p. 284. n. 1034. *Balb. Taur.* p. 77. *Re Seg.* p. 40., et *Tor.* 1. p. 253. *Coll. Herb. Ped.* 5. p. 121. n. 7. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 217. *Comoll. Prodr.* p. 91. *Barb. Agg.* p. 32.* *Pollin. Ver.* 2. p. 100. *Morett. in Mem.* 1. p. 268. *Suffr. Foroj.* p. 145. *Bert. Amæn. Ital.* p. 242. n. 48. *Seb. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 163. *α. β.* Maur. Cent. XIII.* p. 23. *α.* Ten. Syll.* p. 234. *A. B. Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. p. 542. *α. b. c.**, et *Sup.* 1. p. 148.* *Desf. Atl.* 1. p. 379. *De Cand. Franç.* 3. p. 331. *α. β. Roep. En. Euph.* p. 67. n. 24. *Koch. Syn.* p. 633. *Reich. Exc.* 3. p. 759. n. 4776., et *Cent.* 15. p. 5. t. 141. fig. 4776. *Host. Austr.* 2. p. 557. *Gaud. Helv.* 3. p. 273.

E. acuminata *Sav. Bot. Etr.* 1. p. 144.* *Ten. Nap.* 1. p. 261.

E. obscura *Lois. Desl. Not.* p. 76. t. 5. f. 2.*, et *Gall. ed.* 2. tom. 1. p. 339. t. 29.* *De Cand. Franç.* 5. p. 358. *Reich. Cent.* 15. p. 2. t. 132. f. 1755.

Pithyusa angustis, acutisque Esulæ foliis annua *Barrel. Ic.* 752.

P. minor subrotundis et acutis fol. *Barrel. Ic.* 751. *lusus.*

Peplis annua, foliis acutis, flore muscoso *Bocc. Sic. p. 24., et p. 25. t. 13. fig. I. F.*

Tithymalus foliis acutis *Zannich. Ist. t. 199. confusa cum E. Pepli L.*

T. annuus erectus, folio oblongo acuminato *Segui. Sup. p. 92. n. 3.*

Ital. Calenzola aristata.

Ann. Frequens in arvis, vineisque Italiæ. Legi Sarzanæ in marginibus viarum prope omnem Macram, et inter satam subcollina di *Montedarme*, Bononiæ *al Sasso*. Habui ex Pedemontio in arvis ad Albam Pompejam a BARTERO, in campis subcollinis ad Clastidium (*Casteggio*) a Prof. DE NOTARIS, Mantuâ extra portam *Pradella* a BARBIERIO, ex campis prope Tridentum, et *Livezzano* a FACCHINIO, ex agro Bassanensi *al Campo di Borso* a MONTINIO, ex viis, ruderatis, et semitis circa Tergestum a TOMMASINIO, et a BIASOLETTO, ex arvis Patavinis a MONTINIO, ex Eugneis in *Rua*, et *Venda* a MAJERO, Ravennâ in marginibus fossarum a DALLAGATA, ex *Sasso Feltrio* in subapennino Ariminensi ab AZZAROLIO, ex arvis Senogalliensibus a SALVATORIO, ex agro Maceratensi ab Eq. NARDUCCIO, ex districtu S. Severini *alle Grotte di S. Eustachio* a Prof. OCTAVIANO, ex agro Pisano ab Eq. Prof. CAJ. SAVIO, ex *Montecatini* vallis Cecinæ ab AMIDEO, ex ripis Arni prope Florentiam a BARONIO, Centumcellis, Româ, et Tibure in viis, et pascuis a Prof. MAURIO, ex Sicilia inter segetes ab Eq. GUSSONIO. Floret a Maio in Julium.

Radix longa, fusiformis, gracilis, lateraliter ramulosa, aut fibrillosa. Caulis teres, erectus, vel ascendens, dum brevior subinde decumbens, simplex, aut basi ramosus, palmaris-dodrantalis, rarius pedalis. Folia alterna, sparsa, modo crebra, modo remotiuscula, obverse lanceolato-cuneata, in petiolum tenuem angustata, ludunt latiora, vel angustiora, et interdum fere obverse lanceolato-linearia, inferiora minora, obtusa, vel retusa; cito diffusa, his proxima acutiuscula, superiora acuta, et passim mucronato-aristata. Umbella terminalis, tri-quinqæfida, dichotoma, nunc contracta, densiflora, nunc elongata, laxiflora. Insuper pedunculi dichotomi, solitarii, in axillis foliorum superiorum. Involucrum universale tri-pentaphyllum pro numero radiorum umbellæ, foliolis caulina superiora referentibus. Involucella sessilia, subcordato-triangularia, aut ovata, acuta, vel sæpius mucronato-aristata, plerumque basi obliquata.

Flor. Ital. T. V.

Nectaria quatuor, luteola, læviter semilunata, crusculis brevibus. Capsula acute trigona, lævis, glabra. Semina oblonga, tetragona, faciebus transverse, et parallele rugosis, et inter rugas sulco impressis, sub vitro minutissime granulato-scabra, nebula cinerea obducta, sub qua rufescunt. Herba rigidula, glabra, glauca, polymorpha, perperam in duas species a nonnullis discernpta, quæ facile disparent in loco natali.

10. *EUPHORBIA terracina*: foliis lanceolatis, uninerviis, inferioribus emarginatis; umbella subquinquefida; nectariis bicornibus, cruribus elongatis, setaceis, acutis; capsulis, seminibusque lævibus.

E. terracina *Sp. pl.* p. 654. *Biv. Bern. Cent.* 2. p. 24. n. 32.*
et *Manip.* 4. p. 38.* *Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. p. 544.*
et *Sup.* 1. p. 148.*

E. Barrelieri *Sav. Bot. Etr.* 1. p. 145.* herb.

E. nicæensis *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 164.*
non All.

E. neapolitana *Ten. Nap.* 1. p. 166. t. 42.

E. italica *Tin. Syn. pl. hort. bot. Acad. R. Pan. ann.* 1802.
p. 13. *Ten. Syll.* p. 235. n. 19.

E. Esula *Ab Ucr. Hort. Panorm.* p. 199., non Linn.

E. valentina *Orteg. Dec.* p. 127. herb. ex Guss.

E. provincialis *Reich. Cent.* 15. p. 7. t. 146. f. 4790.

Tithymalus marinus, folio retuso, terracinensis *Barrel.*
Pl. per Gall. Hisp. et Ital. p. 6. n. 50. ic. 833. ex loco,
sed fig. incompleta.

Ital. Calenzola marina.

Perenn. Legi Neapoli ai *Camaldoli*. Habui ex litore Ostiensis, et Terracinensi, ubi valde copiosa a *PPrr. SEBASTIANO*, et *MAURIO*, a *BARRIERIO*, a *FIORINIA-MAZZANTIA*, et ab *ORSINO*, ex Vesuvio a *MAJERO*, ex litoribus Neapolitanis, ubi frequentissima, et ex Sicilia ab *Eq. GUSONIO*, denuo ex Sicilia maritimis prope Carenim ab *Eq. BIVONA-BERNARDIO*. Floret a vere in autumnum.

Radix fusiformis, interdum crassa. Caulis teres, erectus, ascendens, decumbens, plerumque crassiusculus, inferne, aut in ipsa basi ramosus, ut cæspitem simulet, rarius simplex, spithamalis-sesquipedalis, in aprico rubens. Folia alterna, sparsa, ludunt oblongo-lanceolata, lanceolata, vel lanceolato-linearia, basi plerumque angustata, sessilia, uninervia, margine superiore serrulato-scabra, superiora acuta, vel obtusa cum mucronulo, et interdum cæteris latiora, inferiora, rarius omnia, emarginata cum mucronulo recurvo. Umbella terminalis,

bi-quinquefida, bifida, aut dichotoma. Involucrum universale foliolis pro ratione radiorum rhombeo-lanceolatis, vel rhombeo-ovatis, aut etiam ovato-oblongis, acutis, aut obtusis cum mucronulo. Involucella semiorbiculata, acuta, basi truncata, vel triangularia, acuta. Nectaria luteola, bicornia, cornibus elongatis, setaceis, acutis, subinde instructa denticulo medio inter cornua. Capsula trigona, laevis, glabra. Semina ovoidea, laevis, cinerea, basi oblique secta. Tota planta glabra, nunc virens, vix glaucescens, nunc intense glauca.

Inter mea exemplaria unum ex litoribus Neapolitanis est, missum a Gussonio, quod habet folia omnia emarginata, et inferiora tam insigniter, ut obcordata dici mereantur. *Euphorbia terracina* Reich. Cent. 15. p. 5. t. 141. fig. 4775. differt omnino a nostra, et, ni fallor, pertinet ad *Euphorbiam Lagascae* Spr.

11. *EUPHORBIA variabilis*: foliis imis minoribus, ellipticis, superioribus lanceolatis, uninerviis, acutisque omnibus; umbella subquinquefida; nectariis semilunatis, cornibus longiusculis, crassis, obtusis; capsulis, seminibusque laevibus.

E. variabilis *Cesat. Stirp. Ital. rar. vel. nov. fasc. 1. cum tab. fig. 1-5.* optim.

E. Gayi *Y De Sal. in Bot. zeit. ann. 1834, p. 6.*

Ital. *Calenzola montana.*

Perenn. Habui ex districtu Comensi in monte *Bar* ab Eq. *CESATE*, in *Crosgalle* a *RAINERO*, in viciniis *dei Corni di Canzo* a *DE SALIS*. Floret Junio.

Radix fusiformis, crassiuscula, nigricans. Caulis teres, erectus, vel adscendens, inferne ramosus, suffruticulosus, ramis simplicibus, potius tenuibus, a sesquipollice ad dodrantem longus. Folia ima exigua, elliptica, successiva paulatim majora, oblonga, superiora ceteris longiora, lanceolata, oblongo-lanceolata, aut oblongo-ovata; omnia sessilia, firmula, basi uninervia, acuta, vel saltem acutiuscula, alterna, sparsa, pallide viridia, subtusque magis. Umbella terminalis, tri-quinquefida, bifida, vix dichotoma. Pedunculi accessorii in axillis foliorum superiorum raro occurrunt. Involucrum universale foliis caulinis superioribus simile. Involucella subcordato-triangularia, plerumque acuta, et subinde in cuspidem producta, rarius obtusa; ludunt sinu levi lateraliter excavata, et subinde etiam late crenata. Nectaria semilunata, atro-virentia, cornibus longiusculis, potius crassis, obtusis, e viridi luteolis. Capsula obtuse

trigona, lævis, solummodo sub fortiori vitro minutissime granulata. Semina ovoideo-oblonga, lævia, crasse carunculosa, velo cinereo obducta, sub quo fuscescunt. Tota planta glabra.

Hæc species est valde proxima *Euphorbiæ terracinæ* L., sed facile distinguitur foliis omnibus acutis, nullis emarginatis, basi semper latis, involucellis cordatis, nectariorum cornibus crassis, minus elongatis, obtusis, herba viridi.

12. *EUPHORBIA taurinensis*: foliis inferioribus obverse lanceolatis, emarginatis, superioribus lanceolato-linearibus, integris; umbella subquadrifida, dichotoma; involucellis cordato-triangularibus; nectariis læviter semilunatis; seminibus undique foveolatis.

E. taurinensis Allion. *Ped.* 1. p. 287. n. 1046. t. 83. f. 2.*

Balb. Taur. p. 77.* *Re Seg.* 1. p. 41., et *Tor.* 1. p. 254.

E. terracina Coll. *Herb.* *Ped.* 5. p. 122. n. 10. non Linn.

Ital. Calenzola di Piemonte.

Ann. Habui ex agro Taurinensi a *Lusengo* a MOLINERIO, et a Prof. BALBISIO: Floret ab Aprili in æstatem.

Radix fusiformis, crassiuscula, lateraliter fibrillosa. Caulis teres, erectus, subpedalis, inferne ramosus. Folia alterna, sparsa, uninervia, supra læte viridia, subtus pallentia, inferiora breviora, obverse lanceolata, emarginata, in petiolum tenuem angustata, superiora multo longiora, etiam pollicaria, et quidquam ultra, lanceolato-linearia, basi angustata, apice integra, acutiuscula, vel obtusa, sessilia. Umbella terminalis, triquadrifida, dichotoma, passim elongata, subinde fere semipedalis. Pedunculi plures, dichotomi, solitarii, axillares per longum caulis tractum comitantur umbellam. Foliola involucri universalis tot, quot radii umbellæ, cæterum similia foliis caulinis superioribus, patentia, vel dependentia. Involucella grandia subcordato-vel-rhombico-triangularia, acuta; sæpe longiora, quam lata. Nectaria læviter semilunata, cornibus brevissimis, luteola. Capsula obtuse trigona, angulis dorso minute granulato-scabris, reliqua parte lævis. Semina ovoidea, basi oblique truncata, foveolis undique insculpta, velo cinereo-albente obducta, sub quo dilute ferruginea. Tota planta glabra.

Stirps a nullo præter Allionium, Balbisium, et Re bene intellecta, imo perperam sumpta pro *Euphorbia terracina* L. longe diversa, et in locis maritimis tantum nascente. Recedit quoque ab *Euphorbia variabili* Ces.

radice annua, habitu grandiore, foliis inferioribus emarginatis; umbella longiore, grandius involuclata, nectariis leviter semilunatis, capsula angulis scabra, seminibus foveolatis. Sed eam magis appropinquat *Euphorbia heterophylla* Desf. Atl. 1. p. 385. t. 102., quæ tamen differt nectariis exquisite semilunatis, cornibus longis, capsula, seminibusque levibus.

13. *EUPHORBIA Gayi*: foliis imis spathulatis, superioribus, involucriis, involuclis lanceolato-linearibus; umbella subtrifida, simpliciuscula; nectariis leviter semilunatis; capsulis glabris.

E. Gayi De Sal. in Bot. zeit. ann. 1834. p. 6.*

β minor, foliis inferioribus subrotundo-spathulatis, caule decumbente.

Euphorbia Gayi β montana De Sal. l. c.

Ital. Calenzola di Corsica.

Perenn. Habui ex Corsica in pinetis maritimis inter Aleriam, et Fiumorbo, varietatem β ex pascuis montanis siccissimis supra Mandriale prope Bastia, utramque a DE SALIS. Floret Aprili, Majo, Junio.

Radix gracilis, longa, simplex. Caulis teres, tenuis, erectus, simplex, vel basi parce ramosus, bipollicaris-palmaris. Folia alterna, ima inter se approximata, breviora, spathulata, reliqua successive remotiora, lanceolata, vel lanceolato-linearia, omnia basi angustata, apice obtusa, aut acutiuscula, sub vitro margine minutissime serrulato-scabra. Umbella terminalis, bi-triradiata, rarius quinquerradiata, cum flore centrali breviter pedunculato, simpliciuscula, idest radiis unifloris, aut bifidis, bifloris cum tertio flore alari. Rarius unus, alterve pedunculus axillaris proximus comitatur umbellam. Involucra, et involuclla similia, lanceolato-linearia. Involuclla florem duplo, et triplo superantia. Nectaria leviter semilunata, cornibus brevibus, obtusis, attorubentia, vel luteola. Capsula lævis, semina lævia. Tota planta glabra.

Varietas β est planta pusilla, caule decumbente, unguiculari-bipollicari, foliis crebris, latioribus, inferioribus subrotundo-spathulatis, reliquis obovatis, involucriis, et involucllis ovatis, aut oblongis, aut lanceolatis, umbella radio unico, vel gemino. Perigonium, nectaria, et capsula ut in specie.

Exemplar nostrum speciei fert capsulam, et semina lævia, licet utraque res sit imperfecta. Hinc nullus dubito. quin varietas β sit tantum lusus typi fundamentalis.

14. *EUPHORBIA exigua*: foliis linearibus, acutis, retusive; umbella subquinquefida; involueris, involucellisque lan-
ceolatis; nectariis semilunatis, cornibus setaceis; capsulis
lævibus; seminibus tetragonis, scabris.

E. exigua *Sp. pl.* p. 654. *α. β. γ. Smith. Engl. Fl.* 4. p. 60.,
et *Engl. bot.* v. 19. t. 1336. *Curt. Lond. ed. Grav.* v. 1.
t. 62. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 383. *Fl. Dan.* t. 592. *Sv.*
bot. v. 9. t. 635. *All. Ped.* 1. p. 284. n. 1035. *Re Seg.* p. 40.,
et *Tor.* 1. p. 254. *Bir. Acon.* 1. p. 161. *Coll. Herb. Ped.* 5.
p. 121. n. 8. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 218., et 382. *Lanf.*
Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec. 2. tom. 10. p. 285.*
Poll. Ver. 2. p. 100. *Rom. in Da Rio Giorn. dell' It. lett.*
tom. 24. p. 285. *Nacc. Ven.* 3. p. 48. *Bert. Pl. Gen.* p. 64.,
et *Amén. Ital.* p. 152. n. 135. *Tur. Clav.* p. 16.* *Sav. Bot.*
Etr. 1. p. 141. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 282.* *Seb. et Maur.*
Fl. Rom. prodr. p. 163.* *Ten. Nap.* 1. p. 262. *A. B., et*
Syll. p. 234. n. 10. *A. B. Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. p. 543.
*a. b.**, et *Sup.* 1. p. 148.* *Moris. et De Not. Capr.* p. 117.
Desf. Atl. 1. p. 379. *De Cand. Franç.* 3. p. 332. *α. β.*
Roep. En. Euph. p. 67. n. 23. *Koch. Syn.* p. 634. *α. β. γ.*
Reich. Exc. 3. p. 759. n. 4777., et *Cent.* 15. p. 5. t. 141.
f. 4777. *Host. Austr.* 2. p. 557. *Gaud. Helv.* 3. p. 274.
α. β.

E. retusa *Cav. Ic. et descr.* 1. p. 21. t. 34. fig. 3. *retusa.*
De Cand. Franç. 5. p. 358.* *Reich. Exc.* 3. p. 759. n. 4778.,
et *Cent.* 15. p. 5. t. 141. *f.* 4478.

E. diffusa *Jacq. Ic. rar.* 2. p. 9. t. 88. *Host. Austr.* 2. p. 558.

E. umbella quadrifida: bifida, foliis cuneiformi-lineari-
bus tridentatis *All. Misc. Taur.* 2. p. 209. t. 3. *retusa.*

Tithymalus n. 1048. *α. β. γ. Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2.
p. 9.

Esula minore del Trago *Pon. Mont. Bald.* p. 14.

Esula minor *πολύκλωνος* aculeata *Barrel. Ic.* 85.

Tithymalus sive *Esula* exigua *Segui. Ver.* 1. p. 158. n. 7.

T. angustifolius saxatilis *Magn. Bot. Monsp.* p. 259. fig.
p. 258.

Esula exigua Tragi *Lob. Ic.* p. 357.

Ital. Esula sottile.

Ann. Frequens in herbidiis Italiæ tam in planitie, quam
in collibus, et montibus. Legi Sarzanæ in collibus, in
Liguria orientali a *Varese*, Genuæ al *Lagazzo*, unde
habui quoque a *RAINERO*, Bononiæ agli *Arienti*; in
monte *Paderno* legit, et communicavit *Eq. PAROLINUS*.
Habui ex *Corno alla scala* in Apennino Bononiensi
a *PIRAZZOLIO*, ex agro Clavarensi in Liguria orientali

a TURIO, Albà Pompejà in arenosis ad Tanarum a BERTERO, Mantuà in aggere Padi ad S. Benedictum a BARRIERIO, ex districtu Bassanensi in campis di *Fastro* supra *Primolano* a MONTINIO, ex Istria circa Polam, *Verruda*, *Fasana* a TOMMASINIO, ex viciniis di *Monfalcone* a BRUMATTIO, ex cultis, et ex marginibus agrorum Tergestinis a BIASOLETTO, ex arvis Tarvisinis a *Mogliano* a MAJERO, ex Euganeis prope *Torreglia* a MONTINIO, ex agro Maceratensi ab Eq. NARDUCCIO, et in monte *Birro* a Prof. UTILI, ex viciniis Urbini a Rev. Fratre MAURITIO DE BRIKIA, Asculo, et ex Pratutius a *Civitella di Casa nuova* in radicibus della *Maiella*, et ex monte *Morrone* ab ORSINO, ex monte Pisano a Prof. PETRO SAVIO, Fesulis, et a *Camerata* in districtu Florentino a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTO, Centumcellis, et Romà alla *Valle dell' Inferno* a Prof. MAURIO, ex arvis Siciliae ab Eq. GUSSONIO, et in arenosis Panormitanis ab ORANGERO, ex Corsica a *Bonifacio* a SERAFFINIO. Floret Majo, Junio, et etiam autumno.

Radix fusiformis, lateraliter fibrillosa, modo gracilis, modo crassiuscula. Caulis teres, decumbens, ascendens, erectus, solitarius, vel e radice caespitosus, simplex, aut inferne ramosus, a pollice ad pedem longus. Folia sparsa, nunc crebra, et imbricata, nunc remota, linearia, vel omnia acuminata, vel inferiora obtusa, aut retusa, vel cuncta retusa cum mucronulo in medio, item ludunt ab imo ad summum æque lata, vel apice brevi tractu dilatata, et subspathulata, inferiora breviora, suprema subinde basi quidquam latiora, et lanceolata-linearia. Umbella terminalis, tri-quinquēfida, bifida, aut dichotoma. Pedunculi bifidi, vel dichotomi, solitarii, axillares in foliis superioribus comitantur umbellam. Involucra, et involucella inter se similia, lanceolata, vel lanceolato-linearia, acuminata, aut retusa more foliorum. Nectaria quatuor, vel quinque, semilunata, cornibus setaceis, longiusculis, luteola, vel rubro-purpurea apicibus luteolis. Capsula trigona, lævis, angulis tamen sub vitro scabridis. Semina tetragona, cinerea, et sub nebula cinerea fusca, undique granulato-sabra. Herba glabra, virens cum lævi glaucescentia.

Quod dicit Linnæus in Sp. pl. l. c., acutam nasci in collibus, retusam in pratis, locum non obtinet apud nos, cum et in collibus, et in pratis habeatur uterque lusus, imo in eodem individuo occurrant folia acuta, et retusa.

15. *EUPHORBIA spinosa*: caule fruticoso, ramosissimo, sero rigescente; foliis oblongo-lanceolatis; umbella subquinquefida; nectariis subrotundis, integerrimis; capsula muricata; seminibus lævibus.

E. spinosa *Sp. pl.* p. 655. *Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr.* 1. p. 327., et *Fl. Græc.* 5. p. 49. t. 463. *All. Ped.* 1. p. 284. n. 1037. *Coll. Herb. Ped.* 5. p. 118. n. 1. *Nocc. et Balb. Tic. 2. in omiss. p. 7. Pollin. Ver. 2. p. 111., et 3. p. 798. Bert. Pl. Gen. p. 64., et Aman. Ital. p. 152. n. 136. Sav. Pis. 1. p. 454., et Bot. Etr. 1. p. 143. Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 165.* *Ten. Nap. 1. p. 263. excl. Column., et Syll. p. 233. n. 1. Moris. Stirp. Sard. elench. fasc. 1. p. 41.* De Cand. Franç. 3. p. 342. Roep. En. Euph. p. 61. n. 8. Reich. Exc. 3. p. 757. n. 4766. excl. syn. Column., et De Candoll., et mutato Zannich. in Zanon., et Cent. 15. p. 4. t. 137. f. 4766. Host. Austr. 2. p. 558.**

E. pungens *Lamck. Enc. méth. bot. éd. de Pad. tom. 2. p. 427. n. 68.*

Alipo Matth. Valgr. ann. 1585. tom. 2. p. 1343. fig. Pl. junior.

Alypum Cæsalp. De pl. lib. 9. cap. 8. p. 375.

Galastivida Il. di Candia, ovvero *Tithimalo spinoso* di prima specie *Pon. Mont. Bald. p. 116. fig. mala.*

Esula fruticans, seu *Pithyusa Romanorum* *Barrel. Ic. 197.*

Tithymalus angustifolius asper montis Divi Juliani Zanon. Hist. plant. ed. Mont. p. 220. t. 171. herb. Bonon.*

Esula minima montis Divi Juliani Bellucc. Ind. hort. Pis. p. 23.

E. lignosa, procumbens, pungentibus ramis *Till. Cat. hort. Pis. p. 59.*

Tithymalus montanus, saxatilis, fruticosus, et cæspitosus, humilis, caulibus lignosis, tenuiter et dense ramificatis, Hypericoid folio glauco, florum sectionibus quinis, subrotundis, fructu verrucoso, semine lævi *Mich. Cat. hort. Flor. app. p. 179. n. 27. excl. synon. Column.*

Esula minor frutescens spinis longis horridis *Mentz. Pugill. ex loco, sed sine fig.*

Ital. Erba di Gabbreto *Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 99.*

Frut. Legi in Liguria occidua in monte Ramazzo retro Sestri, ubi copiosa, et in montibus retro Pegli, in Hetruria in monte S. Juliani supra thermas Pisanas, Tibure contra le Cascatelle. Habui ex districtu Camerinensi alle Case nuove a Prof. OCTAVIANO, ex

Piceno *alla Madonna dell'Ambro* a MARZIALETTO, *all'Acquasanta* prope Asculum, et in monte Pizzo, tum Reate in Sabinis ab ORSINO, ex rupibus ad catartactam Natis a FIORINIA-MAZZANTIA, denuo ex Liguria occidua in pinetis di Pegli a Prof. DE NOTARIS, ex Hetruria a Montecerboli ab AMIDEO, a Montecastelli vallis Cecinae, et a Montecalvi alla Sassetta in Maremma a Prof. ANT. TARCIONIO-TOZZETTIO, in monte Argentario a Prof. GIULIO, ex montibus Tiburtinis a PPRI. SEBASTIANO, et MAURIO, et ibid. in villa Vari ab Eq. PAROLINIO, ex Gargano a Pagliccio ab Eq. GUSONIO, ex monte Peregrino prope Panormum ab Eq. BIVONA-BERNARDIO, ex Ilva ad S. Petrum in campo a Prof. PETRO SAVIO, ex saxosis montanis Sardiniae ab Eq. Prof. MORISIO, et ad fodinam di Montepani Iglesias a Prof. DE NOTARIS, ex Corsica a Bastia a SOLEIROLIO. Floret a Martio in Majum.

Radix lignosa, ramosa. Caulis fruticosus, teres, crassus, erectus, ramosissimus, caespitem densum efformans, tectus cortice cinereo, a paucis pollicibus ad pedem, et sesquipedem longus. Ejus rami juniores saepe rubent, siccando persistunt, rigescunt, denudantur, et apice quodammodo spinescunt. Folia sessilia, sparsa, oblongo-lanceolata, lanceolata, et etiam lanceolata-linearia, obtusa, vel acuta, plerumque basi paulo angustata, ima minora, suprema subinde latiora, obovata; omnia passim parva, rarissime pollicaria, integerrima, glabra, glaucescentia. Umbella terminalis, tri-quinqueradiata, interdum uni-biradiata, brevis, simplex. Involucri foliola ovata, aut ovato-oblonga, obtusa, vel acuta. Involucella obovata, obtusa, raro acuta, saepe flavicantia, subinde tamen viridia. Nectaria quinque, subrotunda, integerrima, lutea. Capsula subglobosa, leviter trisulca, papillis brevibus, crassis, obtusis muricata, magnitudine, et forma coriandri saccharati, tota virene, pilis carens. Semina ovoidea, compressiuscula, laevia, velo cinereo facile evanescente obducta, sub quo e flavo fusca sunt. Tota planta glabra.

Synonymon Columnæ, quod pertinet ad *Euphorbiam epithymoidem* L., ut mox videbimus, a quibusdam perperam affertur ad *Euphorbiam spinosam* L. Sed quod valde singulare, et mirandum est, habetur apud Montium in Zanoni. hist. l. c., qui asseverat, se vidisse stirpem hanc ope culturae mutatam in *Euphorbiam*

serrata L., et hactenus asservantur in herbariis Bononiensibus exemplaria *Euphorbiae serratae* cum scheda manu ipsius Montii exarata, quæ fert synonyma ad *Euphorbiam spinosam* L. pertinentia. Hic vero fatetur oportet, virum cæteroquin clarissimum deceptum fuisse aliquo sationis errore, schedulis seminum commutatis.

Euphorbia spinosa L. occurrit quoque in maritimis Dalmatiæ, unde habui a Prof. Visianio, et ex insula Pago a Biasoletto.

16. *EUPHORBIA Apios*: radice tuberosa, cerviculata; foliis oblongis, tenuiter serrulatis, umbella subquinquefida, bifida; involucellis rhombeis; nectariis integerrimis; capsula verrucosa.

E. *Apios* Sp. pl. p. 656. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 326. Ten. Nap. 4. p. 259.* et Syll. p. 233. n. 4.*

Apios Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 1336. fig. Ang. Sempl. p. 298. Dur. Herb. ed. Rom. 1585. p. 38. fig.

Tithymalus bulbosus Apios Fuch. Barrel. Ic. 832.

T. tuberosa radice Dod. Pempt. p. 373. fig.

T. tuberosa radice, Ischias Clus. Hist. pl. lib. 6. p. CXC. fig.

Ital. *Apios* Matth. l. c. *Esola ritonda* Imper. apud Clus. l. c.

Perenn. Habui ex argillosis Lucaniæ ab Eq. Prof. ΤΕΝΟ-
ΝΙΟ. Floret Majo.

Radix tuberosa, crassa, obverse ovoideo-fusififormis, inferne attenuata in fibram, superne arcuata in cervicem apice cauliferam tecta cortice fusco, intus alba. Caulis solitarius, vel duo-tres ex eadem radice, basi attenuati, et glabri, inferne ramosi, superne pilosi, steriles decumbentes, floriferi assurgentes, quinque-sexpollicares. Folia sparsa, ima minora, obovata, basi angustata, reliqua majora, oblonga, circiter semipollicaria, omnia obtusa, tenuiter serrulata, uninnervia, avenia, glabra, vel pilosa præsertim margine. Umbella terminalis, brevis, quadri-quinquefida, bifida, subinde simplex. In axillis supremis foliorum pedunculi pauci, solitarii, bifidi, aut uniflori umbellam comitantur. Foliola involucri similia foliis caulinis supremis, sed paulo breviora. Involucella rhombea. Utræque tenuiter serrulata. Nectaria subrotunda, integerrima, lutea. Capsula thecaphoro crassiusculo suffulta, grandiuscula, verrucosa, papillis obtusis. Semina lævia, fusca. Herba virens.

17. *EUPHORBIA epythymoides*: foliis ovatis, oblongisve, subtus pubescentibus; umbella subquinquefida, bifida; nectariis integerrimis; capsula grandi, crinita.

E. epythymoides *Sp. pl.* p. 656.

E. epythymoides *Roep. En. Euph.* p. 62. n. 9. excl. fig. Jacq.

E. fragifera *Jan. Cat. pl. phænog.* p. 76.* et *El.* p. 7. n. 40.* *Koch. Syn.* p. 629. *Reich. Exc.* 3. p. 757. n. 4765., et *Cent.* 7. p. 24. t. 647. fig. 870-872., et *Cent.* 15. p. 4. t. 136. f. 4765.

Tithymalus Pithyusa *Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 335.*

T. Epithymi fructu *Column. Ecp̄r.* 2. p. 52. fig. p. 51. optima.

Ital. Esola fragolosa.

Suffr. Habui ex montibus calcariis Tergestinis, ubi valde copiosa, a TOMMASINIO, ex monte *Karst* prope Tergestum a Prof. JANIO, ex thermis di *Monfalcone* a BERINIO, et a BRUMATTIO. Floret Majo, Junio.

Radix ramosa, sursum multiceps. Caules caespitosi, ascendentes, vel erecti, teretes, pubescentes, pilosi, aut glabri, palmares-pedales, inferne ramosi, et perennantes. Folia alterna, sparsa, potius crebra, sessilia, ovata, oblonga, et interdum lanceolata, integerrima, acutiuscula, supra glabra, aut vix pilosa, sub vitro minute granulata, subtus pubescentia, aut pilosa, a tribus, quatuorve lineis ad pollicem longa. Umbella terminalis, passim brevis, tri-quinquefida, bifida, subinde simplex, uni-biradiata. Pedunculi axillares accessorii nulli. Involucri foliola ovata, ovato-lanceolata, aut subrotunda, acuta. Involucella ovata, aut subrotundo-ovata, obtusa cum mucronulo. Nectaria subrotunda, integerrima, fusce rubentia. Capsula subglobosa, magnitudine ciceris, trisulca, tota crinita aculeis herbaceis, subulatis, longis, intorto-flexuosis, plerumque pulchre rubentibus, inter quos in statu juniori capsulae interjiciuntur pili longi, demum diffusi. Semen grandiusculum, ovoideum, læve, basi carunculosum, caruncula stipitellata, fusco-castaneum cum nebula tenui, cinerea, facile evanida. Herba virens, rigidula. Una tantum vice vidi biumbellatam.

Jacquinius forte oblitus plantæ, quam primo miserat ad Linnaeum, dedit in *Flor. Austr.* 4. p. 23. t. 344. sequentem speciem pro *Euphorbia epythymioide* L. At Fabius Columna reapse descripsit, et icone exacta exhibuit stirpem nostram, quæ magnitudine, et crinibus capsulae

a reliquis omnibus facile distinguitur. Is autem dixit, eandem longe lateque montes incolere, quos autem montes non indicavit, nec profecto siluisset, si fuissent in regno Neapolitano. Forte habuit cum aliis stirpibus Tyrolensibus a Fratre Gregorio Regiensi ex montibus Karstiz, et Tergestinis, ubi copiose provenit. Linnæus ex notis, quas in Sp. pl. l. c. dedit, evidenter egit de planta nostra, cui jure attribuit synonymon Columnæ, et vel ipsum nomen specificum a Columna desumpsit.

18. *Euphorbia dulcis*: caule cespitoso, decumhente; foliis lanceolatis; umbella subquinquefida, trifida, bifida; involuclis obovatis, obtusis; nectariis integerrimis; capsulis muricatis.

E. dulcis Sp. pl. p. 656. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 327., et Fl. Græc. 5. p. 50. t. 464. Reich. Exc. 3. p. 757. n. 4763., et Cent. 15. p. 3. t. 135. f. 4763.

E. epythymioides Bert. Pl. Gen. p. 65., et Amœn. Ital. p. 153. n. 138. Jacq. Austr. 4. p. 23. tab. 344. All. Ped. 1. p. 284. n. 1038. herb. Reich. Exc. 3. p. 757. n. 4764., et Cent. 15. p. 4. t. 136. f. 4764. Host. Austr. 2. p. 559.

E. verrucosa Re Seg. p. 40.,* et Tor. 1. p. 256.* Birol. Acon. 1. p. 161. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 220. Comoll. Prodr. p. 91. Lanf. Mant. in Conf. a Brugn. Giorn. dec. 2. tom. 10. p. 285.* Poll. Ver. 2. p. 105. Suffr. Foroj. p. 144. Jan. El. p. 7. n. 24.* Ten. Nap. 1. p. 268., et Syll. p. 236. n. 24. A. B. Guss. Sup. 1. p. 150.* Desf. Atl. 1. p. 383. Roep. En. Euph. p. 61. n. 7. Koch. Syn. p. 628. Gaud. Helv. 3. p. 284.

E. flavicoma De Cand. Cat. pl. hort. bot. Monsp. p. 110. n. 99., et Franç. 5. p. 364.

E. carniolica De Cand. Franç. 3. p. 342. ex ipso Auct. Tithymalus verrucosus Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 336. T. n. 1052. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 10. ex descr., et ex Fl. Græc.

T. nemorosus acutiori folio dulcis Barrel. Ic. 834.

Ital. Titimalo dolce.

Perenn. Legi Sarzanæ in Brina di Ponzano, Genus secus aquæductum extra portam del Zerbino, et al Lagazzo, Bononim in sylvis degli Arienti, a Barbiano, Gaibolla, Casalecchio. Habui ex agro Clavarensi alla Madonna di Mantallegro a Turio, ex Pedemontio in sylvis della Mandria a Prof. Re, et a BONJEANNIO, et a Superga ab Eq. PAROLINIO, ex Corni di Canzo ad Larium a RAINERO, ex districtu Bergomensis a

Sudorno, al Pascolo dei Tedeschi, et a Lovere a BERGAMASCHIO, Mantuâ a Bellacqua a BARBIERIO, ex districtu Bassanensi in sylvis di Romano, d' Angarano, et Solagna a MONTINIO, ex alpinis Feltrensibus alla Vallazza supra Auno ab EFqq. CONTARENO, et PAROLINIO, ex fruticetis, et dumetis Tergestinis a FACCHINIO, ex Euganeis ad thermas Aponis a MONTINIO, ex Ducatu Parmensi præsertim in monte Prinzero a BERTEO, et a Prof. JANIO, ex districtu Cameriniensi ai Capi di Visso a Prof. OCTAVIANO, ex Præutiis a Rocca di mezzo in sylva de' Cerri a Prof. MAIRIO, et ab OSSINO, ex Ducatu Lucensi al Prato fiorito a Prof. PETRO SAVIO, ex salinis Volaterranis ab AMINCO, ex Sicilia in sylvis di Caronia ab Eq. GUSSONIO. Floret Martio, Aprili.

Radix fusiformis, crassa, extus nigricans, superne soluta in surculos, a quibus proficiscuntur plures caules, æspitiosi, decumbentes, teretes, simplices, aut basi ramosi, dodrantaes-sesquipediales, glabri, vel pilosi, aut pubescentes, præsertim superne. Folia alterna, sparsa, sessilia, inter se potius remota, patentia, vel reflexa, ima minora, obverse lanceolata, aut obovata, obtusa, et subinde retusa, reliqua lanceolata, acuta, aut suprema latiora ovata, vel subrotunda, item acuta, aut obtusa, et interdum retusa, omnia integerrima, aut minute serrulata, supra læte viridia, subtus pallidiora, ludunt glabra, pilosa, vel pubescentia præsertim prope marginem, et subtus. Umbella terminalis, potius brevis, tri-quinqueradiata, trifida-bifida. Radii angulati, modo involucri æquant, modo longiores, effusi. Pedunculi axillares accessorii nulli. Foliola involucri caulinis supremis similia, viridia, rarius e viridi flavicantia. Involucella obovata, aut ovata, obtusa, quandoque viridia, plerumque vero læte flavicantia, integerrima, vel minutissime, et remote serrulata. Radii umbellæ cum involucri, et involucellis variant glabri, pilosi, pubescentes. Flos centralis, et alares longiuscule, et crassiuscule pedicellati, terminales brevissime. Petala subrotunda, integerrima, lutea. Capsula muricata aculeis herbaceis, potius brevibus, cylindræis, obtusis, viridibus, vel rubentibus, pilis interjectis nullis. Semina ovoidea, lævia, velo cinereo tenui obducta, sub quo fuscæscunt, prope hilum instructa caruncula depressa, sessili, reniformi, lutea. Planta in apricis sæpe rubens.

Linnaeus monet in Sp. pl. 1. c., plantam hanc exsiccatione nigram evadere, quod quidem contingere vidi in plantis humiditate madidis, non in omnibus. In Pl. Gen., et in Amæn. Ital. deceptus a planta Fl. Austr. 4. t. 344. perperam habui hanc pro *Euphorbia epythymioide* L., dum sumpseram speciem sequentem pro *Euphorbia dulci* L. Num *Euphorbia verrucosa* All. Ped. 1. p. 287. n. 1050. sit hujus loci, dici nequit, cum desit exemplar in herbario Allionii.

19. *EUPHORBIA purpurata*: radice tuberoso-nodosa; caule erecto, foliis obverse oblongis, obovatisve, obtusis; umbella subquinqesida; involuocellis triangularibus; capsulis verrucosis.

E. purpurata Thuill. Paris. II. 1. p. 235. Re Tor. 1. p. 255., et Ad Fl. Ped. app. p. 22. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 218. Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec. 2. tom. 10. p. 286. Pollin. Ver. 2. p. 102. Morett. in Mem. 1. p. 268. De Cand. Franc. 3. p. 342. Lois Desl. Gall. 1. p. 284.,* et ed. 2. tom. 1. p. 346.*

E. dulcis Jacq. Austr. 3. p. 8. t. 213. non Linn. All. Ped. 1. p. 285. n. 1040. Balb. Taur. p. 77. Re Seg. p. 40. Birol. Acon. 1. p. 161. Coll. Herb. Ped. 5. p. 126. n. 18. Ten. Nap. 4. p. 261. A. B., et Syll. p. 235. n. 18. Reich. Cent. 2. p. 34. t. 143. f. 266. 267. Koch. Syn. p. 628. a. β. Host. Austr. 2. p. 559. Gaud. Helv. 3. p. 282. a. β.

E. solisqua Reich. Exc. 3. p. 756. n. 4759., et Cent. 15. p. 3. t. 134. f. 4759., et b. *purpurata*. Riv. Tetr. irreg. t. 117.

Tithymalus dulcis Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 334.

T. n. 1051. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 10. excl. syn. Barrel.

T. dulcis tuberosa rad. Barrel. Ic. 909.

Ital. Titimalo bitorzoluta.

Perenn. Legi Sarzanæ in colle di Sarzanello, in Liguria occidua in alpinis della Scaggia retro Pegli, Bononiæ in sylvis di Montecastello, et degli Arienti. Filius attulit ex Apennino Bononiensi all' Acero. Habui ex Ducatu Parmensi a Prof. JANIO, ex Pedemontio in sylvis collinis ad Albam Pompejam a BERTERO, ex agro Mediolanensi secus torrentem Seveso a DE CRISTOFFORIS, ex agro Mantuano al Bosco Fontana a BARBIERIO, ex Tyroli meridionali a S. Rocco prope Tridentum a FACCHINIO, ex districtu Bassanensi in Valsugana a Grigno, et in sylvis S. Michaelis d'Angarano a MONTINIO, et ab Eq. FAROLINIO, ex montanis

Tergestinis di *Cologna*, et in monte *Kokush* a *Tommasino*, et a *Biaseletto*, Tarvisio a *Mogliano* a *Majero*, ex sylvis *Maceratensibus* ab *Eq. Narduccio*, ex *Piceno* in valle *Canetra* a *Prof. Maurio*, et *Asculo* ab *Orsino*, ex monte *Pisano* a *Erpici*, et a *S. Maria del Giudice*, et ex *Apennino Pistoriensi* al-
P *Abetone* a *Prof. Petro Savio*, ex sylvis *Viterbiensibus* a *Camillio*. Floret Aprili, Majo.

Radix tuberoso-nodosa, articulata, carnosae, horizontalis, subinde ramosa, articulis subrotundis, gemmas cauliferas ferentibus, deorsum radicanibus fibris ramulosis. Caulis teres, erectus, vel adscendens, simplex, potius gracilis, basi squamatus, spithamalis-pedalis. Folia alterna, sparsa, inter se remotiuscula, obverse oblonga, vel obverse lanceolata, aut obovata, obtusa, et subinde retusa, rarius acutiuscula, integerrima, aut apice leviter serrulata, supra laete, aut saturate viridia, subtus pallidiora, inferiora breviora, suprema interdum ovato-oblonga, aut lanceolata. Umbella terminalis, tri-quinquesida, bifida, vel dichotoma, radiis tenuibus, patentibus, utantibus. Pedunculi bifidi, vel dichotomi, aut etiam simplices, uniflori, siti in axillis supremis saepe comitantur umbellam. Foliola involucri universalis ovato-oblonga, aut lanceolata, obtusa, vel acuta. Involucella cordato-triangularia, acuta, aut obtusa. Utraque integerrima, aut minute serrulata. Nectaria subrotunda, integerrima, atro-rubentia, vel lutescentia. Capsula verrucis inaequalibus, papulosis, saepe purpurantibus adpersa, quae modo interjiciuntur pili, modo desunt. Semina ovoidea, laevia, instructa prope hilum caruncula stipitellata. Tota herba ludit glabra, vel pilosa; subinde etiam involucella occurrunt margine purpurantia.

20. *EUPHORBIA saxatilis*: caule decumbente; foliis inferioribus lineari-cuneatis, retusis, creberrimis, supremis ovatis, distinctis; umbella quinquesida; involu-
cellis semiorbiculatis; nectariis leviter semilunatis; capsula angulis scabra.

E. saxatilis *Murr. Syst. veg. ed. 14. p. 452. n. 47. Willd. Sp. pl. 2. par. 2. p. 912. Jacq. Austr. 4. p. 23. t. 345. Marz. El. p. 32. Morett. in Mem. 1. p. 269. Pollin. Ver. 2. p. 103. Suffr. Foroj. p. 144. Koch. Syn. p. 632. Reich. Exc. 3. p. 761. n. 4786., et Cent. 15. p. 7. t. 144. f. 4786. Host. Austr. 2. p. 561.*

Ital. *Titimale rupino*.

Perenn. Habui ex rupibus del *Firozzo di Portule* in Septem Communibus Vicetinarum, a Prof. MORETTO. Floret Majo, Junio.

Radix longa, flexuosa, fusca, simplex, vel ramosa. Caulis decumbens, teres, inferne ramosus, subpalmaris. Folia caulina inferiora, et ramea creberrima, imbricata, lineari-cuneata, obtusa, et passim retusa, integerrima, uninervia, avenia, glabra, glauca, ima subinde retroflexa, suprema in caule florifero alterna, inter se distincta, ovato-oblonga, vel subrotunda, aut subrotundo-rhombea. Umbella terminalis, quinquefida, bifida, cum flore sessili in centro, et in bifurcationibus. Foliola involucri subcordata, subrotunda, vel rhombeo-subrotunda. Involucella subcordato-semiorbiculata. Utraque obtusa, subinde cum mucronulo brevissimo in medio. Nectaria læviter semilunata, obtusa, luteola. Capsula angulis minute granulato-scabra, reliqua parte lævis. Semina lævia, obducta nebula cinerea. Tota planta glabra.

21. *EUPHORBIA Pineæ*: caule erecto; foliis creberrimis, linearibus, obtusis, patentibus, reflexisque; umbella quinquefida, dichotoma; nectariis longe bicornibus, cruribus setaceis; capsula angulis scabra; seminibus foveolatis.

E. Pineæ Syst. nat. ed. 12. tom. 2. p. 333. n. 64. *Biv. Bern. Man.* 4. p. 19. tab. 5.* *Guss. Pl. rar.* p. 193.,* et *Fl. Sic. prodr.* 1. p. 548. a.*, et *Sup.* 1. p. 149. c., et cc.*

E. segetalis *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 163.* excl. syn.

E. cæspitosa *Ten. Nap.* 1. p. 323. t. 143. f. 2.,* et *Syll.* p. 235. n. 21.*

E. linifolia *Ten. Prodr. in Fl. Nap. I.* p. XXIX.*

E. pithyusa *Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 198. non Linn.

E. portlandica *De Salis. in Bot. zeit. ann.* 1824. p. 5.* non Linn.

E. ragusana *Reich. Exc.* 3. in add. p. 873. n. 478a. b., et *Cent.* 15. p. 6. t. 143. f. 478a. b.

Titlymalus Lini folio major Italicus *Barrel. Ic.* 821. *Mich. Cat. hort. Flor.* p. 95. n. 20.

T. perennis, non repens, *Linariæ* foliis creberrimis, et angustioribus, umbella virescente, sectionibus florum lunatis atque bicornibus, fructu oblongo ad angulos subaspero, semine punctato *Mich. Cat. hort. Flor. app.* p. 179. n. 20.

T. persicus Linariæ folio reptante radice *Zanon. ed.*

Mont. p. 218. t. 169. bona.

Ital. Titimalo Pino marino.

Perenn. Legi in vertice *Castellana*, et in insula *Palmaria* Portus *Lunæ*, ubi copiosa. Habui *Genuâ* a *GRIOLETO*, ex insula *S. Andreæ* ad *Istriam* a *TOMMASINO*, et ex insula *S. Catharinæ* a *BIASOLETTO*, *Româ* ad portam *S. Pancratii*, et ex radicibus *Circæi*, ubi frequens, a *PPR. SEBASTIANO*, et *MAURIO*, ex oris *Neapolitanis* ab *Eq. Prof. TENORIO*, *Panormo* ab *Eq. BIVONA-BERNARDIO*, denuo ex *Sicilia*, ex *Ustica*, ex *Cosyra*, et *Insula sacra in Ægadibus*, ex *Lopadusa*, et *Linosa* in *Pelagiis*, ex insula *Câprearum*, et ex *Inarime* in mari *Neapolitano* ab *Eq. GUSONIO*, ex *Ilva* a *Prof. PETRO SAVIO*, ex *Planaria* a *Prof. GIULIO*, ex *Gorgonia* a *Prof. ANT. TARCIONIO-TOZZETTO*, et denuo a *Prof. PETRO SAVIO*, ex *Sardinia* ab *Eq. Prof. MORISTO*, ex *Corsica* in rupibus maritimis *di Bastia* a *DE SALIS*, et a *S. Manza* a *SOLEIROLIO*. Floret *Julio*, *Augusto*.

Radix fusiformis, vel fusiformi-ramosa, plus minus crassa, flexuosa. *Caulis* teres, erectus, vel adscendens, simplex, aut inferne ramosus, cæspitosus, a spithama ad pedem, et sesquipedem longus, in aprico rubens, in ima parte cito denudatus, et scabèr a reliquiis foliorum delapsorum in quincuncem dispositis. *Folia* sparsa, creberrima, sessilia, linearia, integerrima, uninervia, patentia, vel reflexa, nunc viridia, vix glauca, nunc omnino glauca, senio passim rubentia, omnia, aut inferiora obtusa cum, vel sine mucronulo, alias superiora acuta, aut acutiuscula; item ludunt vel cuncta in caule linearia, vel suprema latiora, rhombeo-lanceolata, rhombeo-ovata, aut oblongo-lanceolata. *Folia* ramealia angustiora. *Umbella* terminalis, quinque-septemfida, pluries dichotoma, sæpe grandis, et elongata, rarius quadrifida, dichotoma. *Pedunculi* accessorii plures, solitarii, axillares in axillis superioribus, dichotomi comitantur umbellam. *Foliola* involucri universalis variant lanceolata, oblongo-lanceolata, rhombeo-lanceolata, vel rhombeo-ovata, acutiuscula, aut acuta. *Involucella* semiorbiculata, aut cordato-subtriangula, concava, obtusa cum mucronulo, vel acutiuscula. Interdum radii umbellæ valde elongati, et repetito dichotomi vestiuntur conjugationibus numerosis horum involucellorum sine floribus, et

Flor. Ital. T. V.

5

bractearum vices gerentibus. Nectaria bicornia, luteola, cruribus longis, setaceis, acutis. Capsula angulis granulato-scabra. Semina ovoidea, velo cinereo obducta, undique foveolis insculpta, prope hilum caruncula cernica, subsessili instructa. Tota planta glabra, in apri-
co hic illic senio rubens.

Huic speciei valde proxima est *Euphorbia portlandica* L., quæ tamen differt statura minore, foliis lineari-spathulatis, nectariis læviter semilunatis, obtusis, nec forte provenit extra Britanniam. Possideo exemplar ejus ex *Lancashire* ab Woodsio, optimeque exhibetur in Raj. Syn. ed. 3. tab. 24. fig. 6., et in Engl. bot. v. 7. t. 441. Reichenbachius quoque egregie representavit in Cent. 15. tab. 148. fig. 4795. desumens ab exemplari Anglico, quocum confudit plantam Dalmaticam pro-
fecto diversam. *Euphorbia pinea* L. nascitur quoque in Dalmatia, eamque habeo ex insula *Surio* a Prof. VISIARIO. Est autem omnino eadem cum *Euphorbia Ragusana* Reich. superius allata, neque color herbæ virens, aut glaucus sistit differentiam essentialem inter hujusmodi plantas.

22. *EUPHORBIA segetalis*: annua; caule erecto; foliis anguste linearibus, acuminatis; umbella quinquefida, dichotoma; nectariis bicornibus, cruribus setaceis; capsula angulis dense granulato-scabra; seminibus foveolatis.

E. segetalis Sp. pl. p. 657., et Mant. alt. p. 393. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 328., et Fl. Græc. 5. p. 52. t. 467. Jacq. Austr. 5. p. 25. t. 450. All. Ped. 1. p. 286. n. 1045. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 219. Ten. Nap. 1. p. 266., et Syll. p. 235. n. 20. Roep. En. Euph. p. 66. n. 22. Koch. Syn. p. 633. Reich. Exc. 3. p. 760. n. 4780. excl. syn. Ten., et Cent. 15. p. 6. t. 142. f. 4780. Host. Austr. 2. p. 563.

Titimalo leptifillo Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 1317. fig. Tithymalus leptophyllus Lugd. hist. 2. p. 1645. fig.

Ital. Titimala campestris.

Anni. Legi in Lunæ portu alla Spezia prope arcem, a S. Terenzo in scopulis supra S. Catharinam, et in litore proximo dicto *Lavallà*. Hæui ex Liguria occidua in vicis prope Albingannum a Prof. SASSIO, ex agro Nicænsi ab Eq. Prof. MORISIO, ex regno Neapolitano in arvis Principatus ultra, et Prætutiorum citra, nec non ex Inarime ab Eq. GUSSONIO. Floret Junio, Julio.

Radix gracilis, fusiformis, vel fusiformi-ramosa, flexuosa, alba. Caulis teres, erectus, vel adscendens, simplex, aut inferne parce, breviterque ramosus, spithamalis-pedalis. Folia sparsa, crebra, sed minus quam in præcedente, anguste linearia, acuminata, uninervia, integerrima, brevissime petiolata, patula, vel reflexa, ima breviora, cito decidua, suprema subinde paulo latiora, lanceolata. Umbella terminalis, quinque-sexfida, dichotoma, vel macrior bifida. Pedunculi accessorii siti in axillis superioribus, solitarii, bifidi, vel dichotomi sæpe comitantur umbellam. Involucrum universalis foliola ludunt lanceolata, rhombeo-lanceolata, vel rhombeo-ovata, plus minus acutata. Involucella triangularia, vel rhombea, magis lata, quam longa, obtusa cum mucronulo exiguo. Nectaria bicornia, luteola, cruribus longis, setaceis, acutis. Capsula in dorso coccorum fascia latiuscula dense granulato-scabra, reliqua parte lævis. Semina ovoidea, velo cinereo obducta, undique foveolata, instructa prope hilum caruncula sessili, reniformi. Totâ planta glabra, nunc intense glauca, nunc magis virens.

Nullus dubito, quin auctores interdum confuderint hanc cum præcedente, et profecto ego accepi utramque simul junctam sub uno eodemque nomine *Euphorbia segetalis*.

23. *EUPHORBIA Pithyusa*: foliis creberrimis, apice involuto-acuminatis, inferioribus, rameisque lanceolato-linearibus, declinatis, superioribus lanceolatis; umbella quinquefida, bifida; nectariis læviter semilunatis, obtusis; capsulis glabris; seminibus reticulato-rugulosis.

E. Pithyusa *Sp. pl.* p. 656. *Sav. Bot. Etr.* 1. p. 146. *De Cand. Franç.* 3. p. 334. excl. syn. *Matth. Reich. Exc.* 3. p. 761. n. 4788., et *Cent.* 15. p. 7. tab. 145. f. 4788.

Tithymalus maritimus, *Juniperi folio* *Bocc. Sic.* p. 9. tab. 5. fig. II. *E. herb. Bonon. Moris. Oxon. sect.* 10. tab. 1. fig. 25.

Ital. Pithusa.

Suffrut. Legi prope Genuam inter Quarto, et Sturla, ubi copiosa, et Genus in litore alla Foce. Habui ex pineto Ravennati a Gozzio, ex litore di Livorno a Brunnero, ex Gorgonia a Prof. ANT. TARGIONIO-Tozzetto, ex Sardinia a Badaroo, ex Corsica a Calvi a Soleirolio. Floret ab Junio in Augustum.

Radix potius crassa, fusiformis, vel fusiformi-ramosa. Caulis teres, decumbens, adscendens, vel erectus, inferne valde ramosus, subinde etiam superne, spithamalis-dodrantalis. Folia sparsa, caulina inferiora, et ramea anguste lanceolato-linearibus, creberrima, deflexa, et deorsum imbricata, caulina superiora latiora, lanceolata, paulo remotiora, omnia integerrima, supra concaviuscula, apice involuto-acuminata, mucronata. Umbella terminalis, quinque-septemfida, dichotoma, macrior quadrifida, bifida. Pedunculi in axillis superioribus solitarii, bifidi, vel dichotomi, sæpe plures umbellam comitantur. Foliola involucri universalis, et involucella ovata, vel ovato-subrotunda. Utraque breviter mucronata. Nectaria levissime semilunata, obtusa, luteo-aurantia, aut luteo-virescentia. Capsula lævis, glabra. Semina ovoideo-subtetragona, leviter reticulato-rugulosa, reticulo cinereo, maculis, punctisque nigris interjectis, prope hilum instructa caruncula exigua, reniformi, flava, sessili. Tota planta glabra, intense glauca, rarius virens.

Hæc species omnino incolit oram maritimam; quare ad eam referri nequit *Euphorbia Pithyusa* All. Ped. 1. p. 285. n. 1041. ex Sabaudia, et Pedemontio, neque tamen dicere possum, quid sit planta Allionii, cum exemplar desit in ejus herbario. Pari ratione excludenda est ab *Euphorbia Pithyusa* L. stirps illa agro Veronensi solemnis, quam *Pithysam* vocavit Matthioli Com. ed. Valgr. 1585. tom. 2. p. 1319. fig. incompl., et quæ certissime pertinet ad *Euphorbiam nicaensem* All., de qua mox loquar.

24. *EUPHORBIA Paralias*: foliis coriaceis, lanceolatis, imbricatis; umbella subquinquefida; involucellis cordato-semiorbiculatis, concavis; nectariis semilunatis; capsulis, seminibusque lævibus.

E. Paralias Sp. pl. p. 657. Jacq. Hort. Vind. 2. p. 88. t. 188. All. Ped. 1. p. 286. n. 1042. Coll. Herb. Ped. 5. p. 123. n. 12. Pollin. Ver. 2. p. 104. Ruch. Ven. p. 119. Moric. Ven. 1. p. 379. Nacc. Ven. 3. p. 49. Suffr. Foroj. p. 144. Bert. Amæn. Ital. p. 242. n. 49. Sav. Pis. 1. p. 455.* et Bot. Etr. 1. p. 144.* Seb. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 163. Ten. Nap. 1. p. 265., et Syll. p. 234. n. 14. Ab Ucr. Hort. Pan. p. 198. Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 547.* et Sup. 1. p. 149. a. b.* Desf. Atl. 1. p. 281. De Cand. Franç. 3. p. 334. Koch. Syn. p. 633. Reich. Ero. 3. p. 761. n. 4789., et Cent. 15. p. 7. t. 145. f. 4789. .

- E. paralia* *Smith. Engl. Fl.* 4. p. 63., et *Engl. bot.* v. 3. tab. 195. *Hook. Brit. Fl.* ed. 2. p. 382. *Bert. Pl. Gen.* p. 65., et *Amæn. Ital.* p. 153. n. 137. *Roep. En. Euph.* p. 66. n. 21. *Host. Austr.* 2. p. 562.
E. n. 3. *Ginann. Pin. Rav.* p. 231.
Tithimalo Paralia *Matth. Valgr.* 1585. tom. 2. p. 1313. fig. incomp. *Anguil. Sempl.* p. 293.
Marittimus *Thiithimalus* *Cesalp. De pl. lib.* 9. cap. 9. p. 375.
Tithymalus maritimus *Cup. Hort. Cath.* p. 214.
T. Paralias *Castell. Hort. Mess.* p. 23.
T. paralius marin. *Donat. De' sempl.* p. 101. fig.
T. paralias, maritimus *Zannich. Ist.* p. 259. t. 40.
T. marittimus glauco folio *Mich. Cat. hort. Flor.* p. 95. n. 18., et *app.* p. 178. ad n. 18.
T. Paralius ex locis maritimis *Dod. Pempt.* p. 370. fig.
Ital. Tortomaglio marino. Tortomaglio titimaloide *Targ. Tozz. Diz. bot.* 2., p. 99.
Suffrut. Communis in universo litore Italico. Legi in litore Lunensi alla *Marinella*, in Lunæ portu ad S. Bartholomæum prope Spediam, in Liguria occidua a *Sestri di Ponente*, et observavi in litore Ravennati. Habui Genuâ a *RAINERO*, Nicæâ ab *Eq. Prof. MORISIO*, ex ora Adriatica a *Monfalcone*, et Grado a *TOMMASINIO*, Fossâ Clodiâ a *MONTINIO*, Comaclo ab *Eq. CAMILLO SALINA*, ex ora circumpadana inter *Mesola*, et *Folano* a *FELISIO*, ex litore Ravennati a *Gozzio*, ex districtu Ariminensi alla *Catolica* ab *AZZAROLIO*, Senogalliâ a *SALVATORIO*, Anconâ a *MARCHISIA*, et a *MARZIALETTO*, ex portu di *Recanati* ab *Eq. NARDUCCIO*, Cuprâ maritimâ a *PASSERINIO*, ex litore Asculano ad S. Benedictum ab *ORSINO*, ex litore Firmano a *MARZIALETTO*, et a *Prof. OCTAVIANO*, ex litore Pisano ab *Eq. Prof. CAJET.*, et a *Prof. PETRO SAVIO*, Ostiâ a *BRUNNERO*, ex Sicilia ad Drepanum, et Segestam, ex Lopadusa, et Pieria ab *Eq. GUSSONIO*, ex Iliâ a *Prof. GIULIO*, ex Corsica a *Calvi* a *SOLEIROLIO*. Floret ab Junio in Augustum.
Radix fusiformis, vel fusiformi-ramosa, longa, flexuosa, sæpe crassa. Caulis teres, erectus, vel ascendens, basi ramosus, cæspitosus, ramis strictis, aliis sterilibus, aliis floriferis, subinde etiam superne ramosus, spithamalis-sesquipedalis. Folia numerosissima, creberrima, undique sparsa, plerumque in plures series imbricata, alias vel omnia, vel superiora patentia,

crassa, coriacea, concaviuscula, diu persistentia, integerrima, enervia, aut subenervia, obtusa, vel acuta, aut saltem acutiuscula, inferiora breviora, et angustiora, lanceolata, vel lanceolato-linearia, superiora grandiora, ovato-lanceolata, aut oblongo-lanceolata. Umbella terminalis, tri-quinquefida, vix ultra, bifida, vel dichotoma. Sæpe pedunculi solitarii, bifidi, vel dichotomi, siti in axillis superioribus umbellam comitantur. Foliola involucri universalis ludunt subrotundo-ovata, ovata, ovato-lanceolata, aut ovato-oblonga, acuta, foliis caulinis in cæteris similia. Involucella cordato-semiorbiculata, obtusa cum mucronulo exiguo, concava, subinde in radiis pluries repetita, et bracteiformia, ut in specie sequente. Nectaria semilunata, cornibus brevibus, lutea. Capsula lævis. Semina grandiuscula, subrotunda, lævia; velo cinereo obducta, sub quo fuscescunt, prope hilum instructa caruncula exigua, sessili, reniformi, lutea. Tota planta glabra, et intense glauca, rarius glauco-virens.

25. *EUPHORBIA Cupani*: foliis coriaceis, remotiusculis, obverse lanceolatis, acutis, uninerviis, imis serrulatis; umbella subquinquefida; involucellis rombeo-obovatis; nectariis semilunatis; capsulis lævibus; seminibus reticulato-scabris.

E. Cupani Guss. *Fl. Sic. prodr.* 1. p. 548.* sub *Euph. tanaicensis*.

E. tanaicensis Guss. *l. c.* p. 547.*

Tithymalus Timelææ linarifolio foliis *Cup. Panph.* 2. t. 155. ex Guss.

Ital. *Tortomaglio Gnidio*.

Suffrut. Habui ex Sicilia ad Drepanum, et Segestam ab Eq. Gussonio. Floret a Majo in Septembrem.

Præcedenti proximâ; differt notis sequentibus. Caulis altior, bi-tripedalis, minus ramosus. Folia minus crebra, obverse lanceolata, uninervia, facile difflua, ima obtusa, serrulata, reliqua acuta, integerrima, aut apice serrulata. Umbella longior. Foliola involucri caulinis superioribus similia, sed paulo latiora. Involucella rhombeo-obovata, mucronulata, integerrima, vel superne serrulata, subinde in radiis pluries repetita, et bracteiformia, ut in præcedente specie. Nectaria læviter semilunata, corniculis magis distantibus. Capsula lævis. Semina reticulato-scabra. Tota planta glauco-virens.

26. *EUPHORBIA Myrsinites*: foliis coriaceis, obovato-spathulatis, mucronatis, margine scabridis; umbella submultifida, bifida; nectariis breviter bicornibus, capitellatis; capsula lævi; seminibus longitudinaliter rugoso-reticulatis.
- E. Myrsinites* *Sp. pl.* p. 661. herb. ex *Guss. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr.* 1. p. 331., et *Fl. Græc.* 5. p. 55. tab. 471. *Guss. Pl. rar.* p. 195.,* et *Fl. Sic. prodr.* 1. p. 555.,* et *Sup.* 1. p. 152.* *Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 199. *Ten. Nap.* 4. p. 264., et *Syll.* p. 237. n. 29. *Brocch. Oss. nat. in Bibl. Ital. tom.* 29. p. 81. *Reich. Exc.* 3. p. 762. n. 4796., et *Cent.* 15. p. 8. t. 148. f. 4796. opt. *Host. Austr.* 2. p. 566.
- E. rigida* *Ten. Nap.* 4. p. 265. excl. plur. syn., et *Syll.* p. 237. n. 31.
- Titimalo Mirsinite Matth. Valgr.* 1585. tom. 2. p. 1312. fig. incomp. *Anguill. Sempl.* p. 292. ex loco.
- Tithymalus Myrsinites*, latifolius *Cup. Hort. Cath.* p. 213. *Tourn. Inst.* p. 86. herb. ex *Guss.*
- T. Myrsinites* *varior pingui crasso fol. e crasso virens* *Barrcl. Ic.* 1200.
- Esula folio Myrti Riv. Tetr. irr. t.* 216. bona.
- Ital. Titimalo Mirsinite. Tortomaglio* *Anguill. Sempl.* p. 292.
- Suffrut.* Habui ex *Montigno* in districtu Camerinenſi a Prof. OCTAVIANO, ex Piceno alla Madonna dell' Ambro prope Montefortino a MARZIALETTO, ex Bocca di Cerri, et ex Castel di Sangro in regno Neapolitano ab ORSINO, ex Nebrodibus Siciliæ ab Eq. GUSONIO, ex Corsica in editis di Campotile a SOLEIROLIO. Floret a Majo in Julium.
- Radix fusiformis*, aut fusiformi-ramosa, crassa. Caules teretes, crassi; cæspitiosi, decumbentes, spithamales-pedales, simplices, rarissime uno, alterove ramo instructi, inferne a foliis deciduis cicatrisati, et sæpe rubentes. Folia sparsa, crebra, sessilia, initio imbricata, postea patula, vel deflexa, crassa, coriacea, obovato-spathulata, vel obverse lanceolata, breviter cuspidata, cuspidate involuto, superiora in caulibus junioribus sterilibus longius cuspidata, utraque integerrima, margine cartilaginea, et scabrida, concaviuscula. Umbella terminalis, plerumque sexfida, bifida, sed ludit quinque-octofida, bifida, brevis, radiis crassis. Rarius in axillis supremis augetur uno, alterove pedunculo bifido. Involucri universalis foliola late obovata,

vel late rhombea, obtusa cum mucronulo in medio. Involucella cordato-semiorbiculata, mucronata. Perigonii laciniae ovatae, quinque nudae, ciliolatae, convergentes, quinque erectae, et nectariiferae. Nectaria semilunata, lutea, corniculis brevibus, apice capitellatis. Capsula grandis, trigona, oblonga, laevis. Semina oblonga, longitudinaliter rugoso-reticulata, cinerea, prope hilum instructa caruncula crassa, lutea, subsessili, convexa, rugosa, apice umbilicata. Tota planta glabra, et intense glauca more *Euphorbiae Paralias* L.

Ad hanc, non ad sequentem, referendam puto figuram Matthioli, quam superius adduxi, licet nonnulli contrariam sententiam teneant. Matthiolius exhibuit formam surculorum juniorum sterilium, in quibus folia sunt observationibus quoque nostris paulo angustiora, obverse lanceolata, seu basi insigniter angustata, superiora vero acuminata, acumine saepe producto, quae folia nullo pacto habentur in sequente.

Obtinui quoque hanc speciem ex insula *Cherso* ad Dalmatiam a Biasoletto, et ex *Corcyra* in Joniis in monte S. Salvatoris a Talbotio, et Braila.

27. *EUPHORBIA biglandulosa*: foliis coriaceis, lanceolatis, acuminatis; umbella submultifida, bifida; nectariis breviter bicornibus, capitellatis; capsula, seminibusque laevibus.

E. biglandulosa Desf. in *Annal. du Mus. d'hist. nat.* t. 12. p. 114. tab. 14. Guss. *Pl. rar.* p. 197.,* et *Fl. Sic. prodr.* 1. p. 555.,* et *Sup.* 1. p. 152.*

Tithymalus myrsinites Matth. *Bonan. Panph.* t. 158. bona.

T. Græcus, Amygdali folio acutissimo et glauco, caule purpureo *Tourn. Coroll.* p. 1. herb. ex Guss.

T. *Myrsinites latifolius* Raj. *Stirp. Eur. extr. Britan. nasc. syll.* p. 282. ex loco.

Ital. *Mirsinite bastarda*.

Suffr. Habui ex collibus Siciliæ ab Eq. Gussone. Floret Februario, Martio.

Valde proxima præcedenti, a qua differt hisce notis. Caulis decumbens, ascendens, vel erectus, a dodrante ad sesquipedem longus. Folia longiora, exacte lanceolata, acuminata, inferne latiuscula. Umbella sex-duodecimfida, bifida. Folia involucri universalis lanceolata, vel rhombeo-obovata, acuminata. Capsula multo grandior, acute trigona, laevis. Semina oblonga, tetragona, laevia, obducta velo cinereo tenui, prope

hilum instructa caruncula crassa, insigni, sessili, convexa, lutea, umbilicata. Tota planta hic quoque glabra, et intense glauca.

Hujus speciei profecto non est *Euphorbia rigida* Marsh. juxta exemplar lectum a Brunnero in Tauria meridionali prope *Alupkan*, et ab eodem mihi benevole concessum. Hæc facile dignoscitur herba viridj, vix glaucescente, nectariis fusce purpureis, seminibus sphaeroides; quare Sprengelio Syst. veg. 3. p. 801. n. 200. assentiri nequeo, qui eam cum *Euphorbia biglandulosa* Desf. consociavit.

Aliam *Euphorbiam biglandulosum* ex Willdenowii Sup. p. 27. recepit Sprengelius in Syst. veg. 3. p. 789. n. 52., quæ novo nomine distinguenda est.

28. *EUPHORBIA dendroides*: caule fruticoso, erecto; foliis tenuibus, lanceolatis; umbella submultifida; involucellis semiorbiculatis; nectariis obiter semilunatis; capsula, seminibusque lævibus.

E. dendroides Sp. pl. p. 662. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 330., et Fl. Græc. 5. p. 54. t. 470. All. Ped. 1. p. 289. n. 1058. Coll. Herb. Ped. 5. p. 118. n. 2. Pollin. Ver. 2. p. 111., et 3. p. 798. Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 165. Ten. Nap. 4. p. 260., et Syll. p. 234. n. 12. Ab. Ucr. Hort. Pan. p. 199. Bio. Bern. Cent. 1. p. 34. n. 31.* Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 545., et Sup. 1. p. 148. Moris. Stirp. Sard. cl. fasc. 1. p. 40.* Moris. et De Not. Capr. p. 118. Desf. Atl. 1. p. 377. De Cand. Franç. 3. p. 340. Reich. Exc. 3. p. 758. n. 4772., et Cent. 15. p. 5. t. 140. f. 4772. opt.

E. divaricata Jacq. Ic. rar. 2. p. 9. t. 87.

Tithimalo dendroide Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 1316. ex loco. Fig. mala.

Titimalo petreo Anguill. Sempl. p. 294.

Tithymalus arborescens Cæsalp. De pl. lib. 9. cap. 11. p. 376. ex loco.

T. dendroides, mai. et verior, Ital. Barrel. Ic. 910.

T. siciliensis oleæ folio caule tumente Zan. Hist. ed. Mont. p. 219. t. 168.

T. arboreus Alp. Exot. p. 69. fig.

Ital. *Tortomaglio dendroide* Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 98.

Frut. Legi in insulis Palmaria, et Tyro Portus Lunæ. Observavi a Porti in finibus Etruriæ cum Montignoso in rupibus marmoreis, ubi Cæsalpinus quoque, et unde obtinui a Prof. PUCCINELLIO. Habui ex pineto Clavavarensi in Liguria orientali a TURIO, Terracinâ, ubi

copiosissima, et ubi vidcrat Matthiolius, a FIORINIA-MAZZANTIA, Panormo ab Eq. BIVONA-BERNARDIO, ex insula *Monte Cristo* in mari Tyrrheno a Prof. GIULIO, ex Sardinia ab Eq. Prof. MORISIO, et ex collibus Calaritanis a Prof. DE NOTARIS, ex Corsica a Bonifacio a SERAFFINIO, et a Calvi a SOLEIROLIO. Floret Majo, Junio.

Radix ramosa. Caulis fruticosus, lignosus, teres, crassus, erectus, ramosus, a pede ad duos cubitos altus, inferne nudus, et cicatricibus foliorum delapsorum crebre notatus. Rami ludunt alterni, gemini, vel terni, junioribus foliosis, et sæpe rubentibus. Folia sparsa, crebra, tenuia, lanceolata, obtusiuscula, aut vix acuta, basi quidquam angustata, patentia, vel reflexa, etiam pollicem, aut sesquipollicem longa, uninervia, integerrima, læte viridia cum levi glaucescencia. Umbella terminalis, tri-oclofida, sæpius tamen quinque-sexfida, bifida, vel dichotoma, præ planta potius brevis. Pedunculi accessorii nulli. Foliola involucri universalis caulinis similia. Involucella subcordato-semiorbiculata, grandia, obtusa, nunc viridia, nunc e viridi flavicantia. Neotaria obiter semilunata, obtusa, luteola. Capsula lævis, multo minor, quam in præcedente. Semina subrotunda, compressiuscula, lævia, prope hilum instructa caruncula cristæformi, sessili, lutea. Tota planta glabra. Folia, et involucra senio sæpe rubent.

Possideo exemplar ramis superioribus tumentibus, ut in figura Zanoniana, puto ab insecti nidulantia punctura.

29. *EUPHORBIA fruticosa*: caule fruticoso, erecto; foliis lanceolatis, acuminatis, basi angustatis; umbella quinquefida, trifida, bifida; involucellis obovatis; nectariis subrotundis; capsula verrucosa; seminibus lævibus.

E. fruticosa Biv. Bern. Cent. 1. p. 35. n. 32.* Guss. Fl. Sic. Prodr. 1. p. 545.* et Sup. 1. p. 149. a.*

E. spinosa Desf. Atl. 1. p. 380. tab. 101. herb. ex Guss. Tithymalus arboreus, tuberosa radice, mollioribus foliis semine verrucoso aspero Bocc. Mus. di piant. p. 109. t. 88.

β foliis brevioribus, ovato-lanceolatis.

Euphorbia fruticosa b Guss. Sup. 1. p. 149.*

E. papillaris Jan. El. p. 7. n. 74.*

Ital. Tortomaglio arbuscello.

Frut. Habui ex Sicilia in monte Peregrino ab Eq. BIVONA-BERNARDIO, a BRUNNARO, et ab ORANGERO, et in montibus di Val di Mazzara ab Eq. GUSSONIO.

Varietatem β accepi ex *Ægusa* a Prof. JANIO, et ex insula Sacra ab Eq. GUSONIO. Floret Martio, Aprili, et subinde iterum autumnò.

Radix ramosa. Caulis teres, fruticosus, erectus, dichotomus, plerumque rubens, uni-tripedalis, et ultra. Rami erecti, nunquam spinescentes. Folia sparsa, lanceolata, acuminata, firmula, basi angustata, breviter petiolata, patentia, vel reflexa, supra late viridia, lævia, subtus glaucescentia, et sub vitro minutissimo granulata, ima breviora. Umbella terminalis, quinquefida, trifida, bifida, brevis. Unus, alterve pedunculus accessorius, axillaris in foliis supremis subinde comitatur umbellam. Foliola involucri foliis caulinis similia. Involucella obovata, obtusa, vel mucronata, viridia, aut flavicantia. Nectaria subrotunda, integerrima, lutea. Capsula obtuse trigona, trisulca, undique adspersa verrucis brevibus, crassis, ovoideis, obtusis, ægre deliiscens. Semina ovoidea, compressiuscula, lævia, castaneo-ferruginea, instructa prope hilum caruncula sessili, convexa. Tota planta glabra. Umbella radii, et involucella senio sæpe rubent. Varietas β differt tantum foliis brevioribus, ovato-lanceolatis, acutis, vel supremis obtusis, involucri ovatis, obtusis.

Hæc species longe distat ab *Euphorbia spinosa* L., ad quam Desfontainesius male retulit.

30. *EUPHORBIA orientalis*: caule herbaceo, erecto; foliis lanceolatis; umbella quinquefida, trifida, dichotoma; involucri rhombeis; nectariis subrotundis; capsula superne aculeis subramosis muricata; seminibus lævibus.

E. orientalis Sp. pl. p. 660. in herb. Banks. ex Guss. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 330. herb. Sibth. ex Guss., et herb. Bonon.

E. ceratocarpa Ten. Nap. 1. p. 268. t. 43., * et Syll. p. 236. n. 25. * Guss. Pl. rar. p. 194., * et Fl. Sic. prodr. 1. p. 553., * et Sup. 1. p. 151.*

Tithymalus palustris, Amygdali folio glauco, leviter hirsutus Cup. Hort. Cath. p. 213., et Sup. alt. p. 88.

T. folio longo glauco, caule rubro, seminibus verrucosis Raj. Stirp. Europ. extr. Brit. nasc. syll. p. 276.

T. folio longo glauco, caule rubro, capsulis verrucosis, elatior, sculus Raj. Hist. 1. p. 872. n. 44.

T. orientalis, Salicis folio, caule purpureo, flore magno Tourn. Coroll. p. 2.

Ital. Tortomaglio cornuto.

Perenn. Habui Neapoli in valle di *S. Rocco*, ai *Camaldoli*, et a *Bagnara* ab Eq. Prof. *TENORIO*, ex *Apulia* in ripis dell'*Ofanto* prope *Barletta*, ex *Calabria*, et *Sicilia* ab Eq. *GUSSONIO*. Floret a Majo in Julium.

Radix fusiformis, aut fusiformi-ramosa. *Caulis* plerumque cespitosus, teres, erectus, vel adscendens, simplex, a sesquipede ad tres pedes longus, sæpe rubens. *Folia* sparsa, sessilia, lanceolata, obtusa, vel acutiuscula, mucronulata, inferne angustata, integerrima, utrinque late viridia cum lævi glaucescentia, patentia, nervo basi crasso dirempta, plus quam pollicem longa, quatuor-quinque lineas lata. *Umbella* terminalis, quinquefida, trifida, dichotoma, elongata, effusa, dum macrior quinquefida, trifida, bifida. *Pedunculi* accessorii plures, solitarii in axillis superioribus, trifidi, dichotomi, aut bifidi. *Foliola* involucri rhombeo-ovata. *Involucella* obovata, flavicantia, rarius viridia. *Utraque* obtusa cum mucronulo. *Nectaria* subrotunda, integerrima, lutea. *Capsula* grandiuscula, trigona, profunde trisulca, superne muricata aculeis corniculiformibus, herbaceis, crassis, simplicibus, ramosisve, incurvis. *Semina* ovoidea, compressiuscula, lævia, matura fusco-plumbea, instructa prope hilum caruncula subtipitellata, convexa, parva, lutea. *Tota planta* glabra.

31. *EUPHORBIA nicæensis*: foliis crebris, subcoriaceis, lanceolatis, acutis, obtusisve, mucronulatis; umbella submultifida; involucellis simiorbiculatis; nectariis breviter bicornibus; capsula, seminibusque lævibus.

E. nicæensis Willd. *Sp. pl.* 2. par. 2. p. 921. *Jacq. Ic. rar.* 3. p. 6. t. 485. *All. Ped.* 1. p. 285. n. 1039. t. 69. f. 1.* *Coll. Herb. Ped.* 5. p. 129. n. 27.* *Pollin. Ver.* 2. p. 108. *De Cand. Franc.* 3. p. 358.* et 5. p. 363. a.* *Roep. En. Euph.* p. 65. n. 20. *Koch. Syn.* p. 632. a. *β. Reich. Exc.* 3. p. 762. n. 4795., et *Cent.* 15. p. 8. t. 148. f. 4795.

E. japygica Ten. *Nap.* 4. p. 266.* sine fig., licet afferatur, et *Syll. app.* p. 509.*

E. serotina Host. *Austr.* 2. p. 562. ex loco.

E. glareosa Marsh. ab *Biebst. Cauc.* 1. p. 373., et 3. p. 324. ex specim. Taur.

Tithymalus Seguierii Scop. *Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 335. t. 20.

Pitiusa della campagna di Verona Matth. *Valgr.* 1585. tom. 2. p. 1320. fig. incompl. in p. 1319.

Pytyusa Calz. Viag. di mont. Bald. p. 7.

Tithymalus creticus Alypi folio *Zanon. Hist. pl. ed. Mont. p. 220. t. 170.*

T. foliis brevibus aculeatis Segui Ver. 1. p. 154. n. 3. tab. 3: fig. 1.

β foliis lanceolato-linearibus, acuminato-mucronatis; umbella e centro prolifera.

*Euphorbia biumbellata Moris. Pl. sicc. ex Sard.**

α foliis elliptico-oblongis, obverse oblango-spathulatis, obtusis.

Euphorbia nicænsis Ten. Nap. 1. p. 274., et Syll. p. 238. n. 36.**

E. nicænsis β *pannonica Reich. Cent. 15. p. 8. t. 148. f. 4795.*

E. pannonica Host. Austr. 2. p. 566.

Tithymalus marinus rotundifolius Italicus Barrel. Ic. 824. pl. macrior.

δ foliis inferioribus parvis, obovatis, supremis majoribus, cordatis; involucris, involucellisque ample orbiculatis.

Euphorbia Baselicis Ten. Nap. 4. p. 265. t. 143. f. 1., et Syll. p. 237. n. 32.* Reich. Cent. 15. p. 7. t. 144. f. 4786. b.*

Tithymalus marinus latifolius Italicus Barrel. Ic. 823. Ital. Titimalo olivello.

Perenn. Habui ex agro Nicænsi a MOLINERIO, ab Eq. Prof. MORISIO, et a COLLA, ex agro Veronensi a RAINERO, et a MAJERO, ex districtu Tergestino, ubi copiosa, a TOMMASINIO, ex *Monfalcone* a BRUMATTIO, ex Præutiis a Pizzoli a Prof. MAURIO, et a CECCHETTO, ex Japygia a Lecce ab Eq. Prof. TENORIO. Varietatem β obtinui ex Sardinia ab Eq. Prof. MORISIO. Varietatem α accepi ex alpebus Apuanis inter vertices *Pisanino*, et *Pizzo d'uccello* a Prof. PETRO-SAVIO, ex *Hetruria* in serpentinis di *Montecerboli* ab AMIDEO, ex Præutiis ab Eq. Prof. TENORIO. Varietas δ missa ex viciniis di *Marta* in valle Albingaunensi *Liguriz* occidue a BADAROO, et a Prof. SASSIO, ex *Valstagna*, et *Val della corda* ad canalem di *Brenta* a MONTINIO, ex agro Volaterrano ab Eq. NARDUCCIO, ex Gargano ab Eq. Prof. TENORIO, et a GASPARRINIO, tum inter *Cerignola*, et *S. Cassano* ab Eq. GUSSONIO. Floret Junio.

Radix fusiformis, aut fusiformi-ramosa, lateraliter fibrosa. Caulis decumbens, adscendens, erectus, teres, simplex, vel basi ramosus, et cæspitosus, uni-bipedalis, sæpe rubens. Folia sparsa, crebra, sessilia,

subeoriacea, lanceolata, obtusa, vel acuta, mucronulata, integerrima, basi tri-quinquenervia, patentia, vel reflexa, superiora subinde latiora. Umbella terminalis, sex-duodecimfida, bifida, rarius quadri-quinquefida, bifida. Sæpe in axillis foliorum superiorum pedunculi accessorii, solitarii, bifidi. Involucri foliola ludunt subrotunda, late ovata, aut ovato-oblonga. Involucella cordato-semiorbiculata, lutescentia, luteo-aurea, vel omnino viridia. Utraque obtusa onm mucronule exiguo. Nectaria lutea, breviter bicornia, cornibus crassiusculis, obtusis. Capsula lævis, sicca facile corrugata. Semina ovoidea, compressiuscula, lævia, cinerea, prope hilum instructa caruncula reniformi, sessili, depresso-convexula, lutea. Tota planta glabra, e viridi glaucescens, senio rubens præsertim in parte superiore.

Varietas β habet folia angusta, lanceolato-linearia, valde acuminato-mucronata. E centro umbellæ produciuntur pedunculus nudus, vel subnudus, ipsa fere duplo longior, qui apice fert aliam umbellam. Reliqua omnino ut in typo speciei. Habeo exemplaria ex districtu Tergestino foliis acutis, mucronatisque, quæ nexum faciunt inter speciem, et hanc varietatem.

Varietas α differt tantum foliis latioribus, elliptico-oblongis, aut obverse oblongo-spathulatis, obtusis cum, vel sine mucronulo.

Varietas δ habet folia inferiora parva, obovata, suprema grandiora, cordato-ovata, aut cordato-subrotunda, amplexicaulia, omnia obtusa cum, vel sine mucronulo. Involucra, et involucella late cordato-orbiculata, obtusissima. Subinde involucra ludunt late cordato-ovata.

Exemplar lectum a Brunnero in Tauria juxta domum Cl. Stevenii, et mihi benevole concessum demonstrat, *Euphorbiam glareosam* Marsh. omnino convenire cum *Euphorbia nicæensi* All.

32. *EUPHORBIA Tommasiniana*: caule erecto; foliis sessilibus, cordato-lanceolatis, cuspidatis, basi dilatatis; umbella submultifida, bifida; nectariis breviter semilunatis, obtusis; capsula angulis scabra; seminibus lævibus.

Ital. *Esola lanciuala*.

Perenn. Habui ex montibus calcariis Tergestinis præsertim in viciniis di Bare a TOMMASINIO, et a BIASOLETTO. Floret Junio.

Caulis teres, erectus, vel adscendens, simplex, aut basi subramosus, spithamalis-pedalis. Folia sparsa, firmula, potius approximata, sessilia, cordato-lanceolata, basi dilatata, apice cuspidata, acuta, vel superiora acuminata, integerrima, uninervia, stricta, ima breviora, cito diffusa, superiora circiter semipollicem longa. Umbella terminalis, parva, septem-decemfida, bifida. Pedunculi accessorii plures, bifidi, solitarii in axillis superioribus. Involucri foliola foliis caulinis supremis similia, interdum vero cordato-ovata, mucronulata. Involucella cordato-triangularia, acuta, magis lata, quam longa. Nectaria laeviter semilunata, atro-purpurea, corniculis brevibus, obtusis, subinde apice luteolis. Capsula parva, angulis minute granulato-scabra, reliqua parte laevis. Semina ovoidea, laevia, maturata castaneo-fusca. Tota planta glabra, et glaucescens.

Illustris Præses Mutius Tommasinius, eum mitteret ad me hanc plantam, monuit, eam olim confusam fuisse cum *Euphorbia Gerardiana*, quæ profecto diversa; addidit quoque, esse qui putent, eandem pertinere ad *Euphorbiam neapolitanam* Ten., quæ magis adhuc recedit. Ipse Tommasinius rem sensit, neque ullo nomine specifico stirpem distinxit, quod ego a nomine ejus desumptum jure merito statuendum duxi.

33. *EUPHORBIA Gerardiana*: foliis subcoriaceis, lanecolato-linearibus, mucronulatis, basi angustatis; umbella submultifida, dichotoma; involucellis semiobicularis; nectariis integris, sublunatisve; capsulis undique scabris; seminibus laevibus.

E. Gerardiana Willd. *Sp. pl.* 2. par. 2. p. 920. *Jacq. Austr.* 5. p. 17. t. 436. *Balb. Taur.* p. 78. *Re Tor.* 1. p. 265.* *Birol. Acon.* 1. p. 162. *Coll. Herb. Ped.* 5. p. 130. n. 31. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 221. *Pollin. Ver.* 2. p. 107. *Ten. Nap.* 1. p. 272., et *Syll.* p. 237. n. 33. *De Cand. Franç.* 3. p. 337. *Lois. Desl. Gall.* 1. p. 281.* et ed. 2. tom. 1. p. 341.* *Roep. En. Euph.* p. 65. n. 18. *Koch. Syn.* p. 630. *Reich. Exc.* 3. p. 762. n. 4794., et *Cent.* 15. p. 8. tab. 147. f. 4794. *Host. Austr.* 2. p. 565. *Spreng. Hal.* p. 136. t. 3. f. 1. *Gaud. Helv.* 3. p. 280.

E. Seguierii All. *Ped.* 1. p. 288. n. 1054.* et 2. p. 364.* *Re Seg.* p. 40.*

Tithymalus Paralias Scop. *Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 338.

T. n. 1055. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 11.

T. n. 18. *Ger. Gallopr.* p. 540.

T. Amygdaloides angustifolius *Tabern. Ic.* 591.

Ital. Esula linoide.

Perenn. Habui ex Pedemontio in alveis fluminum, præsertim Padi a MOLINERIO, a Prof. RE, et a BERTERO, ex Corsica in promontorio Sacro a SOLEIROLIO. Floret Majo, Junio.

Caulis teres, subpedalis, basi decumbens, et valde ramosus, cæspitosus, ramis simplicibus, erectis, strictis, subæqualibus, fere omnibus simul floriferis. Folia parva, sparsa, crebra, subcoriacea, lanceolato-lineararia, aut lineararia, acuta, mucronulata, integerrima, basi trinervia, et angustata, ut veluti brevissime petiolata videantur; ludunt erecta, patentia, vel reflexa; superiora sæpe paulo latiora. Umbella terminalis, octo-decemfida, dichotoma, macrior bifida. Pedunculi accessorii bifidi, vel dichotomi sæpe occurrunt in axillis superioribus. Involucri foliola ovata, vel oblonga, mucronulata, patentia, aut reflexa. Involucella parva, rhombeo-semiorbiculata, vel subcordato-semiorbiculata, plerumque mucronulata. Nectaria lutea, nunc subrotunda, integerrima, nunc antice tridentata, nunc obiter semilunata. Capsula parva, passim tota minute granulato-scabra, rarius lævis, vel angulis tantum scabra. Semina ovoidea, lævia, cinerea, prope hilum instructa caruncula reniformi, depresso-convexiuscula, lutea. Tota planta glabra, et glaucescens.

34. *EUPHORBIA aleppica*: caule erecto; foliis lineari-setaceis, creberrimis, umbella quinquefida, dichotoma; involuclis ovatis, acuminato-aristatis; nectariis semilunatis; seminibus scabris.

E. aleppica *Sp. pl.* p. 657. *Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr.* 1. p. 326., et *Fl. Græc.* 5. p. 49. t. 462. *Reich. Exc.* 3. p. 760. n. 4781., et *Cent.* 15. p. 6. t. 142. f. 4781.

E. Pineæ *All. Ped.* 1. p. 286. n. 1044.*

Tithymalus *Cyparissius* *Alp. Exot.* p. 65. fig. p. 64.

T. argenteus maritimus leptophyllus *Triumf. Obs.* p. 65. herb. Bonon. *Mich. Cat. hort. Fl.* p. 95. n. 21.

T. maritimus, annuus, admodum glaucus, et quasi argenteus, foliis crebris, tenuissimis, florum sectionibus lunatis et barbatis, fructu lævi, semine rugoso aut punctato *Mich. l. c. app.* p. 179. n. 21.

Ital. Esula crinita.

Ann. Habui ex agro Nicænsi a MOLINERIO, ex campis Apuliæ sub Gargano, et ex Calabria a Briatico prope Monteleone ab Eq. GUSSEONIO. Floret Junio.

Radix fusiformis, aut fusiformi-ramosa, longa. Caulis teres, erectus, vel adscendens, simplex, aut basi ramosus, foliis densissime tectus, a palmo ad pedem longus. Folia sparsa, creberrima, imbricata, linearisetacea, acuminata, mucronata, scabra, ima breviora, decidua, remanentibus cicatricibus, suprema longiora, et quidquam latiora. Umbella terminalis, longa, quinquesida, dichotoma. Pedunculi accessorii, longi, dichotomi, siti in axillis superioribus. Involucri foliola ovato-lanceolata, aut lanceolata. Involucella ovata. Utraque acuminato-aristata. Nectaria semilunata, luteola. Capsula minutissime granulato-scabra, subinde laevis. Semina subglobosa, granulato-scabra, cinereo-alba; deterso velo cinereo, subtus fusca. Tota planta glaucescens.

Accepi quoque ex Dalmatia ad Spalatum a Prof. Visianio, et a Biasoletto, et ex Peloponneso ad Naupliam a Prof. Zuccarinio.

35. *ΕΥΡΗΩΝΙΑ* *Cyparissias*: caule erecto, superne ramoso; foliis linearibus, rameis angustissimis; umbella multifida, dichotoma; nectariis semilunatis; seminibus laevibus.

E. Cyparissias *Sp. pl.* p. 651. *Smith. Engl. Fl.* 4. p. 66., et *Engl. bot.* v. 12. t. 840. *Hook. Brit. Fl. ed. 2.* p. 382. *Jacq. Austr.* 5. p. 16. t. 435. *Plenck. Ic. pl. med.* 4. p. 65. t. 367. *Bull. Pl. ven.* t. 97. *All. Ped.* 1. p. 288. n. 1055. *Balb. Taur.* p. 78. *Re Seg.* p. 40., et *Tor.* 1. p. 257. *Birol. Acon.* 1. p. 162. *Coll. Herb. Ped.* 5. p. 131. n. 32. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 221., et 383. *Comoll. Prodr.* p. 91. *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec.* 2. tom. 10. p. 286. *Pollin. Ver.* 2. p. 107. *Ruch. Ven.* p. 120. *Moric. Ven.* 1. p. 381. *Nacc. Ven.* 3. p. 51.* *Suffr. Foroj.* p. 144. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 282. *Bert. Pl. Gen.* p. 65., et *Amæn. Ital.* p. 153. n. 139. *Sav. Bot. Etr.* 1. p. 146.* *Seb. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 164. *Ten. Nap.* 1. p. 271.,* et *Syll.* p. 238. n. 35.* *De Cand. Franç.* 3. p. 337. *Roep. En. Euph.* p. 64. n. 17. *Koch. Syn.* p. 631. *Reich. Exc.* 3. p. 762. n. 4793., et *Cent.* 15. p. 8. t. 147. f. 4793. *macrior. Host. Austr.* 2. p. 565. *Gaud. Helv.* 3. p. 278.

E. Esula *Ten. Nap.* 1. p. 270.* non Lin. Planta præcox.

E. esnloides *Ten. Syll.* p. 258. n. 34.,* et *Fl. Nap. t.* 232. f. 1.* pl. præcox.

Tithymalus Cyparissias *Scop. Carn. ed. 2. tom.* 1. p. 339.

T. n. 1047. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 8.

Tithimalo Cyparissio *Matth. Valgr.* 1585. t. 2. p. 1315. fig. *Flor. Ital. T. V.*

- Esula in officinis in campestribus proveniens *Cæsalp. De pl. lib. 9. cap. 7. p. 374.*
Cyparissa Calz. Viag. di mont. Bald. p. 7.
 Tithimalo Ciparisso del Lobelio, et da altri (malamente) stimato Esula minore *Pon. Mont. Bald. p. 3.*
Tithymalus cyparissias major Mich. Cat. hort. Fl. p. 95. n. 8., et app. p. 177. sub n. 8.
T. cyparissias Mich. Cat. hort. Flor. p. 95. n. 9. 10., et app. p. 177. sub n. 9. 10. Zannich. Ven. p. 260. t. 114. f. 2. Segui. Ver. 1. p. 157. n. 5.
 β luxurians; umbella e centro iterum umbellifera.
Euphorbia Cyparissias var. Spreng. Syst. veg. 3. p. 802. sub. n. 206.
E. biumbellata Desf. Atl. 1. p. 387. herb. ex Guss. Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 549. ex ipso Guss., qui vidit in meo herb.
Ital. Erba Cipressina. Erba di Gabbreto. Erba lattona. Erba rognà. Esula minore. Rogna di muro. Titimalo ciparissia, o ciparissio. Tortomaglio ciparissia Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 98.
Perenn. Vulgaris in viis, ruderatis, marginibus agrorum, pascuis, inque rupestribus, sterilibus, etiam in montanis. Legi Sarzanæ in arvis ad Macram, Bononiæ in collibus omnibus. Habui ex Gothardo Italico ab Eq. BASSIO, ex Tyroli Italico in *Fiemme* prope *Sommeda*, in *Fassa a Soraga*, *Fiano*, et *Penia* a FACCHINIO, ex districtu Bassanensi ad vias d' *Angarano*, et in campis di *Roman* a MONTINIO, ex agro Tergestino a TOMMASINIO, ex litore Clodiensi a Prof. NACCARIO, Senogalliâ ad flumen *Misa* a SALVATORIO, ex Piceno alle *Piane di Falerone* in ruinis theatri antiqui, et in monte *Volubrio* a MARZIALETTO, ex agro Pisano ab Eq. Prof. SAVIO, Volaterris ab AMIDEO, Interamnâ, et Terracinâ a FIORINIA-MAZZANTIA, ex montibus ad Sarnum in Campania felici a GASPARRINIO, Neapoli secus viam di *Poggio reale* ab Eq. Prof. TENORIO, et ab Eq. GUSSONIO, ex pascuis montanis Dauniae denuo ab Eq. Prof. TENORIO. Varietatem β accepi ex Liguria orientali ad fodinas schisti tegularis in monte S. Jacobi prope *Lavagna* a TURIO. Floret a Martio in æstatem.
 Radix stolonibus sursum gemuniferis longe repens. Caulis teres, erectus, solitarius, a spithama ad sequepedem longus, initio simplex, postea superne ramosus. Rami sparsi, modo pauci, modo numerosi, plerumque

steriles, in plantis præcocius breves, in serioribus elongati, et arbusculæ modo corymbosi. Folia sparsa, numerosa, crebra, patula, linearia, tenuia, basi aque lata ac in tota longitudine, supra læte viridia, subtus glauca; in caule primario latiora, acutiuscula, vel obtusa cum, aut sine mucronulo, ima præ supremis brevissima, et decidua, remanentibus cicatricibus; in ramis crebriora, angustissima, et subinde fere setacea, acuta. Umbella terminalis, multiradiata, dichotoma, aut bifida. Pedunculi accessorii dichotomi, aut bifidi passim in axillis superioribus. Involucri foliola lanceolata, vel linearia. Involucella cordato-semiorbiculata, plerumque intense flavescentia, senio pulchre rubentia. Utraque obtusa, aut acutiuscula. Nectaria semilunata, luteola. Capsula granulis minutis scabra, subinde lævis. Semina ovoidea, lævia, matura flavido-ferruginea, prope hilum instructa caruncula reniformi, sessili, depresso-convexula, lutea. Tota planta glabra, valde lactescens.

Varietas β est lusus ex loco humenti, luxurians caule bipedali, simplici, aut vix ramoso, foliis caulinis ab imo ad summum paulo ultra lineam latis, circiter pollicem longis, rameis multo angustioribus, inferioribus obtusis, superioribus acutiusculis, umbella primaria multifida, bifida, involucrata foliolis lanceolatis, vel lanceolato-linearibus, in reliquis folia caulina superiora referentibus. Ex ejus centro prodit pedunculus nudus, ipsa fere duplo longior, apice sustinens aliam umbellam multifidam, bifidam, involucratam foliolis ovatis, aut ovato-lanceolatis, acuminatis. Reliqua omnia ut in specie, ad quam jure merito traxit Sprengelius, quidquid alii in contrarium sentiant.

Folia hujus speciei in pagina inferiore sæpe infestantur *Æcidio Cyparissia*, tuncque fiunt latiora, obtusa, morboque squallentia. In hoc statu planta a nonnullis habita est pro distincta specie, vel pro varietate, sed perperam, cum sit stirps degenerans ad pathologiam pertinens. Ramulus ita morbosus, et fungifer exhibetur a Jacquino in Fl. Austr. l. c.

36. *EUPHORBIA Esula*: caule erecto, breviter ramoso; foliis obverse lanceolatis, obtusis, acutiusculis; umbella multifida, dichotoma; involucellis cordato-semiorbiculatis; nectariis rhombeis, corniculatis; seminibus lævibus.

E. Esula Sp. pl. p. 660. Smith. Engl. Fl. 4. p. 65., et Engl. bot. v. 20. t. 1399. Plenck. Ic. pl. med. 4. p. 67. t. 370. All. Ped. 1. p. 288. n. 1053. Bir. Acon. 1. p. 162. Coll. Herb. Ped. 5. p. 129. n. 26. Nocc. et Balb. Tio. 1. p. 220. Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec. 2. t. 10. p. 286.* Sav. Bot. Etr. 1. p. 147. De Cand. Franç. 5. p. 361. Roep. En. Euph. p. 64. n. 15. Koch. Syn. p. 631. Reich. Exc. 3. p. 761. n. 4791., et Cent. 15. p. 8. t. 146. f. 4791. Host. Austr. 2. p. 564.

Tithymalus n. 1046. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 8.

Tithymalo *Cyparissio* affinis, lato *Leucoij* folio, erecta, non ramosa, multicaulis *Bocc. Mus. di piant.* p. 30. t. 15. ex loco, et ex herb. Bonon.

β foliis obverse lanceolato-linearibus, elongatis.

Ital. *Esula minore*. *Scombran* Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 98.

Perenn. Legi Sarzanæ in *Camisano*, ubi frequens, Bononiæ *alle Grotte*, in ripis *Sapenæ*, a *Paderno*, et a *Casalecchio* in campis secus *Rhenum*. Habui ex agro Mantuano a *BARBIERO*, ex Ducatu *Lucensi* in campis arenosis secus *Auserem* a Prof. *Puccinellio*, ex Agro *Pisano* a Prof. *Petro Savio*. Varietatem β accepi ex agro *Lucensi* in monte *Fegatese* a *BUBANIO*. Floret Aprili, Majo.

Radix late repens, scatens gemmis cauliferis. Caulis teres, erectus, superne sæpe ramosus, ramis alternis, brevibus, sterilibus, sesqui-bipedalis, subinde rubens. Folia sparsa, inter se remotiuscula, obverse lanceolata, obtusa, vel acutiuscula, integerrima, inferne angustata, et veluti brevissime petiolata, patula, aut reflexa, supra late viridia, subtus glaucescentia, inferiora breviora, superiora pollicaria, et etiam sesquipollicaria; ramea conformia, sed minora. Umbella terminalis, octo-decemfida, dichotoma, elongata. Pedunculi accessorii longi, dichotomi, vel breves, bifidi, passim plures, solitarii in axillis superioribus. Involncri foliola oblonga, vel lanceolata, obtusa, aut acutiuscula, vel acuta. Involucella cordato-semiorbiculata, vel cordato-triangulari, magis lata, quam longa, obtusa cum, vel sine mucronulo, viridia, aut viridi-flavescentia. Nectaria corpore rhombeo, breviter corniculata, cruculis obtusis, e luteo purpurea. Capsula vel tota laevis, vel granulis minutissimis præsertim in dorso medio coccorum scabra. Semina ovoidæ, lævia, fusca, prope hilum instructa caruncula reniformi, sessili, depressa, lutea. Tota planta glabra; raro perficit

fructum, quia gemmis radicalibus passim multiplicatur.

Varietas β gaudet foliis angustioribus, et longioribus, obversæ lanceolato-linearibus, obtusis, vel acutiusculis, circiter duos pollices longis, duas lineas latis, rameis paulo brevioribus, et angustioribus. In reliquis nulla diversitas a specie.

37. *EUPHORBIA Triumphetti*: caule erecto; foliis lanceolato-linearibus, elongatis, utrinque angustatis, acutis, margine cartilagineis; umbella submultifida, bifida; involucllis rhombeo-ovatis; nectariis longe bicornibus; capsula angulis scabra; seminibus lævibus.

Tithymalus repens folio *Esulæ* minoris *Dodonæi* glauco tamen, et elatior *Triumph.* *Observ.* p. 65. herb. Bonon.

Ital. *Esula serpeggiante*.

Perenn. Habui ex pineto Ravennati a Gozzio. Floret Aprili, Majo.

Multa habet præcedentis speciei, sed differt notis sequentibus. Latius radice repit. Caulis bipedalis, et etiam paulo ultra, simplex, vel superne ramosus. Folia lanceolato-linearia, tam inferne, quam superne angustata, acuta, vel acuminata, margine cartilaginea, integerrima, duos pollices longa, sesquilineam, vel duas lineas lata, ramea multo minora, et angustiora, acuminata. Umbella terminalis, quinque-quindecimfida, bifida, multo brevior. Pedunculi accessorii plures, bifidi, axillares in foliis superioribus per sat longum caulis tractum. Involucris foliola ovata, aut lanceolata, acuta. Involucella rhombea, in luxuriantibus plantis rhombeo-semiorbiculata, mucronulata. Nectaria semilunata, cornibus longis, luteo-fusca. Capsula in dorso coccorum minute granulato-scabra. Semina ovoidea, lævia, coloris cinereo-glauci, prope hilum instructa caruncula pallide luteola, subsessili, subrotunda, antice incisura connivente. Tota planta glabra, viridi-glauescens.

Planta nostra appropinquat quoque *Euphorbiam virgatam* Waldst. et Kit.; sed hujus folia sunt multo breviora, basi lata, apice acutiuscula, herba saturate viridis.

38. *EUPHORBIA serrata*: foliis linearibus, lanceolatisve serratis, superioribus latioribus, cordato-amplexicaulibus; umbella quinquefida, trifida, dichotoma; nectariis subrotundis; capsulis, seminibusque lævibus.

E. serrata *Sp. pl.* p. 658. *Jacq. Ic. rar.* 3. p. 5. t. 484. *Bull. Pl. ven.* t. 75. *All. Ped.* 1. p. 287. n. 1049.* *Coll. Herb. Ped.* 5. p. 124. n. 15. *Ten. Nap.* 4. p. 260.* *et Syll.* p. 235. n. 17.* *Desf. Atl.* 1. p. 383. *De Cand. Franç.* 3. p. 336. *Reich. Exc.* 3. p. 760. n. 4784., *et Cent.* 15. p. 6. t. 144. f. 4784.

Anonymos Gesn. Op. bot. ed. Schm. p. 125. n. 123. *tab. ære sculp.* 14. *fig.* 123.

Tithymalus myrtites *Valentinus Clus. Hist. pl. lib.* 6. p. CLXXXIX. *fig.*

T. Characias *V. Dod. Pempt.* p. 369. *fig.*

T. Characias serratifolius *Ger. em.* p. 500. *fig.*

T. serratus Dalechampii *Ludg. hist.* 2. p. 1649. *fig.*

T. Characias folio serrato *Moris. Oxon. sect.* 10. *tab.* 1. *fig.* 3.

Ital. Titimalo dente di sega.

Perenn. Habui ex agro Nicænsi a MOLINERIO, et ab Eq. Prof. MORISIO, ex agro Fundano *alle Gole d' Itri* ab ORSINO, et ab Eq. Prof. TENORIO. Floret Majo.

Radix longa, fusiformis, flexuosa. *Caulis* decumbens, adscendens, teres, striatus, simplex, vel alterne ramosus, ramis brevibus, sterilibus, dodrantalis-pedalis, et etiam paulo ultra. *Folia* sparsa, sessilia, inter se potius remota, lanceolata, vel linearia, supremis sæpe basi dilatatis, subcordato-amplexicaulibus, longe cuspidatis; omnia argute serrulata, ludunt acutiuscula cum mucronulo, acuta, aut acuminata, ramea minora. *Umbella* terminalis, tri-quinquefida, dichotoma, vel bifida; dum luxuriat longa, et radiis primariis crassiusculis pollens. *Pedunculi* accessorii nulli. *Foliola* involucri lata, et sæpe valde, cordato-ovata, acuta, aut cuspidata, argute serrulata. *Involucella* quoque cordato-ovata, acuta, inferiora majora, serrulata, in luxuriantibus plantis latissima, semiorbiculata; superiora minora, subintegra; utraque e viridi flavicantia. *Nectaria* subrotunda, fulva, margine externo sæpe erosula. *Capsula* oblonga, trigona, trisulca, lævis. *Semina* oblonga, obtuse subtetragona, lævia, subinde superne subpilosa, flavicantia, instructa prope hilum caruncula elevata, pallide luteola. Tota planta glabra, et intense glauca.

39. *EUPHORBIA carniolica*: radice tuberoso-nodosa, horizontali; caule erecto; foliis obverse lanceolatis, obovatisve; umbella quinquefida, bifida; floribus longe pedicellatis; capsulis verrucosis; seminibus lævibus.

E. carniolica Willd. *Sp. pl.* 2. par. 2. p. 910. *Jacq. Austr.* 5. p. 34. app. t. 14. *Morett. in Mem.* 1. p. 269. *Pollin. Ver.* 2. p. 102. α .^{*} β .^{*} γ .^{*} *Koch. Syn.* p. 628. *Reich. Exc.* 3. p. 757. n. 4760., et *Cent.* 15. p. 3. t. 134. f. 4760. *Host. Austr.* 2. p. 561.

Tithymalus pilosus Scop. *Carn. ed. a. tom.* 1. p. 336. t. 21. *Ital. Titimalo penzolo.*

Perenn. *Habui* ex *Valmeria* supra *Mandello* ad *Larinum* ab *Eq. Cesate*, ex *Baldo* in vallibus *Fredda*, et *Novesa*, et ex alpiibus *Tridentinis Scanuccia*, et *Campogrosso* a *POLLINIO*, ex *Tyroli Italico* in *Fiemme*, et in pratis subalpinis *della Bella* a *FACCHINIO*, ex viciniis *di Marostica* ab *Eq. PAROLINIO*, ex sylvis *d'Angarano*, *d'Oliero*, et *Roman* a *MONTINIO*, ex montibus *Forojuliensibus* a *Prof. BRIGNOLIO*, a *CERNAZAO*, et a *RAINERO*. Floret ab *Aprili* in *Junium*.

Radix tuberosa, rhizomate crasso, inæqualiter nodoso, horizontali, sæpe ramoso, extus nigrescente, deorsum radicante fibris ramulosis, sursum gemmas caulinas ferente. Caulis teres, striatus, erectus, vel ascendens, passim spithamalis-pedalis, dum luxuriat bi-tripedalis, simplex, pilosus; inferne cito nudus, basi squamatus. Folia sparsa, inter se remota, et magis inferiora, obverse lanceolata, vel obovata, aut oblongo-obovata, in petiolam brevem angustata, obtusa, aut acutiuscula, tenuia, integerrima, plus minus pilosa præsertim subtus, rarius tota glabra, patentia, supra late viridia, subtus pallentia, imâ multo minora. Umbella terminalis, quinquefida, bifida, radiis tenuibus, sæpe nutantibus, floribus omnibus longe pedicellatis. Pedunculi accessorii bifidi, vel simplices uniflori in axillis foliorum superiorum. Involucri foliola obovata, obverse lanceolata, aut elliptico-oblonga, breviterque petiolata. Involucella elliptico-ovata, subinde grandia. Utraque integerrima, obtusa, vel acutiuscula. Perigonium passim extus pilosum. Nectaria subrotunda, integerrima, flava. Capsula potius grandis, obtuse trigona, trisulca, coccis dorso papilloso-verrucosis, pilis subinde interjectis. Semen crassum, subglobosum, leve, plumbeo-fuscum, et insuper nigro-maculosum, instructum prope hilum caruncula subsessili, depresso-subrotunda, leviter reniformi, lutæa.

Quid sit *Euphorbia carniolica* All. *Ped.* 1. p. 287. n. 1048., dictu difficile, quia in herbario Allionii deest exemplar, vix tamen credi potest esse veram ex loco in limitibus agrorum *Pedemontii* eidem assignato.

40. *EUPHORBIA hyberna*: caule crasso, simplici; foliis ovato-oblongis, obtusis; umbella subsexfida, bifida; nectariis reniformibus, integerrimis; capsulis muricatis, erectis; seminibus laevibus.

E. hyberna *Sp. pl.* p. 662. *Smith. Engl. Fl.* 4. p. 67., et *Engl. bot.* v. 19. t. 1337. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 381.

Coll. Herb. Ped. 5. p. 126. n. 20. *Viv. Fl. Cors. diagn.*

p. 7.* *De Sal. in Bot. zeit. ann.* 1834. p. 5.* *De Cand.*

Franç. 3. p. 344.* *Roep. En. Euph.* p. 62. n. 10. *Reich.*

Exc. 3. p. 758. n. 4767., et *Cent.* 15. p. 4. t. 137. f. 4767.

E. hibernica *Moris. Stirp. Sard. el. fasc.* 1. p. 40.*

Tithymalus hibernicus, vasculis muricatis, erectis *Dill.*

Elth. 2. p. 387. t. 290. f. 374. opt.

T. platyphyllos *Dod. Pempt.* p. 372. fig. *Clus. Hist. pl.*

lib. 6. p. CXC. fig. *Ger. emac.* p. 500. fig.

Plataphyllum hispanicum *Lob. Ic.* 361.

Ital. Titimalo latifoglio.

Perenn. Habui ex humentibus montanis Sardiniae ab Eq.

Prof. MORISIO, ex Corsica in monte *Coscione* a *SA-*

RAFFINIO, qui miserat ad Vivianum quoque, in mon-

te *Pino* ad mapalia a *DE SALIS*, in monte *D'oro* a

SOLEIROLIO. Floret Junio.

Radix fusiformis. Caulis teres, crassus, intus spongiosus, simplex, striatus, erectus, vel adscendens, etiam bipedalis. Folia sparsa, numerosa, crebra, sessilia, ovato-oblonga, vel obovata, obtusa, integerrima, tenuia, utrinque saturate viridia, patentia, aut reflexa. Umbella terminalis, quinque-sexfida, vix ultra, bifida, vel breviter dichotoma. Pedunculi accessorii numerosi, bifidi, aut breviter dichotomi, solitarii in axillis superioribus. Involucri foliola elliptica, vel elliptico-oblonga, interdum umbellam fere æquantia. Involucella subcordato-ovata, sæpe flavicantia. Utraque integerrima, obtusa, vel acutiuscula. Nectaria reniformia, extus rotundata, fusce purpurantia. Laciniae perigoniales nectariis interpositæ ovatæ, erectæ, pallentes. Capsula potius grandis, semper erecta, obtuse trigona, trisulca, aculeis herbaceis, cylindraccis, obtusis muricata. Semina ovoidea, grandiuscula, lævia, coloris castaneo-ferruginei, prope hilum instructa caruncula exigua, brevissime stipitata, capitato-trigona, pallide lutea. Tota planta glabra, vix foliis junioribus interdum nervo pilosis.

41. *EUPHORBIA corallioides*: foliis lanceolatis, sessilibus; umbella quinquefida, trifida, subdichotoma; involucellis

ovatis; nectariis subrotundis, integerrimis; capsulis lævibus, hirsutissimis.

E. corallioides *Sp. pl.* p. 659. *Engl. bot. sup. v. 3. t. 2837.*

Ten. Syll. p. 234. n. 13. *B. Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 546.*

a. b.* et Sup. 1. p. 149.* Roep. En. Euph. p. 60. n. 5.*

herb. ex Guss. Reich. Exc. 3. p. 758. n. 4768., et Cent. 15.

p. 4. t. 137. f. 4768. mediocr.

E. lanuginosa *Ten. Nap. 1. p. 264.*

E. pilosa *Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 382.*

E. procera β *trichocarpa* *Koch. Syn. p. 630.*

Tithymalus *Montis Pollini Amygdali angustiori folio*

pallido, hirsutus *Cup. Sup. alt. p. 88.*

T. nemorosus villosus mollior *Barrel. Ic. 198.*

Ital. Titimalo lanuto.

Perenn. Habui ex umbrosis Lucanæ a *GASPARRINIO*, ex

Sicilia in sylvis di *Valdemone* ab *Eq. GUSSONIO*. Floret

Majo, Junio.

Radix fusiformi-ramulosa. Caulis teres, erectus, sim-

plex, sesqui-bipedalis, molliter pubescens, subinde

glaber, aut fere glaber, sæpe rubens. Folia sparsa,

sessilia, lanceolata, integerrima, vel serrulata, infe-

riora obtusa, et basi quidquam angustata, superiora

acuta, aut acutiuscula, basi rotundata; cæterum cun-

cta squallide virentia, molliter pubescentia, vel pilo-

sula, senio sæpe rubentia. Umbella terminalis, qua-

drì-quinquefida, trifida, bifida, vel dichotoma; sub-

inde quadri-quinquefida, bifida, aut dichotoma. Pe-

dunculi accessorii in axillis superioribus trifidi, bifi-

di, vel dichotomi. Involucri foliola foliis caulinis su-

perioribus similia, et sæpe æque longa. Involucella

ovata, aut ovato-oblonga, acuta, vel acutiuscula.

Utraque integerrima, vel plus minus serrulata. Nec-

taria subrotunda, integerrima, lutea. Capsula lævis,

sive granulis carens, hirsutissima, villis longis, ca-

nescentibus. Semina subrotunda, compressiuscula, læ-

via, e flavo ferruginea, prope hilum instructa carun-

cula exigua, brevissime stipitellata, convexa, pallide

flava.

Capsula recens quam oertissime lævis; sicca minus lævis

apparet, nec tamen granulata dici potest. Semina

sunt quoque lævia, neque ego detegere potui in illis

ullam asperitatem, quæ, si cui apparuit, profecto ac-

cidentaliter dicenda.

4a. *EUPHORIA pilosa*: pubescens; foliis sessilibus, corda-

to-lanceolatis, apice serrulatis; umbella quinquefida,

trifida, subdichotoma; nectariis subrotundis, integerrimis; capsulis granulato-verrucosis, hirsutisque; seminibus scabridis.

E. pilosa *Sp. pl.* p. 659. *Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr.* 1. p. 329. *Engl. bot. Suppl.* v. 2. t. 2787. *Re Tor.* 1. app. p. 362. *Pollin. Ver.* 2. p. 106.* *Roepp. En. Euph.* p. 63. n. 12. a. *Reich. Cent.* 2. p. 35. t. 145. fig. 269., et *Cent.* 15. p. 4. t. 138. f. 4770.

E. verrucosa *Sp. pl.* p. 658. ex specim. imperfecto in ejus herb., non Mant.

E. palustris *All. Ped.* 1. p. 289. n. 1057. herb.

E. platyphylla *Sav. Pis.* 1. p. 457.

E. platyphylla β *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 165.*

E. pubescens *Desf. Atl.* 1. p. 386. (excl. Vahl.). Pl. luxur.

Jaeg. Eccl. 1. p. 98. t. 66. valde luxur. *Sangu.* *Cent.*

p. 68.* *Ten. Nap.* 4. p. 262., et *Syll.* p. 235. n. 22. *Guss.*

Fl. Sic. prodr. 1. p. 551.,* et *Sup.* 1. p. 150.* *Moris. et*

De Not. Capr. p. 118. *De Cand. Franc.* 3. p. 344. *Reich.*

Exc. 3. p. 758. n. 4769., et *Cent.* 15. p. 4. t. 138. f. 4769.

Tithymalon latifolium aliud apud nos passim juxta flumen oriens *Cæsalp. De pl. lib.* 9. cap. 12. p. 377.

Tithymalus minor, palustris, canescens *Myrthi folio hirsuto* *Cup. Sup. alt.* p. 88.

T. palust. villos. mollior. erectus *Barrel. Ic.* 885.

T. Salicis folio tenuissimo serrato et villosulo *Segui. Sup.* p. 92. n. 2. non Tourn.

Ital. *Titimalo peloso*.

Perenn. Legi Sarzanæ in arvis prope amnem Macram, Bononiæ in paludibus di Gandazollo. Habui ex agro Nicænsi ab Eq. Prof. MORISIO, ex agro Veronensi a POLINIO, ex Piceno ad portum S. Elpidii ab Eq. NARDUCCIO, Cuprà maritimâ, et ex Julia nova Prætutiorum ab ORSINO, ex Ducatu Lucensi a Sorbano a Prof. PUCCINELLIO, ex agro Pisano prope balnea ad molenina a Prof. PETRO SAVIO, ex oris Trasimeni a BRUNERO, Volaterris in campis prope Roncolla ab AMIDEO, ex faucibus Tiberis a PPFR. SEBASTIANO, et MAURIO, ex oris Acherusiæ ab ORSINO, ex humentibus, et rivulis Siciliæ ab EEQQ. BIVONA-BERNARDIO, et GUSONIO, ex Ilva a Prof. PETRO SAVIO, ex Corsica a Calvi a SELKHOLLO. Floret Junio, Julio.

Distinguitur a præcedente, cui valde proxima, notis sequentibus. Caulis subinde inferne ramosus, rarius superne, etiam tripedalis. Folia basi magis lata, cordate-lanceolata, amplexicaulia, dum valde luxuriant

cordato-oblonga, acutiuscula, vel acuta, margine superiore constantius serrulata. Involucella subcordato-ovata, vel etiam rhombeo-ovata, acuta. Capsula granulato-verrucosa, et insuper plus minus adspersa pilis longis. Semina e subrotundo ovoidea, castaneo-fusca, sub vitro punctis rariusculis, prominulis scabrida, instructa prope hilum caruncula subsessili, reniformi, pallide flava. Tota planta viridi-glauescens, molliter pubescens, et interdum valde, sive lanuginosa, rarissime hic illic glabrata. Pubescentia albida.

Individua intermedia facile demonstrant junctionem *Euphorbiae pubescentis* Desf. cum *Euphorbia pilosa* L. Quid sit *Euphorbia pilosa* All. Ped. 1. p. 288. n. 1051. declarare nequeo, cum exemplar desit in herbario Alhionii. Cl. Gussonius Londino redux me monuit, in herbario Linnæano haberi sub nomine *Euphorbiae verrucosæ* plantam sola umbella præditam, et carentem foliis, quæ capsulis granulato-verrucosis, villosisque hujus loci potius est. Eadem protulit in Sup. 1. p. 150. sub *Euphorbia pubescente*, quæ confer.

43. *EUPHORBIA denudata*: foliis lanceolatis, serrulatis, basi paulo angustatis; umbella elongata, quinquefida, trifida, dichotoma; involucellis ellipticis, obtusis; nectariis subrotundis; integerrimis; capsulis remote verrucosis, glabris; seminibus scabridis.

E. coralloides C glabrata Ten. Syll. app. p. 602.*

Ital. *Titimalo forcellato*.

Ann. Habui ex Vulture Apulo ab Eq. Prof. TENORIO. Floret Junio.

Radix fusiformis, crassiuscula, fibris lateralibus paucis. Caulis teres, erectus, glaber, simplex, circiter sesquipedalis. Folia sessilia, sparsa, remota, lanceolata, basi quidquam angustata, fere toto margine leviter serrulata, subpilosa, inferiora breviora, obtusa, superiora acutiuscula. Umbella terminalis, grandis, semipedalis, quinquefida, trifida, dichotoma. Pedunculi accessorii pauci in axillis supremis. Foliola involucri foliis caulinis superioribus similia. Involucella sub trifurcationibus elliptico-oblonga, obtusa, vel acutiuscula. Utraque subpilosa. Involucella sub dichotomiis minora, exakte elliptica, obtusa, glabra. Omnia leviter serrulata, virentia. Nectaria subrotunda; integerrima, purpurantia. Capsula glabra, et tantum adspersa verrucis raris, subrotundis. Semina ovoideo-subrotunda, compressiuscula, castaneo-fusca, sub vitro

granulis punctiformibus. rarinseculis scabrida, prope hilum instructa caruncula brevissime stipitellata, convexula, lutea.

44. *EUPHORBIA platyphylla*: foliis sessilibus, lanceolatis, serrulatis, imis spathulatis; umbella subquinquefida, trifida, bifida; involucrellis subcordato-ovatis; nectariis subrotundis, integerrimis; capsulis minute granulatis, glabris; seminibus levibus.

E. platyphylla *Sp. pl.* p. 660. *Hook. Brit. Fl. ed. 2.* p. 381. *Jacq. Austr. 4.* p. 40. t. 376. *Bert. Amæn. Ital.* p. 242. n. 50., et p. 370. n. 150. *Sav. Bot. Etr. 1.* p. 142.* *Seb. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 165. *α. Ten. Nap. 4.* p. 262. *A. B., et Syll. p.* 235. n. 23. *A. B. Desf. Atl. 1.* p. 384. *Roep. En. Euph. p.* 59. 60. n. 4. *β. Gaud. Helv. 3.* p. 285.

E. platyphyllus *Re Seg. p.* 40.,* et *Tor. 1.* p. 256.* *Morett. in Mem. 1.* p. 270. *Poll. Ver. 2.* p. 106. *Ruch. Ven. p.* 120. *Moric. Ven. 1.* p. 380. *Nacc. Ven. 3.* p. 50. *Suffr. Foroj. p.* 145. *Guss. Fl. Sic. prodr. 1.* p. 552.* *De Cand. Franç. 3.* p. 343. *α. Koch. Synop. p.* 627. *Reich. Exc. 3.* p. 756. n. 4758., et *Cent. 15.* p. 3. t. 133. f. 4758.

E. stricta *Syst. nat. ed. 10. v. 2.* p. 1049. n. 42. *Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1.* p. 330., et *Fl. Græc. 5.* p. 53. t. 469. *Smith. Engl. Fl. 4.* p. 64. *α. β., et Engl. bot. v. 5.* t. 333. *Guss. Suppl. 1.* p. 150.* *Reich. Exc. 3.* p. 756. n. 4757., et *Cent. 15.* p. 3. t. 133. f. 4757.

Tithymalus platyphyllus *Scop. Carn. ed. 2. tom. 1.* p. 337.

T. n. 1053. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2.* p. 10.

T. arvensis, latifolius, Germanicus *Zannich. Opusc. posth. p.* 32., et 84. *Segui. Ver. 1.* p. 153. n. 1.

T. platyphyllus *Fuchs. Hist. pl. p.* 813. fig.

β humilis; caule spithamali; foliis obovato-spathulatis; umbella tri-quadrifida, dichotoma.

Euphorbia micrantha *Reich. Exc. 3.* p. 756. n. 4756., et *Cent. 15.* p. 2. t. 133. f. 4756.

Ital. Titimalo palustre. Tortomaglio platifillo *Targ. Tozz. Diz. bot. 2.* p. 99.

Ann. Legi in subalpinis Apuanis ad flumen Audenam prope pontem di Ceserano, Bononiæ in sylvis collinis prope Jola, in agro Ferrariensi in valle di Boscarolo, Ravennæ in pratis prope litus maris. Habui Bononiâ ex fossis subsylvanis extra portam Castiglione a Gozzio, ex Pedemontio in viciniis della Venaria a Prof. Ræ, Mediolano in marginibus agrorum a PPR. BALSAMO-CRIVELLIO, et DE NOTARIS, ex agro Mantuano a Bel-l'acqua a BARBIERO, ex campis d'Angarano in districtu

Bassanensi a MONTINIO, ex viis, et cultis di *Monfalcone*, et Tergestinis a TOMMASINIO, et a BIASOLETTO, ex marginibus fossarum prope Patavium ab Eq. TREVISANO, ex litore Senogalliensi a SALVATORIO, ex agro Maceratensi ab Eq. NARDUCCIO, ex Piceno a S. Angelo in Pontano a MARZIALETTO, ex Ducatu Lucensi a Monte S. Quirico alle Cave del Minutoli a Prof. PUCINELLIO, ex Hetruria in Mugello ab Eq. Prof. SAVIO, ex ora Cumæa ad Acherusiam, ex Principatu ultra, et ex Sicilia ab Eq. GUSSONIO, ex Lucania inter segetes a GASPARRINIO. Varietatem β obtinui ex vineis prope Mediolanum a Prof. DE NOTARIS, et a PESTALOTTA, ex Piceno in monte *De' fiori* ab ORSINO. Floret Junio, et per æstatem.

Radix fusiformis, potius gracilis, longa, flexuosa, lateraliter fibroso-ramulosa. Caulis teres, erectus, vel ascendens, intus spongiosus, crassitie variz, plerumque simplex, luxurians per totam longitudinem alterne ramosus, ramis brevibus, inferioribus sterilibus, glaber, a pedo ad sesquipedem longus, sæpe rubens. Folia sparsa, ima minora, obovato-spathulata, obtusa, et veluti in petiolum attennata, reliqua sessilia, lanceolata, modo angusta, modo lato, acuta, inferne paululum angustata, tamen basi subcordato-amplexicaulia; omnia margine superiore argute serrulata, glabra, vel subpilosa præsertim subtus ad marginem, et nervum medium, læte viridia, patentia, vel reflexa. Umbella terminalis, tri-quinquefida, trifida, dichotoma; macrior, vel ramealis tri-quinquefida, bifida, aut dichotoma. Pedunculi accessorii plures, trifidi, dichotomi, vel toti dichotomi, solitarii in axillis superioribus. Involucri foliola lanceolata, glabra, vel pilosa more foliorum caulinorum. Involucella sub trifurcationibus ovato-oblonga, vel rhombeo-ovata, sub bifurcationibus subcordato-triangularia, vel subcordato-ovata. Hæc interdum pluries repetita per longitudinem radiolorum cum flore axillari. Omnia acuta, aut acutiuscula, serrulata, glabra, læte viridia, vel flavicantia. Perigonium extus plerumque pilosum. Nectaria parva, subrotunda, integerrima, flava. Capsula subglobosa, læviter trisulca, granulis subrotundis, parvis verruculosa, glabra. Semina ovoideo-subrotunda, compressiuscula, lævissima, nitida, castaneo-fusca, prope hilum instructa caruncula exigua, brevissimo stipitelata, convexula, lutea.

Varietas β est planta macrior. Caulis ejus spithamalis. Folia omnia obovato-spathulata, in petiolum veluti angustata, acutiuscula, margine superiore serrulata, forma, et magnitudine accedentia ad folia *Euphorbiæ falcatae* L. Umbella terminalis tri-quadrifida, dichotoma. Reliqua adamussim ut in specie.

Stirps magnitudine mire ludibunda, plurimam habens affinitatem cum *Euphorbia pilosa* L., a qua tamen distinguitur radice annua, habitu nudiore, foliis basi angustioribus, involucellis subcordato-triangularibus, capsulis rotundioribus, glabris, seminibus lævissimis. Observationem, quam in utroque loco Amœn. Italic. addidi sub *Euphorbia platyphylla*, desumpsi ab *Euphorbia pilosa* L., quam tunc putabam esse varietatem ejus. Exemplar *Euphorbiæ platyphyllæ* deest in Al-lionii herbario.

45. *EUPHORBIA palustris*: caule erecto, ramis sterilibus; foliis lanceolatis, integerrimis, utrinque angustatis; umbella submultifida, trifida, bifida; involucellis ovatis; nectariis subrotundis, integerrimis; capsula papillis cylindræis, obtusis verrucosa; seminibus lævibus.

E. palustris *Sp. pl.* p. 662. *Fl. Dan.* t. 866. *Sv. bot. v.* 5. t. 329. *Bull. Pl. ven.* t. 87. *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec.* 2. t. 10. p. 286.* *Pollin. Ver.* 2. p. 109. *Ruch. Ven.* p. 121. *Moric. Ven.* 1. p. 381. *Nacc. Ven.* 3. p. 51. *Suffr. Foroj.* p. 144. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 282.* *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 166. *Ten. Nap.* 4. p. 266., et *Syll.* p. 239. n. 37. *De Cand. Franç.* 3. p. 344. *Roep. En. Euph.* p. 62. n. 11. *Koch. Syn.* p. 629. *Reich. Exc.* 3. p. 758. n. 4771., et *Cent.* 15. p. 5. t. 139. f. 4771. *Host. Austr.* 2. p. 567. *Gaud. Helv.* 3. p. 287.

E. brachiata *Jan. El.* p. 7. n. 75.*

Tithymalus n. 1054. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 11.

T. palustris *Cæsalp. De pl. lib.* 9. cap. 6. p. 374.

T. palustris fruticosus *Zannich. Ist. delle piant.* p. 259. tab. 217. angustifol. *Segui. Ver.* 1. p. 154. n. 2.

Esula major *Dod. Pempt.* p. 374. fig.

E. palustris *Riv. Tetr. irr.* t. 116. bona.

Ital. *Esula maggiore. Esula palustre. Titimale palustre* *Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 99.

Offic. *Esulæ radix, cortex radices, herba* *Lin. Mat. med.* p. 90. n. 255.

Perenn. Habui ex ripis Padi a Prof. JANIO, ex paludibus Mantuanis a BARBIERIO, ex paludosis circa *Monfalcone* a TOMMASINIO, ex Euganeis ad sepes di *Torreglia*,

et Aponis a MONTINIO, ex fossis agri Ravennatis a DALLAGATA, ex Pontinis a FIORINIA-MAZZANTIA, ex litore di Francavilla prope Pescara ab ORSINO. Floret Majo, Junio.

Radix crassa, fusiformi-ramosa, collo gemmifera. Caulis teres, erectus, crassus, striatus, intus spongiosus, bipedalis-orgyalis, valde ramosus, ramis alternis, sterilibus, supremis umbellam sæpe superantibus, passim rubro-corallinus, vel rubro-purpurascens. Folia sparsa, sessilia, lanceolata, modo late, modo anguste, obtusiuscula, vel acuta, integerrima, rarius apice subserrulata, basi angustata, interdum senio rubentia, suprema ad flores in individuis luxuriantibus quandoque breviora, et latiora, ovato-oblonga, aut ovata, viridia, vel flavicantia; ramea passim angustiora, et confertiora. Umbella terminalis, præ planta brevis, quinque-decomfida, trifida, bifida. Pedunculi accessorii pauci, trifidi, bifidi, siti in axillis supremis, facile cum ipsa umbella confundendi. Involucri foliola oblongo-obovata. Involucella ovata, aut elliptico-ovata. Utraque obtusa, et plerumque flavicantia. Nectaría lata, brevia, extus rotundata, integerrima, fulva. Capsula quam in præcedente duplo major, papillis cylindraceis, crassiusculis, obtusis undique verrucosa, cæterum glabra. Semina grandiuscula, ovoidea, lævia, fusca, prope hilum instructa caruncula sessili, subrotundo-reniformi, lutea. Tota planta glabra.

Usus. Ob vim causticam corrosivam adhibetur in tinea, verrucis, odontalgia; ut remedium purgans nunc desueta.

*** *Spurie umbellatæ, foliis decussatis. Cataputicæ.*

46. *EUPHOREIA Lathyris*: caule erecto; foliis lanceolatis, decussatis; umbella subquadrifida; capsula lævi; seminibus reticulato-rugosis.

E. Lathyris Sp. pl. p. 655. *Smith. Engl. Fl.* 4. p. 61., et *Engl. bot.* v. 32. t. 2255. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 383. *Bull. Pl. ven.* t. 103. *Plenck. Ic. pl. med.* 4. p. 65. t. 366. *All. Ped.* 1. p. 284. n. 1036. *Balb. Taur.* p. 77. *Re Seg.* p. 40., et *Tor.* 1. p. 254. *Birol. Acon.* 1. p. 161. *Coll. Herb. Ped.* 5. p. 122. n. 9. *Comoll. Prodr.* p. 91. *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec.* 2. tom. 10. p. 285. *Pollin. Ver.* 2. p. 101. *Suffr. Foroj.* p. 145. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 282. *Sav. Pis.* 1. p. 453. *Sebast. et Maur. Fl.*

Rom. prodr. p. 163. *Ten. Nap.* 1. p. 263., et *Syll.* p. 233. n. 5. *De Cand. Franc.* 3. p. 333. *Roep. En. Euph.* p. 67. n. 26. *Koch. Syn.* p. 634. *Reich. Exc.* 3. p. 760. n. 4783., et *Cent.* 15. p. 6. t. 143. f. 4783. *Host. Austr.* 2. p. 558. *Gaud. Helv.* 3. p. 275.

Tithymalus Lathyris Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 333.

T. n. 1044. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 7.

Lathiri Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 1321. fig. *Dur. Herb. ed. Rom.* 1585. p. 242. fig. rud.

Cataputia Casalp. De pl. lib. 9. cap. 13. p. 377.

Lathyris, sive Cataputia minor Zannich. Opusc. posth. p. 84.

Esula minor Riv. Tetr. irr. t. 114.

Ital. Cacapuzza. Catapuzza. Catapuzia. Catapuzia minore. Catapuzzo. Esca da pesci. Gomitaria, Scacapuzzo. Scatapuzza. Scatapuzia Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 98.

Offic. Cataputiae minoris semina Lin. Mat. med. p. 90. n. 256.

Ann. Bienn. Legi Bononiæ in collibus di Roncorio, et habui ex fossis subsylvanis extra portam di Castiglione a Gozzio. Accepi ex Apennino Liguriæ orientalis alle Giare a Turio, ex collibus di Roman, et S. Michaelis d' Angarano in districtu Bassanensi a Montinio, ex hortis Fossæ Clodiz a Prof. NACCARIO, ex agro Viterbiensi a CAMILLIO. Floret Junio.

Radix fusiformis, longa, lateraliter fibrillosa. Caulis teres, erectus, striatus, sæpe crassus, et intus spongiosus, simplex, aut superne ramosus, a spithama ad tres pedes longus, glaucus, subinde rubens. Folia opposita, sessilia, decussata, lanceolata, obtusa, vel acuta, basi subcordata, glaucescentia, supra atro virentia, subtus pallida, passim longa; rarius ludunt sparsa. Umbella terminalis, tri-quadrifida, bifida, vel dichotoma. Rami caulini supremi subinde abeunt in bifurcationem dichototam. Involucri foliola foliis caulinis superioribus prorsus similia. Involucella grandia, cordato-lanceolata, vel cordato-ovata, acuminata, subinde per radiorum dichotomorum longitudinem pluries repetita cum flore axillari. Nectaria semilunata, lutea. Capsula grandis, lævis, glabra. Semina crassa, ovoidea, rugis reticulata, nebula cinerascens obducta, sub qua fuscescunt, prope hilum instructa caruncula exigua, sessili, papillari, conica, luteola. Totâ planta glabra.

Usus. Semina pollent vi corrodero, et ad verrucas destruidas laudantur, licet nunc vix in usu. Herba abundat succo lacteo, drastico, quo agricolæ inficiunt vineas, ut latrones male mulcator prohibeant a vinea.

**** *Spurie umbellatæ ; involucrellis connato-perfoliatis : Characiæ.*

47. *EUPHORBIA amygdaloides*: foliis subcoriaceis, obverse lanceolatis, pilosis: umbella quinquesida, bifida, pedunculis accessoriis plurimis; involucrellis orbiculato-perfoliatis, amplis, patentibus; nectariis semilunatis, acutis, capsulis glabris; seminibus ovoideis.

E. amygdaloides *Sp. pl.* p. 662., et *Amæn. Acad.* 3. p. 126. *Smith. Engl. Fl.* 4. p. 68., et *Engl. bot. v. 4. tab.* 256. *Comoll. Prodr.* p. 92.* *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec. 2. t. 10. p. 286.* Pollin. Ver. 2. p. 110. Bert. Amæn. Ital.* p. 370. n. 151. *Ten. Nap.* 4. p. 263., et *Syll.* p. 236. n. 26. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. p. 553.* et *Sup.* 1. p. 151.* *Roep. En. Euph.* p. 68. n. 27. *Koch. Syn.* p. 630. *Reich. Exc.* 3. p. 763. n. 4799., et *Cent.* 15. p. 9. t. 150. f. 4799. *Host. Austr.* 2. p. 568.

E. sylvatica *Sp. pl. ed. 1. p. 463., et Amæn. Acad.* 3. p. 126. *Jacq. Austr.* 4. p. 39. t. 375. *Bull. Pl. ven.* t. 95. *All. Ped.* 1. p. 286. n. 1043. *Balb. Taur.* p. 78. *Re Tor.* 1. p. 257. *Biot. Acon.* 1. p. 162. *Coll. Herb. Ped.* 5. p. 130. n. 30. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 221. *Comoll. Prodr.* p. 92.* *Suffr. Foroj.* p. 144. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 164.* *Ten. Nap.* 4. p. 263., et *Syll.* p. 237. n. 27. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. p. 554.* et *Sup.* 1. p. 151.* *De Cand. Franç.* 3. p. 339. α . β . *Gaud. Helv.* 3. p. 281.

Tithymalus sylvaticus *Scop: Carn. ed. 2. tom. 1. p. 333. T. n. 1045. Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 8.

Tithymalo *Characiæ* similis in montibus *Casalp. De pl. lib. 9. cap. 5. p. 373.*

Tithymalus lunato flore *Column. Ecphr.* 2. p. 56. tab. p. 57.

T. Amigdaloides major tortuoso caule *Barrel. Ic.* 839.

T. Amigdaloides minor subglaber *Barrel. Ic.* 830.

T. Amigdaloides minimus glaber *Barrel. Ic.* 829.

T. sylvaticus, lunato flore *Zannich. Opusc. posth. p. 34., et 84. Segui. V. 1. p. 156. n. 4391.*

Ital. Tortomaglio di selva.

Flor. Ital. T. V.

Suffrut. Frequens in sylvaticis, inque sepibus totius Italiae. Legi Sarzanæ in colle di *Sarzanello*, in alpinis Apuanis al *Giovo* supra *Vinca*, in subalpinis Apuanis in via inter Massam ducalem, et *Fornole*, Bononiæ a *Gaibolla*. Habui ex vallibus Clavarensibus in Liguria orientali a TURIO, ex montibus ad Larium a Prof. COMOLLIO, ex districtu Bergomensi a *Gorlago* a BERGAMASCHIO, Mantuâ al *Bosco Fontana* a BARBIERIO, ex districtu Bassanensi in monte di *Rubio* ab Eq. PAROLINIO, in sylvis d'Angarano, Roman, et Solagna a MONTINIO, ex Istria al *Bosco di Montona* a TOMMASINO, ex montosis apricis Tergestinis a BRASO-LETTO, Senogalliâ al *Sasso*, et in sylva delle Grazie a SALVATORIO, ex monte Birro Apennini Maceratensis a Prof. UGILI, ex *Arcevia* in districtu Camerinensi a Prof. OCTAVIANO, ex vallibus Volaterranis ab AM-PEO, ex Casentino ad Camaldulenses ab Ill. PRINCIPES DE CANINO, Româ in monte Malo a Prof. MAURIO, ex collibus Allianis a MASQUILLIERIO, ex Ariciâ a BARBIERIO, Terracinâ a FIORINIA-MAZZANTIA, Neapoli in *Falle della salute*, ubi legerat Columna, et ex sylvaticis, sepibusque Siciliæ ab Eq. GUSSONIO, Panormo ab Eq. BIVONA-BERKARDIO, ex Corsica in incultis d' *Aiacchio* a SOLEIROLIO. Floret Martio, Aprili.

Radix ramosa. Caules e radice plures, caespitosi, basi ramosi, teretes, erecti, vel adscendentes, subinde tortuosi, fragiles, pubescentes, primo anno steriles, et onusti foliis sparsis, inferioribus cito deciduis, supremis majoribus, crebris, rosulatis, longis, et in centro rosula depressentibus, omnibus subcoriaceis, obverso lanceolatis, aut obovatis, obtusis, rarius acutis, basi valde angustatis, petiolatis, supra saturate virentibus, subtus pallidioribus. Altero anno ex apice hujus caulis, et ex centro rosulae foliorum producitur caulis florifer, nubilis cernuus, in anthesi erectus, pubescens, adpersus foliis alternis, sessilibus, inter se remotis, multo minoribus, oblongo-obovatis, obtusis. Totus caulis ita evolutus plurimum variat longitudine, scilicet a semipede ad quatuor pedes; peracta fructificatione perit, gemmis novis e basi ejus se se evolvantibus, et caules in omnibus similes daturis. Omnia folia integerrima, nunc utrinque pubescentia, nunc subtus tantum. Umbella terminalis, quinque-sexfida, bifida, rarius dichotoma. Pedunculi accessorii plurimi, solitarii, axillares, bifidi, vel dichotomi, racemum

longum, uniformem sistentes. Involueri foliola ovata, aut ovato-oblonga, obtusa, integerrima. Involucella fere per totam basim connato-perfoliata, seu utrinque breviter scissa, grandia, patenti-concaviuscula, orbiculata, obtusa, vel retusa, quandoque veluti in apicem triangularem angustata, virentia, aut e viridi flavicantia, glabra. Nectaria semilunata, cornibus acutis, luteola, subinde atropurpurea. Capsula obtuse trigona, glabra, sub vitro granulis minutissimis scabra. Semina ovoidea, lævia, matura fusca, prope hilum instructa caruncula substipitellata, subrotunda, convexula, lutea. Caulis inferne, et folia caulis sterilibus subtus sæpe rubent.

48. *EUPHORBIA semiperfoliata*: foliis subcoriaceis, obverso lanceolatis, glabris, pilosisve; umbella submultifida, bifida, pedunculis accessoriis plurimis; involucellis orbiculato-semiperfoliatis, parvis, patulis; nectariis bicornibus; capsulis glabris; seminibus subglobosis. *E. semiperfoliata* *Vio. Fl. Corsic. dign. p. 7.* *Moris. Stirp. Sard. et. fasc. 1. p. 41.* *De Salis. in Bot. zeit. ann. 1834. p. 7.* *Lois. Desl. Gall. ed. 2. tom. 1. p. 343. n. 34.* *Duby. Bot. Gall. ed. 2. tom. 2. p. 1011.*

Ital. Tortomaglio a piatello.

Suffrut. Habui ex Sardinia in monte *Gennargentu* ad rivulos ab Eq. Prof. MORISIO, ex Corsica in monte *della Trinità* a SERAFFINIO, et ab Eq. Prof. VIVIANO. Floret Majo, Junio.

Simillima præcedenti, sed multo minor omnibus partibus. Caulis ad summum sesqui-bipedalis. Folia breviora, et angustiora, superiora plerumque acuta, vel acutiuscula. Umbella sex-quatuordecimfida, in macris tantum individuis quadri-quinquefida, cæterum bifida, et dum luxuriat dichotoma. Involuceri foliola ludunt subrotunda, elliptica, oblonga, obtusa, vel oblongo-lanceolata, acutiuscula. Involucella parva, orbiculata, patenti-concaviuscula, minori tractu conuata, ideo semiperfoliata, obtusa, subinde acutiuscula. Nectaria bicornia, corpore latiusculo, cornibus subulatis, acutis, longiusculis, subparallelis, luteola, vel atropurpurea. Capsula dimidio minor, sub vitro granulis exiguis undique scabra, sed omni villositate carens. Semina subglobosa, crusta cinerea obvelata, e qua hic illic prodeunt punctula nigra, cæterum lævia, sub velo cinereo nigrescentia, prope hilum instructa caruncula brevissime substipitellata, subrotundo-reniformi,

convexula, lutea. Tota herba ludit glabra, vel puberula.

Cl. Vivianius obtinuit tantum exemplaria macriora a Seraffinio, sicuti ego quoque ab eodem obtinui; ideo vidit umbellam quadrifidam, et ego quinquefidam; sed in omnibus exemplaribus Sardois, quæ postea accepi ab Eq. Morisio, umbella est multifida, scilicet sex-quatuordecimfida.

49. *Euphorbia Characias*: foliis anguste lanceolatis, acutiusculis, mollissime tomentosulis, creberrimis; umbella multifida, bifida; involucellis connato-semipervoliatis, parvis, campanulatis; nectariis antice abscissis, integerrimis; capsulis globoso-trigonis, villosis.

E. Characias *Sp. pl.* p. 662. *Smith. Engl. Fl.* 4. p. 68., et *Engl. bot.* v. 7. t. 412. excl. syn. Jacq., et Riv. *Hook. Brit. Fl. ed. 2.* p. 383. *All. Ped.* 1. p. 289. n. 1060. *Coll. Herb. Ped.* 5. p. 119. n. 3. *Bert. Pl. Gen.* p. 65., et *Aman. Ital.* p. 154. n. 140. *Sav. Pis.* 1. p. 459. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 165.* *De Cand. Franç.* 3. p. 340. *Reich. Exc.* 3. p. 763. n. 4800. excl. pl. Hostii, et var. β ., et *Cent.* 15. p. 9. t. 150. f. 4800.

Tithimalo Characia Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 1311., qui habuit a Ghinio, sed figura parum exacta. *Dur. Herb. Rom.* 1585. p. 457. fig. rud. *Anguill. SEMPL.* p. 292. ex loco prope Lunam, et ex usu.

Tithymalus Characias Casalp. De pl. lib. 9. cap. 5. p. 373.

T. fruticosus, semper virens, Salicis folio glauco, non serrato, et mollissima lanugine vestito, florum sectionibus quaternis, reniformibus, atrorubentibus fructu piloso *Mich. Cat. hort. Flor. app.* p. 176. n. 2.

T. Characias *L. Clus. Hist. pl. lib.* 6. p. CLXXXVIII. fig.

Characias Monspelliensis Clusij et Matthioli Lob. Ic. p. 359.

Ital. Titimalo Caracia. Erba lazza. Tortomaglio maggiore Ang. SEMPL. p. 292. *Caracia. Cometa. Erba lazza. Erba mora. Erba esca da pesci. Esca da pesci. Esula maggiore. Gobius. Mandolina mirtile. Titimalo Caracia. Tortomaglio cometa. Tortomaglio gobius. Tortomaglio mandorlina Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 98. *Suffrut.* Copiosa in ora maritima Italiæ ad mare Ligusticum, et Tyrrhenum, sed et in ora Adriatica reperitur. Legi in promontorio Lunensi *al Corvo*, et copiosissimam observavi in toto monte *Caprione*, ad quem illud promontorium pertinet, tum in ambitu, inque insulis portus

Lunæ. Legi pariter Genus in muro oppidi *alla Cava*. Habui ex maritimis Maceratensibus a Prof. UTILI, ex Argentario a Prof. GIULIO, Romæ a Prof. MAURIO, Terracinâ a FIORINIA-MAZZANTIA; ex insula Caprearum a Prof. GIRALDIO, ex insulis *Monte Cristo*, et Gorgonia a Prof. GIULIO, ex Sardinia in pascuis *di Orri* a Prof. DE NOTARIS, ex Corsica a TALLANO a SERAPPINIO. Floret Aprili, Majo.

Habitus *Euphorbia amygdaloides* L. Totus caulis uni-bipedalis, crassus, pubescens. Folia in caule sterili anguste lanceolata, longa, sparsa, creberrima, acutiuscula, basi insigniter angustata, perennantia, in parte caulis florifera multo breviora, et remotiora; omnia mollissime tomentosula præsertim subtus, supra glauco-virentia, subtus pallentia. Umbella multifida, bifida, aut breviter dichotoma, villosa. Pedunculi accessorii pluri- mi, racemum longissimum sistentes. Radii umbellæ, et pedunculi accessorii primo nutantes. Involucri foliola ovata, aut oblonga, obtusa, vel acutiuscula. Involucella parva, scilicet tres-quatuor lineas longa, connato-semiperfoliata, campanulata, obtusissima, demum patula. Nectaria atro-purpurea, vel purpureo-rubella, rarius luteola, postice convexa, lateribus chineata, antice abscissa, aut levissime excavata, semper integerrima. Capsula dense villosa, villis patulis, insuper minute granulata. Semina crassiuscula, ellipsoidea, velo cinereo obducta, sub quo fuscescunt, lævia; subinde tamen sub vitro granulis minutissimis punctiformibus scabrida apparent, instructa prope hilum caruncula papillari, sessili, pyramidata, pallide luteola. Herba fetens, abundans lacte, quod venenum piscibus. Vide Amœn. Ital. p. 154., et Ang. Sempl. p. 292.

50. *EUPHORBIA eriocarpa*: foliis anguste lanceolatis, acutis, mollissime tomentosulis; umbella multifida, bifida, involucellis parvis, connato-semiperfoliatis, campanulatis; nectariis antice abscissis, denticulatis; capsulis oblongo-trigonis, villosissimis.

E. eriocarpa Bert. Comment. de itin. Neap. p. 22. tab. 3., et in Nov. Comm. Acad. scient. Inst. Bon. tom. 3. p. 174. tab. 13.

E. Characias B Ten. Syll. p. 237. n. 28.*

E. Characias Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 554., et Sup. 1. p. 151.

E. sylvatica Mant. alt. p. 395. non Amœn. Acad., nec Sp. pl.

Esula caule crasso Riv. *Tetr. irr. t. 115.*

Ital. *Caracia dentellata*.

Suffr. Observavi in agro Formiano ad sepes. Habui Interamnâ alla *Strettura*, et a *Sapigno* a FIORINIA-MAZZANTIA, ex Campania felici ab Eq. Prof. TENORIO. Floret a Martio in Majum.

Habitus præcedentis, sed grandior. Caulis crassior, etiam bicubitalis; sterilis, dum junior, rubro-corallinus. Folia anguste lanceolata, acuta, et sæpe mucronulata. Involucella ut in illa. Nectaria atropurpurea, antice abscissa, et eroso-denticulata, apicibus denticulorum viridulis. Capsula fere duplo grandior, villosior, trigono-oblonga ex coccis magis oblongatis. Semina quoque majora, levissima, cinereo-albentia, sub velo cinereo fusca, instructa prope hilum caruncula grandiore, subrotundo-reniformi, depresso-convexa, brevissime substipitellata. Reliqua similia.

51. *EUPHORBIA melapetala*: foliis anguste lanceolatis, nudiusculis, umbella multifida, bifida; involucellis grandibus, connato-semiperfoliatis, campanulatis; nectariis antice abscissis, integerrimis; capsulis pubescentibus.

E. melapetala Gasparr. *Ind. sem. hort. reg. in Boccadif. ann. 1830. p. 3.* Guss. Sup. 1. p. 152.**

E. Characias Sibth. et Smith. *Fl. Græc. prodr. 1. p. 332. herb. Sibth. ex Guss.*

Ital. *Caracia campanaccia*.

Suffr. Habui ex glareosis Siciliæ a *Sferracavallo*, *Renna*, *Capo d' Orlando* a GASPARRINIO, Panormo a *Monte Cuccio*, *Cefalù* ab Eq. GUSSONIO. Floret ab Januario in Majum.

Habitus duarum præcedentium. Caulis tripedalis; crassus, glaber, vel superne pubescens, albens. Folia subcoriacea, anguste lanceolata, acutiuscula, basi attenuata, glauco-viridia, supra glabra, subtus pubescentia, et pallidiora. Involucri foliola elliptico-oblonga, aut rhombo-subrotunda, obtusa. Involucella grandia, quinque-sex lineas longa, connato-semiperfoliata, obtusissima, campanulata. Radii umbellæ, et pedunculi accessorii semper nutantes. Nectaria omnium hujus sectionis grandiora, antice abscissa, integerrima, atropurpurea. Capsula grandis ut in præcedente, pubescens. Semina grandiuscula, ellipsoidea, levia, immatura flavicantia, matura castaneo-fusca, prope hilum instructa caruncula crassiuscula subrotundo-reniformi, tumente, convexa, brevissime substipitellata.

5a. *EUPHORBIA veneta*: foliis anguste lanceolatis, acutis, mollissimo tomentosulis; umbella multifida, bifida; involucellis parvis, connato-semiperfoliatis, campanulatis; nectariis exqu岸site semilunatis; capsula villosissima.

E. veneta Willd. En. 1. p. 507. Lindl. in Bot. regist. ann. 1838. v. 24. t. 6. optima Poll. Ver. 3. p. 797. Nacc. Ven. 3. p. 52. Reich. Cent. 15. p. 9. t. 150. f. 4800. b.

E. Characias Jacq. Collect. 1. p. 57.; et Ic. rar. 2. p. 19. t. 89. Suffr. Foroj. p. 206. Roep. En. Euph. p. 68. n. 27. Reich. Exe. 3. p. 763. n. 4800. β . Host. Austr. 2. p. 568. non Linn., nec Smith.

E. Wulfenii Koch, Syn. p. 631.

Ital. *Caragia campanella*.

Suffr. Habui ex saxosis prope Tergestum, et ex rupibus montanis di Contovello, et Santa Croce in ditione Tergestina a TOMMASINIO, a BIASOLETTO, et a Prof. VISANTIO, qui novissimus me monuit, speciem hanc occurrere etiam in Istris, et Dalmatia. Floret Aprili; Maio.

Habitus trium pręcedentium. Caulis late cęspitosus, etiam bicubitalis. Folia mollissime tomentosula. Foliola involucri elliptica, elliptico-oblonga, et etiam obovata, obtusa. Involucella magnitudinis, et formę ut in *Euphorbia Characia*. Nectaria exacte semilunata, luteola, subinde fusca etiam in eodem cęspite. Capsula paulo grandior, quam in *Euphorbia Characia*, villosissima. Semina ellipsoidea, grandiuscula, levia, immatura flavicantia, matura castaneo-fusca, prope hilum instructa caruncula crassinsecula, papilliformi-conica, hinc fissā, seu reniformi; pallide lutea, brevissimo subtipitellata.

Omnes species hujus novissimę sectionis jam a pluribus annis cultę in horto bot. Bononiensi probe distinctę remanserunt.

ORDO IV. PENTAGYNIA.

GLINUS.

Lin. Gen. p. 243. Juss. Gen. p. 316. Lamck. Ill. 5. t. 413. Vent. Tabl. 3. p. 369. Gęrtn. De fruct. 2. p. 236. t. 130. Desf. Atl. 1. p. 388. De Cand. Prodr. 3.

p. 455. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. *p.* 557. *Endl. Gen.* *p.* 952. *n.* 5185. *α.*

Rolofa Adans. Fam. 2. *p.* 256.

Plenckia Rafn. Specch. 1. *p.* 194. *n.* 19.

Perigonium simplex, liberum, quinquepartitum, persistens, intus coloratum, sive petaloideum, in fructu connivens. Stamina duodecim-viginti, perigonio breviora, filamentis subulatis, antheris cordato-oblongis, compressis, bilocularibus, incumben- tibus. Nectaria (petala Linnæo, aliisque) ligulæ angustissimæ, perigonio breviores, bi-quadrifidæ, vel indivisæ, numero variæ, staminibus interjectæ. Stili quinque, basi connati, filiformes, breves. Stigmata simplicia. Capsula membranacea, oblonga, pentagona, quinquelocularis, quinquevalvis, dissepimentis medio valvarum affixis. Semina minuta, in quovis loculo numerosa, reniformia, tumidula, scabra, prædita funiculo umbilicali longo, tenuissimo, setiformi, circumvoluto, qui ad insertionem suam in semine expanditur in membranulam arilloideam, oblongam.

Habitus. Plantæ annuæ, vel fruticulosæ, tomentosæ. Caulis, prostratus, ramosus. Folia subrotunda, petiolata, solitaria, vel fasciculata, inæqualia. Flores axillares, breviter pedunculati, aut sessiles.

Ord. nat. Caryophyllei γ *Lin. Ord. nat. n.* XXII., *et Præl. p.* 349. *Ficoideæ Juss. Gen. p.* 315. *Smith. Gram. p.* 165. *Vent. Tabl. 3. p.* 266. *De Cand. Prodr. 3. p.* 415. *Rich. Fam. in Élém. éd. 5. p.* 199. *Bartl. Ord. nat. p.* 308. *Mesembrinæ Schultz. Nat. syst. p.* 431.

1. *GLINUS lotoides*: herbaceus, tomentosus; caule prostrato; foliis obovatis, longe petiolatis, inæqualibus; floribus pedunculatis.

G. lotoides Sp. pl. p. 663. *Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p.* 333., *et Fl. Græc. 5. p.* 56. *t.* 472. *Coll. Herb. Ped. 2. p.* 511. *n.* 1. *Sebast. et. Maur. Fl. Rom. prodr. p.* 166. *Ab. Ucr. Hort. Pan. p.* 200. *Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p.* 557.,* *et Suppl. 1. p.* 153.* *Moris.*

Stirp. Sard. el. fasc. 1. p. 19. Desf. Atl. 1. p. 388. De Cand. Prodr. 3. p. 455.*

Alsine Lotoides sicula Bocc. Sicil. p. 21. tab. 11. in. p. 20. fig. II. B. Tourn. Inst. 1. p. 242.

A. folio sphæroide, Heliotropio cognata Cup. Hort. Cath. p. 6.

Portulaca Boetica luteo flore spuria aquatica Barrel. Ic. 336.

Ital. Lotoides.

Ann. Habui ex Sicilia in humentibus Catanæ a Prof. COSENTINIO, et ab Eq. GUSSEPIO, ex Sardinia ad rivulos ab Eq. Prof. MONSIO. Floret Septembri, Octobri.

Radix fusiformis, gracilis, longa. Caulis prostratus, teres, alterne ramosus, vel dichotomus, a spithama ad pedem, et etiam quidquam ultra longus. Folia fasciculata a duobus ad quinque, inæqualia, obovato-spathulata, longe petiolata, integerrima, obtusa, et subinde retusa. Flores plures, fasciculati, vel glomerati, axillares, breviter pedunculati, pedunculis nudis, unifloris, sæpe inæqualibus. Perigonium in anthesi patens, in fructu campanulato-connivens, segmentis ovato-oblongis, dorso tomentosis, intus petaloideis, albidis, vel lutescentibus, externis tribus acutis, vix marginatis, internis duobus obtusiusculis, insigniter membranaceo-marginatis. Antheræ luteæ, obtusæ, aut emarginatæ. Nectaria ligulæ quinque-duodecim, lineari-angustissimæ, bi-trifurcæ, vel integre, breves. Pistillum stamina æquans. Reliqua generis. Tota planta albido-tomentosula, villo fasciculato-stellato.

ORDO VI. DODECAGYNIA.

SEMPERVIVUM.

Lin. Gen. p. 244. Juss. Gen. p. 207. Lamck. Ill. 5. t. 413. Vent. Tabl. 3. p. 275. Gærtn. De fruct. 1. p. 314. t. 65. Smith. Engl. Fl. 2. p. 350. De Cand. Mém. sur les Crass. p. 57. tab. 1. fig. 4., et Prodr. 3. p. 411. Endl. Gen. p. 811. n. 4623.

Sedum Tourn. Inst. 2. tab. 140. fig. C-I. PP.

Calyx perianthium liberum, monophyllum, sex-vel-duodecimpartitum, lusu magis adhuc, vel

minus, laciniis carnosis, lanceolatis. Petala tot, quot laciniæ calycis, lanceolata, acuta, patentia, vel coadunato-campaniformia. Stamina sex-viginti, filamentis subulatis, antheris subrotundis, vel didymis, bilocularibus, incumbentibus. Nectaria squamæformia circa ovaria in pluribus, non in omnibus speciebus. Ovaria orbem sistentia, spatio interno vacuo, tot quot stamina, vel numero minore, oblonga, compressa, acuta. Stili erecto-patuli. Stigmata capitata. Capsulæ oblongæ, semilanceolatæ, compressæ, stilo persistente terminatæ, erecto-patulæ, uniloculares, sutura interna dehiscentes. Semina exigua, numerosa, margini interno utriusque suturæ horizontaliter affixa.

Habitus. Plantæ fruticosæ, vel perennes, succulentæ; quæ perennant, sunt e collo radicis surculosæ, surculis apice hybernacula foliata, scolymiformia ferentibus. Folia simplicia, carnosa, plana, sessilia, sparsa, sæpe ciliata. Flores thyrsoides, aut cymosi. Petala albida, viridula, flavæ, rosea, vel purpurea, subinde basi inter se coherentia.

Ord. nat. Succulentæ β *Lin. Ord. nat. n. XIII., et Præl. p. 315. Vent. Tabl. 3. p. 271. Sempervivæ Juss. Gen. p. 207. Smith. Gram. p. 162. Schultz-Nat. syst. p. 498. Crassulacæ Bartl. Ord. nat. p. 309. De Cand. Mém. sur les Crass. p. 2., et Prodr. 3. p. 381. Rich. Famill. in Él. éd. 5. p. 203.*

* *Fruticosa.*

1. *SEMPERVIVUM arboreum*: caule fruticoso, erecto, lævi; foliis cuneato-spathulatis, glabris, ciliatis; thyrsæo elongato.

S. arboreum Sp. pl. p. 664. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 334., et Fl. Græc. 5. p. 57. t. 473. Moris. Stirp. Sard. el. fasc. 1. p. 21. Coll. Herb. Ped. 2. p. 499. n. 4. Desf. Atl. 1. p. 389. De Cand. Prodr. 3. p. 411. n. 8. Semprevivo arboreo Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 1178. fig. sine flor. Dur. Herb. Rom. 1585. fig. agg. tav. penult. S. maggiore Ang. Sempl. p. 276. fig. p. 277.*

Alterum genus (Sempervivū) majoris *Casalp. De pl. lib. 15. cap. 20. p. 577.*

Sedum majus legitimum Clus. Hist. pl. lib. 4. p. lvij. fig. p. lvij.

Ital. *Semprevivo arboreo. Sopravvicolo dei giardini Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 214.*

Frut. Habui ex rupibus Sardinia ab Eq. Prof. MORISIO. Floret Febuario, Martio.

Caulis teres, crassus, erectus, superne ramosus, tectus cortice carnoso, extus cinereo, bi-tripedalis, inferne longo tractu nudus, et a foliis delapsis tantum cicatratus, hic illic radices in aere agens. Rami succulenti, alterni. Folia carnosa, sparsa, crebra, cuneato-spathulata, inferne longe angustata, apice mucronulata, margine attenuata, et albo-hyalina, ciliisque albo-hyalinis instructa, superficie late viridia, glabra, nitida, in apice ramorum steriliū dense rosulata, in prolongatione florifera caulis remota, patentia. Thyrsus terminalis, ramosus, elongatus, acutus, multiflorus, glaber, vel puberulus, bracteolatus, bracteis exiguīs, lanceolatis, acutis, carnosīs, viridibus, deciduis. Calyx hemisphæricus, novem-decemfidus, laciniis lanceolatis, acutiusculis, vel acutis, virentibus, strictis, glandulis brevissime stipitellatis adpersus. Petala octo-decem, lanceolata, acuta, luteo-aurea, carina dorsali viridula, calyce duplo longiora, patentia, vel recurva. Stamina viginti, corolla paulo breviora, aut æqualia, lutea, primo erecta, postea patentia, filamentis capillaribus, antheris parvis, ovatis. Nectaria squamulæ emarginatæ, pellucidæ, nitidæ, albæ, ovaria circumstantes. Ovaria decem, e flavo viridula, glabra. Capsulæ decem. Reliqua generis. Petala siccando albescunt.

**** Perennia. Corolla polypetala, stellatim patens.**

1. **SEMPERVIVUM tectorum:** hybernaculis patulis; caule, foliisque inferioribus glabris, ciliatis, acuminatis; floribus subdodecandris; petalis calyce duplo longioribus. *S. tectorum Sp. pl. p. 664. Smith. Engl. Fl. 2. p. 350., et Engl. bot. v. 19. t. 1320. Curt. Lond. ed. Grav. v. 3. tab. 81. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 217. Fl. Dan. t. 601. Sv. bot. v. 4. tab. 260. Plenck. Ic. pl. med. 4. p. 68. t. 372. All. Ped. 2. p. 174. n. 1935. Balb. Breuv. p. 79.*

- Re Tor.* 1. p. 258. *Birol. Acon.* 1. p. 163. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 500. n. 7. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 222., et 383. *Comoll. Prodr.* p. 92., et *Com.* 3. p. 253. *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec.* 2. tom. 10. p. 286. *Pollin. Ver.* 2. p. 112. *Nacc. Ven.* 3. p. 52. *Suffr. Foroj.* p. 144. *Re Fl. Atest.* p. 50. *Sav. Pis.* 1. p. 461., et *Bot. Etr.* 4. p. 163. *De Cand. Pl. grass. tab.* 104., et *Franç.* 4. par. 1. p. 396., et *Prodr.* 3. p. 413. n. 23. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 23. heft. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 384. *Koch. Syn.* p. 262. *Reich. Exc.* 3. p. 550. n. 3559. *Host. Austr.* 1. p. 569. *Gaud. Helv.* 3. p. 288.
- Sedum tectorum Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 325. S. n. 949. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 1. p. 409.
- Semprevivo maggiore Matth. Valgr.* 1585. tom. 2. p. 1175. fig. *Dur. Herb. ed. Rom.* 1585. p. 425. fig.
- Ombilico di Venere seconda specie Ang. Sempl.* p. 276. *Sempervivum majus Casalp. De pl. lib.* 15. cap. 20. p. 577.
- Sedum majus vulgare Mich. Cat. hort. Flor.* p. 88. n. 2., et *app.* p. 172. n. 2.
- Ital. Aizoon. Barba di Giove. Carciofi grassi. Erba da calli. Guarda casa. Semprevivo. Semprevivo de'muri. Semprevivo maggiore. Sopravvivo. Sopravvivolo maggiore Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 214.
- Offic. Sempervivi majoris herba Lin. Mat. med.* p. 76. n. 222.
- Perenn. Occurrit in tectis, et muris, præsertim in Italia superiore, et media. Habui ex Bagnacavallo prope Ravennam a BUBANIO. Floret Julio, Augusto.*
- Radix fusiformis, brevis, crassa, lateraliter aucta fibris crassis, longis. Ex ejus collo prodeunt surculi horizontales, squamati, apice ferentes hybernaculum foliatum, subrotundum, crassum, referens calathum Cynaræ Scolymi, constans foliis undique imbricatis, patulis, basi radicans. Ex ejus centro altero anno producit caulis teres, erectus, inferne crassus, superne sensim sensimque tenuior, simplex, vel prope flores breviter ramosus, apice tantum pubescens, reliqua parte glaber, undique foliosus, dodrantalis-pedalis. Folia hybernaculorum obovato-cuneata, dorso convexulo-carinata, caulium floriferorum ovato-oblonga, sessilia, undique sparsa, crebra, ramea cæteris minora, et remotiora; omnia carnosa, valde succulenta, nitida, longo cuspidata, ciliata, glabra, caulinis supremis tantum leviter pubescentibus. Cyma terminalis, bis bifida, subspicata, sursum secundiflora, patens, et decummi patienti-recurva, hirta, sæpe lateraliter aucta racemis*

simplicibus, ramos canlinos terminantibus. Flores potius grandes, subsessiles, inodori, basi suffulti bractea parva, ovato-lanceolata, acuta, deorsum flexa, reliqua folia in cæteris referente. Calyx pubescens, vel hirtus, pilis apice glanduliferis, duodecimfidus, lacinii lanceolatis, acutis. Petala duodecim, anguste lanceolata, acuminata, ad summum calyce duplo longiora, pallide rosea, hirta præsertim margine, et carina. Stamina duodecim, corolla paulo breviora. Stili quoque duodecim, corollam subæquantes. Stigmata capitata, lutea. Capsula erecta, stilo elongato rostrata, serie simplici, duplici, vel multiplici, spatio interno vacuo. Apices foliorum hybernaculorum sæpe fusce rubent. Numerus duodenus in partibus floribus subinde abludivit.

Usus. Ob vim adstringentem, et refrigerantem olim adhibebatur in febribus, dysenteria, aphthis; nunc folia tantum ad callos emolliendos inserviunt.

3. *SEMPERVIVUM montanum*: totum pubescenti-glandulosum, viscidum; hybernaculis intus conniventibus; foliis lanceolatis; petalis calyce triplo longioribus; staminibus subvigenis.

S. montanum *Sp. pl.* p. 665. *Jacq. Austr.* 5. p. 50. *app. tab.* 41. *macr. All. Ped.* 2. p. 174. n. 1936. *Re Seg.* p. 41. *Birol. Acon.* 1. p. 163. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 501. n. 8. *Comoll. Prodr.* p. 92., et *Com.* 3. p. 255. *Pollin. Ver.* 2. p. 113. *Suffr. Poroj.* p. 144. *Bert. Amæn. Ital.* p. 370. n. 152. *Bert. fil. It. in Apenn. Bon.* p. 14.* *Sav. Bot. Etr.* 4. p. 164. *De Cand. Pl. grass. tab.* 105., et *Franç.* 4. par. 1. p. 396., et *Prodr.* 3. p. 413. n. 25. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 23., et 67. heft. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deut. Fl.* 3. p. 387. excl. descr. *Koch. Syn.* p. 263. *Reich. Excurs.* 3. p. 550. n. 3560. *Host. Austr.* 1. p. 570. *Gaud. Helv.* 3. p. 289.

S. globiferum *Comoll. Prodr.* p. 92.* excl. omn. syn.

S. montanum var. *Clusianum* *Ten. Syll. app.* p. 557.

S. Clusianum *Ten. Nap.* 4. p. 268. t. 233. fig. 1.

Sedum n. 951. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 1. p. 410.

S. mont. umbilicatum incanum min. fl. satur. purp. *Barrel. Ic.* 374. pl. macr.

S. majus non reticulatum, flore purpureo mont. angustifol. *Barrel. Ic.* 391. fig. 2. hybernac. tantum.

Sempervivum montanum *Vandell. De Ap. therm. fig. titulo libri præmissa. Linn. Epist. in Vandell. De therm. agr. Patav. apolog. contra Hall.* p. 42.

Aizoo montano de' Lionesi *Pon. Mont. Bald.* p. 176.

Cotyledon altera III. *Clus. Hist. pl. lib. 4. p. lxiij.* fig. Ital. *Guardaosa* Bert. *Amœn. Ital.* p. 370.

Perenn. Legi in alpinis Apuanis in *Sagro*, et in vertice *la Preta* ad supremam *Tambura*, ubi copiosum, tum in monte *Beni Apennini* Florentini inter *Pietramala*, et *il Covigliaio*. Filius attulit ex crista orientali Cornu scalarum in Apennino Bononiensi. Habui ex alpinis *Vicussene* in Liguria occidua a Prof. SASSIO, ex thermis Valderiis a BERTERO, ex Cenisio a BONJANNIO, ex Sempronio Italico supra *Frassinone* a Prof. DE NOTARIS, ex *Valsassina* a *Premone* a Prof. BALSAMO-CRIVELLO, ex montibus ad Larium prope *Sueglio* a Prof. COMOLLIO, et in vicinijs *di S. Abbondio* a RAINERO, ex Tyroli Italico in *Fedaia di Fassa*, et in *Fiemme* ad *S. Pelegrinum*, et prope *Cavallese* in rupibus porphyreticis a FACCHINIO, ex *Montalon* in *Valsugana* ab Eq. PAROLINIO, et a MONTINIO, ex Umbria in monte *S. Vicino* ab Eq. NARDUCCIO, ex Prætutiis ab ORSINO, ex Apennino Pistoriensi a Prof. PETRO SAVIO. Floret Julio, Augusto.

Habitu pollet præcedentis, sed plerumque paulo minus. Notæ distinctionis sunt sequentes. Hybernacula minora, foliis externis patentibus, internis conniventibus, utrisque obversæ lanceolatis, raro obovato-cuneatis. Folia caulina lanceolata, et in individuis humilioribus fere lanceolato-linearibus, breviter, vel longiuscule mucronata, nunc dense, nunc rariuscule ciliata, fere omnia pubescentia, vel hirsuta pilis apice glanduliferis, vix foliis hybernaculorum, et caulinis imis glabris. Caulis erectus, vel adscendens a pollice ad dodrantem longus, totus villo canescente hirsutus. Inflorescentia hirsuto-glandulosa, viscida. Petala calyce triplo longiora, rosea nervo medio saturatiore, vel tota purpurea. Stamina circiter viginti, petalis concoloria, eisque insigniter breviora. Nectaria sub ovariis lamellæ subquadratæ, erectæ. Pistilla quam in præcedente breviora. Capsulæ circiter decem, hirtæ, semi-obovato-oblongæ, latere dorsali curvo, rostratæ stilo sæpe demum recurvato, maturæ purpurantes. Species mire ludens forma, et magnitudine; dum major, valde appropinquat *Sedum tectorum* L., sed cito distinguitur hirsutæ caulibus, et foliorum, foliis angustioribus, petalis longioribus, saturate coloratis, staminibus subvigenis, et loco natali montano. Herba in alpestribus apricis plerumque rubens.

Valde suspicor *Sempervivum Funkii* Braun. in Sturm. Deutsch. Fl. 1. abth. 67. heft. esse levem lusum *Sempervivi montani* L. capsula brevior, et paulo latiore. Videant autopsæ.

4. *SEMPERVIVUM arachnoideum*: hybernaculis globosis, filo arachnoideo intertexto reticulatis; foliis lanceolatis, apice barbatis.

S. arachnoidenum Sp. pl. p. 665. Jacq. Austr. 5. p. 51. app. tab. 42. Allion. Ped. 2. p. 174. n. 1937. Re Seg. p. 41. Birol. Acon. 1. p. 163. Coll. Herb. Ped. 2. p. 501. n. 9. Comoll. Prodr. p. 92., et Com. 3. p. 257. Pollin. Ver. 2. p. 114. Ors. in Cap. Opusc. p. 287.* Sav. Bot. Etr. 4. p. 163. Sang. Cent. p. 68. Ten. Nap. 4. p. 268. A. B., et Syll. p. 239. n. 1. A. B. De Cand. Pl. grass. tab. 106., et Franç. 4. par. 1. p. 397., et Prodr. 3. p. 413. n. 26. Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 23. heft. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 388. Koch. Syn. p. 263. Reich. Exe. 3. p. 550. n. 3561. Host. Austr. 1. p. 571. Gaud. Helv. 3. p. 291.

S. pumilum Ten. Viagg. in Abruzz. p. 69. n. 445.

Sedum n. 952. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 1. p. 410.

Sempervivum rubrum montanum γαφαλαίδης Column. Ecphr. 1. p. 292. fig. p. 291.

Sedum mont. roseum minus reticulatum Barrel. Ic. 391., et 393.

S. gnaphaloides, angusto oblongoque folio, flore purpureo Triunfetti Tit. Cat. hort. Maur. p. 159.

S. montanum tomentosum Mich. Cat. hort. Flor. p. 88. n. 3., et App! p. 172. n. 3. Segui. Sup. p. 208. n. 3.

Ital. Sopravvivo ragnatello.

Perenn. Habui ex montibus d'Antola in Apennino prope Genpam ab hortulano Durattiano, ex Genisio a Bonjeannio, et a Vincentio, ex Braulio, et Bormio in Valtellina a Rainero, ex montibus ad Larium a Prof. Morettio, ex Valsassina prope Premana a Pfr. Balsamo-Grivellio, et De Notaris, ex Castel Baradello, et S. Abbondio prope Comum a Rainero, ex Tyroli Italico in Fiemme, et Fassa a Facchinio, et a Rainero, et a Cima d'Asta ab Eq. Petruccio, ex Montalon in Valsugana a Montinio, et ab Eq. Parolinio, Bassano in ipso muro oppidi a Montinio, ex districtu Patavino in rupibus prope il Cataio a Majeno, ex Umbria in saxosis ad lacum Nursinum prope i Mergani, et in montibus Nursinis al Castelluccio a Prof. Octaviano, ex Piceno in Vettore, et Pizzo di Sivo ab Orsino. Floret Julio, Augusto.

Sempervivo montano L. in omni statu minus. Radix longa, gracilis, fusiformi-ramosa. Hybernacula globosa, parva, et sæpe exigua, foliis obverse lanceolatis, et quandoque etiam obovato-cuneatis, obtusis, aut breviter acutis, hirtulis, ciliatis, apice flocco albo-lanato barbatis; eadem filis arachnoideis, albis, a folio in folium telæ arachnoideæ instar intertextis reticulata, præsertim hyemæ, et veræ; cum enim adoleverunt, folia eorum patent, fila arachnoidea disparent, remanente tantum flocco lanugineo in apice foliorum. Canalis a pollice ad spithamam longus. Folia caulina lanceolata, acuta, vel acuminata, apice flocco lanato, cano barbata, margine, et sæpe etiam superficie villosa, et fere lanata. Cyma terminalis modo contracta, pauciflora, modo elongata, multiflora, et subiunde aucta racemis axillaribus, proximis. Bractea lineares, vel lanceolato-lineares, acuminatæ. Flores grandiusculi, evidenter pedicellati. Lacinia calycinæ lanceolata, obtusæ, aut vix acutæ, puberulæ. Petala lanceolata, nunc latiora, acuta, nunc angustiora acuminata, in medio semper latiora, utrinque angustata, basi distincta, vel connata, calyce fere triplo longiora, rosea, aut purpurea, nervo satnratiore, rarius albida. Nectaria squamulæ truncatæ. Capsulæ pilis brevissimis, apice glanduliferis plus minus adpersæ. Reliqua ut in præcedente.

5. *SEMPERVIVUM Wulfenii*: foliis hybernaculorum patulis, obovato-cuneatis, exquisite micronatis, caulinis lanceolatis, acuminatis; petalis linearibus, calyce triplo longioribus; staminibus subvigenis.

S. Wulfenii Hopp. in Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 386. Koch. Syn. p. 262. Reich. Exc. 3. p. 550. n. 3562.

S. globiferum Jacq. Austr. 5. p. 50. app. tab. 40. Allion. Ped. 2. p. 175. n. 1939. Re Seg. p. 41.* Coll. Herb. Ped. 2. p. 500. n. 6. Pollin. Ver. 2. p. 113. De Cand. Franç. 4. part. 1. p. 397., et Prodr. 3. p. 413. n. 22. Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 23. heft. Host. Austr. 1. p. 570. Gaud. Helv. 3. p. 291.

Sedum n. 950. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 1. p. 410.

Ital. Sopravvivolo giallo.

Perenn. Habui ex Pedemontio in montibus di Corio a Prof. RE, ex Valtellina prope la Ghiacciaia del forno a RAINERO, ex Tyroli Italico in alpihus di Penia, et Fedaia di Fassa, et in alpihus di Vienza, et Bocche

di Fiemme a *FACCHINIO*, ex *Montalon* in *Valsugana* ab *Eq. PAROLINIO*. Floret *Julio*, *Augusto*.
Hybernacula prædita foliis obovato-cuneatis, exquisito mucronatis, glabris, vel pilosulis, margine ciliatis, subinde remote, aut omnino nudis, demum patentibus. Caulis teres, crassus, erectus, vel adscendens, inferne glaber, reliqua parte pilosus, aut pubescens, circiter apithamalis. Folia caulina lanceolata, acuminato-mucronata, ciliata, inferiora glabra, superiora pilosa, aut pubescentia. Oyma terminalis, trifida, radiis demum apice recurvis. Bractea lanceolato-lineares. Flores potius grandes, evidenter pedicellati. Lacinie calycinae lanceolatae, acutae, hirsutae. Corolla calyce triplo longior. Petala duodecim-quindecim, linearia, valde acuminata, citrina, siccande plerumque luride virescentia, hispidula. Stamina circiter viginti, corolla multo breviora, filamentis nunc citrinis, nunc purpureis, antheris flavis, polline anreo. Pistilla circiter sex, staminibus paulo breviora. Stigmata capitata, lutea. Nectaria lamella subquadrata. Capsula semilanceolata, stilo rostrata, glabra, vel pilosa. Herba e viridi glaucescens. Pili plantae apice glanduliferi. Reliqua ut in præcedentibus.

*** *Perennia*. Corolla hexapetala, campaniformis.

6. *SEMPERVIVUM hirtum*: hybernaculis patulis; foliis omnibus lanceolatis, acuminatis, caulinis subcordatis; floribus dodecandris.

S. hirtum *Sp. pl.* p. 665. *Jacqu. Austr.* 1. p. 10. t. 12. ex pl. culta. *All. Ped.* 2. p. 175. n. 1938. t. 65. f. 1. pessima. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 500. n. 5. *De Cand. Pl. grass.* tab. 107., et *Frang.* 4. par. 1. p. 398., et *Prodr.* 3. p. 413. n. 21. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 30. heft. *Röhl. cum. Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 389. *Kock. Syn.* p. 263. *Reich. Exo.* 3. p. 550. n. 3663. *Hort. Austr.* 1. p. 570.

S. hirsutum *Pollin. Ver.* 2. p. 113.

Sedum majus latifolium, floribus magnis albicantibus *Segui. Ver.* 1. p. 460. n. 2.

β *pumilum*, foliis glabris, ciliatis.

Sempervivum arenarium *Koch. Syn. in add.* p. 833. *Ital. Sopravvissolo frangiato*.

Perenn. *Habitu* ex *Pedemontio* in saxosis ad thermas *Valderias alla Fontana d'oro* a *BERTHO*, ex *Baldo* in *Flor. Ital. T. V.*

rupibus prope sanctuarium B. M. V. della Corona a FACCHINIO. Varietatem β accepi ex alpe di Comelico in districtu Belunensi ab eodem FACCHINIO. Floret Augusto.

Hybernacula demum patentia, instructa foliis lanceolatis, longe acuminatis, ciliatis, hirtis, vel glabris. Caulis teres ad dodrantem usque longus, erectus, vel ascendens. Folia caulina lanceolata, acuminata, basi dilatata, et subcordata, ciliata, vel omnia, vel superiora, hirta. Cyma terminalis, ramosa, hirta, quidquam contracta. Flores pedicellati, potius grandes, sed magnitudine ab uno in aliud individuum variabili. Calyx sexpartitus, hirtus, laciniis lanceolatis, acutis. Corolla hexapetala, calyce triplo, aut fere triplo longior, campaniformis, ex albo pallide ochroleuca, subinde cum aliqua purpurascentia. Petala lanceolata, margine fimbriato-lacera, extus hirta, et acute carinata, supra contra carinam canaliculata. Stamina duodena, corolla breviora, sex sita contra petala, sex inter petala, demum se se exerentia, et recurva, filamentis albidis, antheris flavis, didymis. Nectaria lamellæ bifidæ. Pistilla sex, staminibus saepe longiora. Capsula semilanceolata, hirta. Planta viscida ex hirsutiae apice glandulifera.

Varietas β differt habitu multo humiliore. Caulis uni-bipollicaris. Folia ciliata, sed superficie glabra, caulina valde acuminata. Corolla calyce triplo longior.

Si recte video, *Sempervivum soboliferum*, et *Sempervivum arenarium* Koch. Syn. in censu varietatum *Sempervivi hirti* L. habenda sunt, potius quam in censu specierum; innituntur enim characteribus partium summopere ludentium.

CLASSIS XII. ICOSANDRIA.

ORDO I. MONOGYNIA.

PHILADELPHUS.

Lin. Gen. p. 247. Juss. Gen. p. 325. Lamck. Ill. 5. t. 420. Vent. Tabl. 3. p. 323. Gærtn. De fruct. 1. p. 173. t. 35. De Cand. Prodr. 3. p. 205. Endl. Gen. p. 1187. n. 6105. Syringa Tourn. Inst. 3. tab. 389.

Calyx perianthium monophyllum, inferne turbidatum, adhærens, superne liberum, quadri-quinquefidum, erecto-patens. **Petala** quatuor-quinque, grandia, subrotunda, patentia. **Receptaculum** discoideum, tubum calycinum intus vestiens. **Stamina** viginti, et ultra, corolla breviora, filamentis subulatis, antheris oblongis, bilocularibus, incumbentibus. **Ovarium** semiadhærens. **Stilus** filiformis, tri-quadri-quinquefidus. **Stigmata** obtusa, simplicia. **Capsula** inferne tubo calycino adhærens, superne libera, quadri-quinquelocularis, quadri-quinquevalvis, valvis medio septiferis. **Semina** exilissima, valde numerosa, arillo ad umbilicum seminis fimbriato, extremitate opposita in caudam acuminatam attenuato. **Habitus.** Frutices, vel arbusculæ. **Canlis** erectus, ramosus. **Folia** opposita, ovata, tri-quintuplinervia. **Flores** terminales; racemosi, pedicellis oppositis; rarius axillares. **Petala** alba.

Ord. nat. *Hesperidæ* **Lin. Ord. nat. n. XIX., et Præl.** p. 346. *Myrti* **Juss. Gen.** p. 322. **Smith. Gram.** p. 168. *Myrtoideæ* **Vent. Tabl. 3.** p. 317. *Myrtineæ* **Schultz. Nat. syst. p. 426.** *Philadelphæ* **Don. in Jam. Edinb. phil. Journ. 1826, April. p. 133.** **De Cand. Prodr. 3.** p. 205. *Onagrarie* **Barl. Ord. nat. p. 318.**

1. **PHILADELPHUS coronarius;** foliis ovatis, acutis, remote serrulatis, basi subrotundatis, subtus nudis; racemo terminali; stilo profunde partito.

Ph. coronarius **Sp. pl. p. 671.** **Lamck. Ill. 5. tab. 420.** **Nouv. Duh. 2. p. 298. tab. 83.** **Targ. Tozz. Observ. bot. dec. 1. et 2. p. 39. tab. 4. fig. 23. 26. 29.** **All. Ped. 1. p. 294. n. 1071.** **Balb. Taur. p. 79. Re Tor. 1. p. 258.** **Coll. Herb. Ped. 2. p. 413. n. 1.** **Comoll. Prodr. p. 93.** **Pollin. Ver. 2. p. 117.** **Nacc. Agg. p. 18.* et Ven. 3. p. 53.*** **Jan. El. p. 7. n. 1.*** **Ten. Nap. 1. p. 275., et Syll. p. 241. n. 1.** **De Cand. Fr. 4. par. 2. p. 425., et Prodr. 3. p. 205. n. 1. α.** **Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 3. heft. Röhl. cum Mert. et Koch: Deuts. Fl. 3. p. 399.** **Koch. Syn. p. 249.** **Reich. Exc. 3. p. 561. n. 3629.** **Gaud. Helv. 3. p. 300.** **Ph. n. 1100.** **Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 37.**

Siringa di fior bianco, ovvero Filadelfo d'Ateneo *Pan. Mont. Bald. p. 209.*

Siringa alba, seu Philadelphus Athenæi *Segui. Sup. p. 294.*

S. alba *Gesn. Op. bot. ed. Schm. p. 123. n. 177. icon. lign. tab. 20. fig. 177.*

S. italica *Lob. Ic. 2. p. 102.*

Prutex coronarius *Clus. Hist. pl. lib. 1. p. 55. fig.*

Ital. *Erba Siringa. Fior Angiolò. Gelsomino della Madonna. Salindia. Salinga. Siringa Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 166.*

Frut. Arbust. Habui ex Baldo a Prof. JANIO, ex eodem monte alla Madonna della corona, ex Tyroli meridionali prope Roboretum in valle dei Corvi, ex Schener in finibus Tyrolensibus, et Feltrinis a PACCHINIO, ex districtu Bassanensi in *Falstagna al Buso* a MONTINIO, et ab Eq. PAROLINIO, Fossâ Clodiâ in sepibus alla *Ca-bianca* a Prof. NACCARIO. Floret Majo, Junio. Arbustula sex-octopedalis, sæpe vero in sylvis, et sepius ceduis frutex cæspitosus. Caulis teres, erectus, glaber, opposito, vel alterne ramosus, ramis junioribus pilosisculis. Folia opposita, ovata, aut ovato-oblonga, acuta, vel acuminata, basi subrotundata, breviter petiolata, his triplinervis, idest primo basi, deinde paulo supra basim, vel quintuplinervis, remote serrulata, serraturis apice-callosis, subciliata, supra saturate viridia, subtus pallentia, et nitentia, modo utrinque glabra, modo subtus ad nervos; et venas pilosa. Racemus terminalis, simplex, brevis, cruciatus cum flore impari terminali. Flores gratissime olentes, odore citreo. Bractem sub pedicellis lineares, caducæ; imæ subinde sunt ipsa folia caulina suprema. Flos terminalis interdum gaudens numero quinario partium, reliqui numero quaternario. Lacinie calycinae ovato-lanceolatae, acutæ. Corolla grandis, alba, campaniformi-patens. Petala ovata, obtusa, sæpe retusa. Stilus fere usque ad basim partitus. Semina scobiformia, spadiceo-rufa. Reliqua generis.

MYRTUS.

Lin. Gen. p. 248. Tourn. Inst. 3. t. 409. Juss. Gen. p. 324. Lamck. Ill. 5. tab. 419. Vent. Tabl. 3. p. 325.

Gærtn. De fruct. 1. p. 184. t. 38. De Cand. Prodr. 3. p. 238. Endl. Gen. p. 1231. n. 6316.

Calyx perianthium monophyllum, tubo turbinato, adhærente, limbo quinquepartito, rarissime quadripartito, libero. **Petala** subrotunda, plerumque quinque, raro quatuor. **Stamina** numerosissima, filamentis subulatis, antheris ovatis, bilocularibus, incumbentibus. **Ovarium** sepultum. **Stilus** filiformis. **Stigma** obtusum. **Bacca** subrotunda, adhærens, limbo calycino coronata, bilocularis, loculis mono-polyspermiis. **Semina** reniformia, dorso tecta crusta ossea, facie, seu concavitate repleta substantia fungosa.

Habitus. Frutices, vel arbusculæ. **Folia** simplicia, opposita, vix alterna, punctato-glandulosa. **Pedunculi** axillares, uniflori, solitarii, vel fasciculati. **Petala** alba, rosea. **Seminis** embryo curvus. Plures species heterogenæ olim in hoc genere comprehensæ, nunc expulsæ.

Ord. nat. *Hesperidæ a Lin. Ord. nat. n. XIX., et Præl. p. 346. Myrti Juss. Gen. p. 322. Smith. Gram. p. 168. Myrtoideæ Vent. Tabl. 3. p. 317. Myrtaceæ R. Brown. Gen. rem. in Flind. voyg. 2. p. 546. De Cand. Prodr. 3. p. 207. Bartl. Ord. nat. p. 330. Rich. Fam. in Él. éd. 5. p. 212. Myrtinæ Schultz. Nat. syst. p. 426.*

1. **MYRTUS communis:** foliis ovatis, acuminatis, distantibus; pedunculis solitariis, unifloris; calycibus acutis, basi hibracteatis; baccis ovoideis.

M. communis *Sp. pl. p. 673. a. et γ. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 336., et Fl. Græc. 5. p. 59. t. 475. opt. Lamck. Ill. 5. t. 419. bona. Nouv. Duh. 1. p. 201. t. 43. Plenck. Ic. pl. med. 4. p. 70. t. 374. All. Ped. 2. p. 137. n. 1791. A. Coll. Herb. Ped. 5. p. 429. n. 2. Comoll. Prodr. p. 93. Pollin. Ver. 2. p. 118. a. et γ. excl. reliq. Suffr. Foroj. p. 145. Spad. Xil. 2. p. 50. Sav. Pis. 1. p. 463., et Bot. Etr. 2. p. 205., et Tratt. degli arb. ed. 2. tom. 2. p. 140. Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 168. Ten. Nap. 4. p. 271., et Syll. p. 241. n. 1. A. a. Ab. Uer. Hort. Pân. p. 203. Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 560. a. b. c.* et Sup. 1. p. 153.* De Cand. Franç. 4.*

- par. 2. p. 426. *α. γ. et Prodr.* 3. p. 239. n. 5. *α. γ. Röhl. cum. Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 400. Koch. Syn. p. 250. Reich. Exc. 3. p. 641. n. 4118. Host. Austr. 2. p. 1. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 341.
- Mirto Matth. Valgr. 1585. tom. 1. p. 248. fig. Dur. Herb. ed. Rom. 1585. p. 296. fig. Anguill. SEMPL. p. 71.
- Myrtus Casalp. De pl. lib. 3. cap. 39. p. 127.
- M. communis, Italica Cup. Hort. Cath. p. 148. Zannich. Opusc. posth. p. 19.
- M. latifolia Romana Cup. l. c. p. 148.
- M. sylvestris Castell. Hort. Mess. p. 15.
- M. sylvestris foliis acutissimis Garid. Air. p. 323. tab. 70. (err. 110.) pl. luxur.
- M. Boetica sylvestris Clus. Hist. pl. lib. 1. p. 66. fig. bona. *β* baccis albis.
- Myrtus communis *β* Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 336.
- M. communis *α* italica *β* Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 560.
- M. communis B leucocarpa Ten. Syll. p. 241.
- M. communis bacca alba Moris. Stirp. Sard. el. fasc. 1. p. 19.*
- Ital. Mirtella. Mirto. Mortella. Mortina. Mortine Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 150.
- Offic. Myrti folia, baccæ Linn. Mat. med. p. 77. n. 224.
- Frut. Copiose in Italia in sylvulis ad mare hinc a Nicæa, inde ab Istria ad Calabriam extremam, inque insulis. Legi Sarzanæ, ubi frequens in omnibus sylvulis, præsertim in promontorio Lunensi, et in toto monte Caprione, nec non in collibus, insulisque ad Portum Lunæ. Habui Genuâ a VINCENTIO, et a RAJNERO, ex insula de' Brioni ad Istriam a TOMMASINIO, ex Hetruria in sylvaticis di Serravezza, di Livorno, di Montecatini, et Campiglia a Prof. ANTONIO TARGIONIO-TOZZETTO, iterum ex viciniis di Livorno, ab Eq. PAROLINIO, ex balneis di Montecatini ab illustr. Princ. CAROLINA NAPOLEONA Princ. JOSEPHI BONAPARTE, Volaterris ab AMIDEO, ex Cala di Forno, et ex monte Argentario a Prof. GIULIO, Ostiâ a BARRIERIO, ex fruticetis maritimis di Finale, et Cefalù in Sicilia ab Eq. GUSSONIO, Capreis a Prof. GIRALDIO, ex insulis maris Tyrrheni Gianutri, Montecristo, et Gorgonia a Prof. GIULIO, ex Corsica a Calvi a SOLEIROLIO, et ad Aiaccio ab Eq. GUSSONIO. Varietatem *β* obtinui ex sylvis Sardinie ab Eq. Prof. MORISIO. Floret Julio.

Arbuscula *orgyalis*, sed passim in sylvis ceduis frutex humilior, caespitosus. Caulis teres, erectus, oppositus, vel alterne ramosus, subinde etiam ramis verticillato-ternis, aut quaternis, inferne cortice cinereo, senescendo rimoso, superne in ramulis junioribus rubescente. Ramuli tetragoni, glabri, vel subpilosi, glandulosi. Folia opposita, raro verticillato-terna, saepe lusu hic illic alterna, brevissime petiolata, coriacea, ovata, magnitudinis mire variantis vel in eodem individuo, et interdum grandia, alias ovato-lanceolata, integerrima, glabra, nitidula, pellucido-punctata, supra lato, vel saturate viridia, subtus pallidiora, uninervia, parallele venosa, venis paulo ante marginem folii confluentibus veluti in nervum periphericum, sive opposita, sive alterna inter se potius remota, basi angustata, ima acuta, superiora exquisite acuminata. Stipula utrinque una, exigua, puberula in basi cujusvis petioli. Petioli glandulosi. Pedunculi tenues, solitarii, axillares, nudi, uniflori, longitudinis varii, subposito folio plerumque breviores. In apice pedunculi statim sub calyce bractea dum, opposita, lineares, virides, caduca. Flores suaveolentes. Laciniae calycinae quinque, ovatae, concavae, acutae, ciliolatae, patentes. Corolla alba, mediocri magnitudinis, sed calyce multo grandior, patens. Petala quinque, subrotunda, obtusa, concava, subciliata. Stamina corollam aequantia. Stylus longitudine staminum. Stigma crassiusculum, depressum, incurvum. Bacca ovoidea, obtusa, umbilicata, pulposa, coronata limbo calycino connivente, maturitate caeruleo-nigrescens cum nebula glauca, corona quoque caeruleo-nigrescente. Semina circiter quinque in quovis loculo, grandiuscula, testa exteriori pallide straminea, nitida. Tota planta pollens odore proprio myrteo, grato, forti, diu etiam in siccis perdurante.

Varietas β est levis. Insus baccis albis; in reliquis nulla diversitas.

Uusus. Planta corroborans, adstringens. Landatur in profluviis, et in leucorrhoea. Floribus obtinetur aqua distillata, quae aqua angelica dicitur, odore suavis, cuius tem abstergens, firmans. Eam adhibent mulieres, quae senescentis aetatis vitia cum simulata juventute commutare student. Cato docet facere vinum murtenum ex bacis myrti ad alvum crudam, ad lateris dolorem, et ad celiacum De ro. rust. ed. Pomb. p. 198. §. 125.

Veteres tam oleum, quam vinum myrto condiebant :
 « Succorum natura præcipuam admirationem in myrto
 « habet, quando ex una omajum olei, vinique bina
 « genera fiunt,, Plin. Nat. hist. lib. 15. cap. 29. Ute-
 bantur baccis loco piperis : » Et aprorum sapor com-
 « mendabatur ad intinctus, additis myrtis,, Plin. l. c.
 Folia nunc magno in usu ad opus coriarium. Hæc
 planta amat maris vicinia :

amantes litora myrti

Virg. Georg. lib. 4. v. 124.

Fortè hac ratione, vel ob pulchritudinem olim Veneri
 attributa :

*gratissima . . .
 Formosæ myrtus Veneri . . .*

Virg. Eccl. 7. v. 61. 62.

Triumphantes, et ovantes myrto Veneris victricis co-
 ronabantur, quod de Augusto auspicabatur Virgilius :

*te maximus orbis
 Accipiat cingens materna tempora myrto.*

Georg. lib. 1. v. 26. et 28.

2. MYRTUS *tarentina* : ramulis hirtis ; foliis ovatis, par-
 vis, creberrimis ; pedunculis solitariis, unifloris ; caly-
 cibus obtusis ; baccis globosis.

M. communis β *tarentina* Sp. pl. p. 673. Pollin. Ver. 2.
 p. 119. β . Spad. Xil. 2. p. 50. β . De Cand. Franç. 4.
 par. 2. p. 426. β ., et Prodr. 3. p. 239. n. 5. β .

M. communis C. All. Ped. 2. p. 137. herb.

M. communis A. b. *tarentina* Ten. Syll. p. 241. n. 1.

Mirto *tarentina* Matth. Valgr. 1585. tom. 1. p. 249. fig.
 Dur. Herb. ed. Rom. ann. 1585. p. 296. sine fig.

Myrtus *tarentina* Plin. Nat. hist. lib. 15. cap. 29. Casalp.
 De pl. lib. 3. cap. 49. p. 127.

M. minor vulgaris Cup. Hort. Cath. p. 149. Garid. Aix,
 p. 323. tab. 71. bona.

Ital. Mirte *tarentino*. Mortella di foglia piccola. Mor-
 tellina Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 150.

Frut. Habui Neapoli ab Onasio. Floret Julio.

Hæc species, quamvis præcedenti proxima, habet faciem
 propriam, quam nunquam mutat. Caulis idem, sed
 rami longiores, stricti, ramuli hirti. Folia exigua,
 conjugationibus creberrimis, cruciata, elliptico-ovata,
 ima obtusa, reliqua acuta, nitidiora, fere utrinque

concoloria. Pedunculi breviores, pubescentes. Flos minor. Lobi calycini rotundati, obtusissimi, ciliati. Petala exquisitius ciliata. Bacca minor, globosa. Semina triplo minora, et in quavis bacca numerosiora, magisque compressa.

Nulla alia *Myrtus* occurrit in Italia; sed passim colitur in hortis nostris *Myrtus batia latifolia*, *domestica* Clus. Hist. pl. lib. 1. p. 65. fig., quæ ob folia grandia, oblongo-lanceolata, conferta, minus nitentia, mihi videtur distincta species, nec pro varietate *Myrti communis* cum Linnæo habenda.

PUNICA.

Lin. Gen. p. 248. Tourn. Inst. 3. t. 407. Juss. Gen. p. 325. Lamck. Ill. 5. t. 415. Vent. Tabl. 3. p. 328. Gærtn. De fruct. 1. p. 183. t. 38. De Cand. Prodr. 3. p. 3. Endl. Gen. p. 1236. n. 6340.

Malum punicum turbinatum Put. in Comment. Bon. tom. 2. par. 2. p. 39. tab. 1-5.

Calyx perianthium adhærens, crassum, coriaceum, coloratum, limbo libero, quinque-septemfido. Petala quinque-septem, obovata, unguiculata, alternantia cum laciniis calycinis, eisque longiora. Receptaculum discoideum, oram tubi calycini intus vestiens. Stamina numerosissima, corolla breviora, filamentis tenuibus, filiformibus, antheris subquadratis, bilocularibus, incumben-
tibus, lateraliter dehiscentibus. Ovarium sepul-
tum. Stylus crassus, longitudine staminum. Stigma clavatum, papillosum. Balaustium globo-
sum, coronatum limbo calycino coarctato, tu-
buloso, quinque-septemdentato, intus bicame-
ratum, concameratione inferiore multo minore,
minorique loculorum numero divisa, tecta for-
nice conico, concameratione superiore multo am-
pliore, multiloculari. Loculi primarii dirempti
dissepimento prætenui, membranaceo. Semina
valde numerosa, oblonga, angulata, obvoluta
arillo celluloso, aquoso, colorato, diaphano, pa-
rietibus loculorum hærentia.

Habitus. Arbusculæ, aut frutices. Caulis valde ramosus. Ramuli tetragoni, sæpe senio apice spinoscentes. Folia simplicia, opposita, vel alterna, rarius verticillata, lanceolata, impunctata, exstipulata, subinde cum spina axillari. Flores solitarii, vel pauci coadunati, terminales, subsessiles. Calyx, et corolla coloris vivide coccinei, lusu albescentis.

Ord. nat. Pomaceæ β *Lin. Ord. nat. n. XXXVI., et Præl. p. 444. Myrti Juss. Gen. p. 322. Smith. Gramm. p. 168. Myrtoideæ Vent. Tabl. 3. p. 317. Granateæ Don. in Jam. Edinb. phil. journ. ann. 1826. Jul. p. 134. De Cand. Prodr. 3. p. 3. Bartl. Ord. nat. p. 324. Schultx. Nat. syst. p. 429.*

1. *PUNICA Granatum*: arborescens; foliis lanceolatis, subundulatis.

P. Granatum Sp. pl. p. 676. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 336., et Fl. Græc. 5. p. 60. t. 476. Nouv. Duh. 4. p. 44. t. 11. prima. Plenck. Ic. pl. med. 4. p. 71. tab. 376. All. Ped. 2. p. 140. n. 1804. Coll. Herb. Ped. 2. p. 363. n. 1. Nocc. et Balb. Ticin. 1. p. 223., et 383. Comoll. Prodr. p. 93. Barb. Agg. p. 33. Pollin. Ver. 2. p. 120. Ruch. Ven. p. 121 Moric. Ven. 1. p. 212. Nacc. Ven. 3. p. 54. Suffr. Foroj. p. 145. Spad. Xil. 2. p. 189. Sav. Tratt. degli alb. ed. 2. tom. 2. p. 155., et Bot. Estr. 2. p. 106. Maur. Cent. XIII. p. 24. Ten. Nap. 4. p. 271., et Syll. p. 241. n. 1. Guss. Pl. rar. p. 200., et Fl. Sic. Prodr. 1. p. 561. Ab. Ucr. Hort. Pan. p. 203. Desf. Atl. 1. p. 392. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 427. a., et Prodr. 3. p. 3. n. 1. a. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 401. Koch. Syn. p. 238. Reich. Exc. 3. p. 638. n. 4103. Host. Austr. 2. p. 1. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 341. Gaud. Helv. 3. p. 301.*

P. n. 1098. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 36.

Melagrano Matth. Valg. 1585. tom. 1. p. 246. fig.

Melegnano Dur. Herb. ed. Romæ 1585. p. 281. fig.

Pomigranati salvatichi Ang. Sempl. p. 71. sub Balaustio.

Punica, quæ malum granatum fert Casalp. De pl. lib. 3. cap. 60. p. 141.

P. sylvestris Segui. Ver. 2. p. 310.

Ital. Granata. Granato. Mela granata. Melagtana. Melagrano salvatico Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 182.

Offic. Cortex præsertim radicis malacorei, balaustiorum flores, granatorum semina Lin. Mat. med. p. 77. n. 223.
Arbosc. Frut. Passim occurrit in sylvis demissis, sepibusque Italiae præsertim temperationis. Legi Sarzanæ ad sepem, Bononiæ extra portam Castiglione, in monte Sabbione, et a Zolla predosa ad Guglielmino. Habet Mantuæ a Bibbianello a BARRIERO, ex Tyroli meridionali in apricis di Bolzano ab Eq. DE HEUTLERO, ex rupestribus ad fontem Timavi prope S. Joannem de Duino a TOMMASINO, ex Apennino Umbro ad Petram pertusam (Furlo) a Prof. OCTAVIANO, et ex montosis ad ripas di Sanginesio ab Eq. NARDUCCIO. Floret Junio, Julio.

Arboscula biorgyalis, sed plerumque in sylvis, sepibusque caduis frutex cæspitosus, bi-tripedalis. Caulis teres, erectus, valde ramosus, cortice seniore cinerascens, rimoso, in ramulis rubido. Rami oppositi, vel alterni, erecto-patuli, juniores tetragoni, senio apice spinescentes. Folia opposita, vel alterna, lanceolata, aut oblongo-lanceolata, brevissime petiolata, obtusa, aut vix acuta, integerrima, late viridia, subtus pallidiora, glabra, nitida, subundulata, decidua, in macrioribus ramis parva, oblonga, aut ovato-oblonga. Petioli plerumque rubelli. Subinde in axilla folii spina ex ramo abortiva. Flores terminales, subsessiles, solitarii, vel duotres coadunati. Calyx turbinatus, intense, et vivide coccineus, laciniis ovato-lanceolatis, acutis. Petala obovata, anguste unguiculata, vivide coccinea, crispula, nervo crasso dirempta, limbo calycino longiora. Stamina fere longitudine calycis, incurva. Stylus coccineus. Balaustum globosum, in statu sylvestri parvum, coronatum tubo brevi, matrum et flavido rubescens. Arillus seminum coloris pyropi, austero-acidus. Reliqua generis. Planta glabra.

Hæc species passim quoque colitur, et adipiscitur balaustum longe majus, arillo saporis austero-dulcis, valde expetiti.

Usus. Ad tormina, et si alvus non consistet, et si tænia, et lumbrici molesti erunt, XXX. mala Punica acerba sumito, contundito, indito in urceum, et vini nigri austeri congios tres, vas obliquo, post dies XXX. aperito, et utito: ieunus heminam bibito, Cat. de re rust. ed. Pomb. p. 199. §. 126.

Malum Punicum ubi florebit colligito. Tres minas in amphoram infundito. vini Q. L. veteris addito, et

« fœniculi radicem puram contusam minam. . . . Ubi vo-
 « les cibum coquere, et lotium facere, hinc bibito
 « quantum voles sine periculo. Idem vinum tœnias pur-
 « gat, et lumbricos, Cat. l. c. p. 200 §. 127.

Recentiores laudant flores (balaustia), corticem fructus
 (malicorium), et semina (granata) ad profluvia, ad
 vermes, ad cephalalgiam, præsertim vere corticem ra-
 dicis veluti specificum ad tœniam.

Obs. Hanc arbusculam antiquissimam fuisse in Italia li-
 quet ex Catone. Solemnem quoque oris Africæ septen-
 trionalis demonstrant nummi Cyrenaici balaustio signa-
 ti, et Plinii verba: " Sed circa Carthaginem Punicum
 « malum cognomine sibi vindicat Africa, Nat. hist.
 lib. 13. cap. 19., quod cognomentum a colore desump-
 tum, non a loco, mihi videtur.

AMYGDALUS.

Lin. Gen. p. 248. Tourn. Inst. 3. t. 402. Juss. Gen.
p. 341. Lamck. Ill. 5. t. 430. Vent. Tabl. 3. p. 356.
Gærtn. De fruct. 2. p. 74. t. 93. De Cand. Prodr. 2.
p. 530. Endl. Gen. p. 1250. n. 6405.
Persica Tourn. Inst. 3. t. 400. De Cand. Prodr. 2.
p. 531.

Calyx perianthium liberum, marcescens, tubo cam-
 panulato, limbo quinquefido, patente, vel reflexo.
 Receptaculum discoideum, faciem internam
 tubi calycini vestiens, ora exteriore petaliferum,
 et statim post petala staminiferum. Petala quin-
 que, obovata, patentia. Stamina ultra viginti,
 inæqualia, corolla breviora, filamentis subulatis,
 glabris, antheris subrotundis, bilocularibus, in-
 cumbentibus. Ovarium villosum. Stilus crassius-
 culus, filiformis, stamina longiora subæquans,
 basi villosus. Stigma depresso-capitatum, papil-
 losum. Drupa coriacea, vel carnosa, extus velu-
 tina, hinc sulco lævi notata. Nux oblonga, aut
 subrotunda, acuta, vel acuminata, tumens, mar-
 ginibus compressis, superficie irregulariter reticu-
 lato-sulcata, foraminibusque portusa, mono-di-
 spermia. Amygdala amara, vel dulcis, oleosa.

Habitus. Arbores, arbusculæ, vel frutices. Rami sparsi, patuli. Folia alterna, lanceolata, dentata, vel integra, e gemmis propriis, hysterañtia. Flores ante folia, sessiles, vel subsessiles, solitarii, aut geminati. Petala alba, rosea, rubra. Drupæ coriaceæ juniores edules confectæ cum syrupo, vel intra liquorem spirituosum. Drupæ carnosæ maturitate edules, deliciosæ, valde expetite.

Ord. nat. Pomaceæ *Lin. Ord. nat. n. XXXVI., et Præl. p. 444.* Rosaceæ *Juss. Gen. p. 334. Smith. Gramm. p. 171. Vent. Tabl. 3. p. 331. De Cand. Prodr. 2. p. 525. Rich. Famill. nat. in Él. éd. 5. p. 216. Amygdalæ Barth. Ord. nat. p. 404. Schultz. Nat. syst. p. 487.*

1. *AMYGDALUS communis*: foliis lanceolatis, serrulatis; drupa oblonga, coriacea, tomentosa.

A. communis *Sp. pl. p. 677. Nouv. Duh. 4. p. 71. t. 29. All. Ped. 2. p. 136. n. 1785. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 224., et 383. Pollin. Ver. 2. p. 121. Moric. Ven. 1. p. 212. Nacc. Ven. 3. p. 55. Sav. Tratt. degli alb. éd. 2. tom. 2. p. 25. Spad. Xil. 1. p. 77. Desf. Atl. 1. p. 393. De Cand. Franc. 4. par. 2. p. 486., et Prodr. 2. p. 530. n. 4. α. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 402. Koch. Syn. p. 205. Reich. Exc. 3. p. 647. n. 4152. Host. Austr. 2. p. 2. Caud. Helv. 3. p. 303.*

A. n. 1078. (err. 1089.) *Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 26.*

Mandorle Matth. Valgr. 1585. tom. 1. p. 393. fig. Dur. Herb. ed. Rom. 1585. p. 272. fig.

Mandole Ang. Sempl. p. 78.

Amygdala Casalp. De pl. lib. 2. cap. 14. p. 47.

Ital. Mandorla. Mandorlo Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 15.

Offic. Amygdalæ dulcis, et amara nuclei Lin. Mat. med. p. 79. n. 229.

Arbor. Arbusc. Habui ex montibus Terracinensibus a *FROBIA-MAZZANTIA. Floret Martio.*

Caudex cortice cinereo-fusco, senio rimoso. Rami sparsi, patuli, subinde apice spinescentes. Folia e gemmis propriis in ramulos foliosos demum evolutis, hysterañtia, alterna, oblongo-lanceolata, acuta, basi angustata, breviter petiolata, serrulata, serraturis apice glanduliferis, glabra, late viridia, subtus pallidiora. Gemmæ foliaceæ primores evolvuntur in apice ramorum

seniorum. Gemmarum foliacearum squamæ inferiores duræ, latæ, breves, acutæ, fusco rubidæ, superiores longiores, ovato-lanceolatæ, acuminatæ, carina dorsali e rubido virentes, lateribus membranaceæ, pallidæ, vel ferrugineæ, omnes margine barbata, sed inferiores subinde nudæ. Flores ante folia, e gemmis propriis, in lateribus ramorum seniorum, solitarii, vel geminati, fere sessiles, odore veluti amygdalæ amaræ. Squamæ harum gemmarum similes squamis gemmarum foliiferarum. Calyx e viridi rubens, tubo campanulato, glabro, limbi laciniis tubo longioribus, oblongis, obtusis, concavis, patentibus, margine lanugineis. Corolla grandis, alba, vel ex albo leviter carnea, calyce multo longior. Petala obovata, emarginata, aut erosa, ungue rubente. Stamina longiora calycem paulo superantia, filamentis rubescentibus, antheris parvis, luteis. Ovarium, et stilus inferne teguntur villo denso. Drupa coriacea, oblonga, compresso-tumens, acuta, extus viridis, tomentosaque. Nux mono-disperma, oblonga, compresso-turgens, putamine ligneo, acuta, margine suturali attenuato, superficie in sculpta sulcis, et foraminibus irregulariter dispositis. Amygdala in plantis sylvestribus amara, rarius dulcis. Caulis, et folia glabra.

Hæc planta dum apud nos occurrit sylvestris, passim quoque colitur, et cultura adipiscitur drupas magnitudinis diversæ, putamine nunc duro, nunc tenero, amygdalasque frequentius dulces, quæ quidem gratæ palato, non stomacho, dum amaræ modice sumptæ gratiores stomacho.

Usus. Oleum ex amygdalis dulcibus recens expressum est remedium purgans præstantissimum, et in colicis affectibus laudatissimum.

Observ. Stirps nota in Italia ab antiquiori ævo; quod si Cato De re rust. ed. Pomb. p. 42. §. 8. vocavit nucem Græcam, ut quidam autumant, id intelligendum de aliqua varietate ejus profecta e magna Græcia, ut declarare videtur Columella, qui Tarentinam dicit De re rust. lib. 5. cap. 10. Contra vero *Amygdalus persica* L. est planta apud nos omnino advena, sed lato culta, et fructibus deliciosissimis plurimum ludens.

PRUNUS.

Lin. Gen. p. 249. Tourn. Inst. 3. t. 398. Juss. Gen. p. 341. Lamck. Ill. 5. t. 432. f. 1. Vent. Tabl. 3. p. 354.

Gærtn. De fruct. 2. p. 74. t. 93. Smith. Engl. Fl. 2. p. 353., et Gram. t. 20. f. 261. De Cand. Prodr. 2. p. 532. Endl. Gen. p. 1250. n. 6406.

Cerasus Tourn. Inst. 3. t. 401. Juss. Gen. p. 340. Vent. Tabl. 3. p. 353. De Cand. Prodr. 2. p. 535.

Armeniaca Tourn. Inst. 3. t. 399. Juss. Gen. p. 341.

Lamck. Ill. 5. t. 431. Vent. Tabl. 3. p. 355. De Cand. Prodr. 2. p. 531.

Laurocerasus Tourn. Inst. 3. t. 403.

Calyx perianthium liberum, marcescens, tubo turbinato, vel campanulato, limbo quinquesido, laciniis patentibus, vel demum retroflexis. **Receptaculum** discoideum, tubum calycinum intus vestiens, ora externa petaliferum, et statim prope petala staminiferum. **Petala** quinque, subrotunda, vel obovata, calycem superantia. **Stamina** ultra viginti, filamentis subulatis, antheris subrotundo-didymis, bilocularibus, incumbentibus.

Ovarium liberum, **Stilus** longitudine staminum. **Stigma** orbiculatum, depressum. **Drupa** carnosa, oblonga, vel globosa; hinc sulco levi notata, glabra, rarius apice pilosa, matura colorata. **Nux** ossea, lenticulari-subrotunda, turgens, vel oblonga, subcomplanata, non pertusa, mono-dispermia. **Amygdala** amara, vel dulcis.

Habitus. Arborea, arbusculæ, aut frutices. **Caulis** erectus, vel decumbens, aut prostratus, ramis patulis, sæpe distortis, subinde apice spinescentibus. **Folia** e gemmis propriis, simplicia, petiolata, ovata, oblonga; oblongo-lanceolata, serrata, vel crenata, plerumque decidua. **Petioli** sæpe apice glandulosi, basi stipulati; stipulis caducis. **Gemma** floriferæ inter gemmas foliiferas. **Flores** racemosi, corymbosi, solitarii, aut geminati. **Petala** alba, vel rosea. **Drupæ** plurium specierum cultura sunt mites, quæ ob gratum saporem habentur in deliciis, et longe lateque apud nos colantur. Hinc species varietatum feracissimæ.

Ord. nat. Ut in *Amygdalo* p. 124.

1. *Prunus Padus*: foliis oblongo-obovatis, serrulatis, subtus basi biglandulosis; racemis elongatis, cylindraceis, patulis, pendulisque; laciniis calycinis patentibus.
- P. Padus* *Sp. pl.* p. 677. *Smith. Engl. Fl.* 2. p. 354., et *Engl. bot.* v. 20. t. 1383. *Hook. Brit. Fl.* ed. 2. p. 220. *Fl. Dan.* t. 205. *Sv. bot.* v. 2. t. 121. *Plenck. Ic. pl. med.* 4. p. 77. t. 381. *All. Ped.* 2. p. 134. n. 1778.* *Balb. Taur.* p. 79. *Re Seg.* p. 41., et *Tor.* 1. p. 259. *Birol. Acon.* 1. p. 164. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 295. n. 26. *Comoll. Prodr.* p. 93. *Barb. Agg.* p. 33.* *Pollin. Ver.* 2. p. 123. *Suffr. Foroj.* p. 145. *Sav. Tratt. degli alb. ed.* 2. tom. 2. p. 148. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 405. *Koch. Syn.* p. 207. *Reich. Exc.* 3. p. 642. n. 4119. *Scop. Carn.* ed. 2. tom. 1. p. 343. *Gaud. Helv.* 3. p. 304.
- Cerasus Padus* *Nouv. Dub.* 5. p. 2. t. 1. *De Cand. Franç.* 4. part. 2. p. 480. a., et *Prodr.* 2. p. 539. n. 26. a. β. δ.
- Padus vulgaris* *Host. Austr.* 2. p. 4.
- P. n.* 1686. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 30.
- Ciriegie* racemose *Matth. Valgr.* 1585. tom. 1. p. 254. fig. dextrorsum versa.
- Arbuscula ignota* *Germ. Op. bot. ed. Schm.* p. 123. n. 170. *ic. lign. tab.* 19. f. 170.
- Cerasia racemosa nigra* *Tabernam. Ic.* 988.
- Cerasa racemosa* *Lugd. hist.* 1. p. 312. fig.
- Ital. Pado* *Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 181.
- Arbusc. Frut.* *Habui* ex *Pedemontio* a *MOLINARIO*, ex *Valtellina* a *BARBIERO*. Floret Aprili.
- Arbuscula uni-biorgyalis*, vel frutex tri-quadripedalis. Caulis teres, erectus, alterne ramosus, ramis erecto-patulis, tectus cortice fusce rubido. Folia sita in ramulis novis, alterna, petiolata, oblongo-obovata, acuta, vel acuminata; interdum basi subcordata, minute, et creberrime biserrulata, serraturis incurvis, plerumque glandula acuta terminatis, late viridia, subtus pallidiora, contrita foetida, decidua, basi subtus biglandulosa, sed glandula ista subinde lateraliter migrant in apicem petioli. Stipula utrinque una in basi petioli, lanceolato-linearis, elongata, serrulata, albo-membranacea, caduca. Racemi laterales, inferne foliosi, elongati, cylindracei, laxiflori, primo patuli, postea penduli. Flores imi subinde stant in axilla folii, reliqui, vel etiam omnes in axilla bractea oblongo-lanceolata, obtusa, elongata, concavo-canaliculata, albo-membranacea, puberula, citissime caduca, ut flores passim nudi habeantur. Pedicelli tenues,

subæquales, initio erecti, demum patentos. Flos parvus. Calycis segmenta rotundata, glandulis ciliata, etiam in fructu patentia. Petala alba, obovata, obtusa, serrulata, vel crenata, calyce duplo, et triplo longiora. Genitalia corolla breviora. Drupa globosa, parva, pulposa, succosa, prope maturitatem rubida, matura nigra, nitens, saporis austero-acidi, ingrati.

Nux rugosa, nec tamen pertusa. Tota planta glabra.

Usus. Decocto corticis saturatissimo Fennones curant luem veneream. Vide Linn. Fl. Suec. ed. 2. p. 166. n. 431.

a. *Prunus Mahaleb*: foliis late ovatis, acutis, crenatis; corymbis paucifloris; laciniis calycinis senescentibus recurvatis.

P. Mahaleb Sp. pl. p. 678. Jacq. Austr. 3. p. 15. t. 227.

Plenck. Ic. pl. med. 4. p. 77. t. 38a. All. Ped. 2. p. 134.

n. 1779. Balb. Taur. p. 79. Re Seg. p. 41., et Tori. 1.

p. 259. Birol. Acon. 1. p. 165. Coll. Herb. Ped. 2. p. 294.

n. 18. Morett. in Mem. 1. p. 270. Comoll. Prodr. p. 94.

Barb. Agg. p. 33.* Pollin. Ver. 2. p. 124. Ruch. Ven.

p. 122. Nacc. Ven. 3. p. 57. Suffr. Foroj. p. 145. Sav.

Tratt. degli alb. ed. 2. tom. 2. p. 151. Spad. Xil. 2. p. 165.

Ten. Nap. 4. p. 273., et Syll. p. 245. n. 7. Ab Ucr.

Hort. Pan. p. 205. Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 562.,* et

Sup. 1. p. 154.* Röhl. cum. Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3.

p. 406. Koch. Syn. p. 207. Reich. Exc. 3. p. 643. n. 4124.

Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 343. Gaud. Helv. 3. p. 305.

Cerasus Mahaleb Nouv. Duh. 5. p. 6. t. 2. De Cand.

Franç. 4. par. 2. p. 480., et Prodr. 2. p. 539. n. 25.

Hort. Austr. 2. p. 5.

C. n. 1084. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 29.

Mahaleb Matth. Valgr. 1585. tom. 1. p. 190. fig. Dur.

Herb. ed. Rom. 1585. p. 269. fig.

Macaleb Ang. Sempl. p. 228.

Machaleb albero Calz. Viag. al mont. Bald. p. 8.

Machalepo del Gesnero, et del Matthioli Pon. Mont.

Bald. p. 138., et 211.

Cerasus alpina, pumila, folio subrotundo, fructu Ci-

ceris magnitudine, nigro-rubello, acido, amaritudine

sensibiliori Cup. Hort. Cath. p. 45.

C. amara, alpina, pumila, folio subrotundo (seu cor-

diformi) fructu Ciceris magnitudine, nigro Cup. Sup.

alt. p. 16.

C. sylvestris, amara, Mahaleb putata Mich. Cat. hort.

Flor. p. 23. n. 2., et app. p. 126. n. 2. Segui. Ver. 2.

p. 306. J. Bauh. Hist. pl. 1. lib. 2. p. 227. fig. bona.

Flor. Ital. T. V.

Ital. *Ciliegio canino*. *Legno di S. Lucia* Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 180.

Arb. Frut. Habui Mantuâ *al Bosco fontana* a BARBIERIO, ex collibus Veronensibus a RAINERO, Veronâ in sylva *del Mantico* a MANGANOTTO, ex oris Benaci a FOX-STRANGWEJO, ex Tyroli meridionali in districtu *di Bolzano* a FACCHINIO, et in dumetis Brixinensibus ab Eq. DE HEUFLERO, ex montibus Bassanensibus ab Eq. PAROLINIO, tum in sylvis, et sepibus *di Pove*, et S. Michaelis *d' Angarano* a MONTINIO, ex sylvaticis circa Tergestum a BIASOLETTO, et a TOMMASINIO, ex Umbria *a Frasassi* ab Eq. NARDUCCIO, ex Petra pertusa (*Furlo*), *Pioraco*, et *Rio sacro* a Prof. OCTAVIANO, ex Piceno in monte *Pizzo alla Galeotta* a MARZIALETTO, *a Cascia*, et ex Præutiis *a Massa* in radicibus montis Velini ab ORSINO, in sepibus *della Foce* prope *Pizzoli* a CECCHETTO, ex Ducatu Lucensi in monte *Penna* supra *S. Lorenzo Vaccoli* a Prof. PUCINELLIO, ex monte Pisano *a Pozzuolo* a Prof. PETRO SAVIO, ex Nebrodibus Siciliæ ab Eq. GUSSONIO. Floret Martio, Aprili.

Arbor vigintipedalis, et ultra, sed passim in sylvis cædis arbuscula humilior, vel frutex cæspitosus. Caulis teres, erectus, superne ramosissimus, ramis sparsis, patulis, apice sæpe senio spinescentibus, cortice rubido-cinereo. Folia subrotundo-ovata cum brevi cuspidæ, subinde basi subcordata, longiuscule petiolata, crenata, crenis incurvis, apice glandulosis, imis exceptis, initio fere fasciculata, postea evoluto e gemma ramulo alterna, supra late viridia, subtus pallidiora, sicca grate odora. Stipulæ in basi petioli lineares, elongatæ, serrato-ciliatæ, membranacæ, albidæ, caducæ. Ramuli floriferi e gemmis lateralibus inter ramulos foliiferos, inferne foliacei, apice terminati racemo subcorymboso, paucifloro, simplicis, breviter pedunculato, erecto, pedicellis subinde in fructu cernuis. Sub quovis pedicello bractea parva, oblonga, obtusa, membranacea, apice serrulata, caduca. Calycis lacinia oblongæ, obtusæ, in anthesi patentes, in fructu retroflexæ. Corolla parva, alba, calyce duplo, vel triplo longior. Petala obovata, obtusa, venosa, subcrenata. Genitalia corolla breviora. Drupa ovoidea, vix piso major, oblique acutata, matura nigra, saporis ingrati. Nux læviscula. Amygdala amara, aromatica. Tota planta glabra; subinde in montanis petioli superiores, et pedunculi sunt puberuli.

Usus. Lignum fusco rubens, durum, præstans ad opus torno poliendum.

3. *Prunus brigantiaca*: foliis late ovatis, subcordatis, crebre duplicato-serratis, subrugosis, nervis, venisque villosis; floribus subsessilibus, fasciculatis; drupa globosa.

P. brigantiaca Vill. Dauph. 3. p. 535. Nouv. Duh. 5. p. 187. t. 59. All. Auct. p. 31. Re Seg. p. 41. Coll. Herb.

Ped. 2. p. 292. n. 6. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 484.

Armeniaca brigantiaca De Cand. Prodr. 2. p. 532. n. 4.

Ital. Marmota. Prugno Marmota.

Arbusc. Habui ex Oulx prope Segusium a BONJEANNIO. Floret Aprili.

Caulis teres, erectus, octo-decempedalis; cortice cinereo, ramosus, ramis sparsis, patulis, subflexuosis, junioribus rubidis. Folia alterna, petiolata, late ovata, sæpe subcordata, acuminata, crebre, et argute duplicato-serrata, subrugosa, supra saturate viridia, glabra, subtus pallidiora, valde reticulato-venosa, inferne nervo, venisque dense villosa. Petioli pubescentes, prope apicem uni-biglandulosi. Stipulæ in basi petioli angustæ, laciniatæ, oiliatæ, ciliis apice glanduliferis, caducæ. Gemmæ florales laterales, uni-quadrifloræ. Flores subsessiles, fasciculati, ante folia prodeuntes, grato odori. Calyx reticulato-venosus, glaber, laciniis oblongis, obtusis, concavis, margine angusto albo-membranaceo, serrulato. Corolla potius parva, tamen calyce duplo longior, alba. Petala obovata, obtusa, concava. Genitalia erecta, corollam superantia, etiam duplo. Drupa parva, globosa, carnosa, albo-flavida, et, qua sole tangitur, rubescens, saporis ingrati, non edulis. Nuclens quidquam complanatus, striatus. Amygdala amara.

Usus. Brigantiaci extrahunt ab amygdalis hujus speciei oleum dulce, suave, quod oleum *de Marmote* vocant, et magni faciunt ad usum domesticum loco olei olivarum.

4. *Prunus Cerasus*: foliis ovatis, oblongatisve, biserratis, longe petiolatis; umbellis simplicibus, sessilibus; drupa globosa.

P. Cerasus Sp. pl. p. 679. a. Smith. Engl. Fl. 2. p. 354. a.

All. Ped. 2. p. 134. n. 1780. Bulb. Taur. p. 79. Re Seg.

p. 41., et Tor. 1. p. 259. Birol. Acon. 1. p. 165. Coll.

Herb. Ped. 2. p. 293. n. 11. Comoll. Prodr. p. 94. a.

Pollin. Ver. 2. p. 125. a. Bert. fl. It. in Apenn. Bonon.

- p. 19.* *Ten. Syll. p. 244. n. 3. A. Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 563. Reich. Exc. 3. p. 644. n. 4130. β.*
Cerasus n. 1083. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 28.
C. sativa, fructu rotundo, rubro et acido Duham. Arb. 1. p. 148. n. 9. tab. 56. bona.
β drupa rubro-nigrescente, succo sanguineo.
Prunus Cerasus Engl. bot. v. 10. tab. 706. Smith. Engl. Fl. 2. p. 354. δ.
P. Cerasus γ avium Pollin. Ver. 2. p. 126.
P. Avium Sp. pl. p. 680. Plenck. Ic. pl. med. 4. p. 71. t. 377. fig. drupa nigra. Sv. bot. v. 3. tab. 205. All. Ped. 2. p. 134. n. 1781. Birol. Acon. 1. p. 165. Coll. Herb. Ped. 2. p. 293. n. 10. Comoll. Prodr. p. 94. Spad. Xil. 2. p. 176. Sav. Tratt. degli alb. ed. 2. tom. 2. p. 152. Ten. Nap. 4. p. 274., et Syll. p. 244. n. 4. Koch. Syn. p. 206. Reich. Exc. 3. p. 644. n. 4132. α. Host. Austr. 2. p. 5. Gaud. Helv. 3. p. 309.
Cerasus avium Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 168. Nouv. Duh. 5. p. 10. tab. 3. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 482., et Prodr. 2. p. 535. n. 2. α. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 406.
C. n. 1082. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 29.
C. major ac sylvestris fructu subdulci nigro colore inficiente Segui. Sup. p. 295.
Ital. Ciliegio salvatico. Ciliegio montanaro.
Offic. Cerasorum rubrorum, vel nigrorum fructus Lin. Mat. med. p. 80. n. 233.
Arb. Arbusc. Filius attulit ex Apennino Bononiensi all' Acero. Habui ex agro Veronensi in colle S. Leonardi ad sepes a MANGANOtto, ex sylvis d' Angarano in districtu Bassanensi a MONTINIO, ex Umbria in monte la Rosa ab ORSINO, ex Piceno a Montefortino a MARZIALETTO. Varietatem β accepi ex Apennino Bononiensi all' Acero a PIRAZZOLIO, ex monte Pisano a MULINA a Prof. PETRO SAVIO. Floret Majo, Junio in alpinis; delata in planitiem floret Aprili.
Arbor insignis, sed et arbuscula passim occurrit in rupesribus montanis. Caudex conicus, cortice lævi, cinereo, epidermide circulariter secedente. Rami sparsi, patuli. Folia e gemmis propriis, primordialia parva, æstivantia involuta, ovata, subtus pilosula, vel glabra, seriora multo majora, oblongata, vel oblongo-lanceolata, acuta, aut acuminata, biserrata, serraturis plerumque apice glandulosis, conduplicata, longo petiolata, glabra, aut vix in nervo, et venis primariis

inferne pilosa, supra late viridia, subtus pallidiora, decidua. Glandulæ duæ in basi folii, vel in apice petioli. Stipulæ lineares, longæ, ciliato-glandulosæ, caducæ. Gemmæ floriferæ *pterales*, sitæ inter gemmas foliiferas. Utræque evolvuntur squamis supremis foliaceis. Flores in umbella simplici, sessili, subinde tantum biradiata. Radii longi, uniflori, nudi, nutantes, et in fructu penduli. Calycis tubus campanulatus; limbi lacinie ovata, obtusæ, concavæ, integræ, vel subdentato-glandulosæ, cito retroflexæ. Petala calyce multo longiora, obovata, integra, aut emarginata, alba. Stamina inæqualia, longiora corollam subæquantia, filamentis albis, antheris parvis, luteis. Stigma filiformis, virens, corolla paulo brevior. Stigma bilobum, umbilicatum. Drupa globosa, rubra, magnitudine ciceris grossioris, carne initio aquosa, acida, maturitate mitiore, et tunc eduli. Planta in genere glabra.

Varietas β differt foliis junioribus subtus magis pubescentibus, petalis constantius emarginatis, drupa atrorubente, carne sanguinea, matura dulciore, et magis expetita. Turdi, et merulæ valde devorant.

Ex hac specie tot, tantæque Cerasorum mitium varietates dimanarunt esui gratæ, et ubique apud nos cultæ, quas inter habenda est *Cerasus* a Lucullo Romanam, victo Mithridate, importata; is enim non valde inserviisset gulæ suæ, corruptorumque Romanorum, si *Cerasum sylvestrem* intulisset.

Usus. Drupis cerasorum sive acidulis, sive dulcibus, sive austeris obtinentur syrupi, rob, confectiones, aquæ ardentes, liquores suaves, quæ omnia magni fiunt tam in medicina, quam in domestico usu. Lignum ob duritiem, et ob colorem flavum ad res, quæ larem ornant, præstantissimum.

5. *Prunus domestica*: subinermis; foliis ovatis, crenatis, utrinque angustatis, subtus pubescentibus; pedunculis subsolitariis; petalis subrotundis; drupa globosa.

P. domestica *Sp. pl.* p. 680. *Smith. Engl. Fl.* 2. p. 355., et *Engl. bot.* v. 25. t. 1783. *Hook. Brit. Fl. ed. 2.* p. 219. *Sv. bot.* v. 3. tab. 193. excl. fig. h. i. *All. Ped.* 2. p. 135. n. 178a. ex loco.

β drupa oblonga, obtusa, basi angustata.

Ital. *Susinello* *Susino salvatico*.

Arbosc. Legi Bononiæ in sepibus prope portam Stephanianam ad molendinum, et ad radices collium *del' Osservanza*. Varietatem β habui ex Sardinia ab Eq. Prof. MORISIO. Floret Martio decedente, et Aprili.

Arhuscula octo-dnodedicimipedalis. Caulis erectus, cortice fusce rubido cum nebula cinerea. Rami alterni, sparsi, patuli, subflexuosi, crassi, rarius ramulis abortivis brevissimis spinescentibus. Folia e gemmis propriis, æstivantia involuta, prima prodenntia parva, ovata, obtusa, recurva, brevins petiolata, successiva multo grandiora, ovata, utrinque angustata, acuta, aut acuminata, longe petiolata; omnia crenulata, crenulis incurvis, sæpe apice glandulosis, supra læte viridia, glabra, subtus albido-pubescentia. Petioli plerumque apice biglandulosi. Stipulæ lineares, angustæ, serrulatæ, ciliatæ, subinde bipartitæ, eaducæ. Flores e gemmis propriis, lateralibus, numerosis, crebris, uni-bifloris, grate olentes odore florum *Cratægi Oxyacanthæ* L. Pedunculi diametro floris breviores, crassiusculi, nudi. Tubus calycinus brevis, campanulatus; lacinis limbi tubo longiores, oblongæ, obtusæ, patulæ, margine anguste albo-membranaceæ, ciliatæ. Corolla alba, patens, calyce triplo longior, et multo grandior, quam corolla *Pruni spinosæ* L. Petalorum lamina subrotunda, obtusa, integra, vel emarginata, ungue brevi. Stamina corolla paulo breviora, aut æqualia, filamentis albis, antheris parvis, luteis, senescendo croceis. Stylus longitudine staminum, virens. Stigma capitatum, convexum, flavum. Drupa globosa, subinde ad formam ellipsoideam accedens, utrinque rotundata, obtusa, magnitudine cerasi grossioris, valde austera, maturitate purpureo-violacea cum nebula glaucescente, vix mitescens. Nux lenticularis, turgens, lævis. Amygdala amara.

Varietas β distinguitur foliis omnibus supra remote pilosis, subtus molliter pubescentibus, pedunculis longitudine drupæ, scilicet unguicularibus, drupa obverse oblongo-ovoidea, obtusa, inferne angustiore. Reliqua ut in specie.

Ex hac innumera varietates perfectæ sunt tam drupa globosa, quam oblonga, diversimode colorata, quæ ob fructuum suavitatem ubique apud nos coluntur.

Usus. Pulpa druparum mitium laxans, purgativa; siccata præstat ad tamarindum arte imitandum.

6. *Pærus Cocomilia*: foliis ovatis, crenatis, utrinque glabris; pedunculis geminatis; petalis obovatis; drupa oblonga, acuta.

P. *Cocomilia* Ten. *Nap.* 4. p. 272. t. 144., et *Syll.* p. 244. n. 6. *De Cand. Prodr.* 2. p. 533. n. 4.

Ital. *Pruno Cocumiglia* Ten. l. c.

Arb. Habui ex Calabria alla Sile ab Eq. GUSSONIO. Floret Aprili.

Similis præcedenti, sed tota glaberrima. Petioli paulo breviores, tres-quatuor lineas tantum longi. Pedunculi geminati. Flos minor. Petala obovata. Drupa oblonga, acuta, apice recurvulo, flava, triplo grandior quam in varietate β speciei præcedentis, nec basi angustata, saporis austero-acidi. Nux oblonga.

7. *Prunus insititia*: ramis spinescentibus; foliis ovato-oblongis, serratis, utrinque angustatis; pedunculis subgeminatis; petalis ellipticis; drupa globosa.

P. insititia Sp. pl. p. 680. Smith. Engl. Fl. 2. p. 356., et Engl. bot. v. 12. t. 841. opt. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 220. All. Ped. 2. p. 135. n. 1784. Re Seg. p. 41. Coll. Herb. Ped. 2. p. 291. n. 4. Pollin. Ver. 2. p. 127. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 412. Koch. Syn. p. 205. Reich. Exc. 3. p. 644. n. 4137. Wallr. Sched. crit. 1. p. 215. Fries. Prim. Fl. Succ. ed. 2. p. 137. Gaud. Helv. 3. p. 311.

P. spinosa h macrocarpa Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 564.

P. n. 1081. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 28.

P. sylvestris quadruplo maiori fructu Cup. Hort. Cath. p. 173.

Ital. *Prugnolo di siepe. Prugnolo da innesto.*

Frut. Arbust. Legi Sarzanæ in sepibus juxta canalem S. Andreae; Bononiæ ad sepem extra portam Stephanianam prope molendinum, et extra portam S. Isajæ ad S. Paulum di Ravona, tum in collibus di Gesso. Habui Mantuæ al Bosco fontana a BARBIERIO, ex districtu Bassanensi in sylvis di Vallison ad S. Eusebium d'Angarano a MONTINIO, ex viciniis Tergesti a Montebello a TOMMASINIO. Floret decedente Martio; et Aprili.

Frutex, vel arbuscula orgyalia, et ultra, cortice gilvo, vel fusco cum nebula cinerea. Rami numerosi, sparsi, patuli, passim instructi ramulis brevibus, crassis, validis, spinescentibus. Gemmæ florum laterales, bifloræ, vel unifloræ. Pedunculi nudi, glabri, aut pubescentes, plerumque, nec semper, diametro floris breviores. Flores quam in præcedente paulo minores; passim evolvuntur eodem tempore, ac gemmæ foliiferæ superiores. Petalorum lamina elliptica, integra; vel retusa, ungue brevi. Drupa globosa, magnitudine cerasi mediocris, circiter diametri sex linearum, semper valde austera,

matura purpureo-cærulescens. Folia primordialia obtusa, et densius pubescentia præsertim subtus, successiva majora, oblonga, acuta, acuteque serrata, pilosula, basi angustata. Reliqua ut in specie præcedente.

8. *Prunus spinosa*: ramis spinescentibus; foliis obverse oblongo-lanceolatis, serrulatis; pedunculis subsolitariis; petalis obovatis; drupa globulosa.

P. spinosa Sp. pl. p. 681. Smith. Engl. Fl. 2. p. 357., et Engl. bot. v. 12. tab. 842. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 220. Fl. Dan. tab. 926. Sv. bot. v. 3. t. 151. Plenck. Ic. pl. med. 4. p. 75. t. 380. Nouv. Duh. 5. p. 185. t. 54. fig. 1. All. Ped. 2. p. 135. n. 1783. Balb. Taur. p. 80. Re Seg. p. 41., et Tor. 1. p. 260. Birol. Acon. 1. p. 165. Coll. Herb. Ped. 2. p. 291. n. 1. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 224., et 383. Comoll. Prodr. p. 95. Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec. 2. tom. 10. p. 287. Pollin. Ver. 2. p. 127. Ruch. Ven. p. 122. Moric. Ven. 1. p. 214. Nacc. Ven. 3. p. 59. Suffr. Foroj. p. 145. Sav. Pis. 1. p. 464., et Bot. Etr. 4. p. 105., et Tratt. degli alb. ed. 2. tom. 1. p. 167. Spad. Xil. 2. p. 183. Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 168. Ten. Nap. 1. p. 276., et Syll. p. 245. n. 9. Ab. Ucr. Hort. Pan. p. 173. Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 563. a. Moris. Stirp. Sard. cl. fasc. 1. p. 18.* De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 484., et Prodr. 2. p. 532. n. 1. a. Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 9. heft. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 411. a. β. Koch. Syn. p. 205: a. β. Reich. Exc. 3. p. 644. n. 4135. a. β. Host. Aust. 2. p. 3. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 342. Gaud. Helv. 3. p. 312.

P. n. 1080. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 27.

Pruno salvatico Matth. Valgr. 1585. tom. 1. p. 286. fig. Dur. Herb. ed. Rom. 1585. p. 378. fig. Pon. Mont. Bald. p. 139.

Prunus sylvestris Casalp. De pl. lib. 2. cap. 15. p. 48. Cup. Hort. Cath. p. 173. Zannich. Ist. p. 219. Segui. Ver. 2. p. 305.

P. sylvestris, fructu parvo serotino Duh. Arb. 2. p. 124. n. 4. tab. 40.

Ital. *Pruno salvatico*. Prugno. Prugnòlo. Spino nero. Susino di macchia. Susino Prugnòlo. Susino salvatico. Vegro. Strigniculi. Strozzapreti. Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 181.

Offic. *Acaciæ nostratis cortex, flores, fructus* Lin. Mat. med. p. 79. n. 231.

Frut. Vulgaris in sepibus, et sylvia Italiæ. Legi Sârzanzæ, a Calice in provincia Lunensi, et Bononiæ. Habui ex

agro Bassanensi a MONTINIO, ex agro Patavino ab Eq. TREVISANO, ex oris lacus Fucini ab ORSINO, ex Sardinia media ab Eq. Prof. MORISIO. Floret decedente Martio, et Aprili.

Valde proxima præcedenti speciei, tamen satis differt notis sequentibus. Caulis humilior, tenuior, intensius ex albo cinerascens, ramulisque spinescentibus numerosioribus instructus. Florum gemmæ plerumque unifloræ, rarius bifloræ. Flores dimidio minores, quam in *Pruno insititia* L.; qui primi, Martio decedente, aperiuntur, evolutionem gemmarum foliiferarum omnino præcedunt. Petala obovata, obtusa, integra, aut subretracta, patentissima. Drupa globulosa, et subinde fere ellipsoidea, semper parva, et multo minor, quam in specie præcedente.

Usus. Hæc planta passim adhibetur ad opus topiarum. Medici prædicant syrupum e cortice, et floribus, nec non succum e fructibus ad profluvia, et diarrhæam. Nunc tamen vix in usu.

9. *Prunus prostrata*: caule ramosissimo, procumbente; foliis ovato-ellipticis, serrulatis; subtus tomentosis; floribus subgeminatis, brevissime pedunculatis; tubo calycino cylindraceo, elongato.

P. prostrata Willd. *Spec. pl. 2. par. 2. p. 997. Bill. Ic. pl. Syr. rar. dec. 1. p. 15. tab. 6. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 340., et Fl. Græc. 5. p. 62. t. 478. Nouv. Duh. 5. p. 182. t. 52. fig. 2. Coll. Herb. Ped. 2. p. 292. n. 8. Desf. Atl. 1. p. 395.*

Cerasus prostrata Moris. *Stirp. Sard. el. fasc. 1. p. 18.* De Cand. Prodr. 2. p. 538. n. 19.*

Amygdalus incana Pall. *Ross. 1. p. 13. tab. 7. figura sinistra inferior, reliquis exclusis.*

Prunus Cretica montana, minima, humifusa, flore suaverubente Tourn. *Coroll. p. 43., et Relat. d'un voyag. du Lev. éd. de Lyon 1727. tom. 1. p. 58. b.*

Ital. Prugnòlo cotonoso.

Frut. Habui ex summitate montis Oliena in Sardinia ab Eq. Prof. MORISIO. Floret Majo.

Fruticulus humilis, procumbens. Caulis teres, crassus, durus, ramosissimus, cortice nigrescente cum levi nebula cinerea, ramis; ramulisque brevibus, tuberculis, apice spinescentibus. Folia parva, ovato-elliptica, acuta, serrulata, subinde inæqualiter, supra saturate viridia, glabra, subtus albo-tomentosa. Petioli breves, pubescentes. Stipulæ lineares, acuminatæ,

serrulato-glandulosæ, glabræ, vel pilosæ, deciduæ. Flores e gemmis propriis lateralibus, bifloris, et interdum unifloris, brevissimè pedunculati. Tubus calycinus cylindraceus, elongatus; limbus tubo brevior. Corolla rosea. Drupa exigua, lenticulari-ovoidea, apiculo, et margine suturaformi pilosis, reliqua superficie glabra. Ulterius examinetur in planta viva, num potius pertineat ad *Amygdalum*.

10. *Prunus humilis*: caule ramosissimo, procumbente; foliis ovatis, argute serrulatis, utrinque glabris; floribus subsolitariis, subsessilibus; tubo calycino campanulato.

P. humilis Coll. Herb. Ped. 2. p. 293. n. 9.

Cerasus humilis Moris. Stirp. Sard. el. fasc. 1. p. 17.*

Ital. *Prugnòlo tortuoso*.

Frut. Habui ex summitate montis *Gennargentu* in Sardinia ab Eq. Prof. MORISIO. Floret Junio, Julio.

Simillima præcedenti; sed caulis magis tortuosus, magisque cinerascens. Folia paululum grandiora, et acutiora, ovata, argutius dentata, utrinque glabra, supra viridia, subtus pallentia. Flores e gemmis propriis, plerumque solitarii, subsessiles. Tubus calycinus campanulatus, glaber; limbus tubo paulo brevior, laciniis facie interna pubescentibus, demum retroflexis. Petala pallide rosea. Stilis inferne pubescens. Drupa exigua, ovoidea, glabra. Meliora ex sicco eruere non potui. *Observ.* *Prunus Lauro Cerasus* L. ubique colitur in Italia, sed planta advena est. Vide Lin. Sp. pl. p. 678. sub. n. 5.

ORDO II. OLIGOGYNIA. BACCATÆ.

(Comprehendit Pomaceas Ord. digyniæ, trigyniæ, et pentagyniæ L.)

CRATÆGUS.

Lin. Gen. p. 622. *Juss. Gen.* p. 335. *Lamck. Ill.* 5. t. 433. *Vent. Tabl.* 3. p. 337. *Lindl. in Trans. Lin. Soc.* v. 13. p. 105. *Endl. Gen.* p. 1239. n. 6353.

Mespilus partim *Juss. Gen.* p. 335. *Lamck. Ill.* 5. t. 436. fig. 2. tantum. *Vent. Tabl.* 3. p. 337. *Lindl. in Trans. Lin. Soc.* v. 13. p. 99. *Smith. Engl. Fl.* 2.

p. 358. *Gærtn. De fruct. 2. p. 43. tab. 87. fig. Mesp. Oxyac.*

Pyrus partim *De Cand. Prodr. 2. p. 633. Lindl. in Trans. Lin. Soc. v. 13. par. 1. p. 97. Smith. Engl. Fl. 2. p. 360. Endl. Gen. p. 1237. n. 6342.*

Calyx perianthium adhærens, limbo libero, quinquefido, patente, aut reflexo, marcescente. Petala quinque, subrotunda, concava, breviter unguiculata, affixa oræ externæ receptaculi discoidei claudentis os tubi calycini. Stamina viginti-plura, in ambitu prope petala inserta, filamentis subulatis, antheris oblongis, bilocularibus, incumbentibus. Ovarium sepultum. Stili unus-quinque, crassiusculi, filiformes. Stigmata orbiculata, vel capitata. Pomum globosum, aut ellipsoideum, carne semper solida, calycis limbo marcescente coronatum, apice umbilicatum, uni-quinqueloculare, pariete loculorum membranaceo, loculis biovulatis, dispermiis, aut monospermiis ovulo altero abortiente. Nuces coriaceæ, vel osseæ.

Habitus. Arbores, vel arbusculæ, aut frutices, sæpe spinoscentes. Rami sparsi. Folia simplicia, petiolata, serrata, lobata, angulata, vel pinnatifida, plerumque stipulata. Corymbi terminales. Petala alba, aut rosea, sæpe grate olentia. Fructus parvi, subinde edules.

Ord. nat. Pomaceæ Lin. Ord. nat. n. XXXVI., et Præl. p. 444. Lindl. in Trans. Lin. Soc. v. 13. par. 1. p. 93. Bartl. Ord. nat. p. 399. Rosaceæ Juss. Gen. p. 334. Smith. Gramm. p. 171. Vent. Tabl. 3. p. 331. De Cand. Prodr. 2. p. 525. Rich. Fam. in Él. éd. 5. p. 216. Mespilæ Schultz. Nat. syst. p. 509.

1. *CRATEGUS Aria*: foliis ovato-oblongis, rotundisve, duplicato-serratis, lobatis, subtus tomentosus; corymbo composito; floribus digynis.

C. Aria Sp. pl. p. 681. Nouv. Duk. 4. p. 129. t. 34. Re Seg. p. 41. Vitm. Sagg. p. 49. Suffr. Forøj. p. 145. Ab Ucr. Hort. Pan. p. 207. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 432. Gaud. Helv. 3. p. 319.

Pyrus Aria Willd. Sp. pl. 2. par. 2. p. 1021. Sibth. et

- Smith. Fl. Græc. prodr.* 1. p. 345., et *Fl. Græc.* 5. p. 63. t. 479. *Smith. Engl. Fl.* 2. p. 365., et *Engl. bot.* v. 26. t. 1858. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 222. *Re Tor.* 1. p. 262. *Birol. Acon.* 1. p. 168. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 358. n. 16. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 222. *Comoll. Prodr.* p. 96. *Poll. Ver.* 2. p. 136. *Spad. Xil.* 2. p. 211. *Bert. Pl. Gen.* p. 66., et *Aman. Ital.* p. 154. n. 141., et p. 371. n. 154. *Bert. fil. It. in Apenn. Bonon.* p. 44., et 20.* *Sav. Bot. Etr.* 1. p. 148. *Ten. Nap.* 4. p. 279., et *Syll.* p. 243. n. 7. *A. B. Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. p. 569.,* et *Sup.* 1. p. 155.* *De Cand. Prodr.* 2. p. 636. n. 23. α . β .
- P. intermedia Ten. Nap.* 4. p. 279. excl. syn., et *Syll.* p. 243. n. 8.
- Mespilus Aria All. Ped.* 2. p. 141. n. 1805. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 345.
- Sorbus Aria Sav. Tratt. degli alb. ed.* 2. tom. 1. p. 203. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 169. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 427. α .* *Koch. Syn.* p. 237. *Reich. Exc.* 3. p. 628. n. 4044.
- Aria nivea Host. Austr.* 2. p. 8.
- A. Clus. Fl. Dan. fasc.* 6. p. 4. tab. 302. (err. 301.)
- Mespilus* n. 1089. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 31.
- Aria Ang. Sempl.* p. 81.
- Sorbi torminalis alterum genus folio Mali rotundiore, magia serrato, inferne candido Casalp. De pl. lib.* 3. cap. 64. p. 146.
- Aria di Theophrasto Pon. Mont. Bald.* p. 149., et 163.
- Mespilus Alni lanato folio major Cup. Hort. Cath.* p. 145.
- M. Alni lanato folio, major, rotundiori altiusque inciso folio Cup. Sup. alt.* p. 63. (err. 57.).
- Aria Castell. Hort. Mess.* p. 4.
- Alni effigie lanato fol. major Tit. It. in calc. Hort. Mauroc.* p. 22. non num.
- Aria Theophrasti Zannich. Opusc. posth.* p. 29.
- Cratægus folio subrotundo serrato subtus incano Segui. Ver.* 2. p. 308. n. 1.
- Sorbus alpina J. Bauh. Hist. pl.* 1. lib. 1. p. 65. fig.
- Ital. Chiavardello. Farinaccio. Lazzarollo di montagna. Matallo. Sorbo delle alpi. Sorbo montano Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 80.
- Arb. Arbusc. Frut. Legi in Liguria occidua in radiceibus montis Gneo retro Sestri di ponente, in Liguria orientali in monte Gottro, in alpihus Apuanis in vertice Sagro al Poggio, et in prærupto descensu, qui ex valle Catino ducit ad semitam di Fornole. Filius*

attulit ex Apennino Bononiensi *all' Acero*. Habui ex Liguria orientali in monte *Megna*, et a *Rocca delle cagne* prope S. Stephanum *d' Aveto* a TURIO, ex Pedemontio in collibus di *Maggiora* provinciam Novariensis a PESTALOZZA, ex montibus ad Larium a Rev. ODESCALCHIO, et in *Corni di Canzo* a RAINZAO, ex districtu Veronensi in dumetis prope *Grezzana* a MANGANOTTO, ex rupestribus di *Fiemme*, et *Fassa* in Tyroli Italico a FACCHINIO, ex sylvis Bassanensibus a MONTINIO, ex montibus *Spaccato*, *Kokusch*, *Taiano* districtus Tergestini a TOMMASINIO, ex Apennino di *Sernano* ab Eq. NARDUCCIO, ex Piceno in monte *Folubrio* ad canobium S. Secundi, *alla Madonna dell' Ambro al Balzo rosso*, a *Capo di Tenna*, *alla Corona* in montibus *della Sibilla*, et in monte *Alpone* a MARZIALETTO, a *S. Marco*, et ex monte *Pollino* ab ORSINO, ex Hetruria in Apennino Pistoriensi *al Teso* a Prof. PETRO SAVIO, in eremo Camaldulensium a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, et in *Montamiata* ab Eq. Prof. CAS. SAVIO, ex Nebrodibus Siciliæ ab Eq. GUSANO, ex Corsica in monte *Poraga* a SOLERIOLIO. Floret Junio, Julio.

Arbor æque grandia ac *Pyrus communis* L., sed passim arbuscula, aut frutex in saxosis, vel in sylvis caduis. Caudex conicus, cortice fusco-cinerascente, glaber. Rami sparsi, patuli, rubidi, juniores albo-tomentosi. Folia sparsa, alterna, breviter petiolata, ovato-oblonga, vel elliptica, aut elliptico-oblonga, rarius orbiculata, acuta, et subinde obtusa, duplicato-serrata, sæpe lobata, aut inciso-serrata, basi rotundata, vel subcordata, quandoque vero cuneata, supra satnrate viridia, nitida, glabra, subtus niveo-tomentosa, uninervia, et parallele venosa. Petioli albo-tomentosi, basi utrinque aucti stipula lanceolato-lineari, villosa, citissime caduca. Corymbi terminales ramis, et ramulis, compositi, solitarii, subsessiles, niveo-tomentosi, senio plus minus denudati. Bractem sub divisionibus corymbi lineares, cito caducæ. Tubus calycinus turbinatus, limbi lacinia lanceolata, acuta, demum retroflexa. Corolla parva, calycem paulo superans, patens, ex albo pallidissime flavens. Petala obovata, obtusa, concava, intus in medio, et basi villosa, senio reflexa. Stamina erecta, corollam subæquantia. Stili duo, staminibus paulo breviores, viriduli, apice sensim sensimque crassiores. Stigmata depresso-orbiculata,

papillosa, quidquam obliquata. Pomum parvum, subglobosum, biloculare, immaturum viride, acidum, maturum coccineum, mite, edule. Nuces coriaceæ, rufescentes.

Cratægus scandica Cels. juxta exemplar e Scandinavia, quod habui a Prof. Wahlbergio, et *Cratægus latifolia* Lamck. ex sylva Fontebelovacensi, quam misit Loiseleurius Deslongchampsius, differunt a *Cratægo Aria* L. tomento sordide albo, neo niveo, præter reliquos characteres in foliis. Neutra hactenus reperta est in Italia.

Urus. Lignum valde durum aptissimum ad dentes rotarum, ad axes carrorum, ad vites torcularium, et ad quodcumque opus torno poliendum, præsertim vero ad carbonem pro usu domestico, cum valdopere calefiat, et calorem diu retineat. Alpini nostrates utuntur cortice ad vestes laneas rubro colore inficiendas.

2. *Cratægus florentina*? foliis cordato-ovatis, lobatis, serratis, subtus tomentosis; corymbis subsimplicibus; floribus pentagynis.

C. florentina Zucc. in *Röm. Collect.* 1. p. 142. n. 72. *De Cand. Prodr.* 2. p. 628. n. 23.

Mespilus florentina Bert. *Aman. Ital.* p. 29. n. 1.

Pyrus florentina Targ. Tozz. *Dec.* 6. in *Mem. di fis. della Soc. Ital. delle scien.* tom. 20. p. 302. tav. 20. bona. *Ten. Nap.* 5. app. 4. p. VIII.

P. cratægifolia Sav. *Tratt. degli alb. ed.* 2. tom. 1. p. 169, et *Bot. Etr.* 2. p. 109.

P. terminalis B *Ten. Syll.* p. 243. ex ipso Auct.

Cratægus italica folio laciniato minori, subtus lanato, fracturæ rotundo, rubro *Mich. in Till. Cat. hort. Pis.* p. 48.; et *Cat. hort. Fl.* p. 30. n. 2.

Ital. Pero Lazzaruolo Targ. Tozz. *Diz. bot.* 2. p. 193.

Arb. Arbuso. Legi Sarzanæ in sylvulis alle Fondachette, Bononiæ in monte Mariano prope il Sasso. Habui ex Piceno in sylvis di Sanginesio ab Eq. Narduccio, ex Ducatu Lucensi in monte S. Quirico a Prof. Puccionello. Floret Majo.

Arbor, vel arbuscula more præcedentis. Cortex caudicia cinereus, in ramis fusce rubidus cum nebula cinerea. Rami sparsi, patuli, juniores pubescentes. Ramuli subinde abortivi, breves, spinescentes. Folia potius parva, alterna, longe petiolata, cordato-ovata, magis longa, quam lata, lobata, seu iucisa, lobis juniorum magis rotundatis, vix acutis, seniorum omnino acutis,

utrisque grossiuscule, et subinæqualiter serratis, inferioribus paulo profundioribus, supra late viridia, glabra, vel nervo, et venis prope basim pilosa, subtus albo-tomentosula, decidua. Petioli lanuginosi. Stipulæ lineari-angustissimæ, longæ, villosæ, caducæ. Corymbus terminalis ramis, ramulisque, subsimplex, subsessilis, pedicellis tenuibus, lanuginosis, sero denudatis, fructiferis pendulis. Bractem in basi, vel in longitudine pedicellorum similes stipulis, rubidæ, caducæ. Calyx dense albo-tomentosus, tubo brevi, campanulato, laciniis limbi tubo longioribus, lanceolatis, acutis, demum retroflexis. Petala alba, obovata, obtusa, concava, integra, aut emarginata, vel crenata, calyce duplo, et triplo longiora. Stamina corollam subæquantia, filamentis glabris, antheris oblongis. Stili quinque, filiformes, staminibus æquales, aut paulo longiores, basi lanati. Stigmata capitata, obtusa. Pomum parvum, ellipsoideum, profunde umbilicatum, quinqueloculare, inter maturandum e viridi flavesceus, maturum pallide rubrum, carne dulci. Nuces coriacæ. Reliqua generis.

3. *CRATEGUS torminalis*: foliis late ovatis, subcordatis, incisæ, senioribus glaberrimis, segmentis acuminatis, æqualiter, crebreque serrulatis, imis patentibus; corymbis compositis; floribus subdigynis.

C. torminalis *Sp. pl.* p. 681. *Engl. bot. v. 5. t. 298. Jasq. Austr. 5. p. 21. t. 443. Fl. Dan. 1. 798. Plenck. Ic. pl. med. 4. p. 85. t. 388. Nouv. Duh. 4. p. 128. t. 33. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 431. Host. Austr. 2. p. 9. Gaud. Helv. 3. p. 318.*

Pyrus torminalis *Willd. Sp. pl. 2. par. 2. p. 1021. Smith. Engl. Fl. 2. p. 362. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 221. Balb. Taur. p. 81. Re Tor. 1. p. 262. Birol. Acon. 1. p. 168. Coll. Herb. Ped. 2. p. 356. n. 10. Nocc. et: Balb. Tic. 1. p. 230., et 385. Comoll. Prodr. p. 96. Barb. Agg. p. 34.* Pollin. Ver. 2. p. 137. Sav. Bot. Etr. 1. p. 149. Spad. Xil. 2. p. 215. Ten. Nap. 4. p. 279., et Syll. p. 242. n. 3. A. Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 570., et Sup. 1. p. 155.* Moris. Stirp. Sard. el. fasc. 1. p. 18.* De Cand. Prodr. 2. p. 636. n. 25.*

Mespilus torminalis *All. Ped. 2. p. 141. n. 1806.*

Sorbus torminalis *Maur. Cent. XIII. p. 24.* Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 429. Koch. Syn. p. 237. Reich. Exc. 3. p. 628. n. 4046.*

Mespilus n. 1088. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 31.*

Sorbo torminale *Matth. Valgr.* 1585. tom. 1. p. 284. fig.

Calz. Viag. di Mont. Bald. p. 11. *Pon. Mont. Bald.* p. 238.

Sorbus torminalis. Quarta Plinii *Aldr. Dendr.* p. 618. fig.

S. torminalis Casalp. De pl. lib. 3. cap. 64. p. 146.

Mespilus Apij folio sylvestris non spinosa sive Oxiantha C. B. P. *Cup. Hort. Cath.* p. 144.

Cratægus folio laciniato Segui. Ver. 2. p. 308. n. 2.

Sorbus torminalis et Cratægus Theophrasti J. Bauh. Hist. pl. lib. 1. p. 63. fig.

Ital. Baccarello. Ciavardello. Mangiarello. Sorbezzolo. Sorbo salvatico. Sorbo torminale Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 81.

Arb. Arbuso. Legi Bononiæ in sylvis di Montecastello, degli Arienti, di Gaibolla, dell'Eremo. Filius attulit ex Apennino Pistoriensi al Cassero prope la Sambuca. Habui Mantuâ al Bosco fontana a BARBIERIO, et a FELISIO, ex Tyroli meridionali prope Bolzano a FACCHINIO, ex districtu Bassanensi in sylvis S. Michaelis d' Angarano a MONTINIO, Tergesto in sylvaticis di Roiano a TOMMASINIO, ex Apennino Aretino al Sasso di Simone ab AMIDEO, et a CHIRICO, ex Piceno in ripis di Sanginesio ab Eq. NARDUCCIO, ex Hetruria in Apennino Mugellano a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, nelle Chiane a Prof. GIULIO, ex Ciminis a Prof. MAURIO, ex Sicilia in Nebrodibus, et in sylvis di Caronia ab Eq. GUSSONIO, ex Sardinia ab Eq. Prof. MORISTO. Floret Majo.

Arbor, vel *arbuscula* more præcedentis. Cortex ramorum saturatius rubet. Rami juniores levius pubescunt. Folia multo ampliora, ovata, sæpe magis lata, quam longa, incisa, inoisionibus septem-novem, acuminato-cuspidatis, crebre, et æqualiter serrulatis, inferioribus longioribus, divaricatis, basi subcordata, rarius rotundata, vel cuneata, juniora subtus pubescentia, æriora subcoriacea, utrinque glaberrima, nitida; omnia supra saturate viridia, subtus pallentia, decidua. Petioli longi, pubescentes, exstipulati. Corymbus grandis, valde compositus, patens, subsessilis, pubescens, terminalis ramis, ramulisque. Bractææ sub divisionibus corymbi parvæ, ovatæ, acutæ, deciduæ. Calyx albo-tomentosulus, tubo turbinato, limbo quinque-dentato; dentibus triangularibus, basi lata, acutis, vel obtusis. Petala alba, obovata, obtusa, concava, integra, calyce triplo, et quadruplo longiora. Stamina corollam subæquantia, filamentis glabris,

antheris didymis, albis, loculis subrotundis. Stili plerumque duo, lusu tres-quinque. Pomum ellipsoideo-turbinaatum, umbilicatum, magnitudinis variae, majus avellanam aequans, initio pubescens, demum glabratum, biloculare, lusu tri-quinqueloculare, inter maturandum austerum, et e viridi flavescens, maturum mitius, fuscum. Nuces coriaceae.

Usus. Lignum durum praestat ad axes carrorum, ad trabes tectorum, ad supellectiles domesticas, aliaque id genus. Decoctione corticis junioris lanæ rubro colore inficiuntur.

4. *CRATEGUS Oxyacantha*: ramis spinosis; foliis coriaceis, glabris, pinnatifido-flabellatis, laciniis acutidentatis, integrisve, imis divaricatis; floribus submonogynis.

C. Oxyacantha *Sp. pl.* p. 683. herb. Linn. ex Prof. Morettio. *Bull. Pl. med. tab.* 333. *fig. B. E. F.*, (excl. reliq. ad *Prunum spinosam* pertinentib.). *Balb. Taur.* p. 80.* *Birol. Acon.* 1. p. 166. *Ruch. Ven.* p. 123. *Moric. Ven.* 1. p. 216. *Ab. Ucr. Hort. Pan.* p. 207. *De Cand. Prodr.* 2. p. 628. n. 29. β . γ . δ .

C. monogyna *Jacq. Austr.* 3. p. 50. t. 292. *fig. 1.* *Comoll. Prodr.* p. 95. *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec.* 2. tom. 10. p. 287.* *Rom. in Da Rio Giorn. dell' Ital. lett. tom.* 24. p. 285. *Morett. Osserv. int. alla Fl. Ven. del Moric.* p. 11. *Sav. Pis.* 1. p. 465,* et *Bot. Etr.* 2. p. 107,* et *Tratt. degli alb. ed.* 2. tom. 1. p. 98.* *Spad. Xil.* 1. p. 185. *Röhl. cum. Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 417. *Koch. Syn.* p. 233. *Reich. Exc.* 3. p. 629. n. 4048. *Host. Austr.* 2. p. 9. *Fing. in Linnæa* 4. p. 374. *tab. 3. f. 2.* pomo globoso.

C. polyacantha *Jan. El.* p. 8. n. 12.* pedunc., calyc., pomisque pubescent.

C. kirtostyla *Fing. in Linnæa* 4. p. 372. *tab. 3. fig. 1.* pedunc., calycibusque pubescent., pomo ellipsoide.

Mespilus Oxyacantha *Smith. Engl. Fl.* 2. p. 359. (excl. *Jacq. tab.* 292. *fig. 2.*), et *Engl. bot. v.* 35. *tab.* 2504. *Nouv. Duh.* 4. p. 154. t. 41. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 344. *De Cand. Franç.* 4. *par.* 2. p. 433.

M. monogyna *All. Ped.* 2. p. 141. n. 1808. *Re Tor.* 1. p. 261. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 351. n. 18. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 228., et 384. *Pollin. Ver.* 2. p. 132. *Nacc. Ven.* 3. p. 61. *Ten. Nap.* 1. p. 279. *A. B. excl. syn. Pall., et Syll.* p. 242. n. 7. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. p. 565. a. b.* *Gaud. Helv.* 3. p. 326.

Flor. Ital. T. V.

- M. maroccana* Ten. *Nap.* 4. p. 275. *A. facta* e ramulis annotinis latifoliis.
- M. triloba* Ten. *Syll.* p. 242. n. 5.
- M. polyacantha* Guss. *Sup.* 1. p. 154. peduno., calyc., pomisque pubescent.
- M. n* 1087. δ Hall. *Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 30.
- Oxiacantha* Matth. *Valgr.* 1585. tom. 1. p. 181. fig.
- Oxyacantha* Aldr. *Herb. v. 1. par. 1. fol.* 343.* *Casalp. De pl. lib. 3. cap. 13. p. 99.*
- O. Acuta* spina Matth. Aldr. *Herb. v. 3. fol.* 359.*
- Acuta* spina Οξυακάνθα Aldr. *Ic. pict. tom. 8. tab.* 11.
- Nespolo salvatico* Dur. *Herb. ed. Rom.* 1585. p. 309. fig.
- Osiacantha* Calz. *Viag. di mont. Bald.* p. 10.
- Oxiacantha* di Dioscoride Pon. *Mont. Bald.* p. 144.
- Mespilus Apij folio sylvestris, spinosa sive Oxiacantha* Cup. *Hort. Cath.* p. 144., et *Sup. alt.* p. 57. *Segui. Ver.* 2. p. 314. n. 2.
- Oxyacantha spinosa minore folio* Barrel. *Ic.* 563.
- Mespilus sylvestris, spinosa, folio in profundas lacinias diviso* Pont. *Comp.* p. 157.
- Spina appendix Plinii* Clus. *Hist. pl. lib. 1. p.* 121. fig.
- Ital. Azarolo salvatico. Bianco spino. Lazzerolo salvatico. Marrucca bianca. Panoseri. Spin bianco* Targ. Tozz. *Diz. bot.* 2. p. 80.
- Arbusc. Frut.* Copiose in omnibus sepibus, et sylvis Italiæ. Legi Sarzanæ, Bononiæ. Habui ex Apennino Genuensi secus novam semitam de' Giovi a RAINEBO, ex Pedemontio a Prof. BALBISIO, et a BONJEANNIO, Mantuâ al Bosco fontana a BARBIERIO, ex Tyroli Italico in sepibus di Fiemme, et ex agro Patavino a FACCHINIO, ex districtu Bassanensi in Valstagna ab Eq. PAROLINIO, et in sylvis, et sepibus prope Bassanum a MONTINIO, ex agro Tergestino a TOMMASINIO, ex montanis Maceratensibus ab Eq. NARDUCCIO, ex Piceno a Montefortino in sepibus a MARZIALETTO, ex agro Pisano ab Eq. Prof. SAVIO, Fesulis a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTO, Terracinâ a FIORINIA-MAZZANTIA, ex Apulia al Tavoliere, et ex Sicilia ab Eq. GUSSONIO, denuo ex Sicilia a Prof. JANTO, ex Sardinia ad sepes d'Iglesias a Prof. DE NOTARIS. Floret Aprili cedente, et Majo.
- Arbuscula mediocris; passim vero frutex humilior in sepibus. Caulis teres, erectus, cortice cinereo. Rami alterni, sparsi, patentes, juniores e viridi rubescentes, flexuosi, armati spinis pungentibus, validis, modo*

crassis, modo tenuibus, quæ sunt ramuli abortivi. Folia alterna, longiuscule petiolata, coriacea, firma, cuneato-flabellata, tri-quinquefida, laciniis apice acute, inæqualiterque dentatis, reliquo margine, vel etiam totis integerrimis, imis longioribus, divaricatis, aut divergentibus, magnitudine plurimum ludentia, et in ramulis annotinis supremis arbuscularum luxuriantium passim grandia, et laciniis latioribus donata, glabra, supra læte, vel saturate viridia, nitida, subtus glauca, subinde juniora plus minus dorso ad nervos, et venas pilosa; cuncta decidua. Stipulæ foliaceæ, falcatæ, breviter petiolatæ, argute serratæ, aut inciso-serratæ, obviæ tantum in ramulis junioribus, sæpe grandes saltem in ramulis foliis amplioribus pollentibus. Corymbi terminalcs ramis, et ramulis, numerosi, crebri, parvi, compositi, vel simplices, glabri, aut pubescentes. Bractæ ad divisiones corymbi lanceolatæ, subserratæ, deciduæ, inferiores subinde foliaceæ, inciso-serratæ, persistentes. Flores odori, fere odore amygdalæ amaræ. Calyx glaber, aut pubescens, tubo turbinato, laciniis limbi triangularibus, obtusiusculis, vel acutis, demum retroflexis. Petala e subrotundo obovata, concava, integra, aut apice denticulata, et quandoque emarginata, alba, patentia. Receptaculum villosum. Stamina corollæ æqualia, vel paulo breviora, filamentis albis, antheris subrotundis, roseis. Stylus solitarius, rarius duo, rectus, vel curvus, crassiusculus, albidus, longitudine staminum. Stigma orbiculare, viridulum. Pomum parvum, sed molis variæ, biloculare, vel uniloculare ex obliteratione alterius loculi, immaturum ellipsoideum, viride, nitens, glabrum, vel pubescens, maturum plerumque globosum, ludit ellipsoideum, vel e subrotundo ellipsoideum etiam in eodem individuo, rubro-corallinum, colore demum saturatiore, carne insipida. Nuces osseæ, ab avibus, et præsertim a *Loxia cocothrace* expetitæ.

Passim in sylvis, et sepibus Bononiensibus vidi in plantis luxuriantibus ramulos annotinos supremos gaudere foliis, et stipulis amplis, dum inferiores ferebant folia parva, et anguste laciniata. Quare *Cratægus maroccana*, et *Cratægus Oxyacantha* quorundam occurrunt in uno, eodemque individo. Idem affirmo de pedunculis, calyceibus, et pomis glabris, vel pubescentibus. *Cratægus monogyna nigra* Pall. Ross. 1. p. 26. tab. 12. laciniis foliorum acuminatis, inciso-serratis, pomis

minoribus, maturis nigris nullimode provenit in Italia, neque hoc synonymon pertinet ad speciem nostram.

Usus. Lignum durissimum aptum torno. Frutex ad opus topiarium ab antiquissimo tempore adhibitum, an ut agricolæ maleficia a prædio prohibeant? Veteres enim putabant, maleficia averti posse spina alba foribus apposita:

Sic fatus, virgam, qua tristes pellere posset

A foribus noxas, hæc erat alba, dedit.

Ovid. Fast. 6. v. 129. 130.

5. *CRATÆGUS oxyacanthoides*: ramis spinosis; foliis obovatis, obtusis, tri-quinquelobis, serrulatis; floribus subdigynis.

C. oxyacanthoides Thuill. Paris. ed. 2. tom. 1. p. 245.

C. Oxyacantha Jacq. Austr. 3. p. 50. tab. 262. fig. 2. Plenk. Ic. pl. med. 4. p. 85. t. 389. Fl. Dan. tab. 634. Sv. bot. v. 3. tab. 157. Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec. 2. tom. 10. p. 287.* Suffr. Foroj. p. 145. Sav. Bot. Etr. 2. p. 106., et Tratt. degli alb. ed. 2. tom. 1. p. 97. Spad. Xil. 1. p. 180. De Cand. Prodr. 2. p. 628. n. 29. α. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 416. Koch. Syn. p. 233. Reich. Exc. 3. p. 628. n. 4047. α. β. Host. Austr. 2. p. 10. Fing. in Linnæa 4. p. 377. tab. 3. fig. 3. fructu nimis parvo, et rotundo.

Mespilus oxyacanthoides Re Tor. 1. p. 261. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 433.

M. Oxyacantha Gærtn. De fruct. 2. p. 47. tab. 87. fig. sinist. All. Ped. 2. p. 141. n. 1087. Coll. Herb. Ped. 2. p. 351. n. 17. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 227., et 384. Pollin. Ver. 2. p. 131. Ten. Nap. 4. p. 280., et Syll. p. 242. n. 6. A. B. Gaud. Helv. 3. p. 327.

M. n. 1087. α. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 30.

Ὠξυακάνθη Acuta spina Aldr. Ic. pict. tom. 8. tab. 26.

Mespilus Apii folio minus laciniato, sylvestris, spinosa, sive *Oxyacantha*, flore (albo), fructu rotundo majore Mich. in Targ. Viag. in Tosc. ed. 2. tom. 1. p. 141., et Rar. MS.

M. sylvestris, spinosa, sive *Oxyacantha*, folio leviter inciso Pont. Comp. p. 157.

Ital. *Acuta spina*.

Arbusc. Frut. Legi Bononiæ in sylvis degli Arienti, et dell'Eremo, tum in sepibus di Zolla predosa al Grande, et alla Ca-bianca, ubi copiose. Habui ex

Pedemontio in sepibus ad Albam Pompejam a BERTERO, ex viciniis Mediolani a Rev. ODESCALCHIO, Mantuâ *al Bosco fontana* a BARBIERIO, ex sepibus Bassanensibus ab Eq. PAROLINIO, et a MONTINIO, ex monte *Kokusch* in districtu Tergestino a TOMMASINIO, qui misit quoque ex agro Goritensi, ex sepibus Camerinnensibus a Prof. OCTAVIANO, ex Prætutiis a Pizzoli in monte *Grande* ab ORSINO. Floret Aprili decedente, et Majo.

Species præcedenti similis, sed grandior, et firmior. Differt præterea notis sequentibus. Folia obovata, obtusissima, superne tri-quinqueloba, lobis rotundatis, multa marginis sui parte serrulatis, sursum versis, in pagina superiore atroviridia, et valde nitida, subtus glauca, seriora crassiora, et duriora. Hic quoque in plantis luxuriantibus rami annotini supremi ferunt folia grandiora. Corymbi subsimplices, plerumque pauciflori. Flores duplo grandiores, passim digyni, rarius monogyni, aut tri-pentagyni. Dentes calycini latius triangulares. Pomum paulo grandius, plerumque ellipsoideum, sed ludit globosum, vel subglobosum etiam in eodem individuo.

Præstat eisdem usibus, ac præcedens.

6. *Crataegus laciniata*: ramis spinosis; foliis pubescentibus, cuneato-flabellatis, pinnatifidis, laciniis apice inciso-serratis; corymbis compositis; calycibus incano-villosis, acuminatis.

C. laciniata Ab. Ucr. in *Opusc. di Aut. Sicil.* 6. p. 251. n. 12. *De Cand. Prodr.* 2. p. 629. n. 35.

C. orientalis Jan. El. p. 8. n. 8.

Mespilus laciniata Guss. *Fl. Sic. prodr.* 1. p. 565,* et *App. p. 11.**

M. pubescens Presl. *Del. Prag.* p. 53.

M. sylvestris, spinosa, hirsuta, Apij folio palmato, fructu majori *Cup. Hort. Cath.* p. 145.

Ital. *Lazzerolo* peloso.

Arbuse. *Frut.* Habui ex Nebrodibus Siciliæ ab Eq. GUS-SONIO. Floret Aprili, Majo.

Habitus duorum præcedentium. Rami fusce rubidi, nobula cinerea, apice valide spinescentes, juniores incano-villosi. Folia molliter, et dense pubescentia, parva, longiuscule petiolata, cuneato-flabellata, pinnatifida, laciniis tribus, vel quinque, sursum versis, apice acute, et inæqualiter inciso-serratis, reliquo margine, subinde etiam totis integerrimis. Stipulae

semiovatæ, falcatæ, superne serratæ, pubescentes. Petioli, corymbi, et calyces incano-villosi. Corymbi compositi, breves, solitarii, subsessiles, terminales ramulis. Calycis dentes triangulares, acuminati, basi lata, demum retroflexi. Petala alba. Stili variant ab uno ad quinque. Pomum ellipsoideum, umbilico villosum, reliqua superficie glabrum, aut apicem versus pilosum, maturum rubrum.

Observ. *Cratægus Azarolus* L., et varietas ejus pomo flavo, paulo grandiore passim coluntur in Italia, sed spontaneas nondum obtinui.

SORBUS

Lin. Gen. p. 250. *Juss. Gen. p.* 335. *Lamck. Ill.* 5. *tab.* 434.

Pyrus partim *Gærtn. De fruct.* 1. *p.* 44. *tab.* 87. figuræ duæ inferiores tantum. *Lindl. in Trans. Lin. Soc.* v. 13. *par.* 1. *p.* 97. *Smith. Engl. Fl.* 2. *p.* 360. *De Cand. Prodr.* 2. *p.* 633. *Endl. Gen. p.* 1237. *n.* 6342.

Calyx perianthium adhærens, limbo libero, quinque-dentato, marcescente. Petala quinque, parva, subrotunda, concava, patentia, breviter unguiculata, inserta oræ externæ receptaculi discoidei claudentis os tubi calycini. Stamina viginti-plura, in ambitu præpe petala affixa, filamentis subulatis, antheris subrotundis, vel ovatis, bilocularibus, incumbentibus. Ovaria sepulta. Stili tres, quatuor, quinque, filiformes. Stigmata obtusa, subinde dilatata. Pomum globosum, vel turbina-tum, umbilicatum, imperforatum, coronatum limbo calycis marcescente, tri-quinqueloculare, pariete loculorum membranaceo, maturum mol-liter pulposum. Noces coriaceæ, plerumque in quovis loculo solitariæ, ovulo altero abortiente, utraque extremitate, aut una tantum acutæ.

Habitus. Arbores, vel arbusculæ. Caudex ramis spar-sis, patulis. Folia pinnata, serrata. Corymbi compositi, terminales. Petala alba.

Ord. nat. Pomaceæ *Lin. Ord. nat. n.* XXXVI., et *Præl. p.* 444. *Lindl. in Trans. Lin. Soc.* v. 13. *par.* 1. *p.* 93.

Bartl. Ord. nat. p. 399. Schultx. Nat. syst. p. 509.
Rosaceæ Juss. Gen. p. 334. Smith. Gramm. p. 171.
Vent. Tabl. 3. p. 331. De Cand. Prodr. 2. p. 525.
Rich. Famill. in Élé. éd. 5. p. 216.

1. *Sorbus aucuparia*; foliis pinnatis, serratis, glabris; corymbo composito, ramosissimo; pomis globulosis.
- S. aucuparia Sp. pl. p. 683. Engl. bot. v. 5. t. 337. Fl. Dan. t. 1034. Plenck. Ic. pl. med. 4. p. 86. t. 392. Lamck. Ill. 5. t. 434. Nouv. Duh. 3. p. 140. t. 33. Re Seg. p. 42. Birol. Acon. 1. p. 166. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 226., et 384. Comoll. Prodr. p. 95. Pollin. Ver. 2. p. 128. Suffr. Foroj. p. 145. Bert. fil. It. in Apenn. Bonon. p. 20.* Sav. Bot. Etr. 2. p. 108., et Tratt. degli alb. ed. 2. tom. 1. p. 202. Spad. Xil. 3. p. 145. Ten. Nap. 1. p. 228. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 436. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 429. Koch. Syn. p. 236. Reich. Exc. 3. p. 627. n. 4039. Host. Austr. 2. p. 11. Gaud. Helv. 3. p. 314.*
- Pyrus aucuparia Smith. Engl. Fl. 2. p. 634. Sv. bot. v. 3. t. 145. Coll. Herb. Ped. 2. p. 359. n. 21. Ten. Syll. p. 243. n. 10. A. De Cand. Prodr. 2. p. 637. n. 30. Gartn. De fruct. 2. p. 45. tab. 87. ubi fructus tantum.*
- Mespilus aucuparia All. Ped. 2. p. 142. n. 1810. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 346.*
- M. n. 1091. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 32.*
- Sorbo salvatico Matth. Valgr. 1585. tom. 1. p. 283. fig.*
- Sorbus sylvestris Aldr. Dendr. p. 620. fig. Cæsalp. De pl. lib. 3. cap. 63. p. 145.*
- Sorbo silvestre del Matthioli Calz. Viag. di Mont. Bald. p. 11.*
- Sorbus aucuparia Segui. Ver. 2. p. 309.*
- β foliolis brevioribus, elliptico-oblongis, sæpe obtusis.*
- Sorbus aucuparia Ab Ucr. Hort. Pan. p. 208.*
- S. aucuparia B Ten. Syll. p. 243.*
- Pyrus pramorsa Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 571.**
- Ital. Sorba lazzaruola salvatica. Sorba ottobrebrina. Sorbo salvatico Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 218.*
- Offic. Sorbi aucupariæ baccae Lin. Mat. med. p. 81. n. 234.*
- Arb. Arbuse. Filius attulit ex Apennino Bononiensi in sylva dell' Acero. Habui ex Cenisio a BONJEANNIO, ex Tyroli Italico in Fiemme, et Fassa in regione Pinus Mughus a FACCHINIO, ex Umbria in monte le Pette-nelle, et ex Piceno in monte Regnolo alla Macchia di Trocca, a Capo di Tenna, et in monte Alpone, a*

MARRIALETTO, iterum in monte *Regnole* a Prof. OCTAVIANO, et in monte *di Accumoli* ab ORSINO, ex Præstitiis in montibus *Calvo*, *Grande*, et *Chiarino* prope *Pizzoli* a CECCHETTO. Varietatem β accepi ex Calabria *alla Sile*, et *Aspramonte*, et ex Sicilia in sylvis *Nobrodum* ab Eq. GYSSONIO. Floret Majo, Junio.

Arbor magnitudine *Pyri Mali*, in saxosis arbuscula. Caudex teres, cortice cinereo. Rami sparsi, patuli, obducti cortice e rubro purpurascente cum levi nebula glauca, circulariter rugoso. Folia alterna, imparipinnata, pinnis in plantis luxuriantibus tredecim-quindecim, quinque-novem in plantis macris, breviter petiolata, foliolis lanceolatis, aut oblongo-lanceolatis, acutis, vel acuminatis, basi brevi tractu integerrimis, reliquo margine argute serratis, et sæpe inæqualiter, supra saturate viridibus, subtus glaucescentibus, ærioribus totis glabris, durioribus, junioribus in facie inferiore ad nervos, et venas pilosulis, impari lateralibus plerumque brevioribus, longiuscule petiolulato. Petioli pilosi, sæpe purpurantes. Corymbi terminales, solitarii, compositi, valde ramosi, grandes, patentes, rubentes, pilosi, aut glabri. Bractæ lineares, caducæ. Calyx parvus, tubo campanulato, limbi dentibus triangularibus, acutis, glaber, aut canescenti-villosus, villo adpresso. Petala alba. Stamina corolla paulo longiora, antheris exiguis, subrotundis. Stili plerumque tres, staminibus breviores. Stigmata obtusa. Pomum magnitudine pisi grossioris, passim triloculare, coronatum dentibus calycinis marcescentibus, immaturum ellipsoideum, e viridi paulatim lutescens, maturum globulosum, ruberrimum, cinnabarrinum, molliter pulposum, amarum. Nuces utrinque acutæ.

Varietas β vix diversa foliolis brevioribus, elliptico-oblongis, sæpe obtusis.

Usus. Elegans planta, præstans ad aueupia ob poma ab avibus expetita. Eadem poma ob vim adstringentem in hæmorrhoidibus adhibita. Lignum durissimum valet ad carros, ad vites torcularium, ad tornum, et similia.

2. *Sorbus domestica*: foliis pinnatis, serratis, subtus tomentosis; corymbo composito; pomis turbinatis.

S. domestica *Sp. pl.* p. 684. *Jacq. Austr.* 5. p. 23. t. 447. *Plenck. Ic. pl. med.* 4. p. 86. t. 391. *Nouv. Duh.* 3. p. 142. t. 34. *Balb. Taur.* p. 80. *Re Tor.* 1. p. 260. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 227., et 384. *Pollin. Ver.* 2. p. 129. *Moric. Ven.* 1. p. 217. *Nacc. Ven.* 3. p. 60. *Sav. Pis.* 1. p. 467., et *Bot.*

- Etr.* 2. p. 108., et *Tratt. degli alb. ed* 2. tom. 1. p. 202.
Spad. Xil. 3. p. 148. *Seb. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 169.
Ten. Nap. 1. p. 228. *Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 208. *De Cand.*
Franc. 4. par. 2. p. 436. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 34. heft.
Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 430. *Koch.*
Syn. p. 236. *Reich. Exc.* 3. p. 627. n. 4041. *Host. Austr.* 2.
p. 12. *Gaud. Helv.* 3. p. 315.
S. aucuparia Barb. Agg. p. 33.*
Pyrus domestica Smith. Engl. Fl. 2. p. 363., et *Engl. bot.*
v. 5. t. 350. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 359. n. 20. *Ten. Syll.*
p. 243. n. 9. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 570., et *Sup.* 1.
p. 155.
P. aucuparia Sangui. Cent. p. 69.* excl. syn.
P. Sorbus Gärtn. De fruct. 2. p. 45. tab. 87., ubi tantum
fructus. *De Cand. Prodr.* 2. p. 637. n. 32.
Mespilus domestica All. Ped. 2. p. 142. n. 1811.
M. n. 1092. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 33.
Sorbo Matth. Valgr. 1585. tom. 1. p. 282. fig.
Sorbe domestiche Dur. Herb. ed. Rom. 1585. p. 441. fig.
Sorba Ang. Sempl. p. 77.
Sorbus Casalp. De pl. lib. 3. cap. 63. p. 145.
S. sativa Zannich. Opusc. posth. p. 30., et 76.
β foliis coriaceis, corymboque glabris; pomis turbinateis,
collo aretatis.
Pyrus Sorbus Moris. et De Not. Capr. p. 53.*
Ital. Sorbo. Sorbo domestico. Sorbo gentile. Sorba (il frut-
to) Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 218.
Offic. Sorbi domestica bacca Lin. Mat. med. p. 81. n. 234.
Arb. Arbusc. Legi Bononiæ in sylvis, ubi frequens, a Mon-
tecastello, al Sasso, a Zolla predosa. Habui Mantuâ
al Bosco Fontana a BARRIERO, ex agro Veronensi a
Stallavena a RAINERO, Bassano in sylvis dei Collalti,
et Costansella a MONTINIO, ex montosis Tergestinis a
BIASOLETTO, et a TOMMASINIO, ex agro Romano alla
Tolfa a Prof. MAURIO, ex Corsica a Calvi a SOLEIRO-
LIO. Varietatem β obtinui ex Ilva a BRUNNERO, ex
Capraria ab Eq. Prof. MORISIO, et a Prof. DE NOTARIS.
Floret Majo.
Arbor præcedente procerior, sed et arbuscula in saxosis,
et in sylvis cæduis. Differt hisce notis. Rami juniores,
et petioli albo-lanuginosi. Foliola substantiâ tenerio-
ris, basi longo tractu integerrima, reliquo margine bi-
serrata, aut simpliciter serrata, nunc minora, ovata,
aut ovato-oblonga, nunc multo longiora, oblongo-lan-
ceolata, vel lanceolata, item ludunt obtusa, acuta, aut

acuminata, supra late viridia, glabra, aut parum pubescentia, subtus albo-tomentosa, seriora subinde tota glabrata, vel saltem prope marginem, impar lateralibus subæquale. Stipula linearis, angusta, serrata, aut bi-trifida, caduca, sita utrinque in basi foliorum supremorum. Corymbi albo-tomentosi, senio tantum calvescentes. Bractem lineares, longæ, eaducæ. Corolla, et antheræ paulo grandiores. Stili tres-quinque, basi barbati, staminibus paulo breviores. Stigmata dilatata, concava. Pomum turbinatum, circiter longitudine pollicis, tri-quinqueloculare, immaturum valde austero-acidum, extus paulatim flavesceens, et, qua sole tangitur, pulchre rubens, maturitate pulposum, molle, mitius, non tamen sine austeritate quadam, edule, coloris purpurascentis. Ex austeritate hujus pomi vates canebat:

*che tra gli lazzi sorbi
Si disconvien fruttare al dolce fico*

Dant. Inf. cant. 15. v. 65. 66.

Varietas β habet foliola duriora, coriacea, lanceolata, acuta, glabra, medietate inferiore integerrima, superiore fere æqualiter, leviter, argute serrata, petiolos puberulos, corymbum glabrum, pomum turbinatum, plus minus oblongum, apice in cervicem coarctatum, purpureo-cæruleum cum levi glaucescencia. Videant autops in planta vivente, an potius sit distincta species.

Usus. Poma ob qualitatem farinosam olim pro alimento ægrotorum laudata, nunc exoletæ. Lignum durissimum præstat eisdem usibus ac lignum præcedentis speciei.

MESPILUS

Lin. Gen. p. 251. Tourn. Inst. 3. t. 410. Lindl. in Trans. Lin. Soc. v. 13. par. 1. p. 99. Endl. Gen. p. 1237. n. 6344.

Mespilus partim *Juss. Gen. p. 335. Vent. Tabl. 3. p. 337. Lamck. Ill. 5. t. 436. fig. 1. tantum. Gærtn. De fruct. 2. p. 43. tab. 87. fig. sinistra tantum. Smith. Engl. Fl. 2. p. 358.*

Amelanchier Lindl. in Trans. Lin. Soc. v. 13. par. 1. p. 100. Endl. Gen. p. 1237. n. 6345.

Cotoneaster Lindl. l. c. p. 101. Endl. l. c. p. 1288. n. 6347.

Pyrus partim *Lindl. l. c. p. 97. Endl. l. c. p. 1237. n. 6342.*

Calyx perianthium adhærens, limbo libero, quinquepartito, persistente, et diu vivente. **Petala** quinque, obovata, aut obverse lanceolata, patentia, vel erecta, inserta oræ externæ receptaculi discoidei claudentis os tubi calycini. **Stamina** viginti-plura, in ambitu inserta prope petala, filamentis subulatis, antheris subrotundis, vel ovatis, bilocularibus, incumbentibus. **Stili** duo-quinque. **Stigmata** depresso-capitata, vel simplicia, obtusa. **Pomum** turbinatum, aut globosum, depresso-umbilicatum, coronatum laciniis calycinis persistentibus, diu viventibus, conniventibus, vel erectis, uni-quinqueloculare, pariete loculorum membranaceo, immaturum austero-acidum, vel insipidum, maturum pulposum, molle, sæpe edule, ferrugineum, rubrum, nigrum. **Nuces** osseæ, vel coriaceæ, nonnullis plerumque abortivis.

Habitus. Arbusculæ, aut frutices, incermes, vel spinoscentes. **Folia** simplicia, petiolata, integerrima, crenata, aut serrata. **Stipulæ** caducæ. **Flores** solitarii, vel racemosi, aut corymbosi. **Corolla** alba, rosea. **Pomum** maturum semper molle, et coronatum limbo calycino virente.

Ord. nat. Ut in *Cratægo* p. 138.

1. *MESPILUS germanica*: foliis oblongis, subserrulatis; floribus solitariis; pomis turbinatis.

M. germanica *Sp. pl. p. 684. Smith. Engl. Fl. 2. p. 360., et Engl. bot. v. 22. t. 1523. Pall. Ross. 1. p. 29. t. 13. f. 1. macrior. Plenck. Ic. pl. med. 4. p. 87. t. 393. Nouv. Duh. 4. p. 143. a. t. 38. All. Ped. 2. p. 142. n. 1812. Balb. Taur. p. 80. Re Seg. p. 42., et Tor. 1. p. 261. Birol. Acon. 1. p. 167. Coll. Herb. Ped. 2. p. 348. n. 1. Comöll. Prodr. p. 95. Pollin. Ver. 2. p. 130. Ruch. Ven. p. 124. Moric. Ven. 1. p. 218. Nacc. Ven. 3. p. 61. Sav. Bot. Etr. 4. p. 105., et Tratt. degli alb. ed. 2. tom. 1. p. 139. Spad. Xil. 2. p. 38. Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 170. Ten. Nap. 1. p. 282. A., et Syll. p. 241. n. 1. Ab Ucr. Hort. Pan. p. 208. Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 564.* De Cand. Franc. 4. par. 2. p. 434. a., et Prodr. 2. p. 633.*

n. 1. α. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 419. Koch. Syn. p. 234. Host. Austr. 2. p. 13. Gaud. Helv. 3. p. 328. Gärtn. De fruct. 2. p. 43. t. 87. fig. prima infer. sinistra.

M. vulgaris Reich. Exc. 3. p. 630. n. 4059.

M. n. 1094. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 33.

Nespolo secondo Matth. Valgr. 1585. tom. 1. p. 274. fig.

N. Dur. Herb. ed. Rom. 1585. p. 309. fig.

N. setanio Anguill. Sempl. p. 73.

Mespilus Cæsalp. De pl. lib. 3. cap. 15. p. 100.

M. folio laurino serrato Cup. Hort. Cath. p. 144.

M. fructu medio e rotundo oblongo, austeriori, insulso, coronâ clausâ Cup. l. c. p. 144.

Ital. Nespolo Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 144.

Offic. Mespili fructus, et semina Lin. Mat. med. p. 82. n. 236.

Arbusc. Frut. Sat frequens in sylvis Italiæ. Legi Sarzanæ in Montedarme, Bononiæ in sylvis inter montem Mariano, et il Battedizzo. Habui ex agro Comensi al Ponte Molinello a RATNERO, ex sylvis d' Angarano prope Bassanum, et ex Euganeis a MONTINIO, Tiburo a BARBIERIO, ex Sicilia in sylva della Ficuzza ab Eq. GUSSONIO. Floret Majo, Junio.

Arbuscula ergyalis-sesquiorgyalis, erecta, tortuosa, cortice cinereo, ramis sparsis, patulis, sæpe per longitudinem spinosis, obductis cortice rubido cum nebula cinerea. Spinæ ramorum breves, validæ. Folia sparsa, brevissime petiolata, oblonga, vel oblongo-lanceolata, acuta, aut acuminata, minuta, et crebre serrulata, vel integerrima, vel margine partim serrulato, partim integerrimo, supra læte viridia, glabra, subtus pallentia, molliterque tomentosula, seriora majora, etiam tres-quatuor pollices longa, primordialia multo minora, subinde obovata, et obtusa. Petioli villosi. Stipulæ ovatæ, citissime caducæ. Flores terminales, solitarii, subsessiles, grandes. Sæpe bractea foliacea, lanceolata comitatur florem. Tubus calycinus valde villosus, aut tomentosus, lacinie limbi longæ, foliaceæ, lanceolatæ, acuminatæ, nudiusculæ, diu viventes, et sic persistentes. Petala alba, obcordata, vel obovata, longe unguiculata, limbum calycinum æquantia, aut paulo superantia. Stamina corolla breviora, antheris oblongis. Stili quinque, crassiusculi, tubæformes. Stigmata obtusa. Pomum turbinatum, vel turbinato-oblongum, villosum, sero denudatum, nunc magnitudinæ avellanæ

crassioris, nunc paulo majus, coronatum laciniis calycinis foliaceis, diu ita viventibus, et persistentibus, conniventibus, quinqueloculare, immaturum exsuccum, austero-acidum, rufo-flavescens, maturum pulposum, molle, ferrugineo-livens, mitius, edule. Nuces ossem, turbinato-trigonæ.

Hæc planta passim colitur apud nos, et adipiscitur poma grandiora, imo interdum maxima, et multo mitiora, valde expetita.

Usus. Pulpa pomorum ob qualitatem adstringentem laudata in profluviis ventris, nunc desueta. Lignum durissimum valet ad vites, clavos, fusos rotarum, aliaque id genus.

a. *MESEPIUS Pyracantha*: ramis spinosis; foliis ovato-oblongis, crenatis; corymbo composito; pomis globulosis.

M. Pyracantha Sp. pl. p. 685. Pall. Ross. 1. p. 29. t. 13. f. 2. b. B. C. All. Ped. 2. p. 142. n. 1813. Birol. Acon. 1. p. 167. Coll. Herb. Ped. 2. p. 350. n. 7. Barb. Agg. p. 33.* Sav. Pis. 1. p. 468. Spad. Xil. 2. p. 40. Ten. Nap. 1. p. 231., et Syll. p. 242. n. 4. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 434.

Cratægus Pyracantha Lindl. in Trans. Lin. Soc. v. 13. par. 1. p. 106. Sav. Tratt. degli alb. ed. 2. tom. 1. p. 96. Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. 2. p. 626. Reich. Exc. 3. p. 629. n. 4052.

Acuta spina Dur. Herb. ed. Rom. 1585. p. 7. fig. mala.

Pyracantha sempervirens Barrel. Ic. 874.

Uva Ursi Lugd. hist. 1. p. 134. fig. bona.

Ital. *Agazzino* Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 145. *Agazzino*. *Pruno gazzerino*. *Marruca nera* Sav. Tratt. degli alb. ed. 2. tom. 1. p. 97.

Frut. Legi Sarzanæ in sylvis di *Groppolo*, in sepibus di *Montedarme*, et in nemoribus di *Marinella*, quibus in locis valde copiosa, Bononiæ in monte *Mariano*, in sylvis di *Zolla predosa*, di *S. Lorenzo in collina*, et di *Mongardino*, Florentiæ a *Monte Acuto*, et *Querceto*. Habui Mantuâ a *Lussara* a *BARBIERIO*, ex districtu *Faventino* a *Casola di Valsenio* a *TASSINARIO*, ex pineto *Ravennati* a *DALLAGATA*, ex sepibus *Senogalliensibus* a *S. Angelo* a *SALVATORIO*, ex *Piceno* a *Montefortino* a *MARZIALETTO*, ex agro *Florentino*, et ex *Provincia Senensi* a *Radicofani* a *Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZET-TRIO*, ex sylvis *Senensibus*, ubi copiosissima, præsertim in sylva *del Matthioli*, et *della Monaca* a *Prof. GIULIO. Floret Majo*.

Fratex ramosissimus, cespitosus. Caulis teres, erectus, ab uno ad quinque pedes longus, cortice gilvo-lutescente, demum fusce rubido. Rami sparsi, patuli, armati spinis validis, alternis, acutissimis, simplicibus, vel ramosis, atro-rubentibus, glabris, subinde foliosis, juniores albedo-villosi. Folia breviter petiolata, ovata, aut ovato-oblonga, obtusa, vel acuta, minute crenata, firmula, nitida, glabra, supra saturate viridia, subtus pallidiora, persistentia, majora pollicem longa, juniora subinde subtus tomentosula præsertim ad nervum medium. Corymbi terminales ramulis lateralibus, compositi, multiflori, numerosi. Bractæ lineares, vel lanceolatæ, acutæ, caducæ, inferiores sæpe foliaceæ, ovatæ, vel oblongæ, persistentes. Ramificationes corymbi pubescentes. Flores parvi. Tubus calycinus turbinatus, pubescens; limbi lacinia breves, triangulares, acutæ, glabræ, aut pilosæ, dorso virides, lateribus membranaceo-albidæ. Corolla alba, calyce duplo longior. Petala obovata, obtusa, concava, integra, patentia. Stamina corollæ subæqualia, antheris subrotundis, roseis, effortis fusce purpureis. Receptaculum lanatum. Stili quinque, crassiusculi, flexuosi viridiluteoli, staminibus breviores, lana receptaculæ stipati. Stigmata obtusa. Pomum parvum, globulosum, magnitudine pisi, umbilico villosa, coronatum dentibus calycinis diu viventibus, et ita persistentibus, conniventibus, quinqueloculare, maturum vivide coccineum, pulposum, molle; ludit colore pallidioro. Nuclei osseæ, trigonæ, latere dorsali convexo.

Usus. Pomis copiosissimis, coloris flammei vividis, diu perdurantibus ornamentum sepium, et sylvarum. Folia valent ad opus coriarium.

3. **MESPILUS Amelanchier**: inermis; foliis ellipticis, obtusis, serrulatis, longe petiolatis; racemis simplicibus; petalis obverse lanceolatis; pomis ovoideis, corona erecta.

M. Amelanchier Sp. pl. p. 685. Jacq. Austr. 3. p. 55. tab. 300. All. Ped. 2. p. 143. n. 1814. Re Seg. p. 42.*
Vitm. Sagg. p. 31. Suffr. Foroj. p. 145. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 347.

Pyrus Amelanchier Willd. Sp. pl. 2. par. 2. p. 1014. Birol. Acon. 1. p. 168. Coll. Herb. Ped. 2. p. 357. n. 15. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 228. Comoll. Prodr. p. 96. Barb. Agg. p. 34. Pollin. Ver. 2. p. 133. Bert. Aman. Ital. p. 371. n. 153. Sav. Bot. Etr. 2. p. 109. Spad. Xil. 2. p. 193.

- Ten. Nap.* 4. p. 278., et *Syll.* p. 243. n. 6. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. p. 568.* *Host. Austr.* 2. p. 14.
Crataegus Amelanchier De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 43a.
Gaud. Helv. 3. p. 321.
Amelanchier vulgaris Moris. Stirp. Sard. el. fasc. 1. p. 17.*
De Cand. Prodr. 2. p. 632. n. 1. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 426. a. β.
Aronia rotundifolia Pers. Syn. pl. 2. p. 39. n. 5. *Koch. Syn.* p. 236. a. β.
Ar. Amelanchier Reich. Exc. 3. p. 630. n. 4057.
Ar. cretica Reich. l. c. n. 4058. excl. syn. *Tourn., et Desf.*
Pyrus n. 1095. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 34.
Diospyros Theophrasti Aldr. Dendr. p. 619. fig.
Amelanchier de' Francesi appresso il Lobelio Pon. Mont. Bald. p. 237.
Amelanchier Galloprovinciæ Barrel. Ic. 527.
Mespilus folio rotundiori, fructu nigro subdulci Segui. Ver. 2. p. 313. n. 1.
Vitis idæa III. Clus. Hist. pl. lib. 1. p. 62. fig. bona.
Ital. Pero corvino Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 144.
Arbusc. Frut. Legi in alpihus Apuanis humilioribus ad acaturigines Frigidæ, et in Lunensium lapidicinis, ubi copiosissima, in editioribus in crista prærupta verticis Sagro, qua respicit vallem Catino, in Insubria Helvetica ad radices montis S. Salvatoris prope Lugano. Habui ex Pedemontio in Vallasco alpium Valderiarum a BERTERO, et in viciniis Segusii a Prof. RE, ex Valtellina in Valdona prope Sondrio a BERGAMASCHIO, ex Corni di Canzo ad Larium a RAINERO, Veronâ in monte Tondo ab eodem RAINERO, in sylva del Mantico a MANGANOTTO, in Baldo a Prof. NACCARIO, ex Tyrolî meridionali prope Bolzano a FACCHINIO, et a RAINERO, et ex Tyrolî Italico in Fiemme, et Fassa a FACCHINIO, ex oris Benaci a Riva a FOX-STRANGWEJO, ex montibus Bassanensibus ab Eq. PAROLINIO, et in sylvis d'Angarano, Campese, et Solagna a MONTINIO, Tergesto in montosis calcariis, præsertim in monte Spaccato, a TOMMASINIO, ex districtu Faventino in sylva di Limisano, et in monte Mauro a TASSINARIO, ex Apennino di Fabriano a Frassassi, et ex Petra pertusa (Furlo) ab Eq. NARBUCCIO, et a Prof. OCTAVIANIO, ex rupibus di Pioraco in districtu Camerinensi ab eodem Prof. OCTAVIANIO, ex Piceno alla Madonna dell'Ambro a Balzo rosso, in montibus della

Sibilla, alla Valleria, et a Capo di Tenna a MARZIALLETTO, ex Præstutiis in monte Velino a Prof. MAURIO, et in monte Marine a CROCCHETTO, ex Ducatu Lucensi a Casoli di Camaione a Prof. PUCCINELLIO, et in Apennino a Calomini a Prof. PETRO SAVIO, ex cataracta Tiberis in Apennino Aretino ab AMIDEO, ex Nebrodibus Siciliæ ab Eq. GUSSONIO, ex montanis Sardinie ab Eq. Prof. MORISIO, ex monte Pertusato Corsicæ a SOLEIROLIO. Floret Aprili, Majo.

Arbuscula orgyalis-sesquiorgyalis, at in sylvis cædis passim frutex cæspitosus. Caulis teres, erectus, glaber, cortice cinereo, epidermide facile secedente. Rami sparsi, erecto-patuli, cortice fusce rubido, juniores niveo-tomentosi. Folia sparsa, longe petiolata, elliptica, obtusa, vel retusa, cum, aut sine mucronulo, subinde subcordata, nunc leviter, nunc exquisitius serrata, alias vel toto margine, vel inferne integerrima, uninervia, parallele venosa, et insuper venis tenuioribus reticulata, decidua, seriora subcoriacea, utrinque glabra, supra late viridia, subtus glauca, juniora tenera, subtus albo-villosa, vel dense albo-tomentosa. Petioli juniores albo-villosi, demum glabrati. Stipulæ lineares, angustissimæ, membranacæ, caducæ. Racemi terminales ramulis, solitarii, simplices, albo-tomentosi, aut albo-villosi, senescendo plus minus glabrati. Bractæ lineari-angustissimæ, acuminatæ, longæ, villosæ, rubellæ, caducæ. Tubus calycinus campanulatus, in anthesi plus minus albo-villosus, senio denudatus, glabratus; limbi laciniæ lanceolatæ, acuminatæ, longiusculæ, subvillosæ, in anthesi patentæ, in fructu erectæ, diu virentes, et ita persistentes. Petala alba, obverse lanceolata, obtusa, integra, aut emarginata, calyce duplo, et triplo longiora. Stamina calyce breviora, antheris exiguis, subrotundis, fuscis. Stili sæpius quinque, subinde tres-quatuor, crassiusculi, longitudine staminum. Stigmata obliquata, orbiculata, depressa, papillosa. Pomum parvum, ovoideum, coronatum laciniis calycinis erectis, viridibus, et diu ita persistentibus, intra quas depresso-umbilicatum, umbilico lanato, aut villoso, quinqueloculare, rarius tri-quadriloculare, inter maturandum rubescens, carne austera, maturum cæruleo-nigricans, obductum nebula glauca, intus pulposum, molle, dulce. Nuclei coriacei, oblongi, compressi, obtusi, basi incurvuli.

Arbuscula, dum floret in sylvis, visu pulcherrima.

4. *MESPILUS ChamæMespilus*: inermis; foliis ovato-oblongis, breviter petiolatis, serratis, glabris; corymbo composito; petalis obverse lanceolatis; pomis globosis.
M. ChamæMespilus *Sp. pl.* p. 685. *Allion. Ped.* 2. p. 143. n. 1815. *Re Seg.* p. 42. *Birol. Acon.* 1. p. 167. *Pollin. Ver.* 2. p. 130. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 345.
Pyrus Chamæmespilus *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 355. n. 2. *Ten. Nap.* 4. p. 278., et *Syll.* p. 242. n. 2. *De Cand. Prodr.* 2. p. 637. n. 38. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 425.
Cratægus Chamæmespilus *Jacq. Austr.* 3. p. 17. tab. 231. *De Cand. Franç.* 4. part. 2. p. 432. *Gaud. Helv.* 3. p. 320.
Sorbus Chamæmespilus *Koch. Syn.* p. 237.
Aronia Chamæmespilus *Reich. Exc.* 3. p. 630. n. 4055.
Aria Chamæmespilus *Host. Austr.* 2. p. 8.
Mespilus n. 1090. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 32.
Cratægus folio oblongo serrato, utrinque virente *Segui. Sup.* p. 296.
Cotonaster forte Gesneri *Clus. Hist. pl. lib.* 1. p. 63. fig.
Chamæmespilus *J. Bauh. Hist. pl. 1. lib.* 1. p. 72. fig.
Ital. Salciagnolo *Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 144.
Frut. Habui ex Apennino Liguriæ orientalis in umbrosis di *Montenero* a *TURIO*, ex albus Pedemontanis a Prof. *BALISIO*, ex *Cenisio* a *BONJEANNIO*, ex Tyroli Italico in alpinis di *Fiemme*, et *Fassa* a *FACCHINIO*, et in monte *Davoi* prope *Vigo* ab Eq. *PAROLINIO*, ex *Portole* Vicetinarum a *MONTINIO*, ex *Pratutiis* a *Pizzoli* a Prof. *MAURIO*, et ab *OSINO*. Floret Junio.
Caulis teres, decumbens, ascendens, valde ramosus, bi-tripedalis, glaber, tectus cortice nigricante cum nebulâ cinerea. Rami sparsi, cortice fusco rubido, juniores pubescentes. Folia alterna, sparsa, crebra, breviter petiolata, ovato-oblonga, obtusa, vel acuta, duplicato-serrata, crassiuscula, firmula, supra saturate viridia, subtus pallidiora, glabra, nitida, vel juniora subtus ad nervum, et venas plus minus lanuginosa. Petioli basi dilatati. Stipulæ lineares, petiolo longiores, subpilosæ, caducæ. Corymbi compositi, solitarii, terminales ramulis, parviflori, densiflori, fastigiati, pedicellis secundariis brevissimis. Bractæ lineares, longæ, membranaceæ, ferrugineæ, caducæ, imæ sub ramis primariis corymbi sæpe folium reliquis simile. Ramificationes corymbi passim albo-lanuginosæ. Tubus calycinus turbinatus, albo-tomentosus, subinde
Flor. Ital. T. V.

glabratus; limbi lacinis lanceolatis, acuminatis, plus minus lanuginosis præsertim margine. Petala obverso lanceolata, obtusa, ex albo rosea, erecta, calyoe duplo longiora. Stamina corolla paulo breviora, antheris subrotundis. Stili plerumque duo. Stigmata depressa, papillosa. Pomum globosum, magnitudine parvi cerasi, coronatum lacinis calycinis virentibus, et ita diu persistentibus, conniventibus, plerumque biloculare, immaturum acidum, e croceo rubens, nitensque, maturum pulposum, molle, palato gratum, edule, extus e rubro nigricans. Nuces coriaces.

5. *MESPILUS Cotoneaster*: inermis; foliis ovatis, ellipticisve, integerrimis, subtus tomentosis; racemis paucifloris, nutantibus; pomis unilocularibus, subturbinato-globosis.

M. Cotoneaster *Sp. pl.* p. 686. *Smith. Engl. Fl.* 4. p. 268. *Pall. Ross. 1.* p. 30. *t. 14. Fl. Dan. t.* 112. *Sv. bot. v.* 5. *t.* 295. *All. Ped. 2.* p. 143. *n.* 1816. *Re Seg. p.* 42. *Birol. Acon. 1.* p. 167. *Coll. Herb. Ped. 2.* p. 349. *n.* 4. *Nocc. et Balb. Tic. 1.* p. 227., et 384. *Comoll. Prodr. p.* 95. *Pollin. Ver. 2.* p. 131. *Suffr. Foroj. p.* 146. *Bert. fl. It. in Apenn. Bonon. p.* 14.* *Sav. Tratt. degli alb. ed. 2. tom. 2. p.* 121. *Spad. Xil. 2.* p. 108. *Ten. Nap. 4. p.* 275., et *Syll. p.* 241. *n.* 3. *De Cand. Franç. 4. part. 2. p.* 435. *Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p.* 346. *Gaud. Helv. 3. p.* 329. *Cotoneaster vulgaris* *Lindl. in Trans. Linn. Soc. v.* 13. *par. 1. p.* 101. *Engl. bot. Sup. v. 2. t.* 2713. *Hook. Brit. Fl. ed. 2. p.* 221., et in *Fl. Lond. ed. Grav. v.* 5. *t.* 36. *De Cand. Prodr. 2. p.* 632. *n.* 1. *a. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p.* 419. *Koch. Syn. p.* 234. *Reich. Exc. 3. p.* 629. *n.* 4053. *Host. Austr. 2. p.* 11.

Mespilus tomentosa *Willd. Sp. pl. 2. part. 2. p.* 1012. *Balb. El. in Accad. di Tor. ann. 1818. tom. 23. p.* 112.* *Coll. Herb. Ped. 2. p.* 349. *n.* 3. *Ten. Nap. 4. p.* 275., et *Syll. p.* 241. *n.* 2. *Gaud. Helv. 3. p.* 330.

M. eriocarpa *De Cand. Franç. 5. p.* 532.

Cotoneaster tomentosa *Lindl. in Trans. Linn. Soc. v.* 13. *par. 1. p.* 101. *De Cand. Prodr. 2. p.* 632. *n.* 2. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p.* 420. *Koch. Syn. p.* 234. *Reich. Exc. 3. p.* 629. *n.* 4054.

C. tomentosus *Host. Austr. 2. p.* 11.

Pyrus nebrodensis *Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p.* 569., et *Sup. 1. p.* 155.*

Mespilus n. 1093. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p.* 33.

Cotonastro del *Gesnero* *Pon. Mont. Bald. p.* 209., et 214.

Mespilus humilis, folio Mali Cydonii rotundo, non serrato *Cup. Hort. Cath. p. 248.*

M. folio subrotundo, fructu rubro *Segui. Sup. p. 298.*

Cotoneaster *J. Bauh. Hist. pl. 1. lib. 1. p. 73. fig.*

Ital. *Cotognastro. Salciagnolo Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 144.*

Frut. Filius attulit ex vertice *Corno alla scala* in Apennino Bononiensi, unde accepi quoque a Prof. PETRO SAVIO: Habui ex valle Augustæ Prætorie a Prof. BALBISIO, ex monte *Generoso* ad Latinum a RAINERO, ex montibus Brixiensibus a Prof. MORETTIO, ex montibus Veronensibus inter *Grezzana*, et *Stalavena* a MANGANOTTO, ex Tyroli Italico in collibus siccis di *Fiemme*, et *Fassa* a FACCHINIO, et in monte *Davoi* prope *Vigo* ab Eq. PAROLINIO, ex montibus di *Valnugana*, et ex sylvis della *Montagna nuova* prope *Rubbio* in districtu Bassanensi a MONTINIO, ex alpinis Forojuliensibus a Prof. MORETTIO, ex Piceno in montibus della *Sibilla alla Corona, alla Valleria, a Capo di Tenna* a MARZIALETTO, et ab Eq. PETRUCCIO, in *Vettore a Buco d' Uro* ab ORSINO, et a MARZIALETTO, in *Vettoretto* a Prof. MAURIO, ex Præutiis in monte *Grande* prope *Pizzoli* a CECCHETTO, et ab ORSINO, in *Maiella a S. Spirito*, et ex Nebrodibus Siciliæ ab Eq. GUSSONIO. Floret Aprili, Majo.

Frutex a pede ad orgyam, et ultra longus, teres, erectus, alterue ramosus, ramis erecto-patulis, cortice cinereo, vel rubido obductis, junioribus pubescentibus. Folia alterna, breviter petiolata, nunc minora, ovata, acuta, nunc duplo, et triplo majora, elliptica, vel subrotunda, obtusa, aut retusa, cum, vel sine mucronulo exiguo, omnia integerrima, supra atroviridia, glabra, nitida, subtus albo-tomentosa, tomento in junioribus niveo, in reliquis sordido. Petioli adpresse villosi. Stipulæ lanceolato-lineares, rufescentes, villosæ, caducæ. Racemi terminales ramulis lateralibus, solitarii, simplices, vel ramosi, semper pauciflori, nutantes. Subinde flos solitarius, pedunculatus. Pedunculi ludunt glabri, aut villosi; sæpe rubent. Bractææ oblongo-lanceolatæ, obtusæ, plerumque rubellæ, caducæ. Flores parvi. Tubus calycinus turbinatus; variat glaber, pilosus, aut lanuginosus, e viridi rubellus; limbi lacinis obtusæ. Petala calyce paulo longiora, subrotunda, obtusa, suberenata, concava, patentia, ex albo rosea, vel rubella, præsertim in medio.

Stamina corollam subæquantia, incurva, filamentis albis, inferne latiusculis, apice attenuatis, antheris ovatis, albis, polline albo, quo emisso, fiunt ferrugineæ. Stili plerumque tres, staminibus breviores, crassiusculi, virides. Stigmata subcapitata. Pomum uniloculare, magnitudine pisi, vel ciceris, e turbinato globosum, dentibus calycinis carnosis, arcuè incurvatis, cortici pomi continuis, concoloribusque coronatum, nunc glabrum, nunc floccosum, aut initio floccosum, postea glabratum, immaturum viride, inter maturandum rubrum, maturum nigrum, pulposum, molle, insipidum. Nuclei osseæ, grandiusculæ, trigonæ, dorso convexæ, sæpius tres tantum, reliquis abortivis, lateraliter sibi invicem appositæ, sed omnino liberæ tum hic, tum centro, dorso tantum cortici pericarpico hærentes.

Characteres, quibus recentiores distinxerunt *Mespilum tomentosum* a *Mespilo Cotoneastro* sunt omnino artificiales, cum eadem planta utramque formam ferat, et pomum passim ludat glabrum, vel lanuginosum.

PYRUS.

Lin. Gen. p. 251. Tourn. Inst. 3. t. 404. Juss. Gen. p. 335. Lamck. Ill. 5. t. 435. Vent. Tabl. 3. t. 335.

Pyrus partim *Gærtn. De fruct. 2. p. 44. t. 87. excl. fig. Sorbi, et Aucupariæ. Lindl. in Trans. Lin. Soc. v. 13. par. 1. p. 97. Smith. Engl. Fl. 2. p. 360. De Cand. Prodr. 2. p. 633. Endl. Gen. p. 1237. n. 6342.*

Malus Tourn. Inst. 3. t. 406. Juss. Gen. p. 334. Vent. Tabl. 3. p. 335.

Cydonia Tourn. Inst. 3. t. 405. Juss. Gen. p. 335. Vent. Tabl. 3. p. 336. Lindl. in Trans. Lin. Soc. v. 13. par. 1. p. 97. De Cand. Prodr. 2. p. 638. Endl. Gen. p. 1236. n. 6341.

Calyx perianthium adhærens, limbo libero, quinquefido, marcescente. Petala quinque, obovata, concava, patentia, inserta oræ externæ receptaculi discoidei claudentis os tubi calycini. Stamina viginti-plura, corolla breviora, affixa in ambitu prope petala, filamentis subulatis, antheris oblongis, bilocularibus, incumbentibus. Stili quinque,

filiformes, crassiusculi, glabri, vel inferne villosi, subinde basi connati. Stigmata capitata. Pomum semper carnosum, solidum, turbinatum, vel subrotundum, umbilicatum, quinqueloculare, loculorum pariete cartilagineo, immaturum acidum, vel austerum, viride, maturum sæpius mitius, et edule, extus ferrugineum, vel flavescens, interdum cum rubedine. Nuces coriaceæ, pyriformi-compressæ, solitariæ, aut geminæ in quovis loculo, nudæ, vel plures intra mucilaginem.

Habitus. Arbores, vel arbusculæ, sylvestres plerumque feræ, sive spinescentes. Rami sparsi, patuli. Folia simplicia, petiolata, ovata, oblonga, aut lanceolata, crenata, serrulata, vel integra. Stipulæ caducæ. Flores corymbosi, aut umbellati, raro solitarii. Corymbi, vel umbellæ simplices, sessiles. Bracteæ caducæ. Pedicelli, et calyces sæpe villosi. Corolla alba, vel ex albo rosea. Pomum in statu sylvestri parvum, ejus forma, color, et sapor plurimum variat in plantis cultis, de quibus hic non agitur, cum hæ ad pomonam pertineant.

Ord. nat. Pomaceæ *Lin. Ord. nat. n. XXXVI., et Præl. p. 444. Bartl. Ord. nat. p. 399. Schultz. Nat. syst. p. 569. Lindl. in Trans. Lin. Soc. v. 13. par. 1. p. 93. Rosaceæ Juss. Gen. p. 334. Smith. Gramm. p. 171. Vent. Tabl. 3. p. 331. De Cand. Prodr. 2. p. 525. Rich. Famill. in Él. éd. 5. p. 216.*

1. *Pyrus communis*: foliis ovatis, subcordatisve, serrulatis; floribus corymbosis; pomis turbinatis.
P. communis *Sp. pl. p. 686. a. Nouv. Duh. 6. p. 192. a. tab. 59. optima. All. Ped. 2. p. 143. n. 1817. Re Seg. p. 42., et Tor. 1. p. 262. Coll. Herb. Ped. 2. p. 355. n. 1. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 229., et 384. Barb. Agg. p. 34. Pollin. Ver. 2. p. 134. a. Suffr. Foroj. p. 146. Bert. fil. It. in Apenn. Bonon. p. 20.* Sav. Bot. Etr. 4. p. 106., et Tratt. degli alb. ed. 2. tom. 1. p. 168. a. Seb. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 170. a. Ten. Nap. 4. p. 276., et Syll. p. 242. n. 1. Ab Ucr. Hort. Pan. p. 209. Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 566. a. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 421. Koch. Syn. p. 234. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 348. Gaud. Helv. 3. p. 323.*

P. Pyraster Spad. Xil. 2. p. 199.

P. Achras Gært. De fruct. 2. p. 44. tab. 87. fig. super. dext. a. b. c.

P. n. 1096. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 35.

Pere salvatiche Matth. Valgr. 1585. tom. 1. p. 272. non fig. Dur. Herb. ed. Rom. 1585. p. 347. non fig. Ang. Sempl. p. 73.

Pyrus sylvestris Aldr. Dendr. p. 380. sine fig. Zannich. Opusc. posth. p. 28. Segui. Ver. 2. p. 308.

Pyri genus sylvestre præ acerbitate ingustabile, et parvum Cæsalp. De pl. lib. 3. cap. 62. p. 144.

β foliis oblongo-ovatis, utrinque angustatis, subintegris; pomis turbinatis.

Pyrus communis b Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 566.*

P. sylvestris verticillato fructu majori, pullo, minusve aspero sapore Cup. Hort. Cath. p. 184.

Ital. *Pero salvatico* Bert. Peruggine Sav. Tratt. degli alb. ed. 2. tom. 1. p. 168.

Arb. Arbusc. Filius attulit ex sylvis del Corno alla Scala in Apennino Bononiensi, et ex sylvis montis Sabbione prope Bononiam. Habui ex Montovolo in districtu Bononiensi a PIRAZZOLIO, ex sylvis Istriæ, et Tergestinis a BIASOLETTO. Varietatem β obtinui ex Regno Neapolitano in Contado di Molise, et ex Sicilia in sylvis di Valdemone, et Caronia ab Eq. GUSONIO. Floret Aprili, Majo.

Arbor insignis, vel in saxosis arbuscula. Caudex conicus, cortice cinereo, senio fusco, rimosoque. Rami sparsi, patuli, tecti cortice gilvo, sæpe armati spinis ex ramulis abortivis. Folia parva, sparsa, longe petiolata, ovata, subinde subcordata, acuta, crebre, et minute serrulata, supra saturate viridia, glabra, subtus pallidiora, pubescentia, aut lanuginosa, sæpe glabrata. Stipulæ lineares, caducæ. Corymbi terminales ramulis, solitarii, simplices, sessiles, albo-tomentosi, senio glabrati. Bractæ lineares, caducæ. Pedicelli in flore tenuiores, in fructu incrassati, et magis apice. Calyx albo-tomentosus, tubo turbinato, limbi laciniis ovatis, aut ovato-lanceolatis, acuminatis, intus quoque villosis, demum retroflexis, marcescentibus. Corolla alba, et plerumque extus rosea, grandiuscula. Petala e subrotundo obovata, obtusa, concava, integra. Stamina corolla paulo breviora, filamentis glabris, albis, antheris roseis, effusis fuscis. Stili quinque, staminibus breviores. Stigmata depresso-capitata, obliqua, papillosa.

Pomum parvum, turbinatum, collo brevi, coronatum limbo calycino emarcido, pollens carne semper solida, immaturum austerum, et acidum, maturum mitius, edule, præsertim coctum, extus coloris ferruginei, et, qua sole tangitur, rubens. Nuces castaneo-fusæ.

Varietas β differt foliis grandioribus, ovato-oblongis, utrinque angustatis, integerrimis, aut obiter crenulatis, collo pomi paulo productiore, sed id non semper.

Pyrus communis Smith. Engl. Fl. 2. p. 361., Engl. bot. v. 25. tab. 1784, est planta non omnino sylvestris primitiva, ut nostra, quod pomum ejus grandius, et mitius facile ostendit. Forte ex plantis cultis facta est sylvestris; ideo sylvestris secundaria.

Ex *Pyro communi* sylvestri hic descripta varietates propemodum infinitæ dimanarunt, quæ ubique apud nos coluntur, et quæ fructus suppeditant sapidissimos, saluberrimos, valde expetitos, multifformes, molis diversæ, imo subinde magnæ, et ponderosæ, qualis tribuitur

gravibusque volemis

Virg. Geor. lib. 2. v. 88.

Usus. Veteres faciebant piris vinum, et acetum, ut habemus a Palladio De re rust. lib. 3. tit. 25. Febr. n. 11. Nos comedimus pira tam cruda, quam cocta, tam recentia, quam sicca, item syrupo, aut saccharo confecta. Lignum arboris durissimum, præstantissimum ad supellectiles domesticas, ad simulacra sculpenda, ad instrumenta musicalia. Colore nigro ita inficitur, ut ebenum imitetur, et fulvo, ut lignum *Mohogani* referat. Truncus arboris infestatur, et pessumdatur ab eruca *Buprestis Fabricii*, præsertim in agro Bononiensi.

2. *Pyrus amygdaliformis*: foliis oblongis, subintegerrimis, basi angustatis, junioribus subtus, calycibusque tomentosis; petiolis abbreviatis; floribus corymbosis; petalis oblongo-obovatis; pomis turbinatis.

P. amygdaliformis Vill. Cat. des pl. du jard. de Strasb. p. 323. excl. syn. Pall. De Cand. Franç. 5. p. 531. excl. syn. Balb., et Prodr. 2. p. 634. n. 4. Moris. Stirp. Sard. el. fasc. 1. p. 18.* Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 423. Koch. Syn. p. 235. Reich. Exc. 3. p. 630. n. 4060.

P. cuneifolia Sang. Cent. p. 69.* excl. syn.

P. parviflora Guss. Sup. 1. p. 154.* excl. syn. Jan. El. p. 8. n. 12.*

P. sylvestris fructu triplo minori, acerbiori, ac tardiori
Cup. Hort. Cath. p. 184.

Ital. *Pero mandorlino.*

Arb. Arbusc. Habui ex Istria a *S. Vincenti, Gimino*, et aliunde a *TOMMASINIO*, ex agro Romano, ubi frequens ab urbe ad Civitatem Castellanam, a Prof. MAURIO, ex sylvis Calabriae ulterioris prope *Rosarno* a GASPARRINIO, ex Apulia a *Tavoliere*, et ex collibus aridis Siciliae ab Eq. GUSSONIO, et in Nebrodibus a Prof. JANIO, ex Sardinia ab Eq. Prof. MORISIO, et in sepibus *di Pula* a Prof. DE NOTARIS. Floret Aprili, Majo.

Arbor, vel arbuscula more praecedentis, quam valde appropinquat. Differt notis sequentibus. Folia oblonga, vel oblongo-lanceolata, obtusa, aut acuta, subinde mucronulata, integerrima, vel leviter subcrenulata, subcoriacea, petiolo proprio quater, et quinquies longiora, supra saturate viridia, glabra, subtus albo-tomentosa, senio tantum subfloccosa, aut glabrata, tuncque glaucescentia. Corymbus, et calyces pari modo albo-tomentosi, senio floccosi, vel glabrati. Corolla minor, alba. Petala oblongo-obovata, obtusa, integra, aut emarginata. Pomum parvum, turbinatum, collo brevi.

Pyrus salicifolia Balb. Misc. alt. p. 18. juxta exemplar, quod ipse Balbisius ad me misit monens desumptum fuisse ex planta culta, pertinet omnino ad *Pyrum salicifoliam* Pall. Ross. 1. p. 20. tab. 9. Nouv. Duh. 6. p. 189. tab. 56., quae a *Pyro amygdaliformi* nostra omnino differt, neque hactenus in Italia reperta est.

3. *Pyrus cuneifolia*: foliis coriaceis, oblongis, subintegerrimis, basi angustatis, junioribus subtus floccosis; floribus corymbosis; pomis globosis, utrinque umbilicatis. *P. cuneifolia* Guss. *Pl. rar. p. 202. t. 39.*, et *Fl. Sic. prodr. 1. p. 567.** *Ten. Nap. 4. p. 277.*, et *Syll. p. 244. n. 11.*, et in addend. p. 602.

P. Sinai Nouv. Duh. 6. p. 190. t. 57.

P. sinaica Thouin. in *Mém. du Mus. d'hist. nat. tom. 1. p. 170. t. 9. fig. 1-6.*

Ital. *Perazzo. Peruggina.*

Arb. Arbusc. Habui ex Sicilia ab Eq. GUSSONIO. Floret Aprili, Majo.

Simillima praecedenti, a qua differt hisce notis. Folia frequentius obtusa, juniora subtus albo-floccosa praesertim ad nervum, cito glabrata. Corolla alba, duplo grandior, petalis subrotundis. Pedunculi breviores, in fructu valde incrassati, et indurati. Pomum omnino

globosum, basi, et apice depresso-umbilicatum, immaturum valde acerbum, diametri circiter sex linearum, diutissime persistens in arbore.

Appropinquat *Pyrus parviflorum* Desf. in Ann. du Mus. d'hist. nat. tom. 12. p. 52. t. 4., sed multo grandior omnibus partibus, nec ut illa gaudens corollis roseis.

4. *Praus Malus*: foliis ovatis, ellipticisve, duplicato-dentatis; umbellis simplicibus; pomis subrotundis, utrinque umbilicatis.

P. Malus *Sp. pl.* p. 686. *α. Smith. Engl. Fl.* 2. p. 362., et *Engl. bot.* v. 3. tab. 179. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 221. *Fl. Dan.* t. 1101. *Sv. bot.* v. 4. t. 229. *All. Ped.* 2. p. 143. n. 1818. *Bir. Acon.* 1. p. 168. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 356. n. 11. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 229., et 385. *Comoll. Prodr.* p. 96. *Barb. Agg.* p. 34. *α. Pollin. Ver.* 2. p. 135. *α. Nacc. Ven.* 3. p. 63. *Suffr. Foroj.* p. 146. *Bert. fil. It. in Apenn. Bonon.* p. 20.* *Orsin. in Capell. Opusc.* p. 286. *Sav. Bot. Etr.* 4. p. 106., et *Tratt. degli alb. ed.* 2. tom. 1. p. 168. *α. Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 170. *α. Ten. Nap.* 4. p. 278., et *Syll.* p. 243. n. 4. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. p. 568. *De Cand. Prodr.* 2. p. 635. n. 15. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 424. *α. β. Koch. Syn.* p. 235. *α. β. Reich. Excurs.* 3. p. 631. n. 4067. *Wallr. Sched. crit.* p. 215. *α. β. Host. Austr.* 2. p. 13. *Scop. Carn. edit.* 2. tom. 1. p. 348. *Gaud. Helv.* 3. p. 325.

P. Agrimelea *Spad. Xil.* 2. p. 207.

P. acerba *Ten. Nap.* 4. p. 278., et *Syll.* p. 243. n. 5. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. p. 567.* et *Sup.* 1. p. 154.*

P. Malus var. *eryostyla* *Moris. Stirp. Sard. et. fasc.* 2. p. 3.*

P. eryostyla *Guss. Sup.* 1. p. 154.*

Malus communis α sylvestris *Nouv. Duh.* 6. p. 142. tab. 45. fig. 1. 2.

M. communis *Moric. Ven.* 1. p. 219. *De Cand. Franç.* 4. part. 2. p. 429. *α.*

Pyrus n. 1097. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 35.

Melo Matth. Valgr. 1585. tom. 1. p. 259. fig.

Mele fructi *Dur. Herb. ed. Rom.* 1585. p. 280. fig.

Poma sylvestria *Aldr. Dendr.* p. 318. sine fig.

Mala sylvestria *Casalp. De pl. lib.* 3. cap. 61. p. 143.

Malus sylvestris, fructu valde acerbato *Seguier. Sup.* p. 297.

Ital. Pomo. Pomo salvatico. Melo. Melo salvatico.

Offic. Pomorum (Bordophiensium) succus liquidus *Lin.*

Mat. med. p. 82. n. 237.

Arb. Arbuse. Filius attulit ex sylva dell' *Apero* sub Cornu ad scalas in Apennino Bononiensi. Habui ex sylvis S. Michaelis d' *Angarano* in districtu Bassenensi a Montinio, ex regno Neapolitano in Principatu ultra ab Eq. Gussonio, et in nemoribus, sepibusque di *Rosarno* a Gasparrinio, ex Sardinia in sylvis montis *Rasu* ab Eq. Prof. Morisio. Floret Aprili, Majo.

Arbor præcedentibus minor, et sæpius arbuscula. Rami sparsi, distorti, patentissimi, juniores pubescentes, tecti cortice rubido-cinerascente, circulariter rugoso. Ramuli steriles ut plurimum spinescentes. Folia sparsa, longe petiolata, ovata, elliptica, aut elliptico-oblonga, breviter cuspidata, nunc acuta, aut valde acuminata, nunc obtusa, duplicato-dentata, vel serrulata, rarius simpliciter, subinde quoque integerrima, saltem aliquo tractu, supra late viridia, glabra, subtus pubescentia, aut tomentosa, præsertim juniora, tomento fulvidulo, ad nervos magis conspicuo, alias etiam subtus glabra, aut fere glabra. Petioli pubescentes, vel glabri. Stipulæ lineares, caducæ. Umbellæ terminales ramulis, solitariæ, simplices, sessiles. Earum radii ludunt tomentosi, pubescentes, glabri. Ita quoque ludit calyx, cujus tubus campanulatus, limbi lacinie lanceolatae, acutæ, patentes, postea reflexæ, demum marcescentes. Flores potius grandes, leviter, grateque odori. Corolla alba, extus passim rosea. Petala e subrotundo obovata, obtusa, concava, genitalibus longiora. Stili quinque, longitudine staminum, nunc glabri, nunc toti, aut inferne villosi. Pomum, quam in præcedente, duplo, et triplo grandius, subrotundum, vel subrotundo-oblongum, basi, et apice depresso-umbilicatum, primo pubescens, postea glabratum, vel jam ab initio glabrum, immaturum viride, austerum, acidum, maturum flaveolum, et, qua sole tangitur, rubescens, mitius, edule, licet non suave. Maturitas ejus lenta, et sera, byeme jam protracto. Hæc est vera planta sylvestris, ejus prima modificatio habetur poma dulciore, citius maturescente.

Ex hac specie innumera varietates profectæ sunt, quæ ob mitia, et suavia poma longe lateque apud nos coluntur, quæ quidem cultura antiquissima est; cum enim homines primum in societatem convenerunt

Tunc victus abierit feri, tunc consita pomus

Tibull. Eleg. lib. 2. el. 1. v. 43.

Poma Veneri grata, ideo gratum amatoribus munusculum :

*Ut missum sponsi furtivo munere malum
Procurrit casto virginis e gremio*

Catull. Carm. 65. v. 19. 20.

Malo me Galatœa petit lasciva puella

Virg. Eccl. 3. v. 64.

Usus. Pomorum varietates cultæ mensarum delictum, cibusque hominum saluberrimus. Pulpa cocta purgans, emolliens, et ad inflammationes externas leniendas, præsertim oculorum, laudata. Decoctum pomorum dulcium pectorale. E pomis dulcioribus exprimitur succus ad tincturam martis pomatam, et ad confectionem *Alkermes* parandas pro usu medico. Veteres faciebant pomis vinum, et acetum, ut docet Palladius De re rust. lib. 3. Febr. tit. 25. n. 19. Septentrionales nunc quoque faciunt pomis fermentatis vinum, quod *Sidro* vocant. Lignum arboris minus durum ligno præcedentis speciei, ideo minus præstans pro suppellectili domestica; tamen aptum torno, et simulacris ligneis sculpendis. Infestatur ab eruca *Cossi Æsculi*.

5. *Praus Cydonia*: foliis ovatis, integerrimis, subtus tomentosis; floribus solitariis.

P. Cydonia Sp. pl. p. 687. a. Jacq. Austr. 4. p. 22. t. 342. Plenck. Ic. pl. med. 4. p. 90. t. 376. All. Ped. 2. p. 144. n. 1819. Coll. Herb. Ped. 2. p. 357. n. 13. Pollin. Ver. 2. p. 135. Moric. Ven. 1. p. 218. Nacc. Ven. 3. p. 64. Spad. Xil. 2. p. 209. Ab Ucr. Hort. Pan. p. 209. Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 568. De Cand. Franç. 4. part. 2. p. 430. a. Host. Austr. 2. p. 13. Gaud. Helv. 3. p. 324. a.

Cydonia vulgaris Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 230., et 385. Ten. Nap. 4. p. 280., et Syll. p. 244. n. 1. Moris. Stirp. Sard. el. fasc. 1. p. 18.* De Cand. Prodr. 2. p. 638. n. 1. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 431. Koch. Syn. p. 234. Reich. Exc. 3. p. 631. n. 4069.

C. communis a. Nouv. Duh. 4. p. 136.

C. europæa Sav. Tratt. degli alb. ed. 2. tom. 1. p. 99.

Cotogno Matth. Valgr. 1585. tom. 1. p. 260. fig.

Cotogni Dur. Herb. ed. Rom. 1585. p. 151. fig.

Melecotogne Anguill. Sempl. p. 72.

Malus cotonea Aldr. Dendr. p. 536. fig. p. 538.

Mala cotonea Cæsalp. De pl. lib. 3. cap. 61. p. 143.

- Malus cotonea sylvestris* Cup. Hort. Cath. p. 132.
 Ital. *Cotogno. Melo* Cotogno Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 193.
 Offic. *Cydonia fructus, cortex, semina* Lin. Mat. med. p. 82. n. 238.
Arbuse. Frut. Legi Bononiæ in collibus di Roncorio, et Paderno ad sepes. Habui ex valle Pantena districtus Veronensis a MANGAROTTO, ex sylvis, et sepibus d'Angarano, et Marsano in provincia Bassanensi a MONTINIO, ex Sardinia media ab Eq. Prof. MONSIO. Floret Aprili, Majo.
 Caulis teres, cortice fusce rubido obductus. Rami sparsi, patuli, juniores pubescentes. Folia sparsa, petiolata, ovata, acuta, subinde obtusa, integerrima, supra glabra, viridia, subtus albo-tomentosa. Stipulæ lineares, caducæ. Petioli tomentosi, aut pubescentes. Flores grandes, solitarii, terminales, subsessiles. Calyx denso tomentosus, laciniis ovato-lanceolatis, vel lanceolatis, acutis, longis, cito reflexis. Petala e subrotundo obovata, alba, extus rosea. Stamina corolla multo breviora, antheris oblongis. Stili basi dense lanati. Pomum junius parvum, turbinatum, valde tomentosum, senescens auctum, subrotundum, subdenudatum, vel glabratum, maturum flavo-aureum etiam carne, fragrantissimum, non edule, sed semper durum, et austorrum, quinqueloculare, loculis plerumque polyspermis, mucilagine repletis. Reliqua generis.
 Culturâ adipiscitur poma multo grandiora, quorum pulpa melle condita olim suppeditabat confectionem illam, quæ, teste Galeno De alim. fac. lib. 2. cap. 23. edit. Junt. Ven. sext. tom. 5. p. 20., ex Iberia Romam ferabatur, et quam Martialis joco vocabat melimella:

*Si tibi Cecropio saturata Cydonia melle
 Ponentur, dicas hæc melimella licet.*

Mart. Epigr. lib. 13. ep. 24.

Nunc vero eadem pulpa saccharo, et cinnamomo exquisitius confecta obtinetur Genuâ, et Ferrariâ. Hæc sunt mala aurea delictum pastorum:

*sylvestri ex arbore lecta
 Aurea mala decem misi, cras altera mittam*

Virg. Eccl. 3. v. 70. 71.

non vero habenda pro malis fabulosis Hesperidum, quorum

Arborem frondes auro radiante nitentes

Ex auro ramos, ex auro poma ferebant.

Ovid. Met. lib. 4. v. 366. 367.

Usus. Poma, semina, et cortex hujus speciei remedium præstans contra nauseam, vomitum, diarrhæam, et choleram ob vim astringentem, et roborantem.

ORDO II. OLYGOGYNIA. CAPSULIFERÆ.

(Comprehendit reliquum ordinis Pentagyniæ L. capsulis præditum).

MESEMBRYANTHEMUM.

Lin. Gen. p. 252. Juss. Gen. p. 317. Lamck. Ill. 5. t. 438. Vent. Tabl. 3. p. 269. Gærtn. De fruct. 2. p. 201. tab. 126. De Cand. Prodr. 3. p. 415. Endl. Gen. p. 946. n. 5163.

Ficoides Dill. Nov. pl. gen. in App. ad Cat. pl. circa Giss. p. 148. tab. 9.

Calyx perianthium carnosum, inferne adhærens, limbo quinquepartito, persistens. *Petala* valde numerosa, linearia, plurium ordinum, rarius unius, libera, aut basi coalita. *Stamina* plurima, multiserialia, in ambitu receptaculi discoidei affixa prope petala, filamentis capillaribus, antheris oblongis, bilocularibus, incumbentibus. *Ovarium* sepultum. *Stili* quinque, ludunt quatuor-decem-viginti, subulati. *Stigmata* simplicia, acuta. *Capsula* turbinata, obscure pentagona, sepulta, et adhærens, apice prominens, et radiatim dehiscens, quinque-plurilocularis, calyce persistente tecta; et coronata. *Semina* minuta, numerosa, compressiuscula.

Habitus. Plantæ carnosæ, suffruticosæ, fruticossæ, rarius annuæ, paucae acaules, omnes loca aquosa refugientes. *Folia* simplicia, polymorpha,

opposita, vel alterna. Flores solitarii. Corolla alba, rosea, purpurea, rubra, flava, sub sole meridiano patens.

Ord. nat. Succulentæ Lin. Ord. nat. n. XIII., et Præl. p. 315. Ficoidæ Juss. Gen. p. 315. Smith. Gramm. p. 165. Vent. Tabl. 3. p. 266. De Cand. Prod. 3. p. 415. Rich. Fam. in Él. éd. 5. p. 199. Bartl. Ord. nat. p. 308. Mesembrinæ Schultz. Nat. syst. p. 431.

1. *MESEMBRYANTHEMUM nodiflorum*: foliis oppositis, alternisque, subteretibus, obtusis, basi ciliatis; floribus axillaribus; petalis minimis.

M. nodiflorum Sp. pl. p. 687. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 346., et Fl. Græc. 5. p. 64. t. 480. Coll. Herb. Ped. 2. p. 504. n. 4. Sang. Cent. p. 70. Ten. Nap. 4. p. 281., et Syll. p. 245. n. 2. Guss. Pl. rar. p. 204., et Fl. Sic. prodr. 1. p. 572.,* et Sup. 1. p. 155.* Ab Ucr. Hort. Pan. p. 210. Jan. El. p. 8. n. 12.* Moris. Stirp. Sard. el. fasc. 1. p. 19.* De Sal. in Bot. zeit. an. 1834. p. 48. Desf. Atl. 1. p. 398. De Cand. Pl. grass. tab. 88., et Prodr. 3. p. 447. n. 268.*

Kali floridum repens Aizoides Neapolitanum Column. Ecphr. alt. p. 72. fig. p. 73. bona. Bocc. Réch. et observ. nat. p. 202.

K. Crassulæ minoris foliis Cup. Hort. Cath. p. 245. Moris. Oz. sect. 5. tab. 33. fig. 7.

Ital. Aizoo vermicolare.

Ann. Habui Nicmâ in arenis del Paglione ab Eq. Prof. MORISIO, ex Sicilia a Prof. JAKIO, ex Lopadusa ab Eq. GUSONIO, ex maritimis Sardinie ad muros, et vias denuo ab Eq. Prof. MORISIO, et in litoribus di Pula a Prof. DE NOTARIS, ex insula Spano prope Corsicam a SOLKINOLIO. Floret a Martio in æstatem.

Radix fusiformis, vel fusiformi-ramosa, flexuosa, alba, subinde gracilis. Caulis carnosus, teres, decumbens, ascendens, vel erectus, sæpe cæspitosus, jam a basi alterne ramosus, dum luxuriat dichotomus, bipollicaris-pedalis. Folia subteretia, obtusa, carnosæ, basi ciliata, majora sex-octo lineas longa, inferiora opposita, superiora alterna. Flores solitarii, axillares, subsessiles. Calycis lacinie lineares, obtusæ, carnosæ, valde inæquales, tribus multo longioribus. Petala alba, minima. Stili quinque. Capsula quinquelocularis. Tota planta minute papillosa, argenteo-glauca, glabra.

Ludit limbo calycino quadrifido; stilis quatuor, capsulis quadrilocularibus.

a. *Mesebryanthemum crystallinum*: hyalino-papulosum; foliis ovatis, planis, undulatisve; floribus terminalibus, subsessilibus.

M. crystallinum *Sp. pl.* p. 688. *Haw. Revis.* p. 157. *Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr.* 1. p. 347., et *Fl. Græc.* 5. p. 65. t. 481. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 564. n. 1. *Ten. Nap.* 4. p. 281. *Ab Uer. Hort. Pan.* p. 210. *Jan. El.* p. 8. n. 1.* *Moris. Stirp. Sard. el. fasc.* 1. p. 19. *De Sal. in Bot. zeit. ann.* 1834. p. 48. *De Cand. Pl. grass. tab.* 128., et *Prodr.* 3. p. 448. n. 278. a. β. *Reich. Exc.* 3. p. 587. n. 3806.

M. glaciale *Haw. Revis.* p. 157. *Guss. Pl. rar.* p. 203.* et *Fl. Sic. prodr.* 1. p. 571.* et *Sup.* 1. p. 155.* *Ten. Syll.* p. 245. n. 1.

M. crystallinum, *Plantaginis folio undulato* *Dill. Hort. Elth.* 2. p. 231. t. 180. f. 251. bona.

Ital. *Cristalloide. Erba cristallina. Erba diacciola* *Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 143.

Ann., et *Bienn.* Habui ex Sicilia a Prof. JAWO, ex Ustica ab Eq. GUSONIO. Floret. Aprili, Majo.

Radix ut in præcedente, sed passim gracillima. Caulis inferne brevi tractu simplex, erectus, mox solutus in plures ramos in orbem rosulatos, crassos, prostratos, dichotomos. Folia subcordato-ovata, acuta, integra, valde succosa, margine undulata, vel plana, sæpe apice rubro-purpurantia, opposita, inferiora, et media petiolata, suprema sessilia. Flores subsessiles, solitarii, terminales cauli, ramisque. Calycis tubus crystallino-papulosus, laciniae absque papulis, obovatæ, acutæ, externæ tres majores, omnes apice plerumque rubro-purpurantes. Petala calyce longiora, inferne connata, angustissima, alba, apicibus leviter purpureo-roseis. Stili quinque, coadunati, staminibus breviores. Capsula quinquelocularis. Tota planta papulis hyalinis, veluti granulis glaciei pulchre adspersa. Est. quam certissime annua; sed sero nascentis sit biennis.

AIZOON.

Lin. Gen. p. 253. *Juss. Gen.* p. 316. *Lamck. Ill.* 5. t. 437. *Vent. Tabl.* 3. p. 368. *Gærtn. De fruct.* 1.

p. 370. tab. 76. *De Cand. Prodr.* 3. p. 453. *Endl. Gen.* p. 947. n. 5165.

Ficoidea Dill. Nov. pl. gen. in app. ad Cat. pl. circa Giss. p. 159. t. 12.

Veslingia Fabr. Helm. p. 363.

Perigonium simplex, monosepalum, liberum, persistens, intus coloratum; tubo brevi, limbo quinquepartito, laciniis lanceolatis. Stamina plura, sinubus perigonii inserta, solitaria, vel per phalanges; filamentis capillaribus, antheris subrotundis, bilocularibus, incumben- tibus. Ovarium pentagonum. Stigmata quinque, crassa, sessilia. Capsula turbinata, pentagona, quinquelocularis, apice depressa, ibique per rimas quinque, radiatas dehiscens. Semina exigua, reniformia, tumidula, sulcis, striisque concentricis instructa.

Habitus. Plantæ annuæ, vel suffruticosæ, humiles, subinde papulosæ. Folia plana, carnosa, integerrima, opposita, vel alterna, sessilia. Flores terminales, et alares, sessiles, vel subsessiles. Perigonium intus albidum, subroseum, flaves- cens.

Ord. nat. Ut in Mesembryanthemo p. 174.

1. *Arizoon hispanicum*: papulosum, glabrum; caule erecto, ramis dichotomis; foliis lanceolatis; floribus solitariis, subpedunculatis.

A. hispanicum Sp. pl. p. 700. Gartn. De fruct. 1. p. 370. t. 76. Coll. Herb. Ped. 2. p. 511. n. 2. Ten. Nap. 4. p. 280. et Syll. p. 245. n. 1.* Guss. Pl. rar. p. 204.* De Cand. Pl. grass. t. 30., et Prodr. 3. p. 454. n. 3.*

Ficoidea hispanica, annua, folio longiore *Dill. Hort. Elth. 1. p. 143. t. 117. f. 143.*

Ital. Ficoide papulosa.

Ann. Habui ex Calabria ulteriore inter *Capo d'armi*, et *Capo Spartivento* ab Eq. Prof. TENORIO, et ab Eq. GUS- SONIO. Floret Aprili, Majo.

Radix fusiformis, gracilis. Caulis ascendens, vel erectus, teres, a pollice ad spithamam longus, alterne ramosus, ramis dichotomis, vel bifidis. Folia lanceolata, obtusa, integerrima, carnosula, nervo dorsali subcarinata, sessilia, plana, amplexicaulia, in caule primario alterna, sub ramorum dichotomiis opposita, ramea angustiora. Flores solitarii, brevissime pedunculati, alares,

et terminales. Perigonium extus viride, intus albidum, tubo campanulato, crasse nervoso, sulcato, nervis in limbi lacinias excurrentibus. Semina nigra, striis granulatis per arcus concentricos instructa. Tota planta glabra, tecta papulis diaphano-virescentibus, quæ per siccationem deplentur, et vesiculas vacuas sistunt.

SPIRÆA.

Lin. Gen. p. 253. Tourn. Inst. 3. t. 389. Juss. Gen. p. 339. Lamck. Ill. 5. t. 439. Vent. Tabl. 3. p. 351. Gærtn. De fruct. 1. p. 337. t. 69. Smith. Engl. Fl. 2. p. 366., et Gramm. t. 20. f. 260. De Cand. Prodr. 2. p. 541. Endl. Gen. p. 1247. n. 6391.

Ulmaria Tourn. Inst. 2. t. 141.

Filipendula Tourn. l. c. t. 150.

Calyx perianthium monophyllum, liberum, persistens, tubo brevi, campanulato, limbo quinquefido, lusu sex-octofido. Petala quinque, vel sex-octo, subrotunda, aut obovata, alternantia cum laciniiis calycinis, et inserta oræ externæ receptaculi discoidei tubum calycinum intus vestientis. Stamina viginti-plura, sita prope petala in ambitu receptaculi, duabus, vel pluribus seriebus, aut per phalanges disposita, filamentis capillaribus, antheris subrotundis, aut ovatis, bilocularibus, incumbentibus. Ovaria quinque, lusu duo-tria-duo-decim, sessilia, vel thecaphoro brevi suffulta. Stili recti, ascendentes, aut recurvi. Stigmata capitata. Capsulæ oblongæ, compressæ, liberæ, vel basi coalitæ, uniloculares, erectæ, aut contortæ, stilo persistente rostratæ, mono-oligospermæ, rarius polyspermæ, latere interno, et apice dehiscentes. Semina linearia, vel oblonga, suturæ affixa, pendula, aut ascendentia.

Habitus. Plantæ perennes, suffruticosæ, fruticosæ, inermes. Caulis simplex, vel alterne ramosus. Folia alterna, modo simplicia, integra, lobata, serrata, modo pinnatifida, interrupte pinnata, vel decomposita. Ludunt quoque basi stipulata, aut

Flor. Ital. T. V.

nuda. Flores corymbosi, cymosi, umbellati, paniculato-racemosi, subinde polygami, vel dioici. Petala alba, rosea.

Ord. nat. Pomaceæ Lin. Ord. nat. n. XXXVI., et Præl. p. 444. Rosaceæ Juss. Gen. p. 334. Smilh. Gramm. p. 171. Vent. Tabl. 3. p. 331. De Cand. Prodr. 2. p. 525. Rich. Famill. in Él. éd. 5. p. 216. Spireaceæ Barth. Ord. nat. p. 403. Schultz. Nat. syst. p. 506.

1. *SPIREA decumbens*: foliis obovato-cuneatis, basi integerrimis, superne duplicato-serratis; ramis teretibus; corymbis compositis; staminibus corollæ æqualibus.

S. decumbens Koch. in Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 6a. heft., et in Röhl. Deuts. Fl. 3. p. 433. Koch. Syn. p. 208.

S. flexuosa Reich. Exc. 3. p. 627. n. 4037. excl. syn. Cambess.

S. ulmifolia Suffr. Foroj. p. 146. ex loco, excl. syn. Scop.

Ital. *Spirea prugnolina*.

Suffrut. Habui ex montibus Forojuliensibus a Prof. BRIGNOLIO, ex monte Corname, et ex muro di Venzone, ubi Suffrenius, a Prof. MORETTO, ex monte Cerva prope Belunum a MONTINIO, ex montibus d' Agordo ab Eq. PAROLINIO, ex montibus Belunensibus versus Val di Fassa, inter Titer, et Primiero, in vicinis di Longaron, et in Val di Foldo inferiore a FACCHINIO. Floret Majo, Junio.

Caulis teres, decumbens, inferne repens, parce ramosus, palmaris-spithamalis, glaber, cortice fusce rubido. Rami alterni, teretes, striis, angulisque omnino carentes, e flavido rubescentes, subinde apice puberuli. Folia parva, alterna, obovato-cuneata, vel obverse lanceolata, basi integerrima, reliquo margine duplicato-serrata, obtusa, aut acuta, breviter petiolata, glabra, rarius puberula, subtus glauca. Corymbus terminalis, compositus, glaber, vel puberulus, nudus, aut interdum inferne folio bracteatus. Flores exigui. Lacinie calycine late ovatae, acutae, demum reflexae. Corolla alba, calyce paulo longior. Petala subrotunda, obtusa, vix lineam longa, ungue brevissimo. Stamina longitudine corollæ.

Spiræa ulmifolia Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 349. t. 22., cujus exemplar adeptus sum a Feriancichio, differt ab hac specie habitu robustiore, elatiore, caule tri-quadrupedali, erecto, valde ramoso, ramis angulatis, foliis,

floribusque duplo, et triplo grandioribus, staminibus corolla insigniter longioribus. *Spiræa flexuosa* Cambess. in Annal. des scienc. nat. 1. p. 265. t. 26. distinguitur a *Spiræa decumbente* Koch. caule quadripedali, ramis angulatis, sulcatis, flore triplo, et quadruplo grandiore, videturque planta Sibirica.

2. *SPIRÆA flabellata*: caule fruticoso, erecto; foliis inferioribus obovato-flabellatis, apice acute incis, superioribus obverse lanceolatis, tridentatis, integrisque; corymbis lateralibus, alternis, subsessilibus.

S. flabellata Bert. apud Guss. *Pl. rar. p.* 205. t. 40.* excl. syn. De Cand. *Ten. Nap. 4. p.* 282., et *Syll. p.* 246. n. 3., et in *App. p.* 603.

Oxyacantha angustifolia non spinosa. Hypericum fruticans Canad. Robini *Barrel. Ic.* 564. ex loco.

Ital. *Spiræa ventagliana*.

Frut. Habui ex Umbria in viciniis Spoletii, quo loco legerat Barrelierius, a Prof. MAURIO, ex Prætutiis in collibus prope Aquila ad S. Demetrium ab Eq. Gussone. Floret Majo, Junio.

Radix repens. Caules approximati, teretes, erecti, bicubitales, orgyales, alterne, et subinde verticillate ramosi, ramis virgatis, angulatis, junioribus puberulis, rubidis cum nebula cinerea. Folia breviter petiolata, subcoriacea, glabra, triplinervia, reticulato-venosa, venis pellucidis, supra late viridia, subtus glauca, inferiora latiora, obovato-flabellata, basi cuneata, et integerrima, apice triloba, lobis lateralibus latioribus, acute, inæqualiterque dentatis, medio integro, aut vix subdentato, multo minore, acuto, superiora obverse lanceolata, basi cuneata, vel tota integerrima, vel apice bi-tri-quinquedentata, subciliolata. Quæ folia prima prodeunt e gemmis propriis fasciculata, reliqua alterna. Corymbi parvi, simplices, sessiles, aut subsessiles, alterni, plerumque numerosissimi, approximati, siti in lateribus ramorum, et racemum longum quodammodo sistentes, e gemmula propria profecti, cujus squamæ supremæ foliaceæ, parvæ, lanceolatæ, integerrimæ, bractearum officio fungentes. Pedicelli, et calyces glabri. Flores admodum parvi. Tubus calycinus turbinatus, nervosus; limbi lacinie triangulares, acutæ, in fructu patentissimæ. Corolla alba, calyce duplo longior. Petala obovata, integerrima. Stamina corolla paulo breviora, incurva. Stili duo-quinque, erecti. Stigmata capitata.

Hæc est ipsamet planta, quam Barrelierius repererat prope Spoletium, neque ulla alia *Spirææ* species ibi occurrit. Auctores passim trahunt figuram Barrelierii ad *Spiræam hypericifoliam* L., quæ certissime differt, et planta Canadensis est. Hujus erroris causa fuit idem Barrelierius, qui perperam attulit ad plantam suam *Hypericum fruticans Canadense* Robini. Etiam *Spiræa crenata* Gouan. Ill. p. 31., sive *Spiræa hypericifolia* γ De Cand. Franç. 5. in add. p. 645. distat a specie nostra foliis multo minoribus, obovatis, obtusissimis, apiceque obtuse dentatis, umbellis sessilibus. Hæc nascitur in Hispania; possideo exemplar ejus lectum prope Victoriam ab Eq. Gussonio, qui dono dedit.

3. *SPIRÆA Aruncus*: foliis decompositis, foliolis ovatis, oblongisve, biserratis; racemo terminali, composito, densilloro; capsulis pendulis.

S. *Aruncus* Sp. pl. p. 702. Pall. Ross. 1. p. 39. t. 26. f. 1. 2. 3. Cambess. in Annal. des scienc. nat. tom. 1. p. 376. α. t. 15. f. 2. A-G. All. Ped. 2. p. 92. n. 1621. Balb. Taur. p. 81. Re Seg. p. 42., et Tor. 1. p. 263. Birol. Acon. 1. p. 169. Coll. Herb. Ped. 2. p. 299. n. 111. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 230. Comoll. Prodr. p. 96. Pollin. Ver. 2. p. 138. Suffr. Foroj. p. 146. Bert. Mant. pl. Fl. alp. Apuan. p. 31. n. 49. Sav. Bot. Etr. 1. p. 149.* De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 479., et Prodr. 2. p. 545. n. 29. α. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 434. Koch. Syn. p. 208. Reich. Exc. 3. p. 626. n. 4025. Host. Austr. 2. p. 16. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 350. Gaud. Helv. 3. p. 331.

Filipendula n. 1134. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 15.

Barba di capra Calz. Viag. di mont. Bald. p. 14.

Barba Capræ floribus oblongis Segui. Ver. 1. p. 465.

B. Capri Fuchs. Hist. pl. p. 181. fig.

B. Capræ Tragi et Fuchsii Camer. Hort. p. 26. t. 9.

Ital. Barba di capra Calz. l. c.

Perenn. Legi prope Genuam in sylvis di Serra di croce retro montem Fasce. Filius attulit ex Apennino Bononiensi alla Gata di Castiglione de' Pepoli, et in monte Barba bianca, unde accepi quoque a pharmacopola MATTHEJO. Herborarius noster pariter attulit ex monte Acuto Apennini Bononiensis. Habui Genuæ in monte della Guardia ad Porciferam a GRIOLETO, ex Liguria occidua in montibus retro Sestri di ponente a Prof. DE NOTARIS, ex agro Mediolanensi a Erba a PPR. BALSAMO-CRIVELLIO, et DE NOTARIS, ex Baldo a BARBIERIO, ex sylvaticis subalpinis montis Pastello

a MANGANOTTO, ex Tyroli Italico in umbrosis di *Fiemme*, et *Fassa* a FACCHINTO, ex montibus Bassanensibus a MONTINIO, ex sylvis convallium di *Roiano* prope Tergestum a TOMMASINIO, ex *Tambura* alpium Apuanarum a GUIDONIO, et ex *Pietra Pana* eamudem alpium a BOTARIO, ex Apennino Pistoriensi al *Pian della quercia*, et al *Teso* a Prof. PETRO SAVIO, et ab Eq. NARDUCCIO. Floret Majo, Junio.

Radix ramosa, crassa, lignosa. Caulis teres, fistulosus, erectus, tri-quadripedalis, parce ramosus, superne flexuosus, sæpe rubens. Folia ampla, petiolata, inferiora supradecomposita, vel decomposita, scilicet tripinnata, aut bipinnata, superiora bipinnata, vel pinnata. Foliola grandia, ovata, ovato-oblonga, aut lanceolata, breviter petiolulata, acuminata, argute biserrata, basi rotundata, vel subcordata, supra lato viridia, subtus pallidiora, impar plerumque majus, subinde bifidum, aut ternatum, foliolis intermedio lateralibus sessilibus. Petioli basi nodoso-incrassati, inferiores elongati. Stipulæ nullæ. Racemus spicæformis, compositus, grandis, terminalis, densiflorus præsertim in anthesi, pedunculatus, nutans, partialibus patentibus, sparsis, cylindraceis, simplicibus, vel basi subramosis, plerumque dioicus, subinde auctus racemis lateralibus in axillis supremis foliorum. Rachis, et fulcra pubescunt. Pedicelli brevissimi. Bractea linearis in pedicello, vel sub pedicello. Flores exigui, grato odori. Calyx campanulatus, albens cum virore levi, subinde apice rubellus, limbi laciniis lanceolatis, aut ovato-lanceolatis, acutis, patentibus. Receptaculum disceideum, calycem intus vestiens, margine crenatum, petaliferum, et staminiferum. Corolla alba, calyce longior. Petala oblongo-obovata, obtusa, integra, aut leviter emarginata, patentia, concaviuscula. Stamina alba, corolla multo longiora, filamentis capillaribus, antheris subrotundis, in flore fœmineo abortiva, calycique subæqualia. Ovaria tria-quinque, libera, oblonga, erecta. Stili breves, crassiusculi. Stigmata capitata. Capsulæ oblongæ, acutæ, nitidæ, pendulæ, mono-pentaspermiæ. Semina tenuia, linearia, longiuscula, utrinque attenuata, lævia, ferruginea. Herba glabra, foliis subinde subtus puberulis. Flores apibus grati, in sylvis speciosi.

4. *SEIRÆA Filipendula*: radice fasciculata, tuberibus fibra pendulis; foliis interrupte pinnatis, foliolis pinatifido-serratis; cyma nuda.

- S. *Filipendula* *Sp. pl.* p. 702. *Smith. Engl. Fl.* 2. p. 368.,
et Engl. bot. v. 4. t. 284. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 222.,
et in Fl. Lond. ed. Grav. v. 4. tab. 58. *Fl. Dan.* t. 635.
Svensk. bot. v. 3. t. 154. *Plenck. Ic. pl. med.* 4. p. 92.
 t. 399. *Cambess. in Annal. des scienc. nat.* 1. p. 378. a. β.
 t. 16. f. 1. A-G. *All. Ped.* 2. p. 92. n. 1622. *Balb. Taur.*
 p. 81. *Re Seg.* p. 42., *et Tor.* 1. p. 263. *Birol. Acon.* 1.
 p. 169. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 300. n. 12. *Nocc. et Balb.*
Tic. 1. p. 231., *et 385. Comoll. Prodr.* p. 96. *Pollin. Ver.* 2.
 p. 138. *Moric. Ven.* 1. p. 219. *Nacc. Ven.* 3. p. 65.* *Bert.*
Pl. Gen. p. 66., *et Amæn. Ital.* p. 154. n. 142. *Sav. Pis.* 1.
 p. 469., *et Bot. Etr.* 2. p. 110. *Sebast. et Maur. Fl. Rom.*
prodr. p. 176. *Ten. Nap.* 4. p. 282., *et Syll.* p. 245. n. 1.
Lamck. Ill. 5. t. 439. f. 1. *De Cand. Franç.* 4. part. 2.
 p. 478., *et Prodr.* 2. p. 546. n. 35. a. *Sturm. Deuts. Fl.* 1.
 abth. 18. heft. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3.
 p. 436. *Koch. Syn.* p. 208. *Reich. Exc.* 3. p. 626. n. 4028.
Host. Austr. 2. p. 16. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 350.
Gaud. Helv. 3. p. 333.
Filipendula n. 1136. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 56.
Filipendula Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 913. fig.
Filipendula Cæsalp. De pl. lib. 14. cap. 13. p. 551.
Enanthe del Fuchsio, chiamata da molti *Filipendula*
Pon. Mont. Bald. p. 11.
Filipendula vulgaris, an *Molon* *Plinii Zannich. Istor.*
 p. 101. t. 223. *Segui. Ver.* 1. p. 493.
Enanthe Fuchs. Hist. pl. p. 563. fig. p. 562.
Filipendula Dod. Pempt. p. 56. fig.
Ital. Erba peperina. Trina di Fiandra. Filipendola. Fi-
lipendula *Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 221.
Offic. Saxifragæ rubræ radix *Lin. Mat. med.* p. 83. n. 239.
Perenn. Frequens in pratis præsertim collinis, et mon-
 tanis Italiæ. Legi Genus al *Lagazzo*, Bononiæ agli
Arienti, a *Roncorio*, a *Gaibolla*, a *Zolla predosa*.
 Habui ex nemoribus Ticini prope *Buffalora* a PPrr.
 BALSAMO-CRIVELLIO, et DE NOTARIS, ex *Corno d'Avia-*
tico in districtu Bergomensi a RAINERO, Veronâ in
 sylva del *Mantico* a MANGANOTTO, ex Tyroli Italico
 in pratis di *Fiemme*, et *Fassa* a FACCHINIO, ex pratis
 circa Tergestum a TOMMASINIO, ex pratis ad Plavim
 a Prof. NACCARIO, ex collibus d'Angarano in districtu
 Bassanensi a MONTINIO, ex Piceno in Apennino di
Sernano ab Eq. NARDUCCIO, in monte *Regnolo* a Prof.
 OCTAVIANO, et a MARZIALETTO, in monte de' *Fiori*, et
 della *Sibilla* a Costa ricciatora ab eodem MARZIALETTO,

ex Apennino Lucensi ad Prato fiorito prope thermas, et ex Hetruria in monte Pisano a Prof. PETRO SAVIO, a Montegiovi in Mugello, a Radicondoli, et alla Sassetta in Maremma a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTO, ex Canino in agro Viterbiensi a Rev. Fratres MAURITIO DE BRIxia. Floret Majo, Junio.

Radix tubera filipendula, globosa, vel oblonga, extus nigrescentia, apice attenuata in fibram descendentem, filis tuberiferis crassiusculis, fasciculatis, longis, nigricantibus. Caulis erectus, terea, striatus, flexuosus, simplex, vel superne parce ramosus, ramis alternis, uni-bipedalis, et etiam paulo ultra. Folia interrupte pinnata, foliolis alternis, maioribus oblongis, pinnatifido-serratis, impari trifido, inferioribus gradatim decre-scentibus, inter inajora minimis pluribus, ramentaceis, inciso-serratis interpositis, radicalia cæspitosa, caulina alterna, remota; omnia sessilia, basi auriculata stipulis adnatis, foliaceis, semicordatis, serratis, amplexicaulibus. Cyma terminalis, nuda. Flores grandiusculi, acute, nec grate, odori. Calycis tubus brevissimus, campanulatus, leviter sulcatus; limbi laciniae sæpe sex, ovatae, aut oblongae, obtusae, cito retroflexae. Petala quinque-sex, alba, vel extus apice rubella, obverse oblongata, vel obverse lanceolata, obtusa, integra; calyce triplo, et quadruplo longiora. Stamina corollae subæqualia, filamentis capillaribus, albis, antheris oblongis, flavis. Ovaria octo-duodecim, hirta. Stili brevissimi, recurvi, supra canaliculati. Stigmata ovato-oblonga, albo-viridula, supra canaliculata. Capsulae tot, quot ovaria, in orbem positae, obtusae, erectae, mono-dispermiae, hirtae. Semina pendula. Herba glabra.

Usus. Ob vim astringentem radix laudata in leucorrhæa, et in dysenteria; nunc vix in usu.

5. *SPIRÆA Ulmaria*: foliis interrupte pinnatis, duplicato-serratis, subtus tomentosis, impari maximo, palmato; cyma nuda.

S. Ulmaria Sp. pl. p. 702. Smith. Engl. Fl. 2. p. 368., et Engl. bot. v. 14. t. 966: Curt. Lond. ed. Grav. v. 1. t. 63. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 222. Fl. Dan. t. 547. Svens. bot. v. 3. t. 189. Cambess. in Annal. des scienc. nat. tom. 1. p. 381. β. All. Ped. 2. p. 93. n. 1623. Balb. Taur. p. 81. Re Seg. p. 42., et Tor. 1. p. 263. Birol. Acon. 1. p. 169. Coll. Herb. Ped. 2. p. 300. n. 13. α. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 231., et 385. Comoll. Prodr. p. 97. Pollin. Ver. 2. p. 139. Suffr. Foroj. p. 146. Sav. Bot. Etr. 2. p. 110.

- De Cand. Franç. 4. part. 2. p. 478., et Prodr. 2. p. 545. n. 30. a. Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 18. heft. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 435. a. β. Koch. Syn. p. 208. β. Reich. Exc. 3. p. 626. n. 4026. a. β. Host. Austr. 2. p. 17. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 351. Gaud. Helv. 3. p. 332. Filipendula n. 1135. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 55. Ulmaria Zannich. Opusc. posth. p. 84. Regina prati Dod. Pempt. p. 57. fig. β foliis subtus denudatis.*
- Spiræa Ulmaria β De Cand. Prodr. 2. p. 545. n. 30. Coll. Herb. Ped. 2. p. 300. n. 13. β. Ten. Nap. 4. p. 282. B., et Syll. p. 245. n. 2. B.*
- S. Ulmaria a Cambess. in Annal. des scienc. nat. 1. p. 380. t. 16. f. 2. A-F. Koch. Syn. p. 208. a.*
- S. Ulmaria Nacc. Agg. p. 19.* et Fl. Ven. 3. p. 65.**
- S. Ulmaria var. Re Tor. 1. p. 263.*
- S. Ulmaria γ Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 436. Gaud. Helv. 3. p. 332. γ.*
- S. denudata Presl. Cechic. p. 101. Gust. Pl. rar. p. 207.* Reich. Exc. 3. p. 626. n. 4027.*
- Ital. Barba caprina. Regina de' Prati. Olmaria Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 221.*
- Offic. Ulmarie radix, herba Lin. Mat. med. p. 83. n. 240. Perenn. Habui ex oris lacus Cenisii a BONJEANNIO, ex viciniis Mediolani a PPrr. BALSAMO-CRIVELLIO, et DE NOTARIS, ex Tyroli Italico in Fiemme a FACCHINIO. Varietatem β accepi ex alpibus delle Vieussene in Liguria occidua a Prof. SASSIO, ex Tyroli meridionali a Pinè inter Fiemme, et Tridentum a FACCHINIO, ex ripis della Brenta in agro Bassanensi a MONTINIO, Fos-sà Clodià a S. Anna a Prof. NACCARIO, ex Piceno al Pizzo di Sivo ab ORSINO, ex Apennino Lucensi prope Sanctuarium S. Pelegriui a Prof. PETRO SAVIO, ex Calabria alla Sile ab Eq. GUSSONIO. Floret Junio.*
- Radix simplex, brevis, crassa, nigra, fibris multis capillata. Caulis erectus, angulatus, striatus, fistulosus, simplex, vel superne parce ramosus, bi-quadripedalis, glaber, in aprico purpurascens: Folia grandia, interrupte pinnata, foliolo impari amplo, palmato-trifido, vel quinquefido, segmentis ovatis, aut lanceolatis, acutis, vel acuminatis, basi sæpe subcordato, rarius subcuneato, foliolis lateralibus ovatis, ovato-lanceolatis, aut lanceolatis, acutis, vel acuminatis, basi subcuneatis, sessilibus, interstinctis foliolis exiguis, inæqualibus, ovatis, acutis, plerumque deorsum versis, inter pinnam,*

et pinnam sæpe pluribus. Cæterum folia duplicate argute serrata magis, vel minus profunde, supra glabra, atroviridia, subtus albo-tomentosa, tomento brevi, plus minus stipato, radicalia cæspitosa, petiolata, caulina alterna, sessilia, basi utrinque auriculata stipula foliacea, semicordata, acuminata, serrata, amplexicauli, subtus albo-tomentosa. Cyma terminalis, nuda, a duobus pollicibus ad semipedem longa, glabra, vel puberula, subinde polygama. Flores parvi, maleolentes. Calyx exiguus, tubo campanulato, puberulo, limbi laciniis ovatis, aut oblongis, acutis, demum retroflexis. Petala alba, obovata, obtusa, integra, triplinervia, ungue tenui, longiusculo, calyce multo longiora. Stamina corollam superantia, filamentis capillaribus, antheris exiguis, ovatis, luteolis. Ovaria quatuor-octo, oblonga, glabra. Stili staminibus, et corolla multo breviores, glabri. Stigmata crasse capitata, puberula. Capsula tot, quot ovaria, plures abortivæ, cæterum compressæ, acute carinatæ, incurvato-contortæ, glabræ, subdispermis. Semina pendula.

Exemplaria Anglica ex *Kingstom* ab *Woodsie* nunc in meo herbario sunt nostris simillima foliis subtus stipate albo-tomentosis.

In varietate β folia sunt utrinque virentia, et subtus denudata, scilicet glabra, aut nervis, venisque puberula, vel etiam tota superficie inferiore pubescentia, non tamen albo-tomentosa. Cyma pubescentior. In reliquis nulla diversitas a specie.

Usus. Planta olim adhibita in dysenteria, et in exanthematibus ob virtutem astringentem, et sudoriferam; nunc exoleta.

ORDO III. POLYGYNIA.

ROSA.

Lin. Gen. p. 254. Tourn. Inst. 3. t. 408. Juss. Gen. p. 335. Lamck. Ill. 5. t. 440. Vent. Tabl. 3. p. 338. Gærtn. De fruct. 1. p. 347. t. 73. Woods. in Trans. Lin. Soc. v. 12. par. 1. p. 173. Lindl. Monogr. p. XXXI. Smith. Engl. Fl. 2. p. 369. De Cand. Prodr. 2. p. 597. Endl. Gen. p. 1240. n. 6357.

Calyx perianthium adhærens, tubo urceolato, globoso, ellipsoideo, vel oblongo, limbo libero, quinquepartito, persistente, aut deciduo, laciniis simplicibus, vel alterne pinnatis, quinta semipinnata. Petala quinque, obcordata, patentia, ungue lato affixa oræ externæ fornicis receptacularis claudentis ostium tubi calycini. Stamina plurima, inserta fornici receptaculari prope petala, filamentis capillaribus, inæqualibus, antheris ovatis, bilocularibus, incumbentibus. Ovaria plura, intra uiceum calycinum abscondita, inter se distincta, villosa, vel glabra. Stili crassiusculi, singuli ex apice lateris interni ovarii proficiscentes; omnes fasciculati in columnam axilem, cylindraceam, liberi, vel coaliti, glabri, aut villosi, fornicem receptacularem perforantes, et plus minus superantes. Stigmata exerta, capitata, papillosa. Cynarhodium globosum, turbinatum, ovoideum, vel oblongum, maturitate pulposum, rubrum, purpurascens, aut nigrescens. Noces monospermæ, parvæ, numerosæ, gregarie, osseæ, oblongæ, angulatæ, villosæ, vel glabræ, receptaculo parietali, setoso insidentes.

Habitus. Frutices ramosi, erecti, aut prostrati, plus minus aculeati. Folia impari-pinnata, vix simplicia, sæpius decidua, foliolis subrotundis, oblongis, lanceolatis, simpliciter, vel duplicate serratis, subinde glandulosis. Petioli basi aucti stipula utrinque adnata, foliacea, plerumque dorso aculeolati, et setoso-glandulosi. Flores solitarii, fasciculati, corymbosi, grate odori, rarius maleolentes, vel inodori. Pedunculi, et calyces, glabri, aut hispido-glandulosi. Corolla alba, rosea, rubra, lutea, crocea.

Observ. Genus *Pomaceis* valde affine. Nam cynarhodium est veluti pomum uniloculare, polyspermium. Species *Rosarum* observentur vivæ, et in statu sylvestri, ut rite cognoscantur. Subdivisio generis a forma urcei calycinalis in anthesi hactenus facilior, et felicior; at forma cynarhodii nullimode certa.

Ord. nat. Senticosæ Lin. Ord. nat. n. XXXV., et Præl. p. 444. Rosacem Juss. Gen. p. 334. Smith. Gram. p. 171. Vent. Tabl. 3. p. 331. De Cand. Prodr. 2. p. 525. Rich. Famill. in Él. éd. 5. p. 216. Bartl. Ord. nat. p. 400. Schultz. Nat. syst. p. 509.

* *Urceo calycinali globoso.*

1. *Rosa spinosissima*: caule erecto, aculeis acicularibus, rectis, patentibus, retrorsisque; foliis parvis, obtusis, incurve serratis; floribus solitariis; laciniis calycinis simplicibus.

R. spinosissima Sp. pl. p. 705. Woods. in Trans. Lin. Soc. v. 12. par. 1. p. 178. a. Lindl. Mon. p. 50. a. Smith. Engl. Fl. 2. p. 375. a., et Engl. bot. v. 3. t. 187., et in Rees' s Cycl. v. 30. n. 9. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 226. a. Lawr. Collect. of Ros. tab. 19., et 48. Svens. bot. v. 8. t. 559. Jacq. Fragm. p. 79. t. 124. All. Ped. 2. p. 138. n. 1794. Re Seg. p. 42. Birol. Acon. 1. p. 170. Coll. Herb. Ped. 2. p. 339. n. 13. Pollin. Ver. 2. p. 141. Bert. fil. It. in Apenn. Bon. p. 14.* Host. Austr. 2. p. 27. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 353. n. 606. Gaud. Helv. 3. p. 338. a. R. spinosissima reversa Bot. regist. v. 5. tab. 431. aculeis retrorsis.*

R. pimpinellifolia Sp. pl. p. 703. Nouv. Duh. 7. p. 19. t. 16. f. 2. Roess. Ros. 1. n. 9. tab. 9., et tab. 15. fig. 2., et 2. n. 59. tab. 59. macrior. Bellard. App. in Acad. de Tur. an. 1790-1791. v. 5. p. 230. in herb. Balb., deest in herb. Bellard. Pollin. Hort. et prov. Ver. pl. nov. p. 14. Ten. Nap. 4. p. 284., et Syll. p. 246. n. 5. B. De Cand. Franc. 4. part. 2. p. 438. a. β., et Prodr. 2. p. 608. n. 54. a. Lois. Desl. Gall. 1. p. 294.,* et ed. 2. tom. 1. p. 358. a. β.* Ruhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 445. a. Koch. Syn. p. 222. a. β. Reich. Exc. 3. p. 612. n. 3948.*

R. pimpinellifolia Marieburgensis Red. Ros. 1. p. 83. fig.

R. pimpinellifolia pumila Red. Ros. 1. p. 85. fig. Pl. macr.

R. arvensis Fl. Dan. t. 398. evidenter, licet aculeis nimis tenuibus.

R. n. 1106. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 40.

R. campestris odorato flore Clus. Hist. pl. lib. 1. p. 116. fig. duplex.

Ital. Rosa di macchia. Rosa saltica Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 206. Caccabelli. Scarnizzi (fructus) Targ. Tozz. l. c.

Frut. Filius attulit ex Apennino Bononiensi al Cavone di Corno alla scala. Habui ex Apennino Liguriæ orientalis

ad S. Stephanum d' *Aveto* in sepibus a TURIO, ex monte *Pastello* provincie Veronensis a POLLINIO, ex Tyroli meridionali in montibus Roboretanis a FACCHINIO, ex montanis di *Valstagna* a MONTINIO, ex monte Majori Istriæ a BIASOLETTO, ex monte *Kokusch* districtus Tergestini a TOMMASINIO, ex Ducatu Parmensi a Prof. JANIO, ex Umbria in montibus *le Pettenelle*, et *Sasso Borghese*, et ex Piceno a *Capo di Tenna*, *Monte Priore*, *Pizzo*, et *Sibilla* a MARZIALETTO, et in *Vettore* ab ORSINO, ex Ducatu Lucensi a S. *Pelegriano* a Prof. PUCCINELLIO, ex Apennino Lucanis a GASPARRINIO. Floret Junio, Julio, citius in demissis.

Radix repens, caules plures, approximatos emittens. Caulis teres, erectus, alterne ramosus, semi-tripedalis, tectus cortice cinereo-rubido, modo aculeatissimus, modo parce aculeatus, et fere inermis: Aculei tenues, aciculares, recti, inæquales, patentissimi, et subinde retrorsi. Aculeis sæpe interjiciuntur setæ rigide, apice glandula terminatæ. Folia impari-pinnata, bi-quinquejuga, foliolis parvis, breviter petiolulatis, subrotundis, aut ellipticis, obtusis, argute, æqualiter, incurve serratis, vix una, alterave serratura biserrata, glabris, supra late, vel saturate viridibus, subtus pallentibus, imis minoribus. Petioli dorso parce aculeolati, vel setosi, cæterum glabri. Stipulæ adnatæ, lanceolato-lineares, acuminatæ, ciliato-glandulosæ. Pedunculi solitarii, uniflori, terminales, ebracteati. Urceus calycinus parvus, globulosus; limbi lacinie lanceolatæ, aut ovato-lanceolatæ, æquales, simplices, integerrimæ, acuminatæ, acumine non dilatato. Pedunculi, et calyces passim variant glabri, vel setoso-aculeati. Flores grate odori, magnitudinis variæ, nunc paulo, nunc duplo, et triplo longiores limbo calycino. Petala obcordata, alba, ungue passim luteo. Stamina corolla breviora, lutea. Ovaria sericeo-villosa. Stili breves, liberi, villosi, flexuosi, fere toti immersi. Stigmata exserta, subcapitata, lutescentia. Cynarhodium perfectum auctum, globosum, vel turbinatum, maturitate purpureo-nigrum.

2. Rosa *Eglanteria*: caule erecto, aculeis horizontalibus, basi compresso-dilatatis; foliolis ellipticis, duplicato-serratis, concavis; pedunculis, urceoque calycino inermibus.

R. *Eglanteria* Sp. pl. ed. 2. p. 703. excl. syn. Casp. Bauh., et Hall. Red. Ros. 1. p. 69. fig. opt. De Cand. Prodr. 2. p. 607. n. 49. a. Gaud. Helv. 3. p. 345. a.

R. foetida All. *Ped.* 2. p. 138. n. 1792. ex charact., et syn., sed deest exempl. in herb. All.

R. lutea Willd. *Sp. pl.* 2. par. 2. p. 1064. Smith. in *Rees's Cycl.* v. 30. n. 2. Woods. in *Trans. Lin. Soc.* v. 12. par. 1. p. 206. Lindl. *Mon.* p. 84. a. Curt. *Bot. mag.* t. 363. opt. *Lawr. Collect. of Ros.* tab. 12. *Birol. Acon.* 1. p. 170. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 341. n. 20. Nocc. et Balb. *Tic.* 1. in add. p. 408. Röhl. cum Mert. et Koch. *Deuts. Fl.* 3. p. 443. a. Koch. *Syn.* p. 222. a. Reich. *Exc.* 3. p. 612. n. 3947. a.

R. cerea Roess. *Ros.* n. 2. tab. 2.

Ital. *Rosa di cimice* Targ. Tozz. *Diz. bot.* 2. p. 204.

Frut. Habui ex Apulia in dumetis, et sepibus ad radices Vulturis a GASPARRINIO. Floret Majo.

Caules a radice vix repente plures, caespitosi, teretes, erecti, tripedales-orgyales, alterne ramosi, aculeati, glabri, sæpe rubidi. Aculei recti, aut fere recti, horizontalis, basi compresso-dilatati, e rubido lutescentes, sparsi, in caule juniore numerosissimi. Folia impari-pinnata, bi-quadrifida, foliolis ellipticis, acutis, plerumque leniter concavis, duplicato-serratis, supra atroviridibus, nitidulis, glabris, subtus pallentibus, et nervo, venisque pilosulis, fricatis inter digitos foetentibus. Serraturæ foliolorum glandulis stipitellatis terminatæ, nervus, et venæ eisdem glandulis plus minus adpersæ. Petioli hirtuli, vix glandulosi. Stipulæ adnatæ, lanceolatæ, acuminatæ, serrato-glandulosæ, margine revolutæ. Flores terminales, solitarii, vel pauci corymbosi, grandes, odore cimicino foetentes. Pedunculi potius breves, glabri, rarins adpersi setis apice glanduliferis, aut aculeolis, erecti, vel cernui, nudi, aut inferne instructi una, alterave bractea ovata, vel ovato-lanceolata, acuminata, ciliato-glandulosa, viridi. Urceus calycinus parvus, globosus, viridis, nitens, glaberrimus, rarius apice subhispidus; limbus foliaceus, tubo multo longior, extus plerumque hispidus, et glandulosus, laciniis ovato-lanceolatis, aut lanceolatis, longissime acuminato-caudatis, cauda apice paululum dilatata, intus, et margine lanuginosis, simplicibus, vel alternis parce, et angustissime pinnulatis. Petala grandia, obcordata, lutea. Stamina lutea, antheris sagittatis, obtusis. Pistilla sericeo-villosa. Stili inclusi, liberi, flexuosi. Stigmata exerta, atropurpurea. Cynarhodium maturum auctum, globosum, aurantiacum.

Linnaeus in Sp. pl. ed. 1. videtur confudisse synonyma hujus speciei cum illis *Rosæ rubiginosæ*; sed herbarium ejus demonstrat, *Rosam Eglanteriam* Sp. pl. ed. 2., et Fl. Suec. huic nostræ omnino respondere. Confer Smith. Engl. Fl. 2. p. 387. sub *Rosa rubiginosa*. *Rosa bicolor* Jacq. Hort. Vind. 1. p. 1. tab. 1. est lævis varietas *Rosæ Eglanteriæ*; sæpe enim vidi flores totos luteos occurrere in eodem caule cum floribus bicoloribus.

3. *Rosa pomifera*: caule erecto, aculeis horizontalibus; foliis ellipticis, duplicato-serratis, tomentosis; limbi calycini laciniis subsimplicibus; urceo calycino, cynarhodiiisque globosis, hispidis.

R. pomifera Smith. Engl. Fl. 2. p. 328. (in observ. ad *Rosam villosam*). Roess. Ros. n. 30. tab. 30. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 478. Koch. Syn. p. 220. Host. Austr. 2. p. 25.

R. villosa Smith. in Rees's Cycl. v. 30. n. 20. Lindl. Mon. p. 74. Fl. Dan. t. 1458. Red. Ros. 1. p. 67. fig. Nouv. Duh. 7. p. 44. t. 15. f. 1. All. Ped. 2. p. 138. n. 1795. Coll. Herb. Ped. 2. p. 340. n. 17. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 232., et 385. De Cand. Prodr. 2. p. 618. n. 95. β . Reich. Exc. 3. p. 615. n. 3974. Gaud. Helv. 3. p. 341. α . Schl. Pl. succ.* *R. n. 1105. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 40.*

R. pomo spinoso, folio hirsuto J. Bauh. Hist. pl. 2. lib. 14. p. 38. fig. bona.

β cynarhodio glabro, inermi.

Rosa villosa β De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 440. Gaud. Helv. 3. p. 341.

R. villosa α Lawr. Collect. of Ros. tab. 33.

R. villosa δ nuda De Cand. Prodr. 2. p. 618.

Ital. *Rosa pomifera*.

Frut. Habui ex Apennino Liguriæ orientalis ad S. Stephanum d'Aveto a TURIO, ex Cenisio prope il Morallet a BONJEANNIO, ex valle Macugnana prope Pestarenna a Prof. DE NOTARIS, ex Tyroli Italico a VIGO, et Campitello a FACCHINIO, ex Piceno in monte Regnola alla Macchia di Trocca a MARZIALETTO, et in Pizzo di Sivo ab ORSINO, ex valle Tiberina provinciæ Aretinæ ab AMIDEO, ex Apennino Pistoriensi al Teso a PPR. PETRO SAVIO, et PARLATORE. Varietatem β legi in cacumine montis Cornoviglia supra Calice in provincia Lunensi. Acepi ex Cenisio al Morallet a BONJEANNIO, ex Apennino Lucensi prope Tereglio, et ex Apennino Pistoriensi al Teso a Prof. PETRO SAVIO, ex pratis di Montenero supra Oliveto ab Eq. GUSSONIO. Floret Junio, Julio.

Caulis teres, erectus, ætate lignescens, et valde crassus, alterne ramosus, aculeatus, cortice trunci senioris cinereo, ramorum glauco-viridi, vel e glauco-viridi purpurascente, etiam bicubitalis, vel orgyalis. Aculei horizontales, recti, aut vix curvuli, sparsi, potius rari, fere æquales, basi compresso-dilatati. Folia impari-pinnata, pinnis duabus-quatuor. Foliola elliptica, aut elliptico-oblonga, interdum quoque ovata, obtusa, vel acuta, sæpe grandia, utrinque molliter cinereo-tomentosa, subinde supra nudiuscula, argute duplicato-serrata, serraturis apice glandulosis, grate olentia. Petioli tomentosi, dorso aculeolati, aculeolis aduncis, plus minus adpersi glandulis stipitellatis. Stipulæ adnatæ, acutæ, apicibus brevibus, divergentibus, ciliato-glandulosæ, extus tomentosæ, inferiores angustæ, supremæ paulo latiores. Flores terminales, solitarii, vel duos-quinque corymbosi, magnitudinis mediocris. Pedunculi ipso flore breviores, aculeati, setoso-glandulosi, subinde inferne instructi bractea ovata, seu potius folio simplicij, tomentoso præsertim extus, oiliato-glanduloso, fructiferi cernui. Urceus calycinus in anthesi parvus, magnitudinæ pisi, aut parum ultra, globosus, hispidus, setis discretis, patentibus, apice glanduliferis, demum rigescentibus, e viridi glaucescens, sæpe cum rubedine, peractis nuptiis paulatim auctus. Limbi calycini lacinia lanceolata, aut ovato-lanceolata, longe acuminato-caudata, cauda apice paululum dilatata, extus setoso-hirta, setis apice glanduliferis, reliqua parte, et præsertim margine tomentosæ, nunc omnes simplices, nunc alternæ anguste pinnulata, in fructu persistentes, et erecto-conniventes. Corolla saturate rosea, limbum calycis æquans, aut paulo superans. Petala obcordata, interdum basi ciliata. Stili inclusi, hirsuti. Cynarhodium perfectum magnitudine cerasi grossioris, globosum, nunc depressum, nunc collo arctatum, et inferne ventricosum, hispidum, setis rigidis, lutescentibus, discretis, apice glanduliferis, inter maturandum gilvo-luteum, maturum pulposum, saturate rubrum, demum nigrescens. Noces grandes, basi, dorso, et magis apice setosæ, reliqua parte glabræ.

Varietas β differt tantum cynarhodio iuermi, vix distinctione digna.

Plures auctores habent hanc speciem pro *Rosa villosa* L. Fl. Succ. ed. a. p. 463., et ipse Linnæus postea videtur

utramque simul conjunxisse in Sp. pl. edit. prima p. 491., et secunda p. 704. Verum *Rosa villosa* Fl. Suec., quæ respondet *Rosa molli* Engl. bot. v. 35. tab. 2459., est planta multo minor omnibus partibus. Conf. Smith. Engl. Fl. 2. p. 381. 382.

** *Urceo calycinali ellipsoideo, vel oblongo.*

4. *Rosa tomentosa*: erecta, aculeis horizontalibus, curvulis; folioliis ellipticis, duplicato-serratis, tomentosis; urceo calycino ellipsoideo, cynarhodioque oblongo hispidis.

R. tomentosa Smith. Engl. Fl. 2. p. 383., et Engl. bot. v. 14. t. 990., et in Rees's Cycl. v. 30. n. 39. Woods. in Trans. Lin. Soc. v. 12. par. 1. p. 197. a. Lindl. Mon. p. 77. a. excl. nonnull. syn. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 231. a., et Fl. Lond. edit. Grav. v. 4. t. 61. De Cand. Prodr. 2. p. 617. n. 91. a. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 474. Koch. Syn. p. 228. Reich. Exc. 3. p. 616. n. 3975. Host. Austr. 2. p. 21. Gaud. Helv. 3. p. 351. a. Schleich. Pl. sicca.*

R. villosa Svensk. bot. v. 5. t. 313. Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 18. heft. parum bene.

Ital. *Rosa vellutata*.

Frut. Habni ex Pedemontio in alpinis di Brey ab Eq. Prof. MORISIO, ex Tyroli meridionali in valle Anania prope Fondo, et ex Tyroli Italico in Fassa, Primiero, Tesino, et Costa di Vigo a FACCHINIO, a Montaloni a BAGGIATO. Floret Junio, Julio.

Simillima præcedenti, a qua differt hisce notis. Aculei curvuli, ad insertionem petioli subinde geminati. Foliola cinereo-tomentosa, sed interdum in facie superiore solummodo pilosa, tamen et viridi cinerea. Pedunculi hispido-glandulosi. Urceus calycinus in anthesi ellipsoideus, hispidus, quandoque subnudus, limbi lacinis alternis plerumque pinnulatis, rarius omnes simplices. Corolla potius grandis, pallide rosea. Cynarhodium maturitate insigniter auctum, oblongum, subinde curvum, rubro-corallinum, tandem fuscum, primo coronatum limbo calycino connivente, postea eodem decedente nudum. Nuces oblongæ, obtusæ, dorso villosæ.

5. *Rosa Heckeliana*: pumila; aculeis aduncis; folioliis parvis, subrotundis, subbiserratis, tomentosis, eglandulosis; urceo calycino ellipsoideo; cynarhodio globoso.

- R. Heckeliana *Trattin. Rosac. mon. tom. 2. p. 85. Ten. Nap. 4. p. 286., et Syll. p. 247. n. 11. De Cand. Prodr. 2. p. 624. n. 127.*
- R. Heckeliana *Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 572.**
- R. bradycarpa *Jan. El. p. 8. n. 44.**
- R. alpina, pumila, Montis Rosarum, Pimpinella fol. minor. ac rotundior. flore minimo livide rubente *Cap. Hort. Cath. p. 192.*
- Ital. *Rosellina molle.*
- Frut.* Habui ex Nebrodibus Siciliæ, ubi frequens, ab Eq. GussONIO, et a Prof. JANIO. Floret Junio, Julio.
- Fruticulus humilis, cortice fusco, vel fusco-cinereo, in ramulis e rubido purpurante. Aculei subulati, basi paulo dilatati, et compressi, leniter adunci, sparsi, subinde sub folio tres-quatuor, subverticillati. Folia impari-pinnata, pinnis duabus-tribus, foliolis parvis, subrotundis, obtusissimis, subbiserratis, serraturis nonnullis interdum apice glanduliferis, in utraque superficie molliter sericeo-tomentosis, cinereis, et omnino eglandulosis, nervo dorsali aculeolato. Petioli tomentosi, vix glandulosi, dorso aculeolati. Stipulæ adnatæ, oblongæ, latiusculæ, tomentosæ, crebre ciliato-glandulosæ, obtusæ, vel acutæ, apicibus divergentibus. Flores parvi, solitarii, terminales, suffulti pedunculo brevi, villosi, et quandoque plus minus hispidoglandulosi. Urcus calycinus exiguus, in anthesi ellipsoideus, glaber, inermis, vel subhispidoglandulosus; limbi laciniæ tomentosæ, extus et margine subinde hispidoglandulosæ, alternæ pinnulatæ, omnium caudis apice quidquam dilatatis, et ciliato-glandulosis. Petala rosea, margine barbata. Cynarhodium maturitate globosum, subinermis. Folia, et pedunculi interdum plus minus denudantur. Planta nec odora, nec viscosa.
6. *Rosa glutinosa*: caule erecto, aculeis falcatis, compresso-dilatatis; foliolis parvis, subrotundis, ovatisve, duplicato-serratis, subvillosis, subtus crebre, supra subglandulosis.
- R. glutinosa *Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 348., et Fl. Græc. 5. p. 66. t. 482. Lindl. Mon. p. 95. Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 573.* et Sup. 1. p. 155.* pl. villosior.*
- R. rubiginosa *Guss. Sup. 1. p. 56.* pl. minus villosa.*
- R. cretica, montana, foliis subrotundis glutinosis et villosis *Tourn. Corol. p. 43.*
- Ital. *Rosellina vischiosa.*
- Flor. Ital. T. V.*

Frut. Habui ex *la Pizzuta* prope Panormum ab Eq. GUS-
SONIO, et a Prof. PARLATORE, ex Phœnicusa ab Eq. GUS-
SONIO. Floret Majo, Junio.

Caulis erectus, glaber, aculeis validis, falcatis, basi com-
presso-dilatatis, numerosis, sparsis, interdum sub folio
pluribus, subverticillatis. Ramuli juniores ludunt pu-
bescentes, vel glabri. Folia impari-pinnata, pinnis dua-
bus-tribus. Foliola parva, subrotunda, obtusissima,
vel ovata, acuta, serrato-serrata, utrinque magis, vel
minus villosa, supra e viridi glaucescentia, parce, vel
nullimode glandulosa, subtus cinerea, et crebre glan-
dulosa. Petioli pubescentes, hispido-glandulosi, dorso
aculeolati. Stipulae latiusculæ, apicibus divergentibus,
acutis, more foliorum glandulosæ. Pedunculi solitarii,
brevissimi, hirtoglandulosi, subinde cernui. Urceus
calycinus in anthesi ellipsoideus, hispidus, vel glaber;
limbi laciniæ extus glandulosæ, alternæ pinnulatæ, pin-
nulis modo paucis, modo numerosioribus. Corolla par-
va, pallide carnea. Cynarhodium maturum globosum
aut ellipsoideum, hispidum, vel inerme, coccineum,
limbo calycino persistente coronatum. Planta viscida,
fœtens.

Rosa rubiginosa cretica Red. Ros. 1. p. 125. tab. profecto
non refert hanc speciem, cum sit omnibus partibus
multo grandior, et gaudeat serraturis foliorum simpli-
cibus.

7. *Rosa Seraphini*: caule erecto, aculeis falcatis, com-
presso-dilatatis; foliolis parvis, subrotundis, serrato-
-serratis, subtus, serraturisque glandulosis, supra gla-
bris; urceo calycino ellipsoideo; cynarhodio subgloboso.

R. Seraphini Viv. *Fl. Cors. diagn.* p. 8.* et *Nov. spec.*
dign. in calce Fl. Libyc. p. 67.* *Guss. Fl. Sic. prodr.* 1.
p. 574.* *De Sal. in Bot. zeit. ann.* 1834. p. 52.

R. parvifolia Sang. *Cent.* p. 70.* herb.

R. rubiginosa Moris. *Stirp. Sard. et. fasc.* 1. p. 18.*

R. sicula Trattin. *Rosac. mon. tom.* 2. p. 86.

R. alpina hircina Pimpinellæ folio, iucarnato parvo flore
Cup. Sup. alt. p. 78.

Ital. Rosellina bituminosa.

Frut. Habui ex Ducatu Lucensi a Pontito, a Verno, et
a Monte Fegatese a Prof. PUCCINELLIO, et al Prato
forito prope thermas Lucenses a Prof. PETRO SAVIO,
ex Nebrodibus Siciliæ ab Eq. GUSSONIO, et a Prof. PAR-
LATORE, ex Sardinia ab Eq. Prof. MORISIO, ex Corsica
in monte Coscione ab Eq. Prof. VIVIANIO, tum inter

Quenza, et Coscione, et al Forte Rizzardina a SERRAFINIO. Floret Majo, Junio.

Caulis teres, erectus, senescens crassus, lignosus, firmus, cinereus, ramis virentibus, aut viridi-rubentibus, bi-tripedsilis. Aculei validi, falcati, basi valde dilatati, et compressi, juniores e flavo rubidi, seniores albentes, sparsi, ad folia subinde geminati, aut tres-quatuor subverticillati, in ramis tenuiores. Folia impari-pinnata, pinnis duabus-tribus. Foliola parva, subrotunda, obtusa, vel acuta, sæpe basi quidquam angustata, argute serrato-serrata, serraturis apice glandulosis, supra atroviridia, nitida, glabra, eglandulosa, subtus pallentia, et valde glandulosa, nervo aculeolata, subinde nervo, et venis pilosula. Petioli pilosi, vel glabri, glandulosi, dorso aculeolati. Stipulae adnatæ, acutæ, apicibus divergentibus, margine ciliato-glandulosæ, inferiores angustiores. Flores parvi, in alabastro extus rubri, explicati albi, albo-carnei, vel saturate rubri, noctu, et in umbra leviter, grateque olentes, sub sole inodori, solitarii, aut duo-tres corymbosi, suffulti pedunculo brevissimo, glabro, vel piloso, et setoso-glanduloso, erecto, aut cernuo, interdum basi instructo una, alterave bractea lanceolata, acuminata, ciliato-glandulosa. Urcus calycinus exiguus, ellipsoideus, et subinde oblongus, inermis, glaber, vel glandulis stipitellatis scatens; limbi lacinia lanceolata, aut ovato-lanceolata, acuminato-caudata, cauda apice non, aut parum dilatata, intus, et margine pubescentes, extus glandulosæ, alternæ numerose pinnulatæ, pinnulis serratis, et ciliato-glandulosis. Petala emarginata, basi lutescentia. Stili inclinsi, liberi, glabri, vel pilosi, aut uno, alterove pilo ad geniculum medium solummodo instructi. Stigmata vix exserta. Cynarhodium maturum turgens, ex ovoideo subglobosum, inerme, glabrum, rarius glandulosum, rubro-corallinum. Nuges albo-barbatæ. Glandulae omnes diaphanæ, sæpe rubellæ, ætate opacæ. Folia unctuosæ, glutinosa, bitumen graveolentia.

8. *Rosa pustulosa*: erecta; aculeis aduncis, compresso-dilatatis; ramulis stipate aculeato-muricatis, nudisve; foliolis ovatis, obtusis, serrato-serratis, glabris, utrinque crebre glandulosis; urceo calycino, cynarodioque ovoideis, inermibus.

R. pulverulenta Ten. *Nap. 4. p. 287.**, et *Syll. app. p. 537.**
*Guss. Fl. Sic. prod. 1. p. 575.**, et *Sup. 1. p. 156.** non Marsh.

Ital. *Rosa pustulosa*.

Frut. Habui ex editiori Apennino Lucanæ a GASPARRINIO, ex Sicilia a *Busambra*, et in *Monte delle rose* ab Eq. GUSSONIO. Floret Junio, Julio.

Caulis erectus, humilis, cortice fusco-einereo, in ramulis rubescente. Aculei caulini adunci, basi compresso-dilatati, sparsi, ad folia, et ramos subinde terni-quaterni, subverticillati. Ramuli sæpe muricati aculeolis, strigisque brevissimis, numerosissimis, stipatis, tenuibus, patentibus, apice nudis, vel glandula terminatis, interdum vero inermes. Folia impari-pinnata, pinnis duabus-tribus. Foliola ovato-elliptica, vel quæ minora subrotunda, obtusa, serrato-serrata, in utraque superficie, et in apice serraturarum creberrime glandulosa, cæterum glabra, aut supra in parte media, subtus in nervo, veisque pilosa. Glandulæ in pagina inferiore foliolorum numerosiores. Petioli pilosi, vel pubescentes, setoso-glandulosi, subtus aculeolati. Stipulæ adnatæ, potius latæ, oblongæ, acutæ, undique, aut subtus, et margine glandulosæ. Flores solitarii, terminales, suffulti pedunculo brevissimo, glabro, aut hispidulo, interdum basi aucto una, vel duabus bracteis, ovato-oblongis, integris, aut acute bifidis, dorso, et margine glandulosi. Urceus calycinus ovoides, glaber, inermis; ludit hispidulus. Limbi laciniæ simplices, vel alternæ vix pinnula lineari auctæ, ovato-lanceolatæ, longe acuminatæ, intus villosæ, extus hispidulæ, et glandulis stipitellatis tum hic, tum margine plus minus adspersæ, in fructu persistentes, conniventes, subinde rubescentes. Corolla saturate rosea. Stili hirsuti, inclusi. Stigmata vix exerta. Cynarhodium maturum grandiusculum, ovoideum, apice contractum, ruberrimum, nitens, pulposum, plerumque glabrum, et inerme.

Rosa pulverulenta Marsh. ab Biebst. Cauc. t. p. 399. differt aculeis caulibus validis, rectiusculis, rameis intermixtis setis numerosis, debilibus, apice glanduliferis, foliolis ovatis, acutis, potius pilosis, flore involucreto foliis circiter quatuor, approximatis, horizontalibus, patentibus, urceo calycino subrotundo, limbi laciniis alternis numerosè pinnulatis, corolla pallide rosea. Confer descriptionem ejus a Lyellio datam in Lindl. Mon. p. 93. Etiam Prof. Janius, qui vidit exemplaria plantæ Marshallianæ, confirmavit per litteras diversitatem ejus.

9. *Rosa rubiginosa* : erecta ; aculeis aduncis ; compresso-dilatatis ; foliolis ovatis , serrato-serratis , subtus , serraturisque glandulosis ; pedunculis , urceoque calycino ellipticoideo hispidis , limbi laciniis alterne pinnulatis ; stilibus subexsertis .

R. rubiginosa Mant. alt. p. 564. Smith. Engl. Fl. 2. p. 385., et Engl. bot. v. 14. t. 991., et in Rees's Cycl. v. 30. n. 34. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 234., et Fl. Lond. ed. Grav. v. 4. tab. 62. excl. fig. 10. Lindl. Mon. p. 86. α. Jacq. Austr. 1. p. 31. tab. 50. Nouv. Duh. 7. p. 46. t. 7. f. 1. All. Ped. 2. p. 140. n. 1803. herb. Balb. Taur. p. 82. Birol. Acon. 1. p. 171. Coll. Herb. Ped. 2. p. 341. n. 21. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 233., et 386. Spad. Xil. 3. p. 75. Sav. Mat. med. p. 7. tab. 27.,* et Tratt. degli alb. ed. 2. tom. 1. p. 189.,* et Fl. Ital. 1. p. 101. tab. 35. fig. 1.,* et Bot. Etr. 4. p. 108.* Fior. in Giorn. de' Lett. Pis. 1828. tom. 17. p. 121. Ten. Nap. 4. p. 287., et Syll. p. 247. A. B. De Cand. Franc. 4. par. 2. p. 445., et 5. p. 535. β., et Prod. 2. p. 615. n. 35. α. excl. syn. Sav. Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 18. heft. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 472. Koch. Syn. p. 227. Reich. Exc. 3. p. 617. n. 3982. Host. Austr. 2. p. 20. Gaud. Helv. 3. p. 353. α. γ. excl. syn. Sav.

R. Polliniosa Pollin. Hort. et prov. Ver. pl. nov. p. 13. quoad caulem primarium , et locum natalem , exclusis reliquis omnibus .

R. dumetorum Sang. Cent. p. 70.* herb.

R. suavifolia Fl. Dan. tab. 870.

R. Eglanteria Woods. in Trans. Lin. Soc. v. 12. par. 1. p. 206. Svens. bot. v. 7. t. 46.

R. n. 1103. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 39.

β pedunculis , urceoque calycino glabris .

Rosa rubiginosa flore albo Pollin. Viag. al lag. di Gard. p. 18., et 89.*

R. rubiginosa sepium Sav. Fl. Ital. 1. p. 103. tab. 35. f. 2.,* et Bot. Etr. 4. p. 109.* Fior. in Giorn. de' Lett. Pis. 1828. tom. 17. p. 121.* De Cand. Prodr. 2. p. 617.

R. rubiginosa C Ten. Syll. p. 247.

R. rubiginosa η Lindl. Mon. p. 88.

R. agrestis Sav. Pis. 1. p. 475.,* et Mat. med. p. 7. tab. 27.,* et Tratt. degli alb. ed. 2. tom. 1. p. 190.* Pollin. Ver. 2. p. 144. t. 2. f. 4.* Barb. Agg. p. 35. Spad. Xil. 3. p. 83.

R. systila Sang. Cent. p. 71.* herb.

R. sepium Engl. bot. sup. v. 1. t. 2653. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 235. Nouv. Duh. 7. p. 47. t. 11. f. 2. Re Ad Fl. Ped. app. p. 23., et Tor. 1. p. 265. Thuil. Paris. ed. 2. p. 252. De Cand. Franc. 5. p. 538.

R. sepium rosea Red. Ros. 2. p. 61. fig. fl. carneo.

R. sepium myrtifolia Red. Ros. 3. p. 51. fig. pl. macrior. fl. albo.

Ital. *Rosa di siepe*. *Rosa balsamina*.

Frut. Habui ex Apennino Liguriæ orientalis ad S. Stephanum d'Aveto a TURIO, ex districtu Veronensi in via, qua ex i Pontoni della Pilarola itur ad pagum Brentino, ubi hæc sola species nascitur, et ubi Pollinius indicat *Rosam Pollinianam*, a FACCHINIO, ex Tyroli meridionali in valle Anania a Randena, al Col dal vent, a Fenesien supra Bolzano, et ex Tyroli Italico a Capriana, Val Florianæ, Fiano, Cor supra Nova-italiana ab eodem FACCHINIO, ex sylvis della Rea di Campese prope sepulchrum Teophili Folenghii, vulgo Merlini Coccaji poetæ jocosæ, a MONTINIO, ex saxosis calcariis del Carso, ex monte Spaccato, ex sylva Farnedo, et ex dumetis circa Tergestum a TOMMASINIO, ex monte Pisano ab Eq. Prof. SAVIO. Varietas β copiosior in sepibus, et sylvis totius Italiæ. Legi Sarzanæ in sepibus, in Liguria orientali in montibus del Bracco, Bononiæ in sylvis di Zolla Predosa. Habui ex Apennino Bononiensi prope Loiano ab illustri PRINCIPIS VIDIU PRINCIPIS LUCIANI BONAPARTE, ex Apennino Liguriæ orientalis alle Giare a TURIO, ex collibus Liguriæ occidentis a BADAROO, ex Cenisio al Morallet Segusium versus a BONJEANNIO, ex sepibus Veronensibus, et præsertim ex sylva del Mantico a POLLINIO, et a MANGANOTTO, ex Tyroli Italico in Fiemme, et Fassa a FACCHINIO, ex districtu Bassanensi in dumetis di Nossellari, in sylvis S. Michaelis d'Angarano, di Campese, et Monte Groso a MONTINIO, ex pineto S. Vitalis prope Ravennam a BUBANIO, ex agro Maceratensi in sylva Bandini ab Eq. NARDUCCIO, ex valle Canetra in Nursinis a Prof. OCTAVIANO, et ab ORSINO, ex sepibus agri Pisani a Prof. PETRO SAVIO, ex monte Giovi in Mugello, ex dumetis agri Florentini, et ex le Salairole a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, Tibure a FIORINIA-MAZZANTIA, et ab ORSINO, ex Lucania a Castelgrande a GASPARRINIO, ex Calabria alla Sile ab Eq. GUSSONIO. Floret Majo, Junio.

Caulis teres, glaber, dum brevior erectus, dum elongatus declinans, et magno arcu nutans, a duobus, tribusve pedibus ad unam, vel duas orgyas longus, alterne ramosus, ramis patulis, ipsis quoque sæpe nutantibus, adpersus aculeis inæqualibus, majoribus

validis, aduncis, basi insigniter compresso-dilatatis, reliquis tenuioribus, plerumque levius aduncis, omnibus in statu juniore e viridi rubentibus, senio dealbatis. Folia impari-pinnata, pinnis duabus-tribus. Foliola ovata, aut subrotundo-ovata, rarius ovato-lanceolata, magnitudine varia, sed passim quam in sequente minor, acuta, vel acuminata, serrato-serrata, serraturis apice glanduliferis, basi rotundata, et integra, quandoque etiam angustata, supra saturate viridia, nitentia, subrugosa, glabra, et subinde quidquam unctiosa, subtus pallentia, crebre glandulosa, terebinthinam grate olentia etiam aliqua distantia, præsertim vero si digitis fricentur, plus minus pubescentia saltem nervo, et venis, plana, vel conduplicata. Petioli pubescentes, glandulosi, dorso aculeolati. Stipulæ adnatæ, margine, sæpe etiam dorso glandulosæ, planæ, vel orâ revolutæ, inferiores angustiores. Flores terminales, solitarii, vel duo-septem corymbosi, medioeris magnitudinis, in umbra leviter, et grate olentes. Pedunculi hispido-glandulosi, sæpe inferne instructi una, alterave bractea, ovato-lanceolata, acuminata, ciliato-glandulosa. Urcus calycinus ellipsoidens, nunc totus, nunc inferne tantum hispido-glandulosus; ludit quoque totus glaber; limbi laciniæ alternæ pluripinnulatæ, facie interna pubescentes, margine ciliato-glandulosæ. Petala carneo-rosea, vel alba, obcordata. Fornix receptacularis claudens ostium tubi calycini conicus, albus, ora subinde rubente. Stamina flava. Stili liberi, pilosi, aut glabri, flavidi, flexuosi, inclusi, vel apice brevi tractu, sive ab ultima flexura exerti. Stigmata papillosa, ad oram sæpe rubella. Cynarhodium inter maturandum lutescens, paulatim luteo-miniaceum, maturum rubro-corallinum, pulposum, pulpâ croceâ, acidâ, turgens, ovoideo-subglobosum, vel ovoideo-oblongum, et utrinque arctatum; senio nigrescit, et limbum calycinum coronantem amittit; maturat Septembri. Noces decem-viginti. Glandulæ omnes stipitellatæ, albo-diaphanæ, vel rubellæ, siccando luteolæ, et demum fusæ.

Varietas β differt pedunculis, calycibusque omnino glabris. In hac foliola plerumque sunt basi angustata.

Rosa rubiginosa Law. Collect. of Ros. tab. 41. 65. 72. 74. pertinet ad plantas cultas ludentes flore pleno.

Diligentissimus Facchinus misit ad me speciem hanc lectam a se ad radices Baldi in via, quæ ex i Pontoni

della *Pilarola* ducit ad pagum *Brentino*, et monuit, hanc solam ibi reperiri; cumque Pollinius ibidem indicaverit *Rosam Pollinianam* suam, hæc debuisset respondere *Rosæ rubiginosæ* L., et respondet profecto quoad caulem tripedalem-orgyalem, et locum natalem, non vero in reliquis, quæ desumpta fuerunt a *Rosa pumila*, ut mox videbimus.

10. *Rosa collina*: erecta; aculeis aduncis, compresso-dilatatis; foliolis ovatis, pubescentibus, subbiserratis, eglandulosis; pedunculis, calycibusque glabris, limbi laciniis alternis pinnulatis; stilibus inclusis, apice hirsutis. *R. collina* Willd. *Sp. pl.* 2. par. 2. p. 1078. *Jacq. Austr.* 2. p. 58. t. 197. optima. *All. Ped.* 2. p. 140. n. 1801. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 343. n. 25. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 234. et 386. *Pollin. Ver.* 2. p. 146. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 286.* *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 34. heft. *Reich. Exc.* 3. p. 620. n. 3996. *Host. Austr.* 2. p. 22. *Schleich. Pl. sicc.**
R. canina β *collina* Gaud. *Helv.* 3. p. 350.
R. dumetorum Ten. *Nap.* 4. p. 286., et *Syll.* p. 247. n. 10.
R. viscosa Jan. *El.* p. 8. n. 45.* *Guss. Sup.* 1. p. 156.
R. leucantha Red. *Ros.* 1. p. 129. fig.

Ital. *Rosa cenericcia*.

Frut. Valde copiosa in sylvis, et sepibus collium Bononiensium, ubi legi *alle Grotte*, *agli Arienti*, a *Monte Paderno*, a *Zolla predosa*, a *S. Lorenzo in collina*. Habui ex Pedemontio ad thermas Valderias prope fontem S. Joannis a BERTERO, ex agro Mantuano a BINBIANELLO a BABRIERIO, ex districtu Veronensi in colibus S. Leonardi a MANGANOTTO, ex Tyroli Italico in *Fiemme*, et *Fassa* a FACCHINIO, ex sepibus Bassanensibus a MONTINIO, ex Piceno prope *Montefortino al Campo di Marte* a MARZIALETTO, in montibus *della Sibilla* a *Fossa Medica*, ex Prætutiis in oris Fucini, et a *Rocca di mezzo* ab ORSINO, Interamunā a FIORINIA-MAZEANTIA, Reate denuo ab ORSINO, ex Etruria a *S. Felice* a EMA a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, ex viciniis Romæ, ubi communis, a Prof. MAURIO, ex Nebrodibus a PPrr. JANIO, et PARLATORE. Floret Majo, Junio.

Caulis ut in præcedente. Aculei pariter similes, interdum subverticillato-terni. Folia impari-pinnata, pinnis duabus-tribus. Foliola ovata, sæpe late, acuta, aut acuminata, modo simpliciter serrata, modo subbiserrata, seu una, alterave serratura majori

in sculpta serratura minori, serraturis puncto glandulari rubello, demum fusco plerumque terminatis, cinereo-pubescentia, supra tamen viridiora, et subrugosa, subtus pallidiora, et passim densius pubescentia, quandoque ludant solummodo villosa in nervo, et venis, reliqua parte glabrescunt, aut subpilosa, superficie eglandulosa, aut solum nervo setulas breves apice glanduliferas ferentia, inodora, licet digitis fricentur. Petioli villosi, vel pubescentes, vix una, alterave seta apice glandulifera adpersi, dorso aculeolati. Stipulae adnatae, potius latae praesertim superiores, acuminatae, margine pilosae, et glandulosae, planae, vel ora subrevolutae. Flores terminales, modo plures tres-octo, corymbosi, modo solitarii, vel gemini, in alabastro extus saturate rosei, explicati carnei, vel albi, magnitudine varii, scilicet a diametro pollicari ad bipollicarem, in umbra leviter, suaveque olentes. Pedunculi glabri, virides, raro hispidi, subinde inferne instructi bracteis ovato-lanceolatis, acuminatis, margine pilosis, et glandulosis. Urcus calycinus ovoideo-oblongus, glaber, raro adpersus setis apice glanduliferis; limbi lacinae alternae pluripinnulae, pinnulis lanceolato-linearibus, omnes longae, villosae, in anthesi retroflexae, in fructu deciduae. Petala obcordata. Fornix receptacularis claudens ostium tubi calycini conicus. Stili inclusi, flexuosi, aut saltem in medio geniculati, apice prope stigma hirsuti, vel pilosi, pilis patulis, reliqua parte adpresse pilosi, aut glabri. Stigmata exserta, pilis stilorum interstincta, papillosa, viridi-fuscula, ora plerumque rubella. Cynarhodium ovoideo-oblongum, vel utrinque, vel collo angustatum, interdum vero subglobosum, inter maturandum flavescens, maturitati proximum flavo-miniaceum, maturum rubro-coralinum, pulposum, molle, pulpa crocea, acida, superficie ejus interna villosa. Maturat septembri. Noces viginti-vigintiquinque, semiovatae, scatentes villo albo, diaphano, demum sordido, et facile diffuso. Herba prorsus inodora, quandoque viscidula.

Cave, ne ex lusibus hujus plantae condas falsas species, vel fuitiles varietates in confusionem scientiae.

11. *Rosa canina*: erecta, glaberrima; aculeis aduncis, compresso-dilatatis; folioli ovatis, oblongiave, subbi-serratis, levissimis, nitidis; limbi calycini laciniis alternis angustissime pinnulatis; stilibus inclusis, apice hirsutis; cynarodiis elongatis.

- R. canina* *Sp. pl.* p. 704. *Smith. Engl. Fl.* 2. p. 394., et *Engl. bot.* v. 14. t. 992. optima., et in *Rees's Cycl.* v. 30. n. 40. *Curt. Lond. ed. Grav.* v. 1. tab. 64. *Woods. in Trans. Lin. Soc.* v. 12. par. 1. p. 223. *a. Lindl. Mon.* p. 98. *a. excl. nonnull. syn. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 235. a. Lawr. Collect. of Ros. tab. 81. fl. carneo. Fl. Dan. t. 555. a. Roess. Ros. n. 21. tab. 21., et n. 29. tab. 29. Plenck. Ic. pl. med. 5. p. 12. t. 404. Nouv. Duh. 7. p. 48. t. 11. f. 1. All. Ped. 2. p. 139. n. 1799. Balb. Taur. p. 82. Re Seg. p. 42., et Tor. 1. p. 266. Birol. Acon. 1. p. 171. Coll. Herb. Ped. 2. p. 342. n. 24. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 234., et 386. Comoll. Prodr. p. 98. *Langf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec. 2. t. 10. p. 287. Pollin. Ver. 2. p. 145. excl. β. Ruch. Ven. p. 124. Moric. Ven. 1. p. 221. Nacc. Ven. 3. p. 66. Suffr. Foroj. p. 146. Spad. Xil. 3. p. 194. Ors. in Cap. Opusc. p. 286.* Sav. Pis. 1. p. 274., et Mat. med. p. 7. tab. 27. bona, et Tratt. degli alb. ed. 2. tom. 1. p. 189., et Bot. Etr. 4. p. 108. (forte mixta cum *Rosa collina*). Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 171.* Ten. Nap. 4. p. 286., et Syll. p. 247. n. 9. A. B. Ab Ucr. Hort. Pan. p. 213. Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 576., et Sup. 1. p. 156.* De Cand. Franc. 4. par. 2. p. 447. *a.*, et 5. p. 538., et Prod. 2. p. 613. n. 75. *a. Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 18. heft., parum bene. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 463. a. Koch. Syn. p. 226. a. Reich. Exc. 3. p. 620. n. 3999. Host. Austr. 2. p. 23. Gaud. Helv. 3. p. 349. a.***
- R. Swartzii* *Svens. bot. v. 8. t. 541.*
- R. n. 1101. Hull. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 38.*
- Ital. *Ballerini. Caccabelli. Capponi. Scarnigi* (fructus). *Cino. Cinosbato. Rosa canina. Rosa di macchia. Rosselline di pruni. Rovo canino. Spina di cane* Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 203.
- Offic. *Rosa sylvestris flores, cynosbati* (fructus), *bedeguar* (nidus insecti) *Lin. Mat. med. p. 84. n. 241. γ.*
- Frut. Vulgaris* in vepretis Italix. Legi Sarzanæ in sepibus, Bononiæ in sylvis al Sasso, et a Zolla Predossa. Habui ex Liguria orientali ad Clavarum, et ad S. Stephanum d' Aveto a TURIO, Genuâ a VICENTIO, ex thermis Valderiis a BERTERO, ex Cenisio a BONJEANNIO, ex valle Artillona Baldi montis, et ex collibus S. Leonardi prope Veronam, a MANGANOTTO, ex Tyrolis Italico in Fiemme, et Fassa prope Soraga a FACCHINIO, a Montalon in Valsugana a BECCIATO, ex districtu Bassanensi in Valstagna al Buso, in sepibus, sylvisque Marosticæ, S. Michaelis d' Angarano, et

Aula a MONTINIO, ex agro Tergestino in dumetis di
Cologna a TOMMASINO, ex Piceno in monte *Regno-*
lo alla Macchia di Trocca a MARZIALETTO, in ripis
Truenti, in monte *Acuto*, in *Pizzo di Sivo*, a *Costa bru-*
ciata, ex Præutiis in monte Velino, ex Sabinis in mon-
te *Polino* ab ORSINO, et Etruria in dumetis sylvæ Pi-
sane prope *Coltano* a Prof. PETEO SAVIO, a *Pana* in
Mugello a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, Tibure
a MASQUILLIERIO, et a FIORINIA-MAZZANTIA, Româ,
ubi vulgaris, a Prof. MAURIO, ex Lucania a GASPAR-
RINIO, et sylvis Siciliæ, et Panormo *al Parco* ab Eq.
GUSSONIO. Floret Majo, Junio.

Caulis, et aculei omnino ut in *Rosa collina* Jacq. Fo-
liola ovata, aut ovato-oblonga, acuta, vel acuminata,
nunc simpliciter serrata, nunc biserrata, serraturis api-
ce glandulosis, plerumque sursum incurvis, dura, fir-
mula, utrinque glaberrima, etiam nervo, venisque, ni-
tida, levissima, supra saturate viridia, subtus paulo
pallidiora, nervo aculeolata, in foliis superioribus sæpe
conduplicata. Petioli anguste canaliculati, glabri, vel
in canaliculo tantum subpilosi, glandulis pedicellatis
subinde adpersi, dorso aculeolati. Stipulæ latæ præ-
sertim superiores, acuminatæ, glabræ, margine gland-
ulosæ. Pedunculi passim glabri, et inermes, ludunt
tamen hispido-glandulosi, erecti, vel cernui. Calyx
fere semper totus glaberrimus, et inermis, raro hispi-
do-glandulosus, urceo ovoideo, vel oblongo, limbi laci-
niis alternis pinnulatis, pinnulis angustissimis, linea-
ribus. Cynarhodium passim insigniter elongatum, forma
oblonga, rarius ovoideum, paulo citius quam in præ-
cedente maturans. Reliqua omnia prorsus ut in illa.
Herba inodora, et glabritie sua facile se monstrans.

Galla *Cynipis Rosæ*, vulgo dicta *Bedeguar*, habetur tam
in hac, quam in *Rosa collina* Jacq., et in *Rosa ru-*
biginosa L.

Usus. Præstat in chlorosi ob vim ecoproticam. Tres no-
vissimæ species hic descriptæ ad opus topiarium passim
adhibentur.

12. *Rosa rubrifolia*: erecta, glaberrima, lnrîde glauca;
aculeis aduncis, tenuibus; foliolis ellipticis, subsim-
pliciter serratis; pedunculis brevissimis, urceoque cal-
lycino ellipsoideo inermibus, limbi laciniis simplici-
bus; stilib; inclusis.

R. rubrifolia Willd. *Sp. pl.* 2. part. 2. p. 1075. Smith, in
Rees's Cycl. v. 30. n. 44. Lindl. *Mon.* p. 104., et in *Bot.*

reg. v. 5. t. 430. mediocr. *Red. Ros.* 1. p. 31. tab. optime. *Jacq. Fragm.* p. 70. t. 106. opt. *Roess. Ros. tom.* 2. n. 54. tab. 54. bona. *Nouv. Duh.* 7. p. 15. t. 10. f. 1. bona. *Bell. Ap. in Acad. de Tur. an.* 1790-1791. v. 5. p. 229. t. 6. ex herb. *Balb. Re Ap. alt. in Accad. di Tor. an.* 1827. tom. 31. p. 198. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 343. n. 28. *Vill. Dauph.* 3. p. 549. *De Cand. Franc.* 4. par. 2. p. 445., et *Pfödr.* 2. p. 609. n. 56. *α. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 460. *Koch. Syn.* p. 225. *α. β. Reich. Exc.* 3. p. 621. n. 4001. *Gaud. Helv.* 3. p. 346. *α.*

R. livida *Host. Austr.* 2. p. 25.

R. n. 1101. *β. Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 39.

Ital. Rosa pavonazza.

Frut. Habui ex Tyroli meridionali orientali, et occiduo, nec non ex districtu Belunensi a *FACCHINIO*, ex montibus Tergestinis *Taiano*, *Kokuschi*, *Nana* a *TOMMASINIO*, ex alpinis Apuanis prope Minucianum *alla Barcaccia*, et ex Apennino Pistoriensi *al Teso* a Prof. *PETRO SAVIO*. Floret Majo, Junio.

Caulis ut in novissimis quatuor, sed glaucus, et superne glauco-purpurascens. Aculei potius rari, sparsi, tennes, sed basi quidquam dilatati, et compressi, inferiores longiusculi, rectiusculi, superiores breviores, adunci. Folia impari-pinnata, pinnis duabus-quatuor. Foliola elliptica, aut ovata, grandiora quam in *Rosa canina* L., acuta, vel acuminata, minoribus tantum obtusis, argute subsimpliciter serrata, basi integerrima, utrinque glaberrima, intense glauca, et sæpius glauco-purpurantia præsertim in ora, nervo, et venis. Petioli glabri, dorso aculeolatis, vel inermes. Stipulæ glaberrimæ, acuminatæ, foliis concolores, margine arcuato, subserrulato-glanduloso, aut integerrimo, nudo, inferiores angustæ, superiores latiusculæ. Flores terminales, corymbosi, vel solitarii, brevissime pedunculati. Pedunculi glabri, inermes, vel strigis apice glanduliferis, paucis adpersi, sæpe inferne instructi bracteis lanceolatis, aut ovato-lanceolatis, acuminatis, subintegerrimis, glabris. Urceus calycinus parvus, ellipsoideus, inermis, glaber; limbi calycini lacinie lanceolatæ, aut ovato-lanceolatæ, longe acuminato-caudatæ, cauda superne paululum dilatata, simplices, rarius alternæ auctæ una, alterave pinnula angustissima, omnes intus, et margine villosæ, extus glabræ, inermes, corollam superantes, aut saltem æquantes, in anthesi patentes, post anthesim coadunato-conniventes, maturo fructu deciduæ.

Gorolla potius parva, saturate rosea. Petala emarginata. Stili inclusi, apice hirsuti. Stigmata vix exerta. Cynarhodium maturum subrotundum, non valde auctum. Planta aspectu suo lurido jam e longinquo dignoscenda.

Exemplar hujus speciei desideratur in herbario Bellardiano, sed est in herbario Balbisii, convenitque cum nostris.

13. *Rosa arvensis*: caule procumbente, flagellari, aculeis parvis, aduncis; foliis subrotundo-ovatis, simpliciter serratis, subtus discoloribus; urceo calycino oblongo, stilisque glabris, longe exertis,

R. arvensis Mant. alt. p. 245. Smith. Engl. Fl. 2. p. 396., et Engl. bot. v. 3. t. 188., et in Rees's Cycl. v. 30. n. 8. Woods. in Trans. Lin. Soc. v. 12. par. 1. p. 232. a. Lindl. Mon. p. 112. a. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 241., et Fl. Lond. ed. Grav. v. 4. t. 60. bona. Lawr. Collect. of Ros. tab. 86. All. Ped. 2. p. 139. n. 1796. excl. syn. Fl. Dan. Balb. Taur. p. 81. Ro Seg. p. 42., et Tor. 1. p. 264. Birol. Acon. 1. p. 170. Coll. Herb. Ped. 2. p. 344. n. 32. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 232., et 385. Comoll. Prodr. p. 97. Barb. Agg. p. 34. Collin. Ver. 2. p. 141. Rom. in Da Rio Giorn. dell' Ital. lett. tom. 24. p. 286. Suffr. Foroj. p. 146. Fior. in Giorn. de' Lett. Pis. 1828. tom. 17. p. 121. Ten. Nap. 4. p. 283., et Syll. p. 246. n. 1. De Cand. Frang. 4. par. 2. p. 438. a., et Prodr. 2. p. 597. n. 1. a. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 432. Koch. Syn. p. 229. Reich. Exc. 3. p. 625. n. 4022. Host. Austr. 2. p. 26. Gaud. Helv. 3. p. 335. a.

R. arvensis ovata Red. Ros. 1. p. 89. fig. bona.

R. dumetorum Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 577.*

R. repens Jacq. Fragm. p. 69. t. 104. bona. Reich. Exc. 3. p. 624. n. 4021.

R. (repens) campestris, alba Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 355.

R. semper virens Roess. Ros. n. 32. tab. 32.

R. sylvestris repens, foliis parvis acuminatis glabris et simpliciter serratis, flore albo odorato, petalis cordatis, fructu ovato lævi Mich. Cat. hort. Fl. p. 81. n. 13.* herb. Mich.

R. campestris repens, foliis parvis glabris, simpliciter dentatis, flore albo, petalis cordatis fructu rotundo parvo, glabra Mich. Rar. MS. n. 5.* herb. Mich.

Ital. *Rosa corallina*.

Frut. Legi a Calice in Lunisiana ad sepes, Bonouie in sylvis di Gaibolla, et Zolla predosa, ubi frequens.

Habui ex Pedemontio in sylvis ad Albam Pompejam a BERTERO, ex districtu Veronensi in sylva *del Mantico* a MANGANOTTO, ex agro Tridentino, et Roboretano Benacum versus a FACCHINIO, ex districtu Basanensi in sepibus *d' Angarana*, et *Pove* a MONTINTIO, ex agro Tarvisino a *Mogliano* a MAJERO, ex collibus Parmensibus a Prof. JANIO, ex Piceno in monte *de' Fiori* a S. Giacomo ab ORSINO, et a *Montefortino* a MAZZIALETTI, ex Ducatu Lucensi a *Coreglia*, et a *Marlia* secus torrentem *Fraga* a Prof. PUCCINELLIO, in Apennino a S. *Ansano*, et ex Apennino Hetruriæ a Prof. PIERO SAVIO, ex Latio in sylvis Albanis a Prof. MAURIO, et a MASQUILLIERIO, ex Regno Neapolitano in sylvaticis Lucaniæ prope *Castelgrande* a GASPARRINIO, in *Monte di mezzo*, et ex Sicilia in sylvaticis *di Caltafuturo*, et *Polizzi* ab Eq. GUSSONIO. Floret Majo, Junio. Caulis teres, inferne brevi tractu erectus, mox statim procumbens, flagellaris, nisi vepribus sustentetur, flexuosus, alterne ramosus, aculeatus, aut fere inermis, viridis, etiam sex-septempedalis, sed passim brevior. Aculei parvi, adunci, basi quidquam dilatati, et compressi, juniores flavidi, vel flavido-rubescences, seniores fuscii. Folia impari-pinnata, pinnis duabus-tribus. Foliola tenuia, parva, subrotundo-ovata, aut ovata, acuta, vel obtusa, simpliciter serrata, serraturis sæpe apice glanduliferis, ciliata, supra læte, et postea flavide viridia, opaca, glabra, aut pilis raris adspersa, subtus discoloria, albescentia, in nervo, et venis pubescentia, reliqua parte pilosa, vel glabra, eglandulosa, inodora. Petioli pubescentes, glandulis stipitatis, rubellis adpersi; dorso aculeolati. Stipulæ angustæ, acuminatæ, margine ciliatæ, et glandulosæ, planæ, aut orâ subrevolutæ. Flores passim grandes, albi, suaveolentes, odore ambrosiaco, sub sole evanido, longiuscule pedunculati, solitarii, vel duo-tres corymbosi. Pedunculi virides, adpersi glandulis stipitellatis, rubidis, inermes, aut vix aculeolati, nudi, vel basi instructi una, alterave bractea, parva, lanceolata, aut ovato-lanceolata, acuminata, margine ciliata, et glandulosa, decidua. Urcens calycinus parvus, ovoideus, vel oblongus, glaber, viridis; ejus limbi lacinie ovatæ, aut ovato-lanceolatæ, acutæ, aut acuminatæ, supra, et margine pubescentes, orâ subglandulosæ, corolla quadruplo, et quintuplo breviores, simplices, aut alternæ parce pinnulatæ, in anthesi retroflexæ, in

- fructu deciduæ. Petala obcordata. Stili glabri, in columnam arcte fasciculati, et subinde superne connati, columnam longe exerta, stricta, stamina subæquante, vel paulo breviora. Fornix receptacularis claudens ostium tubi calycini convexulus, parum prominens. Cynarhodium parvum, ellipsoideum, glabrum, inerme, inter maturandum e flavido rubrum, maturum intense corallinum, molle, pulposum, pulpa crocea, acida, intus superficie setosum; maturat Septembri. Nuces circiter decem, grandiusculæ, longiores, sed tenuiores quam in *Rosa collina* Jacq., oblongæ, dorso convexæ, totæ adpressæ villosæ.
14. *Rosa alpina*: caule erecto, subinermi; folioliis ellipticis, argute serrato-serratis; floribus solitariis; urceo calycino oblongo, limbi laciniis simplicibus.
- R. alpina* Sp. pl. p. 703. Smith. in Rees's Cycl. v. 30. n. 46. Lawr. Collect. tab. 30., et 75. Lindl. Mon. p. 37. α. β. γ., et in Bot. reg. v. 5. t. 424. Jacq. Austr. 4. p. 43. t. 279. All. Ped. 2. p. 139. n. 1798. Re Seg. p. 42., et Tor. 1. p. 265. Birol. Acon. 1. p. 171. Coll. Herb. Ped. 2. p. 338. n. 10. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 234., et 386. Comoll. Prodr. p. 97. Pollin. Ver. 2. p. 145. Suffr. Foroj. p. 146. Ors. in Cap. Opusc. p. 286.* Bert. Aman. Ital. p. 30. n. 1., et Mant. Fl. Apuan. p. 32. n. 50. Bert. fil. It. in Apennin. Bon. p. 9.* Ten. Nap. 4. p. 285., et Syll. p. 247. n. 7. A. B. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 446., et 5. p. 536.* Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 26. heft. excl. fig. e. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 451. α. β. γ. Koch. Syn. p. 223. α. β. γ. Reich. Exc. 3. p. 613. n. 3951. α. Host. Austr. 2. p. 24. Gaud. Helv. 3. p. 357. α. β. Schleich. Pl. sicc.*
- R. pyrenaica* Willd. Sp. pl. 2. par. 2. p. 1076. Smith. in Rees's Cycl. v. 30. n. 47. α. β. Gouan. Ill. p. 31. t. 19. Jacq. Hort. Schönbr. 4. p. 8. t. 416. Ten. Nap. 4. p. 285., et Syll. p. 247. n. 8. A. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 446. Host. Austr. 2. p. 24. Reich. Exc. 3. p. 613. n. 3952. Schl. Pl. sicc.*
- R. glandulosa* Bellard. Ap. in Acad. de Tur. ann. 1790-1791. v. 5. p. 230. juxta exemplar Delphinense missum a Bonjeannio.
- R. inermis* Turr. in Giorn. d' Ital. tori. 1. Venez. 1765. p. 128. n. 110.
- R. pendulina* Reich. Exc. 3. p. 613. n. 3953. α.
- R. n. 1107.* Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 41.
- R. non spinosa* calycis foliis indivisis, fructu oblongo Segui. Sup. p. 297.

R. rubello flore, parvo, simplici, non spinosa J. Bauh. *Hist. pl. 2. lib. 14. p. 39. fig.*

β ramis superne, ramulisque tenuissime aculeato-hispidis. Rosa alpina ♂ rubella De Cand. *Prodr. 2. p. 612.*

R. rubella Smith. *Engl. Fl. 2. p. 374., et Engl. bot. v. 36. t. 2521., et Sup. v. 1. tab. 2601. fig. 3. fructus. Woods. in Trans. Lin. Soc. v. 12. par. 1. p. 177. Lindl. Mon. p. 40. a. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 225.*

R. gentilis Sternb. in *Bot. zeit. ann. 1826. p. 79. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 451. Koch. Syn. p. 223.*

Ital. Rosa alpina.

Frut. Legi in Liguria occidua in alpihus della Scaggia, in Liguria orientali in cacumine montis Gottro, in alpihus Apuanis in Sagro. Filius attulit ex Pisanino esurundem alpium, ex Corno alla scala, et Cimone di Caldaia in Apennino Bononiensi, et ex Cupola di Scaffaiolo in Apennino Mutinensi. Habui denovo ex Corno alla scala al Cavone a Prof. PETRO SAVIO, ex Apennino Liguriæ orientalis a Roncolungo a TURIO, ex Pedemontio in sylvis ad thermas Valderias a BERTEO, in alpinis di Dea ab Eq. Prof. MORISIO, in Cenisio a BONJEANNIO, et a Prof. BALBISIO, ex Valtellina inter Bormio, et S. Catinam a FACCHINIO, ex monte di Pusiana ad Larium ab Eq. CASATE, et ex monte Generoso a RAINERO, ex Ario in alpinis Brixienisibus a ZANTEDESCHIO, ex valle Frigida Baldi, et ex subalpinis montis Pastello districtus Veronensis a MANGANOTTO, ex Tyroli meridionali a Gries, et ex Tyroli Italico in alpinis di Fiemme, et Fassa a FACCHINIO, ex districtu Bassanensi a Montalon in Valsugana, al Buso di Valstagna, alle Bocchette d'Oliero, ai Colalti, a Valerana, et ex Sumano Vicetinarum a MONTINIO, denovo ex montibus Bassanensibus ab Eq. PAROLINIO, ex Umbria a Castel Manardo a Prof. OCTAVIANO, alle Pettenelle, et ex Piceno alla Macchia di Troccà, a Capo di Tenna, a Bocca di foce, alla Corona a MARZIALETTO, ex valle Canetra in Nursinis, ex Vettore, et Pizzo di Sivo Piceni, et ex monte Cornu Prætutiorum ai Valloni arsenicati ab OASINO, iterum ex Prætutis in sylvis di Vallechiarina ab Eq. GUSSONIO, ex Apennino Regiensi al Bosco del Barone a Prof. PETRO SAVIO, et ab Eq. NARDUCCIO, ex Ducatu Lucensi in Apennino di S. Pellegrino a Prof. PUCCINELLIO, in monte Fegatese, et ex Apennino Pistoriensis denovo a Prof. PETRO SAVIO, ex

monte *S. Angelo di Castellamare* prope Stabias a RAINERO. Varietatem β accepi ex monte Majore Istriæ a BIASOLETTO, ex eodem monte, et ex adscensu montis *Taiano* a TOMMASINIO. Floret Junio, Julio.

Frutex erectus, vel ascendens, in saxosis apricis humilis spithamalis-pedalis, in umbrosis sylvarum longior. Caulis teres, plerumque inermis, rarius adpersus aculeis paucis, acicularibus, rectis, patentibus, alterne ramosus, inferne nigrescens cum, vel sine nebula cinerea, superne rubidus, aut purpurascens. Folia impari-pinnata, pinnis tribus-quatuor. Foliola elliptica, elliptico-oblonga, vel minora subrotunda, obtusa, rarius acuta, argute serrato-serrata, vix simpliciter serrata, serraturis apice glanduliferis, supra læte, aut saturate viridia, subtus pallentia, utrinque glabra, vel nervo, et venis, rarius superficie, pilosa, nervo aculeolata, modo exigua tres lineas longa, duas lata, modo gradatim majora ad pollicis usque longitudinem, et ad latitudinem quatuor-sex linearum. Petioli subpilosii, adpersi glandulis stipitellatis, dorso aculeolati. Stipulæ oblongæ, acutæ, vel acuminatæ, apicibus divergentibus, ciliato-glandulosæ, et etiam superficie externa interdum glandulis scatentes. Flores solitarii, terminales ramulis subinde per longum caulis tractum. Pedunculi tenues, mollo breves, modo longiusculi, erecti, vel cernui, glabri, aut hispidi setis apice glanduliferis, in aprico rubro-purpurantes, subinde basi una, alterave bractea margine glandulosa instructi. Urceus calycinus oblongus, collo arctatus, glaber, vel hispido-glandulosus; ejus limbi lacinia simplices, lanceolatæ, aut ovato-lanceolatæ, longe acuminato-caudatæ, cauda apice paululum dilatata, intus, et margine villosæ, interdum ciliato-glandulosæ, dorso glabræ, vel hispido-glandulosæ, corollam æquant, aut paulo longiores, in fructu persistentes, erecto-patulae, vel conniventes. Petala obcordata, saturate rosea. Stili inclusi, apice hirsuti. Stigmata exserta. Cynarhodium perfectum multo auctum, ovoideum, aut oblongatum, basi, et collo constrictum, glabrum, vel hispidum, maturitate saturate rubens, pulposum, molle, demum nigrescens, subinde curvum, et veluti monstrosum forte a punctura insecti nidulantis.

Confer Amœn. Ital. p. 30. pro iis, quæ dixi, et nunc confirmo, de identitate *Rosæ alpinae*, et *Rosæ pyrenaicæ*. Perfecto idem cæspes fert utramque formam, et recte

Flor. Ital. T. V.

14

Smithius in Rees's Cycl. v. 3o. n. 47. dixit: "Nor
 a does Gouan mention any thing that affords a per-
 a manent mark of discrimination between *Rosa pyre-*
a naica and *alpina*.,,

Rosa glandulosa Bell. deest in ejus herbario, sed habe-
 tur in herbario Balbisii, et convenit omnino cum il-
 la, quam obtinui ex Delphinatu a Bonjeannio. Est
 autem ipsamet *Rosa alpina* L. in statu potius macro:
 a The glandular edging of the stipulas, on which our
 a worthy friend Bellardi has founded his character,
 a and name, is no less evident and constant in *pyre-*
a naica, and even in *alpina* itself, of which last in-
 a deed we are strongly inclined to consider the sup-
 a posed species, both of Gouan and Villars, as me-
 a re varieties &c., Smith. in Rees's Cycl. v. 3o.
 a n. 47.

In varietate β aculei numerosi, aciformes, recti, paten-
 tes, vel subretrorsi vestiunt ramos supremos, et etiam
 ramulos, sed non constanter. In reliquis nulla diver-
 sitas a specie; imo in hac varietate quoque urceus ca-
 lycinus ludit glaber, vel hispidus. Laciniae limbi ca-
 lycini in meis exemplaribus æquant, aut superant co-
 rollam; quare character constans non est longitudo
 dimidia corollæ, quam illis tribuit Kochius in Syn.
 p. 223. Identitatem hujus plantæ cum *Rosa alpina* per-
 sensit Reichenbachius, qui eam traxit ad *Rosam py-*
renaicam Gouan. in Fl. exc. 3. p. 613. n. 3952.

15. *Rosa pumila*: humilis, erecta; aculeis tenuibus; so-
 liolis late ellipticis, serrato-serratis, subtus discolori-
 bus, nervo, venisque pilosis, glandulosisque; pedun-
 culis, urceoque calycino oblongo hispidis, limbi laci-
 niis alternis pinnulatis; stilis subexsertis.

R. pumila Sup. p. 262. Smith. in Rees's Cycl. v. 3o. n. 32.
Jacq. Austr. 2. p. 59. t. 198. *All. Ped.* 2. p. 140. n. 1802.
Balb. Taur. p. 81.* *Re Seg.* p. 42., et *Tor.* 1. p. 265.
Bir. Acon. 1. p. 170. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 233. *Barb.*
Agg. p. 35.* *Pollin. Ver.* 2. p. 143. α . β . t. 1. f. 3. exclu-
 sis a var. β caule orgyali, et loco natali. *Rom. in Da*
Rio Giorn. dell' Ital. lett. tom. 24. p. 286. *Suffr. Foroj.*
p. 146. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 34. heft. optim. *Reich.*
Exc. 3. p. 622. n. 4009. α . *Host. Austr.* 2. p. 23.

R. Polliniana Pollin. Hort. et prov. Veron. pl. nov. p. 13.*
 excl. caule orgyali, et loco natali.

R. Pollinii Pollin. Viag. al lag. di Gard. p. 128.* excl. ut
 supra.

- R. gallica* *All. Ped. 2. p. 139. n. 1797.* herb. Sav. Bot. Etr. 4. p. 106.* herb. Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 170.* Ten. Nap. 4. p. 284. B., et Syll. p. 246. n. 4. B. De Cand. Frang. 4. par. 2. p. 444. γ.* Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 485. α. Koch. Syn. p. 230. α.*
- R. gallica pumila* *Lindl. Mon. p. 68. De Cand. Prodr. 2. p. 603. α. Gaud. Helv. 3. p. 343. I. et II.*
- R. hybrida* *Schleich. Pl. sicc.**
- R. n. 1104. Hall. Hist. stirp. indig. Helv. 3. in add. p. 188.*

Ital. *Rosa serpeggiante.*

Frut. Legi in Liguria orientali in montibus del *Bracco*. Bononim in sylvis collium di *Ronzano*, di *Zolla predosa*, di *S. Lorenzo* in collina, et in monte *Mariano* prope il *Sasso*, quibus in locis omnibus valde copiosa. Habui ex Pedemontio ad Albam Pompejam a *BERTERO*, in collibus Taurinensibus, et alla *Venaria* a Prof. *BALBISIO*, ex agro Mediolanensi in sylvis della *Merlata* a PPR. *BALSAMO-CRIVELLIO*, et DE *NOTARIS*, ex nemoribus di *Torre d' isola* secus Ticinum ab eodem Prof. DE *NOTARIS*, Mantuâ a *Gabiana*, et al *Bosco Fontana* a *BARRIERIO*, ex agro Veronensi a *POLLINIO*, tum in collibus humilioribus vallis *Pantena*, et in summo monte, qui imminet vico *Grezzana*, a *MANGANOTTO*, ex Tysoli meridionali prope Brixinam ab Eq. DE *HEUFLERO*, ex districtu Bassanensi a *Mussolente*, *Angarano*, *Assiago*, *Roman*, et *Gloso* a *MONTINIO*, ex montibus Forojuliensibus a Prof. *BRIGNOLIO*, ex sylvis di *Monfalcone* a *BRUMATTIO*, ex sepibus Tergestinis a *BIASOLETTO*, et al *Farnedo* a *TOMMASINIO*, ex sylvis Tarvisinis, ubi communis, a *MAJERO*, ex monte *Cupiolo* districtus Urbinatis ab *AZZAROLIO*, ex Ducatu Lucensi secus la *Freddana*, a *S. Maria del giudice*, et a *Pozzuolo* a Prof. *PUCCINELLIO*, ex monte Pisano a Prof. *PETRO SAVIO*, ex *Verruca* Pisana a *CHIRICO*, ex *Pana* in *Mugello*, et ex monte *Sinario* prope Florentiam a *BARONIO*, Volaterris ab *AMIDEO*, ex *Canino* in agro Viterbiensi a Rev. Fratre *MAURITIO DE BRIXIA*, Româ in collibus, et alla *Valle dell' inferno* a Prof. *MAURIO*. Floret Majo, Junio.

Radix longe repens, caules solitarios hic illic emittens, sæpe approximatos. Caulis teres, erectus, a spithama ad duos pedes longus, alterne ramosus, inferne, cum senescit, obductus cortice fusco-cinerascente, et ab aculeis cito deciduis inermis, superne viridis, aut in aprico

purpureo-rubescens. Aculei crebri, tenues, inaequalis, leniter curvuli, basi paululum compresso-dilatati, interdum subretrorsi, passim rubido-purpurantes. Folia impari-pinnata, pinnis duabus-tribus. Foliola late elliptica, acuta, vel obtusa, leviter serrato-serrata, serraturis apice glandulosis, supra glabra, rarius laete, plerumque saturate viridia, et opaca, subtus discoloria, sive glauco-albentia, nervo, et venis pilosa, et saltem nervo glandulosa, reliqua superficie glabra, vel pilis raris adpersa. Petioli scabri, glandulosi, dorso aculeolati. Stipulae angustae, licet superiores paululum latiores, acuminatae, aut acutae apicibus divergentibus, margine, et dorso glandulosae, planae, aut ora subrevolutae. Flores terminales cauli, ramisque, solitarii, vel duo-tres corymbosi, longiusculo pedunculati, grandes, nunc saturate, nunc laete rosei, nunc pallide carnei, suaveolentes, odore delicato *Rosae damascenae*. Pedunculi hispido-glandulosi, nudii, vel inferne instructi una, alterave bracteola parva, lanceolata, dorso, et margine glandulosa. Totus calyx extus hirtoglandulosus, raro glaber, urceo ovoideo, aut oblongo, saepe utrinque arcuato, laciniis limbi ovatis, ovato-lanceolatis, vel lanceolatis, acuminatis, plerumque corolla dimidio brevioribus, intus, et margine pubescentibus, alternis pinnulatis, pinnulis anguste linearibus, glandulosis, modo numerosis, modo paucis. Petala obcordata. Fornix receptacularis claudens ostium tubi calycini conicus. Stili liberi, multa parte fere recti, adpresse villosi, et inclusi, superne brevi tractu flexuosi, plus minus hirsuti, et exerti; quandoque exeruntur tractu longiore, et inter se laxantur. Stigmata papillosa, luteola. Cyathodium perfectum ex ovoideo subglobosum, vel turbinatum. Glandulae omnes stipitellatae, et cum fulcro suo passim rubido-purpureae.

Rosa gallica L. est quam certissime diversa caule robustiore, altiore, caespitosa, urceo calycino in anthesi globoso, glabro, corolla saturate rubro-kermesina holoserici rubri instar. Colitur passim apud nos ad usum pharmacopolarum pro saccharo rosato conficiendo; spontaneam ex Italia nunquam obtinui.

Superius jam dixi ad *Rosam rubiginosam*, Pollinium ex hujus caule, et ex *Rosa pumila* fecisse *Rosam Pollinianam* suam. Certum est ex observationibus Facchini, in loco natali *Rosae Polliniae* attributo oriri tantum *Rosam rubiginosam* L., quae reapse gaudet caule

elato, etiam orgyali, et ultra. Anno autem 1820., cum Pollinius misisset ad me exemplar *Rosæ pumilæ* sub nomine *Rosæ Pollinianæ*, rem eidem per litteras, candide aperui, tuncque ipse in vol. 2. Fl. Ver. p. 143. fecit ex hac *Rosam pumilam* β suam, retentis pro ea characteribus *Rosæ Pollinianæ*. Quomodo id contigerit, me latet. Forte Pollinius de mento egit, cum non habuerit præ oculis plantam primam, quam viderat in via della Palarola. In figura vero hujus varietatis, quam dedit in Fl. Ver. 2. tab. 1. fig. 3. non solum adplicuit *Rosam pumilam* frustulo caulis *Rosæ rubiginosæ*, verum etiam exhibuit petala integerrima, apice rotundata, quæ neutrius speciei sunt, imo pro fictitiis habenda. Quare *Rosa Polliniana* est hirco-cervus ex *Rosa rubiginosa*, et ex *Rosa pumila*, cujus pars præcipua pertinet ad *Rosam pumilam*.

16. *Rosa sempervirens*: glaberrima; caule prostrato, aculeis falcatis; foliis oblongo-lanceolatis, coriaceis, simpliciter serratis, perennantibus; floribus corymbosis; pedunculis, calycibusque hirsuto-glandulosis; limbi calycini laciniis indivisis.

R. sempervirens Sp. pl. p. 704. Smith. in Rees's Cycl. v. 30. n. 30. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 348., et Fl. Græc. 5. p. 67. t. 483. Lawr. Coll. of ros. tab. 45. Lindl. Mon. p. 117. Ker. in Bot. reg. v. 6. t. 465. bona. Nouv. Duh. 7. p. 26. t. 13. f. 1. Coll. Herb. Ped. 2. p. 344. n. 33. Spad. Xil. 3. p. 72. Ors. in Cap. Opusc. p. 286.* Sav. Pis. 1. p. 471., et Tratt. degli alb. ed. 2. tom. 1. p. 190., et Bot. Etr. 4. p. 109. Sebast. En. pl. amphith. Flav. in Rom. pl. fasc. alt. p. 67.* Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 171.* Ten. Nap. 4. p. 284., et Syll. p. 246. n. 2. A. B. C. Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 577. a. b. c.* et Sup. 1. p. 156.* De Cand. Franç. 5. p. 533. a., et Prodr. 2. p. 597. n. 2. a. β . Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 484. Koch. Syn. p. 229. Reich. Exc. 3. p. 625. n. 4023.

R. sempervirens globosa Red. Ros. 2. p. 15. fig. pl. macr.

R. sempervirens latifolia Red. Ros. 2. p. 49. fig. pl. luxur.

R. atro-virens Viv. Annal. bot. v. 1. par. 2. p. 171.,* et Fl.

Ital. fragm. fasc. 1. p. 4. t. 6.* herb.

Rovo canino Ang. Sempl. p. 59.

Rosa muscatula Cæsalp. De pl. lib. 3. cap. 10. p. 96.

R. sylvestris, sive dumetorum, flore candido, pentapetalo, *Rosæ moschatæ* simplici minori cognata Cup. Hort. Cath. p. 192.

R. sylvestris sive *dumetorum* *Cup. Sup. alt. p. 78.*

R. alba, sylvestris *Castell. Hort. Mess. p. 19.*

R. sylvestris, seu *dumetorum*, scandens, sempervirens, Myrti folio, lucido, flore albo odorato, fructu parvo, rotundo, et hispido *Mich. in Till. Cat. hort. Pis. p. 147., et Cat. hort. Flor. p. 81. n. 12.*

R. semper virens *Clus. App. alt. in calce Exotic. sine fig.*

R. sempervirens *Jungermanni Dill. Elth. 2. p. 326. t. 246. f. 318. bona.*

Ital. Rosa San Giovanni *Mich. Cat. agr. Flor. MS.*

Frut. Legi Sarzanæ in dumetis, et sepibus, ubi copiosa, Bononiæ in collibus di Roncorio, di Gaibolla, dell' Osservanza, di S. Luca supra Casalecchio. Habni ex saxosis circa Genuam a Prof. DE NOTARIS, ex Monfalcone a BRUMATTIO, Tergesto a S. Saba a TOMMASINIO, ex pineto Ravennati a DALLAGATA, et a BUBANIO, ex agro Maceratensi a Prof. UTILI, ex Monteleone ab ORSINO, ex Ducatu Lucensi in Pizzorna a Prof. PUCCINELLIO, ex Hetruria ad balnea di Montecatini ab ill. Principe CAROLINA BONAPARTE f. r. Principis Josephi, in agro Florentino ad sepes, et dumeta, tum a S. Felice a Ema, Fesulis, et a Monte Guidi in Maremma a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, in vepretis ad ripas fluminis Era, et Volaterris in valle ab AMIDEO, in sylvis Senensibus a Prof. GIULIO, ex Canino apud Viterbienses a Rev. Fratre MAURITIO DE BRIKIA, Romæ in rudibus amphitheatri Flavii a Prof. SEBASTIANIO, et a BRUNNERO, et in sepibus circa urbem, ubi communis, a Prof. MAURIO, ex ripis canalium Pontinorum a FIORINIA-MAZZANTIA, Pompejis a VANDERLINDENIO, ex sepibus di Castellamare prope Stabias a RAINERO, Panormo al Parco ab Eq. GUSSONIO, ex sepibus Sardinie ab Eq. Prof. MORISIO, ex Corsica a CALVI a SOLEINOLIO. Floret Junio circa festum nativitatis S. Joannis Baptista.

Caulis prostratus, flagellaris, sed inter vepres, et ad arborea scandens, longitudinis mire variantis, a paucis pedibus ad duas, tresve orgyas usque, alterne ramosus, glaber, virens, in aprico superne purpurascens. Aculei sparsi, remoti, rarius oppositi, vel geminati, falcati, et subinde fere retrorsi, basi compresso-dilatati. Folia impari-pinnata, pinnis duabus-tribus. Foliola ovato-lanceolata, ovato-oblonga, vel ovata, acuta, aut acuminata, minoribus tantum obtusis, coriacea, leviter, simpliciter, et argute serrata, glaberrima,

nitida, supra atrovirentia, subtus pallide viridia, perennantia, ea, quæ prope corymbum, sæpe ternata. Petioli glabri, inermes, vel subaculeolati, et etiam setis paucis apice glanduliferis adpersi. Stipulæ angustæ, acuminatæ, glabræ, margine revolutæ. Corymbi terminales, solitarii, subinde aucti corymbis axillari-bus proximis, multiflori, aut pauciflori, sessiles, vel pedunculati. In plantis macrioribus flores interdum solitarii. Bractæ ad divisiones corymbi lanceolatæ, acuminatæ, longæ, ciliato-glandulosæ, pilosæ, subinde apice dilatato-foliacæ, et serratæ, raro deficientes. Pedunculi proprii hirti setis brevissimis, apice glanduliferis. Flores albi, grandes, noctu, et in umbra fragrantissimi odore ambrosiaco, sub sole prorsus inodori. Totus calyx extus hirtus setis apice glanduliferis more pedunculorum, rarissime glaber. Urceus calycinus parvus, ovoideus; ejus limbi lacinis ovatis, aut ovato-lanceolata, acuminatæ, vel acutæ, simplices, corolla multo breviores, intus, et margine villosæ, in fructu deciduæ. Petala obcordata. Stili hirsuti, longe exerti, stamina subæquantes. Cynarhodium ex ovoideo subrotundum, saturate rubrum.

Usus. Hæc species præstat apud nos ad opus topiarium. Nullus dubito, quin flores ejus suppedient oleum es-sentiale rosæ, ut flores *Rosæ moschata*; cum utrorum-que odor sit prorsus idem.

Forte Allionius in Fl. Ped. 2. p. 139. n. 1800. sub nomine *Rosæ albæ* intellexit *Rosam sempervirentem*; hujus enim speciei est figura Ic. Taur. v. XXII. tab. 51., quam ille affert; sed in herbario Allionii stat *Rosa moschata* L. pro *Rosa albâ*. Idem auctor habet quoque *Rosam cin-namomeam* ibid. p. 138. n. 1793., cujus exemplar in herbario ejus est ex Helvetia. Profecto tam *Rosa al-ba* L., quam *Rosa cinnamomea* L. coluntur in hortis nostris; sed spontaneas nunquam vidi, neque ab aliis obtinui.

Veteres gaudebant coronari rosis, et rosas apponere fo-ribus:

Et caput in verna semper habere rosa (15)

Prop. Lib. 3. eleg. 5. v. 22.

Postibus et duræ suplex blandire puellæ

Et capiti demptas in fore pone rosas.

Ovid. Art. amat. lib. 2. v. 527. 528.

Injiciebant quoque in mensas, ut multi etiam nunc faciunt:

Et latet injecta splendida mensa rosa.

Ovid. Fast. lib. 5. v. 336.

flores cecidere capillis

Decidere in mensas ut rosa missa solet.

Ovid. Fast. lib. 5. v. 359. 360.

Sternebant in sarcophago:

Ille meo caros donasset funere crines

Molliter et tenera poneret ossa rosa.

Prop. Lib. 1. eleg. 17. v. 21. 22.

Tuncque plurimi fiebant rosæ Pæstanae:

Tantaque Pæstani gloria ruris erat

Mart. Lib. 6. epigr. 80.

præsertim cum essent biferæ:

biferique rosaria Pæsti.

Virg. Georg. lib. 4. v. 119.

Plures aliæ rosarum species coluntur in hortis Italicis, quas inter eminent pulchritudine, et suavitate florum *Rosa damascena* W., *Rosa centifolia* L., *Rosa gallica* L., *Rosa alba* L., et floribus pene perpetuis licet non valde odoris *Rosa indica* L.

RUBUS.

Lin. Gen. p. 254. Tourn. Inst. 3. t. 385. Juss. Gen. p. 358. Lamck. Ill. 5. t. 441. f. 1. 2. Vent. Tabl. 3. p. 349. Gærtn. De fruct. 1. p. 350. t. 73. Smith. in Rees's Cycl. v. 30., et Engl. Fl. 2. p. 398. De Cand. Prodr. 2. p. 556. Weih. et Nees. Rub. Germ. p. 11. Endl. Gen. p. 1241. n. 6360.

Calyx perianthium liberum, quinquepartitum, persistens. Petala quinque, obovata, vel oblonga, oræ receptaculi discoidei inserta, alternantia cum laciniis calycinis. Stamina plurima, corolla breviora, in ambitu receptaculi inserta prope petala, filamentis subulatis, antheris ovatis, aut

subrotundis, bilocularibus, iucumbentibus. Ovaria plura, imposita receptaculo convexo. Stilus filiformis unicuique ovario sublateralis. Stigma simplex, obtusum. Syncarpium subglobosum, impositum receptaculo exsucco, convexo, factum ex drupeolis numero variis, basi inter se confluentibus, stilo persistente apiculatis.

Habitus. Caulis fruticosus, vel herbaceus, angulatus, aut teres, plerumque aculeatus, erectus, a recta declinaus, vel prostratus, alterne ramosus. Aculei caulini recti, aut adunci. Folia alterna, petiolata, quinata, ternata, impari-pinnata, raro simplicia, foliolis subrotundis, ovatis, oblongis, serratis, lobatis, incisis. Stipulae lineares, vel oblongae, deciduae. Flores racemosi, corymbosi, subumbellati, vix solitarii. Corolla rosea, carnea, alba. Syncarpium rubrum, aut nigrum, acidum, acido-dulce, saepe edule.

Ord. nat. Senticosæ *Lin. Ord. nat. n. XXXV., et Præl. p. 444.* Rosaceæ *Juss. Gen. p. 334. Smith. Gram. p. 171. Vent. Tabl. 3. p. 331. De Cand. Prodr. 2. p. 525. Rich. Famill. in Élém. éd. 5. p. 216. Dryadæ Barth. Ord. nat. p. 401. Schultz. Nat. syst. p. 507.*

* *Caule fruticoso; foliis quinatis, ternatisve.*

1. *Rubus fruticosus*: caule elongato, pentagono, declinante, aculeis validis, rectis, aduncisve; foliis quinatis, ternatisque, supra glabris, subtus brevissime, adpresse farinaceo-tomentosis, foliolis ovatis, inaequaliter argute serratis; racemo composito, cylindraceo; calycibus inermibus; petalis obovatis.

R. fruticosus *Sp. pl. p. 707. Smith. Engl. Fl. 2. p. 399., et Engl. bot. v. 10. t. 715. optima. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 245. Nouv. Duh. 6. p. 71. t. 22. f. 1. Allion. Ped. 2. p. 132. n. 1773. Balb. Taur. p. 82. Re Seg. p. 43., et Tor. 1. p. 268. Birol. Acon. 1. p. 172. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 237., et 387. Comoll. Prodr. p. 98. Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec. 2. tom. 10. p. 287. Pollin. Ver. 2. p. 149. α. flore roseo. Ruch. Ven. p. 125. Moric. Ven. 1. p. 222. Nacc. Ven. 3. p. 68. A. Suffr. Foroj. p. 146. Orsin. in Cap. Opusc. p. 286. Spad. Xil. 3. p. 94. Sav.*

Pis. 1. p. 479., et *Bot. Etr.* 4. p. 110., et *Tratt. degli alb. ed.* 2. tom. 1. p. 192. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 171. *Ten. Nap.* 4. p. 289. *B.*, et *Syll.* p. 248. n. 4. *Ab Uer. Hort. Pan.* p. 215. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. p. 579. a., et *Sup.* 1. p. 157. *Host. Austr.* 2. p. 28.

R. fruticosus β *canus* *Wahlenb. Succ.* 1. p. 317.

R. discolor *Weihe. et Nees. Rub. Germ.* p. 46. t. 20. *Reich. Exc.* 3. p. 603. n. 3903.

R. sepibus idoneus *Casalp. De pl. lib.* 3. cap. 11. p. 98. *More, over Rubo Ang. Sempl.* p. 257.

Rubus vulgaris, sive *Rubus fractu nigro* *Cup. Hort. Cath.* p. 193. *Zannich. Ist.* p. 228. t. 264. mala. *Segui. Ver.* 2. p. 301. n. 1.

β *flore albo.*

Rubus fruticosus *Weihe. et Nees. Rub. Germ.* p. 24. t. 7. *Ital. Rogo. Rogo di macchia. Rofo* (planta). *More. More campagnole. More di macchia. More di pruno. More prugnole. More di rogo. More nere* (fructus) *Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 207.

Frut. Copiosissimus in sylvis, et sepibus totius Italiae in submontanis, et in planitie. Legi *Sarzanæ*, et *Bononiæ*. Habui ex sepibus circa *Veronam* a *MANGANOTTO*, *Bassano* ab *Eq. PAROLINIO*, *Tergesto* a *TOMMASINIO*, ex *Monfalcone* a *BERINIO*, ex *Hetruria* a *Corniolo* in *Mugello* a *Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTO*, ex *Cannino* in districtu *Viterbiensi* a *Rev. Fratre MAURITIO DE BRIXIA*, ex viciniis *Nursiæ* in montibus *di Capo d'acqua* a *Prof. MAURIO*, ex apricis *Lucaniæ* a *Castelgrande* a *GASPARRINIO*. Varietatem β legi in montanis frigidis *di Calice* in provincia *Lunensi* ad canales. Acepi ex editis montis *Pastello* in provincia *Veronensi* a *MANGANOTTO*. Floret ab *Junio* in *Augustum*.

Canlis mire ludens crassitie, et longitudine, pentagonus, modo exquisito, modo obscure, et obtuse præsertim in parte inferiore senescente, lateribus canaliculatis, raro planis, in angulis valide aculeatus, rarius firmus, erectus, plerumque a recta declinans, ample arcuatus, et dum liber prostratus, a pede ad duas orgyas longus, in umbra glauco-virens, in aprico vel totus, vel in angulis rubro-purpurascens, quandoque etiam late rubens, maxima parte glaber, superne tantum pubescens. Rami alterni, flexuosi, arcuati, plerumque se se implicantcs. Aculei in caule primario validi, numerosi, modo omnes recta patentes, et etiam sursum incurvuli, modo superiores adunci, basi insigniter

compresso-dilatati, viridi-flavicantes, undique, vel basi purpurantes, in ramis minores, plerumque adunci, aut retrorsi. Folia alterna, petiolata, usque ad nova folia sequentis anni perennantia, per longum canlis tractum quinata, in elongatione florifera ternata; ludunt omnia ternata in individuis macrioribus, vel ima, et summa ternata. Foliola magnitudine, et forma mire variantia, ovata, ovato-oblonga; obovata, et quandoque etiam subrotunda, acuminata, aut acuta, crebre, inæqualiter, argute serrato-serrata, supra læte, vel saturate viridia, glabra, aut vix in sulcis supra nervum, et venas pilosa, subtus albo-tomentosa, tomento brevissimo, adpresso, ut farinoso-dealbata potius videantur, in nervo, et venis pilosa, nervo aculeolato, venis primariis numerosis, parallelis, secundariis reticulatis. Foliolum impar longe petiolulatum, subinde cordatum, vel subcordatum; foliola huic utriusque proxima brevius petiolulata, basi interdum quidquam obliquata, rarius extus lobo insculpta; foliola infima, sive exteriora, omnium minora, et petiolulo brevissimo suffulta. Petioli aculeis aduncis, validis instructi, pubescentes, idque magis in foliis supremis. Stipula lineari-angustissima, orta paulo supra basim petioli, decidua. Racemus terminalis, compositus, laxis, cylindraceis, luxurians elongatus, et multiflorus, aculeolatus, at setis apice glanduliferis carens, tomentosus instar paginæ inferioris foliorum, pilis brevissimis, fasciculatis, vel distinctis tomento subinde interjectis, rariusculis. Bractea pubescentes, inferiores in axe primario trifida, laciniis lineari-angustissimis; harum infima subinde est folium simplex, indivisum, vel bitrilobum, inæqualiter serratum; superiores, et quæ in ramis racemi indivisæ, lineares. Calyx brevissime, et stipate tomentoso-farinosus, vix pilosus, albus, eglandulosus, inermis, aut basi tantum aculeolatus, laciniis ovatis, concavis, breviter acuminato-subnatis, in anthesi patentibus, in fructu retroflexis. Corolla rosea, nunc saturate, nunc læte, nunc pallide; ludit calyce paulo, duplo, triplo longior. Petala obovata, vel subrotundo-obovata, obtusa, integra, aut apice eroso-crenata, sæpe crispula, patentia. Filamenta dilute rosea, præsertim inferue. Anthera ovata, pallide flavæ. Syncarpium globosum, magnitudinis varis, drupeolis plus minus numerosis, inter maturandum rubris, acidis, maturitate uigris, nitidis, dulcibus.

pulpa sanguinea, a pueris maxime expetitis. Non omnia syncarpia uno, eodemque tempore maturant in racemo; hinc alia rubra, alia nigra spectaculo non injucundo.

Varietas β est ipsissima species flore albo, quæ apud nos occurrit tantum in montanis frigidis, et quæ Europæ boreali solemnior.

Usus. Sepes fere omnes in Italia constant hoc Rubo. Fructu maturo fit syrupus refrigerans, vel liquor excitans, uterque gratissimus.

a. Rubus *præcox*: caule pentagono, declinante, aculeis adunco-retrorsis; foliis quinatis, supremis ternatis, supra glabris, subtus albo-tomentosis, foliolis amplis, ovatis, subcordatis, inæqualiter argute serratis; racemo villosus; calycibus inermibus; petalis obovatis.

Ital. *Rovo primaticcio*.

Frut. Legi Bononiæ in collibus dell' *Osservanza* in canali inter villam *Aldini*, et *Scarani*, ubi copiosus, in sepibus prope montem *Paderno*, et in ascensu di *Barbiano*. Filius attulit ex Apennino Bononiensi alla *Torre di Ruffeno*. Habui ex sepibus ad Albam Pompejam a *BERTERO*. Floret Majo, et initio Junii.

Multa habet speciei præcedentis, sed pollet habitu foliorum, et florum grandiore. Aculei canlini adunco-retrorsi, basi paulo dilatati, et compressi, reliqua parte attenuati, et viridi flavicantes, vel purpureo-flavidi. Folia quinata, supremis ternatis. Foliola ampla, subrotundo-ovata, vel elliptico-ovata, acuta, aut breviter cuspidata, argute, et inæqualiter serrata, basi subcordata, integra, et interdum quidquam angustata, lateralibus sæpe paululum obliquata, omnia supra satnrate viridia, glabra, subtus albo-tomentosa, tomento stellante, molli, brevi, tamen conspicuo. Petioli villosi, aculeati. Stipulæ elongatæ, lanceolato-lineares, vel lineares, villosæ præsertim margine, ortæ paulo supra basim petioli. Racemus terminalis, compositus, laxis, pyramidatus, ramis patulis, sæpe subretrorsis, aculeatus, villosus, villis patentibus, plerisque fasciculatis; dum luxuriat plusquam pedalis. Calyx tomentosus, villosusque, incanus, inermis, laciniis ovatis, aut evato-lanceolatis, breviter acutatis, demum retroflexis. Flores plus minus grandes, majores diametri fere pollicaris. Petala albo-carnea, subrotundo-obovata, aut obovata, obtusa, crispula, calyce duplo, triplo, et etiam quadruplo longiora. Stamina corolla multo breviora,

- in anthesi patentia, efflata inenrva. Filamenta alba. Antheræ subrotundo-ovate, pallide flavæ, ejaculato pol-line flavo-fuscæ. Stili numerosi, e flavo viriduli. Reliqua ut in *Rubo fruticoso* L. Nullæ setæ glanduliforæ in planta.
- Hæc species plene florot prius quam *Rubus fruticosus* L., imo cum hic incipit, illa fere desinit. Quoad formam foliorum, et foliolorum appropinquat *Rubum vulgarem* Weihe., et Nees. Rub. Germ. p. 38. tab. 14.
3. *Rubus tomentosus*: tomentoso-incanus; caule angulato, aculeis gracilibus, rectis, aduncisve; foliis ternatis, quinatisque, foliolis ovatis, oblongisve, inæqualiter serratis; calycibus inermibus, retroflexis; petalis oblongo-obovatis.
- R. tomentosus* Willd. *Sp. pl.* 2. par. 2. p. 1083. *Weihe. et Nees. Rub. Germ.* p. 27. tab. 8. *Balb. Taur.* p. 82.* *Re Tor.* 1. p. 267. *Biol. Acon.* 1. p. 172. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 307. n. 8. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 235. tab. 8. fol. ternatis. *Ors. in Capell. Opusc.* p. 286.* *Spad. Xil.* 3. p. 199. *Seb. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 172. *Ten. Nap.* 4. p. 289., et *Syll.* p. 247. n. 1. *A. B. De Cand. Franç.* 4. part. 2. p. 476., et *Prodr.* 2. p. 561. n. 43. *a. β. Reich. Exc.* 3. p. 601. n. 3892. *Hort. Austr.* 2. p. 29. *Gaud. Helv.* 3. p. 346.
- R. triphyllus* *Bell. App. in Acad. de Tur. ann.* 1790-1791. vol. 5. p. 235. excl. syn.
- R. collinus* *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 238. tab. 9. fol. quinatis.
- R. fruticosus* γ. δ *Pollin. Ver.* 2. p. 150. 151.
- R. sículus* d *Guss. Sup.* 1. p. 158.* fol. argute serratis.
- β foliis supra plus minus denudatis.
- Rubus tomentosus* b hypoleucus *Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. p. 579.
- R. sículus* a *Guss. Sup.* 1. p. 158.*
- R. fruticosus* 1/4 hypoleucus *Jan. El.* p. 8. n. 4.*
- R. glandulosus* δ ? eglandulosus *De Cand. Franç.* 5. p. 544.*
- R. minor*, alpinus, Etnicus, rectus, canescens, candido flore *Cup. Hort. Cath.* p. 193.
- Ital. *Rovo vellutato*.
- Frut. Legi Bononiæ in sylvis collinis di Paderno, Gai-bolla, Tizzano*, ubi copiosus. Filius attulit ex Apennino Bononiensi prope *le Fellegare*, et ex vertice *Cor-noviglia* supra *Calice* in provincia Lnnensi. Habui ex collibus Taurinensibus a Prof. BALBISTO, ex saxosis ad

thermas Valderias a BERTEAO, ex Euganeis prope *Prag-gia* a MONTINIO, ex montibus Foro-Julien-sibus a GERNAZAO, ex *Monfalcone* a BERINIO, Tergesto a BIASO-LETTO, ex Piceno in monte *de' Fiori* a PRATO lungo a MARZIALETTO, in monte *Vettore* a FORCA di PRESTO, et in monte *Acuto alle Pezze* ab ORSINO, ex Apennino della *Somma* a FIORINIA-MAZZANTIA, ex Hetruria in Apennino Pistoriensis a Prof. PETRO SAVIO, a *Vallom-brosa* a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, ex sylvis, et sepibus Lucanis a Castelgrande a GASPARRINIO, ex provincia di *Molise* a *Monte di mezzo*, et ex Sicilia ab Eq. GUSSONIO, ex Corsica a *Vivario* a SOLERIOLO. Varietatem β legi in Liguria orientali in montibus del *Bracco*, Bononiæ in sylvis di *Montecastello*, et *Cer-retolo* sub Erebo. Filius attulit ex monte *Salvero* ad viam Porrectanam. Habui ex Pedemontio in sylvis col-linis ad Albam Pompejam, et in saxosis ad thermas Valderias a BERTERO, ex districtu Veronensi in monte *Pastello* a MANCANOTTO, ex monte *Spaccato* Istriæ, et ex rupestribus circa *Contovello* a TOMMASINIO, ex Pi-ceno in monte *de' Fiori* a MARZIALETTO, et in *Vettore* ab ORSINO, ex Apennino Mgellano, et ex *Montamia-ta* a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, ex monte *S. An-gelo di Castellamare* a RAINERO, ex fruticetis demissis, et ex trsfosis apricis Lucanis a Castelgrande a GA-SPARRINIO, ex provincia di *Molise* a *Monte di mezzo*, Panormo a *S. Martino*, et in sylva della *Rocella* ab Eq. GUSSONIO, denuo ex Sicilia a Prof. JANIO. Floret Junio.

Caulis inferior senescens subteres, glaber, junior, et superior pentagonus, incano-tomentosus, pilisque sub-fasciculatis insuper villosus, in aprico ex incano-purpurascens, alterne ramosus, etiam quadri-quin-quepedalis, dum brevior erectus, dum longior decli-nans, et subinde arcuatus. Aculei caulini potius gra-ciles, licet basi quidquam compresso-dilatati, alii bre-ves, alii longiusculi, recta patentes, vel adunci, et subinde adunco-retrorsi, ludunt toti glabri, vel basi al-bo-pubescentes. Folia alterna, petiolata, nunc omnia, nunc suprema tantum ternata, reliquis quinatis. Fo-liola magnitudinis, et formæ variæ, plerumque crassiu-scula, sed in umbrosis attenuantur, ovata, obovata, oblonga, rhombea, rhombeo-oblongata, acuta, vel acu-minata, basi integra, reliquo margine inæqualiter ser-rato-serrata, nunc leviter, nunc profundius, nunc

serraturis grossioribus, nunc parvis, et crebrioribus, magis, vel minus argutis, utrinque molliter incano-tomentosa, sed subtus sæpe densius, et albidus, ideo quandoque supra ex incano virentia. Foliolum impar longe petiolulatum, lateralia multo brevius, et subinde fere sessilia, indivisa, vel lobo extus insculpta, sæpe quidquam basi obliquata. Nervus foliolorum in parte inferiore plerumque aculeolatus. Petioli incano-tomentosi, aculeolati. Stipulae lineares, sitæ in basi petioli, aut vix supra, incano-villosæ, cito deciduæ. Racemus terminalis, compositus, partialibus subcorymbosis, sæpe auctus racemis axillaribus proximis, minoribus, incano-tomentosus, et insuper villosus, villis subfasciculatis, aculeatus. Bractea inferiores latiores, trifida, relique lineares, indivisæ; omnes acuminatæ, tomentosæ, et villosæ. Subinde pro bracteis inferioribus folium simplex, indivisum, vel bi-trilobum. Calyx incano-tomentosus, villosusque, inermis, eglandulosus, laciniis ovatis, aut ovato-lanceolatis, brevissime acutato-subulatis, concavis, cito retroflexis. Petala alba, oblongo-obovata, obtusa, crispula, calyce duplo longiora. Stamina alba. Syncarpium potius parvum, globosum, drupeolis numerosis, maturitate nigris. Nulla seta apice glandulifera in hac specie.

Varietas β differt foliis superne denudatis, viridibus, ibique nunc prorsus glabris, nunc punctis prominulis, quæ rudimenta tomenti, nunc pilis stellantibus plus minus raris adspersa. Passim obvius transitus ab hac in typum speciei.

Errant profecto, qui ex hac specie faciunt duas, alteram foliis ternatis, alteram quinatis, cum uterque foliorum modus sit huic solemnus, imo mihi occurrerit in caulibus ejusdem cæspitis.

4. *Rubus incanescens*: caule angulato, aculeato, superne hirsuto; foliis ternatis, supra glabris, subtus tomentosus, foliolis ovatis, inæqualiter serratis, floralibus simplicibus, cordatis; racemo composito, pyramidato, divaricato, villosissimo, hispido-glanduloso, aculeisque falcatis crebre armato; petalis oblongis.

R. glandulosus γ incanescens *De Candoll. Franç. 5. p. 544.*

Ital. *Rovo lanuginoso.*

Frut. Reperi Sarzanæ in Montedarme, et dedi Cl. De Candolle amico optimo f. r., cum Sarzanæ apud me esset. Floret Majo.

Caulis pentagonus, aculeatus, aculeis rectis, aduncisve, flavicantibus, basi insigniter dilatatis, apice attenuatis. Folia alterna, petiolata, ternata, foliolis ovatis, vel ovato-oblongis, breviter cuspidatis, inæqualiter argute serratis, basi integris, supra viridibus, glabris, subtus dense, et molliter albo-tomentosis, impari paulo majore, subcordato, basi quidquam angustiore, lateralibus paululum obliquatis; floralia inferiora duoduatour, simplicia, cordato-ovata, longiuscule petiolata, in reliquis similia. Petioli hirsuti, aculeati, setoso-glandulosi. Stipulæ lineari-angustissimæ, hirsutæ, setosæ, ortæ paulo supra basim petioli. Racemus terminalis, compositus, longus, pyramidatus, laxus, divaricatus, villosissimus, villis patentibus, fasciculatis, albis, et insuper crebre hispidus setis apice glanduliferis, armatusque aculeis falcatis, valde numerosis. Sub ramis inferioribus racemi folia simplicia pro bracteis. Reliquæ bractes lineari-angustissimæ. Calyx hirsutissimus, et plus minus setoso-glandulosus, laciniis ovato-lanceolatis, concavis, apice brevissimo, subulato, glabro, in fructu reflexis. Petala alba, oblonga, basi angustata, obtusa, apice eroso-crenata, calyce circiter triplo longiora. Syncarpium parvum, globosum, drupeolis numerosis, maturitate nigris.

Nulla figura hujus speciei habetur, neque in *Rubis Germanicis Weihei*, et *Neesii*.

5. *Rubus glandulosus*: caule superne angulato, hirsuto, setoso-glanduloso, aculeatoque, aculeis tenuibus; foliis ternatis, quinatisque, supra pilosis, subtus pubescentibus, foliolis late ovatis, oblongisve, cuspidatis, inæqualiter serratis; petalis oblongis.

R. glandulosus Willd. *En.* 1. p. 548. n. 5. *Smith. Engl. Fl.* 2. p. 403. *Bellard. App. in Acad. de Tur. an.* 1790-1791. v. 5. p. 230. *Re Tor.* 1. p. 267. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 307. n. 9. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 236. *Sang. Cent.* p. 71.* *Ten. Syll.* p. 248. n. 3. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. p. 580.* et *Sup.* 1. p. 158.* *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 474., et 5. p. 544. α.

R. fruticosus β *glandulosus* Pollin. *Ver.* 2. p. 150.

R. Koehleri α *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 247. *Engl. bot. sup.* v. 1. t. 2605. *Weihe. et Nees. Rub. Germ.* p. 71. tab. 23.

R. hybridus Vill. *Dauph.* 3. p. 559. *Gaud. Helv.* 3. p. 364. α.

R. villosus α *glandulosus* *De Cand. Prodr.* 2. p. 563. n. 71.

R. Bellardi *Weihe, et Nees. Rub. Germ. p. 97. t. 44. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 509.*

R. hirtus *Waldst. et Kit. Pl. rar. Hung. 2. p. 150. t. 141. Weihe: et Nees. Rub. Germ. p. 95. t. 43. Reich. Exc. 3. p. 607. n. 3928. Host. Austr. 2. p. 32.*

β foliolis parvis, crebre serrulatis, glaucescentibus, supra adpresso villosis, subtus velutinis.

Rubus hirtus Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 580., et Sup. 1. p. 158.**

Ital. *Rovo silvano.*

Frut. Legi in Lunensi provincia prope vicum Calice secus viam del Martinello; ubi valde copiosus. Filius attulit ex Apennino Bononiensi alla Gata di Castiglione de' Pepoli. Habui ex thermis Porrectanis a PIRAZZOLIO, ex Podemontio a Prof. BALBISIO, et in sylvis editioribus di S. Stefano Belbo a BERTERO, ex valle Intrasca ad Verbanum in sylvaticis vallis Canobina a Prof. DE NOTARIS, ex Tyroli Italico in Fiemme prope Tesero a FACCHINIO, ex districtu Bassanensi in sylvis di Vallerana, et Pozzolo prope Rubbio a MONTINIO, ex Apennino Maceratensi in monte Birro a Prof. UTRILI, ex Nursinis in valle Canetra, ex Piceno all' Infernaccio di S. Leonardo, et in monte Acuto alle Pezze ab ORSINO, in monte de' Fiori, in monte Alpone, et a Montefortino a MARZIALETTIO, ex Præutiis in valle Chiarina ab Eq. GUSSONIO, et a Pizzoli a Prof. MAURIO, ex Ducatu Lucensi a Chiatris a Prof. PUCCINELLIO, ex Apennino Pistoriensi a Prof. PETRO SAVIO, ex Montesinario, Vallombrosa, et ex balneis S. Philippi a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, ex Sicilia in sylvis di Rocella, et Ætnæ ab Eq. GUSSONIO. Varietatem β accepi ex Sicilia in sylvis di Caronia, et Cannata ab Eq. GUSSONIO. Floret Majo, Junio, vix Julio.

Caulis cæspitosus, senescens inferne teres, reliqua parte, vel surculis junioribus angulatus, et flexuosus, uni-quadripedalis, dum brevior erectus, dum longior declinans, vel procumbens, superne hirsutus, crebre, inæqualiterque setoso-glandulosus; et aculeatus, aculeis tennibus, basi paululum compresso-dilatatis, recta patentibus, vel leniter recurvis, et subinde recurvato-retrorsis, plerumque totus una cum setis, et aculeis purpurascens, rarius virens aculeis, setisque flavidis. Folia alterna, petiolata, plerumque omnia ternata, vel unum, alterumve ex superioribus ad flores simplex, interdum vero nonnulla ex inferioribus,

Flor. Ital. T. V.

vel in surculis annotinis adhuc sterilibus quinata, aut quaternata. Foliola magnitudine, et forma variantia, subrotundo-ovata, elliptico-ovata, aut ovato-oblonga, sæpe longe cuspidata, alias cuspidè brevi, vel tantum acuta, argute, et crebre serrato-serrata, serraturis parvis, interdum vix inæqualibus, utrinque viridia, sed supra saturatius, pilisque plus minus raris, adpressis adpersa, contra nervum, et venas majores sulco-impressa, subtus pallidiora, et plus minus dense pubescentia, interdum fere glabrata, rarissime albo-tomentosa, in nervo aculeolata. Foliolum impar subinde subcordatum, longius petiolulatum, lateralia passim basi quidquam obliquata, brevissime petiolulata, vel sessilia; aliquando in foliis ternatis lobo insculpta, et etiam bipartita. Petioli more caulis crebre aculeati, setoso-glandulosi, et hirsuti, purpurantes, aut virentes. Stipulæ lineari-angustissimæ, longæ, villosæ, setoso-glandulosæ, ortæ supra basim petioli. Racemus terminalis, compositus, vel subsimplex, potius brevis, et pauciflorus, hirsutus, crebre aculeatus, et setoso-glandulosus more caulis, cujus colorem sequitur; subinde in axillis supremis foliorum augetur uno, alterove racemulo minori, vel etiam flore solitario, pedunculato. Bractæ plerumque longæ, angustæ, inferiores bi-trifidæ, reliquæ indivisæ, lanceolato-lineares, aut lineares, omnes acuminatæ, hispido-glandulosæ, pilosæ. Subinde loco bractearum inferiorum habetur unum, alterumve folium simplex, indivisum, vel bi-trilobum, ovato-oblongum, aut ovato-lanceolatum. Calyx totus hispido-glandulosus, aculeatus, hirsutus, purpurascens, vel virens; ejus lacinie ovato-lanceolatæ, aut lanceolatæ, concavæ, acuminato-subulatæ, acumine sæpe insigniter elongato, in anthesi patentes, in fructu nunc erectæ, nunc retroflexæ. Petala alba, vel ex albo carnea, oblonga, obtusa, calyce sublongiora. Syncarpium subglobosum, magnitudine varium, sæpe grandiusculum, drupeolis numerosis, sursum erectis, prope maturitatem rubrum, acidum; maturitate nigrum, dulce. Decedente Julio occurrunt in eodem racemo syncarpia immatura rubra, cum maturis nigris grato spectaculo.

Varietas *β* est planta humilis. Ejus folia ternata, foliis ovatis, parvis veluti *Rosæ centifoliæ* L., acutis, vel minoribus subrotundis, obtusis, crebre, minute, inæqualiter, argute serrulatis, supra adpresse villosis,

cinereo-glauco, subtus molliter tomentosulis, tomento e cinereo albente. Reliqua ut in specie. Antopta videant in loco natali, quousque hæc forma procedat lusibus suis, et an potius sit distincta species. Nulla figura est in Rubis Germanicis Weih. et Nees., quæ eidem tribui possit.

Tam observationibus Bellardii, quam Auctorum Floræ Hungaricæ, et meis certissimum est, haberi in hac specie folia ternata, et quinata, quamvis plerumque omnia sint ternata. Hinc *Rubus glandulosus* W. non dilaniandus in falsas species, prout haecenus factum est.

6. *Rubus corylifolius*: caule declinante, inferne tereti, superne angulato, aculeis sparsis, rectis, aduncisve; foliis inferioribus quinatis, superioribus ternatis, foliolis late ovatis, duplicato-serratis, lobatisque, supra glabris, subtus pubescentibus; calycibus breviter acuminatis, in fructu retroflexis; petalis obovatis.

R. corylifolius Smith. *Fl. Brit.* 2. p. 542., et *Engl. Fl.* 2. p. 408., et *Engl. bot.* v. 12. t. 827. Anders. in *Trans. Lin. Soc.* v. 11. part. 2. p. 219. Hook. *Brit. Fl.* ed. 2. p. 248. *Lagasc. Hort. sicc. Lond. fasc.* 1. n. 17.* *So. bot.* v. 3. t. 187. *De Cand. Franc.* 4. par. 2. p. 475., et *Prodr.* 2. p. 559. n. 30. & *Gaud. Helv.* 3. p. 361. & opt. descript.

Ital. *Rovo nocciuolino*.

Frut. Legi Bononiæ in adscensu di Barbiano. Habni ex sepibus collum ad Albam Pompejam a BEATERO. Floret Junio, Julio.

Caulis declinans, inferne teres, superne angulatus; quadri-quinquepedalis, longior dum valde luxuriat, glaber, aut pilosulus, plius minus aculeatus, aculeis in parte tereti undique sparsis, cæterum crassiusculis, potius brevibus, basi compresso-dilatatis, rectiusculis, vel leniter aduncis, raris, rarius crebris. Folia alterna, petiolata, inferiora quinata, superiora ternata, utraque lusu quaternata; prope flores subinde simplicia. Foliola late ovata, vel late subrotunda, acuta, aut breviter cuspidata, ima subinde minora, et obtusa, duplicato-serrata, et interdum lobata, magnitudinis variorum, et quandoque grandia ut folia coryli, quibus similia, utrinque virentia, sed supra saturatius, et glabra, subtus pallidius, et pubescentia, raro densius pubescentia, et albicantia. Foliolum impar majus, longiuscule petiolulatum, sæpe subcoordinatum; lateralia brevissime petiolulata, vel sessilia, basi quidquam obliquata, margine

externo interdum lobo insculpta, vel etiam profunde bipartita. Petioli aculeati, glabri, aut vix pilosuli. Stipula lanceolato-lineares, sitæ in basi petioli, aut vix supra. Racemi compositi, pedunculati, terminales, solitarii, sæpe cum axillaribus proximis; ludunt subcorymbosi, vel cylindracei, albo-pubescentes, inermes, vel aculeati, setis apice glanduliferis plerumque carentes, aut saltem paucis, brevibusque adpersi. Bractea lanceolato-lineares, vel lineares, pubescentes, inferiores sæpe palmato-bi-tripartitæ, vel bi-trifidæ. Subinde quoque loco bractearum inferiorum folium simplex; indivisum, aut bi-trilobum. Calyx albido-tomentosulus, pilosusque, inermis, et eglandulosus, rarius aculeolis, præsertim basi, adpersus, vel setis glanduliferis brevibus, paucisque scatens. Lacinia calycinæ ovata, vel ovato-lanceolata, concava, breviter acutata, in anthesi patentes, in fructu retroflexæ. Petala obovata, vel oblongo-obovata, alba, aut ex albo carnea, obtusa, crispula, calyce longiora. Syncarpium globosum, maturitate nigrum, pulpa sanguinea, acida, constans drupeolis numerosioribus, et paulo minoribus, quam in *Rubo cæsius* L.

Certus sum de hac specie ex descriptionibus, et figuris, quas attuli, et præsertim ab exemplari Anglico, quod obtinui a Prof. LAGASCA. Verum sub nomine *Rubi corylifolii* passim accepi plantas et ab hoc, et inter se diversas, ita ut coactus sim silere de synonymis Italorum defectu autopsiæ.

7. *Rubus cæsius*: caule inferne tereti, declinante, prostratoque, aculeis acicularibus, subretrorsis, undique sparsis; foliis ternatis, subtus pubescentibus, foliolis rhombeis, ovatisve, inæqualiter serratis; racemo subcorymboso, paucifloro; calycibus acuminato-caudatis; syncarpium dupreolis paucis, grandibus, depressis.

R. cæsius Sp. pl. p. 706. Smith. Engl. Fl. 2. p. 409., et Engl. bot. v. 12. t. 826. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 248. a. Lagasc. Hort. sicc. Lond. fasc. 1. n. 16.* Fl. Dan. t. 1213. Sv. bot. v. 4. t. 241. optim. Nouv. Duh. 6. p. 69. t. 22. f. 2. medicor. Weih. et Nees. Rub. Germ. p. 102. a. β. tab. 46. fig. 1. 2. All. Ped. 2. p. 132. n. 1772.* Bulb. Taur. p. 82. Re Seg. p. 44. Birol. Acon. 1. p. 172. Coll. Herb. Ped. 2. p. 307. n. 7. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 235. Comoll. Prodr. p. 98. Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec. 2. t. 10. p. 287.* Pollin. Ver. 2. p. 149. Moric. Ven. 1. p. 222. Naec. Ven. 3. p. 68.* Suffr. Foroj. p. 146. Spad. Xil. 3. p. 98. Ors. in

- Cap. Opusc. p. 286. Sav. Pis. 1. p. 480., et Bot. Etr. 4. p. 111. Ten. Nap. 4. p. 288. A. B., et Syll. p. 248. n. 9. A. B. Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 578.* De Cund. Franç. 4. par. 2. p. 474., et Prodr. 2. p. 558. n. 24. a. β. δ. Röhl. cum Mert. et Koch. Deutsch. Fl. 3. p. 491. Koch. Syn. p. 210. Reich. Exc. 3. p. 608. n. 3930. a. β. γ. Host. Austr. 2. p. 32. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 356. Gaud. Helv. 3. p. 360. a.*
- R. cæsius* γ *pseudo-cæsius* *Weih. et Nees. Rub. Germ. p. 103. tab. 46. B. fig. 1.*
- R. corylifolius* *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 171.**
- R. acherunticus* *Ten. Nap. 4. p. 288. t. 235. f. 2.**, *et Syll. in add. et em. p. 603.* Guss. Sup. 1. p. 156.**
- R. n. 1110. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 43.*
- R. alter humilior fructu parvo &c. Casalp. De pl. lib. 3. cap. 11. p. 98.*
- R. repens, fructu cæsius* *Cup. Hort. Cath. p. 193. Zannich. Ist. p. 229. t. 101. mala. Segui. Ver. 2. p. 302. n. 3.*
- Ital. Rogo di fior bianco* *Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 207.*
- Frut. Legi Sarzanæ in humentibus di Camisano, in Lunensi provincia a Calice in sepibus juxta caulem di Campi, Bononiæ in sylvulis umbrosis di Mezzarata, in sepibus al Battiferro juxta il Canale Naviglio, in arvis di Casalecchio secus Rhenum, et in monte Mariano prope il Sasso, in Apennino Florentina prope tabernam del Covigliaio, Cumis in ora Acherusis (Fusaro) cum Eq. Gussonio, qui Rubum acherunticum Ten. esse declaravit, ex quo loco obtinui quoque a Rainero. Habui ex Liguria orientali in ripis Entellæ a Turio, ex Pedemontio a Molinerto, et in sylvaticis thermarum Valderiarum, et Albæ Pompejæ secus Tanarum a Bertero, ex sepibus prope Ticinum ab Eq. Parolinio, Mantuæ a Pradella a Barbierto, ex demissis circa Veronam, et ex Baldo secus viam dei Lumini a Manganotto, ex Tyroli meridionali in dumetis Brixionensibus ab Eq. Hauflero, ex Tyroli Italico in sylvaticis di Fiemme, et Fussa a Facchinio, ex districtu Tergestino in monte Spaccato, et in Lippizza a Tommasinio, ex Monfalcone a Berinio, ex ora Veneta a Cortelazzo a Prof. Naccario, ex agro Parmensi a Prof. Janio, ex arvis Perusinis ab egregio botanophilo Bruschio, ex Piceno a Montefortino a Marzialeto, ex Præstutis prope Avezzano, et Capistrello ab Eq. Gussonio, ex Ducatu Lucensi ad oras paludis Blentinensis a Prof. Puccinellio, ex Hetruuria in rudibus theatri*

Fesulani a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTO, in campis Volaterranis ab AMIDEO, ex sepibus circa Romam, ubi vulgatissimus, a Prof. MAURIO, et ex Palatino in ruderibus domus Augustæ a BARBIERIO, Panormo *alla Pizzuta* a Prof. PARLATORE. Floret Junio, Julio.

Radix repens, et præsertim in arvis longe lateque protensa, caules approximatos sursum emittens. Caulis teres, gracilis, dum humilis erectus, dum longior declinans, vel prostratus, uni-tripedalis, undique aculeatus, glauco-virens, aut glauco-purpurascens, superne, ramisque flexuosus, et subinde obtuse angulatus. Aculei potius breves, basi paululum dilatati, reliqua parte tenues, aciculares, recta subretroorsi, pauci retrorso-aduncii, flavidi, aut purpurantes. Folia alterna, petiolata, ternata, raro quinata. Foliola rhombea, aut ovata, acuta, vel acuminata, imis quandoque minoribus, et obtusis, basi integra, reliquo margine inæqualiter serrata, aut inciso-serrata, serraturis modo parvis, crebris, argutis, modo grossioribus, obtusiusculis, supra leviter plicata, et bullata, late, vel saturate viridia, glabra, aut pilis raris adpersa, subtus nervosa, et reticulato-venosa, plus minus pubescentia, et subinde dense, et moliter, pallidius virentia. Foliolum impar longiuscule petiolulatum, interdum subcordatum, indivisum, vel bi-trilobum. Foliola lateralialia sessilia, basi quidquam obliquata, sæpe margine externo lobo insculpta, aut etiam bipartita. Petioli semiteretes, aculeolati, supra canaliculati, nunc toti, nunc canaliculo pubescentes, reliqua parte glabri, vel subpilosi. Stipula lanceolato-lineares, longiusculæ, sitæ in basi petioli. Racemi solitarii, terminales, et axillares, pauciflori, pedunculati, subcorymbosi, parce compositi, vel simplices, plus minus pubescentes, aculeolati, setisque apice glanduliferis adpersi. Subinde in axillis foliorum loco racemi est pedunculus uni-biflorus. Bractea lanceolato-lineares, vel lineares. Pro bracteis imis interdum folium simplex, indivisum, aut bi-trilobum. Calycis lacinia ovato-oblonga, aut ovato-lanceolata, plus minus longe acuminato-caudata, cauda lineari-subulata, concava, puberula, extus nunc aculeolata, nunc inermes, perumque setis apice glanduliferis rariusculis adpersa, in anthesi patentes, et etiam retroflexa, in fructu erecta, et syncarpio adpressa. Setæ glanduliferae pedicellorum, et calycum sæpe rubescentes. Corolla grandiuscula, et subinde vere grandis, sive diametri octo-decem linearum,

alba, vel pallide carnea. Petala obovata, integra, aut emarginata, crispula, vel plana, subpilosa, venis hyalinis æque dissitis longitudinaliter percursa. Stamina alba. Syncarpium e drupeolis paucis, grandibus, subrotundo-depressis, prope maturitatem rubris, maturis nigro-purpurantibus, vel nigro-cærulescentibus, cæsiopruinosi, pulpa sanguinea, acida.

Hæc species, dum luxuriat, valde appropinquat præcedentem; forte ita se habet lusus ille, de quo loquitur Andersonius in Trans. Lin. Soc. v. 11. par. 2. p. 220. veluti de planta a Wiggisio descripta. Eandem proximitatem adnotarunt quoque Smithius in Engl. Fl. 2. p. 410., et Hookerus in Brit. Fl. ed. 2. p. 248. Nihil tamen secius *Rubus cæsius* L. gaudet caule graciliore, teretiore, aculeis tenuioribus, acicularibus, frequentius recta retrorsis, foliolis minoribus, sæpius ad formam rhombeam accedentibus, faciem simpliciore, parcius florifero, laciniis calycinis longe acuminato-caudatis, fructui adpressis, drupeolis in syncarpio numero minoribus, sed grandioribus. Quoad vero numerum aculeorum in caule, et ad pubescentiam majorem, vel minorem in pagina inferiore foliolorum *Rubi cæsii* L., dantur tot, tantique gradus a maximo ad minimum in individuis diversis, ut de his rebus curari non possit.

* * *Caule herbaceo.*

8. *Rubus saxatilis*: caule herbaceo, basi stolonifero; foliis ternatis; petalis oblongis; syncarpio depauperato, drupeolis grandibus, globosis.

R. saxatilis Sp. pl. p. 708. Smith. Engl. Fl. 2. p. 410., et Engl. bot. v. 32. t. 2233. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 249., et Fl. Lond. ed. Grav. v. 5. t. 37. Fl. Dan. t. 134. Svens. bot. v. 5. t. 349. Weihe. et Nees. Rub. Germ. p. 30. t. 9. All. Ped. 2. p. 133. n. 1774. Re Seg. p. 43. Birol. Acon. 1. p. 172. Coll. Herb. Ped. 2. p. 308. n. 14. Comoll. Prodr. p. 98. Pollin. Ver. 2. p. 151. Suffr. Foroj. p. 147. Cuss. Pl. rar. p. 207.* Ten. Nap. 4. p. 291., et Syll. p. 248. n. 10. De Cand. Franc. 4. par. 2. p. 473., et Prodr. 2. p. 564. n. 78. a. γ. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 491. Koch. Syn. p. 211. Reich. Exc. 3. p. 608. n. 3931. Host. Austr. 2. p. 33. Wallr. Sched. crit. p. 224. a. β. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 357. Gaud. Helv. 3. p. 366.

R. n. 1111. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 43.

Rovo molle d' altra specie *Pon. Mont. Bald. p. 336.*

Rubus idæus lævis Segui. Ver. 2. p. 302. n. 5.

R. saxatilis alpinus Clus. Hist. pl. lib. 1. p. 118. fig.

R. alpinus humilis J. Bauh. Hist. pl. 2. lib. 14. p. 61. fig.

Ital. Rogo erbaiolo. Rogo gramignollo Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 207.

Perenn. Habui ex Liguria occidua in monte Gallè a Prof.

SASSIO, ex Cenisio a BONJEANNIO, ex monte Generoso

ad Larium a Rev. ODESCALCHIO, ex districtu Veronensi

in sylvis editis montis Pastello a MANGAROTTO, ex

montibus Baasanensibus ab Eq. PAROLINIO, ex eisdem

montibus in sylvis di Vallerana prope Rubbio a MON-

TINIO, ex Præutiis alla Maiella in valle di S. Spirito,

et in valle d' Orfenta ab Eq. GUSSONIO. Floret Junio.

Caulis herbaceus, angulatus, erectus, vel adscendens,

subinde flexuosus, pubescens, inermis, aut plus minus

aculeolatus, paucifolius, palmatis, spithamalis, basi

squamatus, et stolonifer, stolonibus prostratis, apice

demum radicanibus. Aculei breves, tenues, acicula-

res, inæquales, recta patentes, lusu sursum incurvu-

li, aut deorsum recurvuli. Folia alterna, longe petio-

lata, ternata, foliolis ovatis, acutis, aut acuminatis,

alias obtusis, duplicato-serratis, utrinque viridibus,

ciliatis, supra glabris, aut vix pilosis, subtus in ner-

vo, venisque plus minus pilosis, vix prorsus glabris,

pallidius virentibus. Foliolum impar sæpe rhombeo-ova-

tum, petiolulatum, vel subsessile, interdum subtrilo-

bnum. Foliola lateralia sessilia, aut subsessilia, basi

obliquata, subinde extus lobo minore insculpta. Pe-

tioli canaliculati, pubescentes, inermes, vel aculeola-

ti. Stipulae foliaceae, oblongae, aut lanceolatae, obtusae,

vel superiores acutae, pilosae, sitae in basi petioli. Fo-

lia ad flores quandoque simplicia, ovata, vel cordato-

-ovata. Flores parvi, terminales, sæpe cum axillaribus

proximis, subumbellati, umbella simplici, bi-decemfle-

ra, sessili, aut breviter pedunculata, folio subposito

semper multo superata. Flores axillares, si qui sunt,

subinde solitarii. Pedunculi, et pedicelli pubescentes,

aculeolati, aut inermes. Bracteam involucentes, lanceo-

latæ, integræ, vel bi-trifidæ. Laciniae calycinae ovato-

lanceolatae, apice breviter acutato-subulatæ, extus pu-

bescenæ, inermes, et eglandulosæ, intus fere tomen-

tosæ, in anthesi patentes, in fructu ascendenti-incur-

væ. Petala angusta, oblonga, obtusa, ex albo viri-

dula, interdum cum rubedine, calyci subæqualia.

Syncarpium e drupeolis paucis, et subinde solitariis, grandibus, maturitate rubro-kermesinis, acidis. Nucula reticulata, foveolata.

*** *Foliis impari-pinnatis, ternatisque.*

9. *Rubus idæus*: caule erecto; foliis impari-pinnatis, ternatisque, subtus tomentosis; racemis paucifloris, nutantibus.

R. idæus *Sp. pl.* p. 706. *Smith. Engl. Fl.* 2. p. 407., et *Engl. bot.* v. 34. t. 244a. vix bona. *Hook. Brit. Fl.* ed. 2. p. 242. *Fl. Dan.* t. 788. *Svens. bot.* v. 3. t. 181. vix bona. *Plenck. Ic. pl. med.* 5. p. 14. t. 407. excl. fig. inferiore dextera. *Nouv. Duh.* 6. p. 70. t. 23. *Weihe. et Nees. Rub. Germ.* p. 107. t. 47. *All. Ped.* 2. p. 132. n. 1771. *Re Seg.* p. 42., et *Ter.* 1. p. 266. *Birol. Acon.* 1. p. 172. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 305. n. 2. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 235., et 383. *Comoll. Prodr.* p. 98. *Pollin. Ver.* 2. p. 148. *α. β. Suffr. Foroj.* p. 147. *Spad. Xil.* 3. p. 89. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 286.* *Bert. Aman. Ital.* p. 371. n. 155. *Bert. fil. It. in Apenn. Bonon.* p. 20.* *Sav. Bot. Etr.* 4. p. 111. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 171. *Ten. Nap.* 4. p. 288., et *Syll.* p. 248. n. 8. *Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 214. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. p. 578.* *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 478. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 490. *Koch. Syn.* p. 210. *Reich. Exc.* 3. p. 608. n. 393a. *Host. Austr.* 2. p. 28. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 355. *Gaud. Helv.* 3. p. 359.

R. n. 1108. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 41.

Rovo ideo *Matth. Valgr.* 1585. tom. 2. p. 1064. fig. fol. ternatis. *Dur. Herb. ed. Rom.* 1585. p. 399. fig. rudis.

Rubo Ideo *Ang. Sempl.* p. 257.

Rubus tertius montibus proprius *Casalp. De pl. lib.* 3. cap. 11. p. 98.

R. idæus sine spinis fructu, et suavitate fragarum similis *Marant. Meth. cogn. simpl.* p. 24.

Rovo ideo di Dioscoride *Pon. Mont. Bald.* p. 336.

Rovi Idei *Ampomeli detti Camp. Spicil.* p. 30.

Rubus Idæus spinosus *Segui. Ver.* 2. p. 302. n. 4.

Ital. Pruno del monte. Rovo ideo. Lampone salvatico. Lampone senza spine (planta). *Ampomello. Aponi. Frambò. Lampine. Lampione. Lamponi. More prugnoles. Lamponi* (fructus) *Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 207.

Offic. Rubi idæi fructus, folia *Lin. Mat. med.* p. 85. n. 242.

Frut. Legi in alpinis Apuanis in vertice *Sagro* praesertim in valle *Catino*, in provincia Lunensi in cacumine montis *Cornoviglia* supra vicum *Calice*, in Liguria orientali in monte *Gottro*. Filius attulit ex Apennino Bononiensi *all' Acero*, et a *Castiglione de' Pepoli*, ex quo novissimo loco habui quoque a MATTEJO. Accepi ex Apennino Liguriae orientalis *alle Cabanne* a TURIO, ex districtu Veronensi in monte *Pastello* a MANGANOTTO, ex Tyrolis Italico in sylvis di *Fiemme*, et *Fassa* a FACONINIO, et a *Cima d'Asta* ab Eq. PETRUCCIO, ex districtu Bassanensi in sylvis di *Vallerana*, et *Collalti* a MONTINIO, ex Apennino Faventino a *Rio del Lago* a TASSINARIO, ex Nursinis a *Castelluccio* a Prof. OCTAVIANO, ex Piceno in monte *Acuto alle Pezze* ab ORSINO, ex Etruria in Apennino di *S. Sepolcro*, et plebis S. Stephani a CHIARCO, ex montosis Siciliis *alla Piana de' Greci* ab Eq. GUSSONIO. Floret Jullo, Augusto, citius in demissis.

Radix repens, caules approximatos emittens. Caulis erectus, alterne ramosus, aculeatus, vel inermis, inferne teres, glaber, et ubi senescit cinerascens, superne obtuse angulatus, pubescens, glauco-virens, et flexuosus, longitudine mire ludens, scilicet a spithama ad tres, vel quatuor pedes. Aculei, ubi adsunt, tenues, aciculares, sparsi, breves, recurvi, vel subretrorsi, interdum numerosi. Rami patuli, saepe nutantes. Folia in macrioribus individuis cuncta ternata, in luxuriantibus inferiora impari-pinnata, pinnis duabus, superiora ternata. Foliola magnitudine ludentia, ovata, ovato-oblonga, acuta, aut acuminata, minimis tantum obtusis, argute serrata, modo fere aequaliter, modo serrato-serrata, et subinde etiam incisa, supra late viridia, pilosa, lineata, subrugosa, subtus niveo-tomentosa, nervo inermi, vel aculeolato, venis parallelis. Foliolum impar majus, longiuscule petiolulatum, nunc basi quidquam angustatum, nunc latum, cordatum, aut rotundatum, superne indivisum, vel bi-trilobum. Foliola lateralia minora, sessilia, aut subsessilia, saepe basi obliquata. Petioli crassi, longi, teretes, supra levissime canaliculati, pubescentes, inermes, aut aculeolati. Stipulae lineari-angustissimae, longae, pubescentes, sitae supra basim petioli. Racemus terminalis, pauciflorus, simplex, nutans, interdum auctus floribus axillaribus proximis, solitariis, longiuscule pedunculatis. Fulcra omnia tenuia, pubescentia, inermia, vel

aculeolata. Bractea similes stipulis; ludunt foliaceae. Laciniae calycinae lanceolatae, plus minus longe acuminate-subulatae, albo-tomentosae, inermes, aut vix aculeolatae, patentes etiam in fructu. Petala oblonga, angusta, obtusa, alba, calyce breviora. Ovaria albo-tomentosa. Syncarpium subrotundum, drupeolis grandinculis, convexo-depressis, stilo persistente; laterali apiculatis, maturitate rubro-kermesinum, gratissimo acidulum cum dulcedine. Receptaculum fructus oblongo-conicum, album, pubescens.

Usus. Fructus praestat in secundis mensis, in gelida sorbitione, in syrupo. Syrupus iste aqua solutus recreat, refrigerat sub calore aetivo; praeterea sitim, aetumque febrilem temperat, exstinguit; eadem obtinentur ex aqua foliorum.

Observ. Nonnullas alias Ruborum species a botanicis nostris evulgatas frustra petii; hinc in re tam difficili de iis cogor silere, donec mihi innotescant.

FRAGARIA.

Lin. Gen. p. 255. Tourn. Inst. 2. t. 152. Juss. Gen. p. 338. Lamck. Ill. 5. t. 442. Vent. Tabl. 3. p. 347. Gært. De fruct. 1. p. 350. t. 73. Nestl. Potent. p. 17. Smilh. in Rees's Cycl. v. 15., et Engl. Fl. 2. p. 413., et Gramm. tab. 20. fig. 259. De Cand. Prodr. 2. p. 569. Endlich. Gen. p. 1241. n. 6361. excl. Duchesn.

Calyx perianthium monophyllum, decempartitum, lacinias alternis minoribus, et externis, persistens, semper patens. Petala quinque subrotunda, ungue brevissimo, patentia, inserta orae receptaculi ampliati contra lacinias minores calycis, decidua. Stamina viginti, vel ultra, corolla breviora, erecta, affixa peripheriae receptaculi prope petala ordine simplici, filamentis basi dilatatis, apice subulatis, persistentibus, antheris subrotundis, bilocularibus, incumbentibus, deciduis. Receptaculum convexum, cui haerent ovaria plura. Stilus in quovis ovario solitarius, lateralis, brevis, persistens. Stigma simplex, obtusum. Fragum factum e receptaculo magno, elevato, globoso, vel ovoideo, maturitate pulposo; succoso,

colorato, eduli, facile deciduo, in cujus superficie nidulantur nuculae numerosissimae, monospermicae, ovales, tumidulo-compressae, undique sparsae, arrectae, incurvae, laeves, glabrae, margine attenuato insidentes receptaculo.

Habitus. Herbae humiles, e collo radiceis plerumque stoloniferae, molliter villosae. Folia radicalia, longe petiolata, ternata, vix simplicia, grosse dentata. Stipulae basi petioli adnatae. Caulis scapiformis, herbaceus, nudus, terminatus corymbo simplici, vel ramoso, involucrato, et saepe bracteato. Petala alba. Flores subinde dioici. Fructum rubrum, rubro-albens, vel albo-lutescens, deliciosum.

Observ. Vocabulum *fragum* a scriptoribus latinis bonae notae sancitum ad significandum fructum *Fragariae* est praestantissimum:

Qui legis flores, et humi nascentia fraga.

Virg. Ecc. 3. v. 92.

Fragaria indica Andr. receptaculo firmiter adherente, exsucco, non eduli, habituque *Potentilla reptanti* L. maxime affinis recte ad genus *Duchesnea* a Smithio ammandata in Linn. Soc. v. 10. par. 2. p. 372.

Ord. nat. Ut in *Rubo* p. 217.

1. *FRAGARIA vesca*: stolonibus radicalibus elongatis; villis petiolorum, et caulium patentibus, pedunculorum adpressis; calycibus fructus reflexis.

F. vesca *Sp. pl.* p. 708. *Smith. Engl. Fl.* 2. p. 114, et *Engl. bot.* v. 22. t. 1524. *Hook. Brit. Fl.* ed. 2. p. 249. *Plenck. Ic. pl. med.* 5. p. 17. t. 412. *Lamck. Ill.* 5. t. 442. *Sv. bot.* v. 1. t. 16. *All. Ped.* 2. p. 59. n. 1491. *Balb. Taur.* p. 83. *Re Seg.* p. 43., et *Tor.* 1. p. 269. *Birol. Acon.* 1. p. 173. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 328. n. 2. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 239., et 387. *Comoll. Prodr.* p. 98. *Pollin. Ver.* 2. p. 164. a. *Bert. Mant. Fl. Apuan.* p. 32. n. 51. *Bert. fil. It. in Apenn. Bonon.* p. 20.* *Jan. El.* p. 8. n. 1.* *Ten. Nap.* 4. p. 291., et *Syll.* p. 248. n. 1. *Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 215. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. p. 581. *De Cand. Franc.* 4. par. 2. p. 468. a. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abtheil. 2. heft. Röhl. cum Mert. et

Koch. Deuts. Fl. 3. p. 511. a. *Koch. Syn.* p. 211. a. *Reich. Exc.* 3. p. 597. n. 3867. a. *Host. Austr.* 2. p. 34. *Gaud. Helv.* 3. p. 367. a. *Wahlenb. Lap.* p. 145., et *Succ.* 1. p. 320.

F. collina Sang. *Cent.* p. 71. * excl. syn.

F. sylvestris *Duchesn. Hist. nat. des Frais.* p. 61.

Potentilla vesca *Scop. Carn. ed. 2. tom. 1.* p. 363.

Fragaria n. 1112. a. *Hall. Hist. stirp. indig. Helv.* 2. p. 44.

Fragaria *Matth. Valgr.* 1585. tom. 2. p. 1075. fig. *Calz. Viag. di mont. Bald.* p. 12. *Pon. Mont. Bald.* p. 237.

Fragaria quoddam genus in alpinis Bargois visum *Cesalp. De pl. lib.* 14. cap. 18. p. 554.

Fraghe *Camp. Spicil.* p. 30.

Fragaria vulgaris *Cup. Hort. Cath.* p. 79. *Segui. Ver.* 1. p. 496.

Fragaria, et *Fraga* major subalba *Lob. Ic.* p. 697.

Fraga altera *Dod. Pempt.* p. 672. fig.

Fragaria *Camer. Epit.* p. 765. fig.

Ital. Fragola salvatica. Fragola bricjolina. Fragola di bosco. Fragola di montagna. Fragola moraiola. Bon-di Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 107.

Offic. Fragariae herba, fructus *Lin. Mat. med.* p. 86. n. 245.

Perenn. *Vulgaris* in editis Apennini, et alpium nostrarum, rarius descendit in planitiem. Legi Bononiæ in sylvis editis di *Montecastello*, et montis *Mariano* prope *il Sasso*. Filius attulit ex Apennino Bononiensi in monte *Barba bianca* prope *Castiglione de' Pepoli*, et in *Nuda di Vidicciatico*, tum ex *Tambura* alpium Apuanarum ai *Campaniletti*. Habui ex districtu Veronensi in sylva *del Mantico* a *MANGANOTTO*, ex sylvis montanis *Bassanensibus* a *MONTINIO*, ex Tyroli meridionali prope *Bolzano* a *FACCHINIO*, ex sylvis montium *Parmensium* a *Prof. JANIO*, ex agro *Maceratensi*, ubi rara, et ex Apennino *Cingulano* in monte *S. Vicino* ab *Eq. NARDUCCIO*, ex *Piceno* in monte *Volubrio alle Svolte* a *MARZIALETTO*, ex *Ducatu Lucensi* a *Gattaiola* a *Prof. PUCCINELLIO*, ex *Ettruria* in sylvis *Fesulanis*, et in montibus *del Casentino* a *Prof. ANT. TARCIONIO-TOZZETTO*, Romæ in villa *Pamfili* a *Prof. MAURIO*. Floret in demissis Majo, Junio, in editis Julio, Augusto.

Radix. lignosa, transversa, fusiformis, fusco-rubida, lateraliter fibris crassiusculis, simplicibus, ramosisve

capillata, superne tecta squamis concoloribus, scariosis; ex apice ejus evolvitur gemma foliifera, et caulifera cum stolonibus. Folia omnia radicalia, caespitosa, longe petiolata, ternata. Foliola sessilia, potius grandia, ovata, grosse, et profunde dentata, dentibus acutiusculis, terminali minore, basi integra, supra lato, vel saturate viridia, adpersaque pilis raris, adpressis, subtus parallele venosa, glaucescentia, et scatentia pilis numerosioribus, adpressis præsertim in nervo, venisque, impari basi cuneato, lateralibus obliquis. Petioli e sinu stipulæ bifidæ, scariosæ profecti, longi, canaliculati, villosi, villis patentibus. Subinde inter folia radicalia ternata habetur unum, alteramque folium simplex. Ex collo radice pariter prodeunt stolones flagellares, prostrati, elongati, pilosi, hic illic radicales, et proles novas ferentes. Caulis solitarius, vel plures inter folia radicalia, herbaceus, simplex, nudus, hirsutus villis patentibus, erectus, interdum flexuosus, nunc foliis longior, nunc brevior, plerumque semipedalis-dodrantalis. Corymbus cauli terminalis, simplex, vel ramosus, involucreto folio simplici, aut ternato, subsessili, profecto e sinu stipulæ bifidæ. In corymbo ramoso sub quovis ramo est bractea parva, angusta, simplex, aut bi-tripartita, acuminata. Loco corymbi habentur quoque flores solitarii in apice caulis. Pedunculi omnes adpersi villosi brevi, nunc toto adpresso, nunc erecto-patulo, in flore erecti, in fructu arcu magno cernui. Flos potius parvus. Calyx laciniis ovato-lanceolatis, acuminatis, plus minus villosus, in anthesi patentissimus, in fructu retroflexus. Petala subrotunda, alba, calyce paulo longiora, aut saltem æqualia. Fragum globosum, vel ovoideum, rubrum, vel rubro-albens, suave, expetitur, magnitudine varium. Villi herbæ canescentes, solitarii, aut fasciculati.

Usus. Fraga hujus speciei sunt delictum mensarum, præsertim lota vino, et saccharo condita; sub sole æstivo præstant in gelida sorbitione. Hinc planta colitur in hortis Italiæ ad fraga præcociora obtinenda, et cum hæc deficiunt, alpini ferunt in oppida nostra ex plantis sylvestribus, nec minus deliciosa, idque obtingit a mense Julio ad Septembrem. Linnæus in Fl. Suec. ed. 2. p. 175., ex eo quod fraga hæc solvant tartarum dentium sine acredine, landabat ad calculos, et podagram, imo asseverat, se usu eorum a podagra prorsus

liberum per plures annos evasisse. At id non observatum in aliis. Aqua ex foliis, et syrupus ex fructibus habentur pro diureticis, et diaphoreticis.

2. *FRAGARIA collina*: minor; flagellis brevibus, nullisve; foliis subtus sericeo-argenteis; villis petiolorum, caulisque patentissimis, pedunculorum erecto-patulis; calycibus frago adpressis.

F. collina Ehrh. Beitr. 7. p. 26. Willd. Sp. pl. 2. par. 2. p. 1093. Fl. Dan. t. 1389. Svens. bot. v. 8. t. 548. Balb. El. recent. stirp. in Accad. di Tor. ann. 1818. tom. 23. p. 106. Coll. Herb. Ped. 2. p. 327. n. 1. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 409. Barb. Agg. p. 35. Pollin. Ver. 2. p. 154. Ten. Nap. 4. p. 291., et Syll. p. 249. n. 2. De Cand. Franc. 5. p. 543., et Prodr. 2. p. 569. n. 3. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 513. Koch. Syn. p. 211. Reich. Excurs. 3. p. 597. n. 3870. Host. Austr. 2. p. 34. Gaud. Helv. 3. p. 368.

F. vesca Sav. Pis. 1. p. 481. Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 172.*

F. vesca $\frac{1}{3}$ collina Jan. El. p. 8. n. 1.*

F. in sylvis nascens Casalp. De plant. lib. 14. cap. 18. p. 554.

Ital. *Fragola di poggio*.

Perenn. Copiosa in herbidis collinum humiliorum in Italia temperatiore. Legi Sarzanæ, ubi frequentissima in collibus omnibus, Bononiæ in sylvis di Ronzano, et Crovara supra la Spipla. Habui ex sepibus collium prope Veronam a MANCANOTTO, et ex Lessiniis a RAINERO, ex districtu Bassanensi in sepibus d'Angarano a MONTINIO, ex viciniis Tergesti a TOMMASINIO, ex agro Parmensi a Prof. JANIO, ex Hetruria in umbrosis montis Pisani a Prof. PETRO SAVIO, in sylvis Fesulanis a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, a Careggi ab Eq. RICASOLO, Romæ a Prof. MAURIO. Floret Aprili, Majo.

Præcedente omnibus herbæ partibus, non flore, minor. Stolones inter folia nulli, vel subsolitarii, breviores, villosi, decumbentes. Foliola præ illis præcedentis speciei parva, supra lineato-subplicata, subtus sericeo-argentina, nitida. Petioli a semipollice ad æquipollicem. longi, densissime villosi, villis patentibus. Caulis foliis æqualis, aut paulo longior, subinde etiam brevior, ideo pollicaris-palmaris, ipse quoque villosissimus, villis patentibus. Corymbis pauciflorus. Pedunculi copiose tecti villis erecto-patulis. Flos ut in præcedente. Calyx fructus frago adpressus. Fragum

coceineum, edule, facile deciduum, saporis quidquam diversi a sapore fragi *Fragaria vesca* L., nec tam grati. Reliqua ut in illa.

Usus. Comeditur ut præcedens, sed venit minori pretio.

3. *FRAGARIA elatior*: firma, grandis, stolonibus elongatis; villis petiolorum, caulium, pedunculorumque patentibus; calycibus fructus retroflexis.

F. elatior Ehrh. Beitr. 7. p. 23. Willd. Sp. pl. 2. par. 2. p. 1091. Smith. Engl. Fl. 2. p. 415., et Engl. bot. v. 31. t. 2197. villis peduncul. nimis obsoletis. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 249. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 512. Koch. Syn. p. 211. Reich. Exc. 3. p. 597. n. 3869. Host. Austr. 2. p. 33.

F. moschata Duchesn. Hist. nat. des Frais. p. 145. pl. culta.

Fragaria et *Fraga* Lob. Ic. 697. Dod. Pempt. p. 672. fig. Ital. *Fragola maggiore*.

Perenn. Rara in Italia. Accepi tantum ex Tyroli Italico al *Castello di Fiemme*, et in viciniis di *Capriana* a *FACCHINIO*. Floret ab Junio in Septembrem.

Gaudet habitu firmiore, et plerumque grandiore, quam *Fragaria vesca* L., a qua præterea differt notis sequentibus. Folia subtus pallentia, non glauca; eorum villositas ut in illa. Caulis crassior. Corymbus compositus, multiflorus, eodem modo involucrat, et bracteatus. Petioli, caulis, pedunculi valde hirsuti, villis patentibus, longioribus. Flos sæpe plusquam duplo grandior. Calyx in fructu retroflexus. Petala late obovata. Stamina quandoque abortiva. Fragum non vidi, sed describitur grande, saturatius rubens, suave, moschatum, fundo calycis tenacius adhærens. Villositas plantæ rudior.

Fraga fuerunt cibus hominum ævo primo, et beato, cum

per se dabat omnia tellus

Contentique cibis, nullo cogente, creatis

Arbateos fatus, montanaque fraga legebant.

Ovid. Met. lib. 1. v. 102-104.

POTENTILLA .

Lin. Gen. p. 255. *Juss. Gen.* p. 338. *Lamck. Illustr.* 5. t. 442. *Vent. Tabl.* 3. p. 346. *Nestl. Pot.* p. 17. tab. 1. (excl. *Comar.*, et *Torm.*). *Smith. Engl. Fl.* 2. p. 415.

De Cand. Prodr. 2. p. 571. (excl. Torm., et Comar.).

Endl. Gen. p. 1242. n. 6363. (excl. Torm.).

Pentaphyllum Tourn. Inst. 2. t. 153. *Gærtn. De fruct.* 1. p. 349. t. 73.

Comaroides Ponted. Anthol. p. 290.

Calyx perianthium monophyllum, liberum, persistens, tubo concavo, brevi, limbo decempartito, laciniis alternis plerumque minoribus, et externis, in fructu erecto-coenivens. Petala quinque, obcordata, obovata, oblonga, obverse lanceolata, inserta oræ receptaculi expansi, et sita contra laciniis externas calycis, decidua. Stamina viginti, et ultra, corollæ breviora, peripheriæ receptaculi prope petala affixa, filamentis subulatis, antheris ovatis, bilocularibus, incumbentibus. Ovaria plura, stilo laterali, persistente instructa. Receptaculum fructus convexum, parvum, exsuccum, pilosum, tectum nuculis monospermis, exiguis, subreniformibus, tumidulis, lævibus, scabris, rugosis, glabris, villosis. Hilus lateralis.

Habitus. Plantæ perennes, paucae fruticosæ, vel annuæ. Folia impari-pinnata, aut digitata, quæ ultima variant ternata, quinata, septenata, novemnata. Foliola serrata, dentata, incisa, basi cuneata integra. Petioli orti e sinu stipulæ bifidæ. Flores dichotomo-corymbosi, raro solitarii. Corolla lutea, alba, rubra.

Ord. nat. Ut in *Rubo* p. 217.

* *Folliis pinnatis.*

1. *POTENTILLA Anserina*: sericeo-argentina; stolonibus reptantibus; foliis interrupte pinnatis, foliolis oblongis, argute-serratis; pedunculis unifloris.

P. Anserina Sp. pl. p. 710. *Smith. Engl. Fl.* 2. p. 417., et *Engl. bot.* v. 12. t. 861. *Curt. Lond. ed. Grav.* v. 3. t. 82.

Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 250. *Fl. Dan.* t. 544. *Svens. bot.*

v. 3. t. 152. *Plenck. Ic. pl. med.* 5. p. 19. t. 413. *Bull.*

Herb. de la Franc. t. 157. *Nestl. Pot.* p. 35. n. 11. *Lehm.*

Pot. p. 71. n. 25. *All. Ped.* 2. p. 54. n. 1472. *Bir. Acon.* 1.

p. 173. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 314. n. 10. *Prin. De Pot.*

Ital. p. 9. n. 5. * *Comoll. Prodr.* p. 99. * *Barb. Agg.* p. 35. *

Flor. Ital. T. V.

- Pollin. Ver.* 2. p. 155. *Moric. Ven.* 1. p. 225. *Nacc. Ven.* 3. p. 71.* *Suffr. Foroj.* p. 147. *Jan. El.* p. 8. n. 2.* *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 455., et *Prodr.* 2. p. 582. n. 72. *α. γ. Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 4. heft. Köhl. cum Mert. et Koch. *Deuts. Fl.* 3. p. 518. *α. γ. Koch. Syn.* p. 213. *α. β. γ. Reich. Exc.* 3. p. 596. n. 3861. *Host. Austr.* 2. p. 35. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 358. *Gaud. Helv.* 3. p. 405. *α. β. γ. Fragaria* n. 1126. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 51. *Potentilla Matth. Valgr.* 1585. tom. 2. p. 1070. fig. *Dur. Herb. ed. Rom.* p. 376. fig. *Calz. Viag. di mont. Bald.* p. 12. *Potentilla Casalp. De pl. lib.* 14. cap. 23. p. 557. *Potentilla (err. typ. Potendilla)* minore, ovvero Argemone d'alcuni *Pon. Mont. Bald.* p. 143. *Pentaphylloides argenteum*, alatum, seu *Potentilla Zannich. Ist.* p. 207. t. 26. *Segui. Ver.* 1. p. 502. *Ital. Argentina. Piè d'oca. Piè di gallo Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 174. *Offic. Argentina herba* Lin. *Mat. med.* p. 86. n. 246. *Perenn.* Habui ex Pedemontio a Prof. BALBISIO, ex *Bormio* in *Faltellina* a RAINERO, ex paludosis di *Colico* a Prof. COMOLLIO, ex *Val Camonica* a *Ponte di legno* a BERGAMASCHIO, ex Baldo a BARRIERIO, ex Tyroli Italico in *Fiemme*, et *Fassa* secus vias a FACCHINIO, in *Val di Fiemme* prope *Egna* a Prof. MENECHINIO, et in monte *Sadole* ab Eq. PAROLINIO, ex districtu Bassanensi in humentibus dei *Collalti*, d'*Assiago*, et *Primiero* a MONTINIO, ex agro Tergestino prope S. Cantianum in arenis fluminis *Reka* a TOMMASINIO, ex provincia Veneta in ripis della *Brenta* a Prof. NACCARIO, ex agro Parmensi a Prof. JANIO. Floret ab Junio in Augustum.
- Radix fusiformis*, brevis, fusce rubens, fibris crassis, ramulosis aucta. Ex ejus collo prodeunt stolones, folia, et pedunculi, seu scapi. Stolones teretes, crassiusculi, prostrati, plus minus elongati, sericeo-villosi, simplices, vel ramosi, hic illie deorsum radicales, sursum emittentes gemmam foliiferam, et floriferam. Folia caespitosa, impari-, et interrupte-pinnata, pinnis numerosis, et saepe totum petiolum vestientibus. Foliola oblonga, obtusa, vel acuta, argute, et profunde serrata, supra viridia, nuda, aut vix villosa, subtus sericeo-argentina, ludant utrinque viridia, et fere denudata, aut utrinque sericeo-argentina, opposita, vel alterna, inferiora decrescentis, et remotiora. Inter pinna-

habentur ramenta foliacea, exigua, integra, ant incisa. Petiolus communis plus minus sericeo-villosus, supra canaliculatus, ortus e sinu stipulae bifidae, laciniis acutis, subinde laciniatis, sericeo-villosis, demum aridis, scariosis, fusce rubidis. Pedunculi, seu scapi solitarii, uniflori, erecti, orti e centro rosulae foliorum, plus minus sericeo-villosi, nunc foliis longiores, nunc breviores. Flos potius grandis. Calyx sericeo-villosus, laciniis ovato-lanceolatis, acutis, vel acuminatis, integris, aut apice incisus. Corolla luteo-aurea, calyce longior, petalis obovatis, integris, vel emarginatis. Ovaria saepe abortiva. Stili crassiusculi. Receptaculum sericeo-villosum. Nuculas non vidi.

Usus. Herba ob vim adstringentem laudata in leucorrhoea, nunc desneta.

2. *Potentilla multifida*: caule decumbente; foliis longo petiolatis, impari-pinnatis, foliolis oblongis, pinnatifidis, subtus villosis-tomentosis; floribus subcorymbosis. *P. multifida* *Sp. pl.* p. 710. *Hall. fil. in Mus. Helv.* 1. p. 56. *Ser. ibid.* p. 79. *tab.* 8. *Nestl. Pot.* p. 33. n. 7. *Lehm. Pot.* p. 64. n. 21. (ubi error. typ. dicitur *supina*). *All. Ped.* 2. p. 54. n. 1473. *Birol. Acon.* 1. p. 174. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 313. n. 8. *Prin. De Pot. Ital.* p. 9. n. 6. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 456., et *Prodr.* 2. p. 581. n. 66. *Koch. Syn.* p. 213. *Reich. Exc.* 3. p. 596. n. 3863. *Host. Austr.* 2. p. 36. *Gaud. Helv.* 3. p. 407. a.

Fragaria n. 1125. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 50. *Ital. Potentilla pennata.*

Perenn. Habui ex Cenisio a Бонжавице. Floret Julio, Augusto.

Radix fusiformis, circa collum tecta squamis, seu reliquiis stipularum aridis, fuscis. Caules e radice plures, caespitosi, decumbentes, ascendentes, teretes, simplices, vel superne ramosi, ramis alternis, adpresse villosi, pollicares-spithamales. Folia radicalia, et caulina inferiora longe petiolata, impari-pinnata, pinnis duabus-tribus, nunc approximatis, nunc inferiore remotiuscula, caulina alterna, superiora successive brevius petiolata, supremas sessilia, vel subsessilia, quinata, vel ternata. Omnium foliola oblonga, profunde pinnatifida, laciniis linearibus, angustis, integerrimis, obtusis, margine revolutis, supra saturate viridia, parce, et adpresse pilosa, subtus villosis-tomentosa, incava, infima decrescentia. Petioli supra canaliculati, villosi, orti e sinu stipulae bifidae, potius grandis,

villosæ, laciniis acuminatis, integerrimis, vel dente insculptis. Flores parvi, terminales, subcorymbosi, axillares, et alares. Folia floralia sæpe simplicia, tripartita. Pedunculi, et calyces adpresse villosi. Laciniis calycinis lanceolatis, acutis, aut acuminatis. Corolla flava, calyci æqualis, aut paulo longior. Petala obovata, emarginata. Receptaculum villosum. Nuclei plicis obscuris, arcuatis instructi, cæterum glabris.

8. *POTENTILLA rupestris*: caule erecto; foliis longe petiolatis, impari-pinnatis, pinnis paucis, foliolis ovatis, dentatis, incisive, pubescentibus; corollis calyce longioribus.

P. rupestris *Sp. pl.* p. 711: *Smith. Engl. Fl.* 2. p. 417., et *Engl. bot.* v. 29. t. 2058. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 250. *Jacq. Austr.* 2. p. 9. t. 114. *Hall. fil. in Mus. Helv.* 1. p. 50. *Ser. ibid.* p. 65. t. 6. f. 1. 2. *Nestl. Potent.* p. 39. n. 21. *Lehm. Pot.* p. 47. n. 10. *All. Ped.* 2. p. 54. n. 1474. *Balb. Taur.* p. 83.* *Re Seg.* p. 43., et *Tor.* 1. p. 269. *Birol. Acon.* 1. p. 174. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 314. *Nöcc. et Balb. Tic.* 1. p. 239., et 387. *Prin. De Pot. Ital.* p. 8. n. 3. *Comoll. Prodr.* p. 99. *Pollin. Ver.* 2. p. 156.* *Suffr. Foroj.* p. 147. *Vitm. Sag.* p. 47. *Bert. Aman. Ital.* p. 371. n. 156. *Bert. fil. It. in Apenn. Bonon.* p. 14.* *Sav. Bot. Etr.* 2. p. 111.* *Moris. Stirp. Sard. el. fasc.* 2. p. 3.* *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 464., et *Prodr.* 2. p. 583. n. 82. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 517. *Kösch. Syn.* p. 213. *Reich. Exc.* 3. p. 590. n. 3825. *Krock. Siles.* 2. p. 162. t. 9. *Host. Austr.* 2. p. 35. *Scop. Carn. ed.* 2. p. 358. *Gaud. Helv.* 3. p. 376.

Fragaria n. 1127. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 51. *Quinquefol. V. fragiferum* *Clus. Hist. pl. lib.* 5. p. cr11. fig.

Pentaphylloides erectum *J. Bauh. Hist. pl. 2. lib.* 17. p. 398. 'fol. d.' (error. p. 598.) fig.

Ital. Fragolaccia rupina.

Perenn. Legi in valle Catino montis Sagro alpium Apuanarum. Filius attulit ex vertice Corno alla Scala in Apennino Bononiensi. Habui ex Apennino Ligurum orientalis in prato dell'Acqua fredda prope S. Stephanum d'Aveto a Turis, ex rupibus supra Niviam ab Eq. Prof. MORISTO, ex Pedemontio in saxosis ad thermas Valderias a BERTERO, in sylvis della Mandria a Prof. BALBISIO, a Confienza in Lomellina ab Eq. CESATE, ex provincia Mediolanensi in sylvis di Origgio, et

prope *Lainate* a PPTR. BALSAMO-CRIVELLIO, et DE NOTARIS, ex monte *S. Eutichio* prope Comum a RAINERO, ex Tyroli meridionali prope Roboretum in rupibus di *Singialto* a POLLINIO, ex Tyroli Italico in *Fiemme* ad orientem di *Predazzo*, et in *Fassa* inter *Soraga*, et *Moena* a FACCHINIO, ex *Montalon* in *Valsugana* ab Eq. PAROLINIO, ex collibus d' *Angarano* in districtu Bassanensi, et ex Euganeis: prope *Praggia* a MONTINIO, ex Apennino Pistoriensi ab Eq. Prof. CAR. SAVIO, ex editoribus pascuis montis *Gennargentu* in Sardinia ab Eq. Prof. MORISIO, ex *Monte d' oro* Corsicæ a SOLENNOLIO. Floret Junio, Julio.

Radix fusiformis, transversa, lateraliter fibrosa, et veluti repens, rufescens, sæpe sursum in plures surculos cauliferos soluta. Caulis teres, erectus, vel adscendens, crassiusculus, simplex, aut superne ramosus, paucifolius, pubescens, in aprico passim rubens, spithamalis-sesquipedalis, et in plantis macrioribus pollicaris-palmaris. Folia radicalia, et caulina inferiora longe petiolata, impari-pinnata, pinnis duabus-tribus. Foliola ovata, magnitudine varia, basi integra, reliquo margine inæqualiter dentata, et sæpe quoque incisa, obtusa, utrinque pilosa, et viridia, sed subtus pallidiora, impari majore, æqualiter cuneato, lateralibus oblique cuneatis, oppositis, vel alternis, inferioribus decrescentibus. Folia caulina pauca, inferiora remotiora, superiora proximiora, multo brevius petiolata, vel sessilia, acuta, sæpe ternata, ceterum reliquis similia. Petioli pubescentes, supra canaliculati, orti e sinu stipulae bifide, parvæ, villosæ, laciniis ovatis, acutis. Flores potius grandes, in corymbo terminali, subdichotomo cum pedunculo alari. Folia floralia sessilia, ternata, foliolis angustis, inciso-dentatis, suprema ramentacea. Pedunculi pubescentes. Calyx hirsutus, laciniis lanceolatis, vel oblongo-lanceolatis, acutis. Corolla alba, calyce longior. Petala subrotunda, integra, vel emarginata. Stamina alba. Anthera margine laterali dehiscentes, loculis ambientibus connectivum ellipsoideum, coloris sanguinei. Receptaculum hirsutum. Nuculae scabriusculæ, subinde obscurissime plicatæ, rufescentes.

4. *POTENTILLA supina*: caulibus dichotomis, prostratis; foliis impari-pinnatis, foliolis oblongis, dentatis; pedunculis axillaribus, unifloris, fructiferis recurvatis; corollis calyce subbrevioribus.

P. supina Sp. pl. p. 711. Jacq. Austr. 5. p. 3. t. 406. Nestl. Pot. p. 38. n. 18. Lehm. Pot. p. 42. n. 7. Allion. Ped. 2. p. 55. n. 1475. Balb. Taur. p. 83.* Re Tor. 1. p. 270. Birol. Acon. 1. p. 174. Coll. Herb. Ped. 2. p. 313. n. 7. Prin. De Pot. Ital. p. 8. n. 2. Pollin. Ver. 2. p. 156. Guss. Pl. rar. p. 208.* Ten. Nap. 4. p. 297., et Syll. p. 252. n. 21. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 456., et Prodr. 2. p. 580. n. 55. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 544. Koch. Syn. p. 212. Reich. Exc. 3. p. 596. n. 3860. Krock. Sil. 2. p. 163. t. 10. Host. Austr. 2. p. 35. Gaud. Helv. 3. p. 406.

Pentaphylli species, flore luteo, sive Enneaphyllos hirsuta *Ambros. Phyt.* 1. p. 414. fig. rud.

Pentaphyl. supin. quorundam *Potentillæ* facie *Clus. Hist. pl. lib. 5. p. cxi.* fig.

Ital. *Piè d'oca verde*.

Ann. Habui, ex Pedemontio secus Padum supra *Moncalieri* a Præf. BALBISIO, ex oris Benaci in viis prope vicum *Lazzise* a POLLINIO, a MANGANOTTO, a RAINERO, et a Prof. NACCARIO, ex Tyroli meridionali prope *Sallorno* inter *Bolzano*, et Tridentum a FACCHINIO, ex oris lacus Fucini ab Eq. GUSONIO. Floret a vere in autumnum.

Radix fusiformis, flexuosa, fusca, tenuis, aut saltem non valde crassa, fibris ramniosis prædita. Caules e radice plures, prostrati, rosulati, dichotomi, teretes, fistulosi, subhirsuti, a semipede ad sesquipedem longi. Folia impari-pinnata, foliolis oblongis, obtusis, dentatis, pilosis, vel supra glabris, utrinque viridibus, sed subtus pallidioribus, oppositis, vel alternis, impari majore, basi cuneato, sæpe bi-trifido, lateralibus oblique cuneatis, inferioribus multo minoribus, et remotioribus; radicalia, et caulina inferiora longe petiolata, pinnis tribus-quinque prædita, suprema sessilia, aut subsessilia, pinnis paucioribus, floralia omnium minora, ternata. Petioli subhirsuti; supra canaliculati, orti e sinu stipulæ bifidæ, lacinii lanceolatis, vel ovatis, integris, acutis, aut obtusis. Pedunculi solitarii, axillares, et in dichotomiis alares, uniflori, filiformes, pubescentes, nudi, potius breves, fructiferi cernui, aut recurvati. Flores parvi. Calyx pilosus, lacinii ovatis, acutis. Corolla lutea, calyci subæqualis, aut brevior. Petala oblongo-obovata, emarginata, vel integra. Receptaculum hirsutum. Nuculæ sulcata, rugulosa.

**** Foliis digitatis.**

5. *POTENTILLA recta*: subhirsuta; caule erecto; foliis inferioribus septenatis, superioribus quinatis, foliolis obverse oblongo-lanceolatis, grossae profunde dentatis, stipulis grandibus, integris, incisive; petalis obcordatis, pallidis, calyce longioribus,
P. recta *Sp. pl.* p. 711. *Nestl. Pot.* p. 42. n. 25. tab. 6. *Lehm. Pot.* p. 79. n. 30. excl. fig. *All. Hall. fil. in Mus. Helv.* 1. p. 56. *All. Ped.* 2. p. 55. n. 1476. excl. syn. *Jacq. Balb. Taur.* p. 83. *Re Seg.* p. 43., et *Tor.* 1. p. 270. *Birol. Acon.* 1. p. 174. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 315. n. 13. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 240., et 387. *Prin. De Pot. Ital.* p. 11. n. 9. *Comoll. Prodr.* p. 99. *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec.* 2. tom. 10. p. 288.* *Pollin. Ver.* 2. p. 157. *Moric. Ven.* 1. p. 224. *Nacc. Ven.* 3. p. 72. *Sav. Bot. Etr.* 2. p. 111.* *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 172. *Ten. Nap.* 1. p. 284. *A.*, et *Syll.* p. 252. n. 19. *De Cand. Franc.* 4. par. 2. p. 467. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 519. *α. Koch. Syn.* p. 213. *α. Reich. Cent.* 4. p. 31. t. 339. f. 520., et *Erx.* 3. p. 595. n. 3855. *Gaud. Helv.* 3. p. 385.
P. pilosa *Willd. Sp. pl.* 2. par. 2. p. 1100. excl. syn. *All. P. hirta* & *recta* *De Cand. Prodr.* 2. p. 579. sub n. 45. *Fragaria* n. 1121. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 49. *Emptafilo Calz. Viag. di mont. Bald.* p. 13.
Quinquefolium erectum, maximum, flore pallide luteo, petalis cordatis *Mich. Cat. hort. Flor.* p. 78. herb. Bonon.
Q. rectum luteum *Zannich. Ist.* p. 222. pl. flore pallido. *Segui. Ver.* 1. p. 499. n. 3. *Hort. Rom.* 5. tab. 49.
Q. rectum, majus *Garid. Aix.* p. 393.
Q. montanum, erectum, hirsutum luteum *Garid. l. c. tab.* 83.
Pentaphyllum rectum majus *J. Bauh. Hist. pl.* 2. lib. 17. p. 598. (pro 398.). fol. c. fig.
Ital. Cinquefoglio. Fragolaocia *Targ. Toza. Diz. bot.* 2. p. 174.
Perenn. Legi Sarzanæ in herbidiis di Montedarme, Bononia in arvis secus Rhenum a *Casalecchio*. Habui ex collibus di *Pegli* in Liguria occidua a Prof. *DE NOTARIS*, Albæ Pompejæ secus Tanarum a *BERTERO*, ex viciniis Comi in monte *S. Donato* a *RAINERO*, ex agro Mantuano a *BARBIERO*, ex monte *Polino* in Sabinis ab *ORSINO*, ex Ducatu Lucensi al *Bagno caldo* a Prof.

PUCCINELLIO, ex herbosis sylvæ Pisanae alla Torre del Riccardi a. Prof. PETRO SAVIO, ex Apennino Mugellano ab Eq. Prof. CAJ. SAVIO, Fesulis al Fonte lucente a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, ex collibus Albanis a Monte Cavo a MARQUILLIARIO, ex Corsica in monte Grosso a SOLEIROLIO. Floret Majo, Junio.

Radix fusiformis, brevis, lateraliter fibris longis, crassis vestita. Caulis teres, erectus, vel adscendens, sesqui-bipedalis, simplex, vel apice ramosus, pilosus, aut subhirsutus, subinde inferne purpurascens. Folia inferiora longe petiolata, septenata, superiora quinata, successive brevius petiolata, supremaque sessilia. Foliola obverse oblongo-lanceolata, obtusa, grosse, et plus minus profunde dentata, supra pilosa, læte viridia, subtus villis longioribus, numerosioribus præsertim in nervo, et venis hirsuta, quidquam pallidiora, venis transversis multis, parallelis instructa, exteriora decrescentia. Petioli subhirsuti, pilis longis, patentibus, orti e sinu stipulæ profunde bifidæ, elongatæ, amplexicaulis, fortiter nervatæ, margine incisæ, rarius integræ, laciniis lanceolatis, vel lanceolato-linearibus. Corymbus terminalis, compositus, subdichotomus cum flore alari longius pedunculato in dichotomiis, pilosus, vel subhirsutus. Folia floralia minora, sessilia inter stipulam bifidam, suprema simplicia, ramentacea, incisæ. Flos grandis. Calyx hirsutus præsertim basi; ejus laciniæ lanceolatæ, acutæ, aut acuminatæ, longitudine æquales, externæ angustiores. Corolla pallide sulphurea, calyce longior, sæpe duplo. Petala obcordata. Receptaculum pilosum. Nuculæ exquisite rugoso-reticulatæ, cristulâ carinatæ.

6. **POTENTILLA obscura**: hirsutissima; caule erecto; foliis inferioribus septenatis, superioribus quinatis, foliolis obverse oblongo-lanceolatis, grosse, profunde dentatis; stipulis grandibus, integris, incisæve; petalis obovatis, emarginatis, aureis, calyci æqualibus.

P. obscura Willd. *Sp. pl.* 2. par. 2. p. 1100. *Nestl. Pot.* p. 44. n. 26. *Lehm. Pot.* p. 82. n. 31. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 316. n. 14. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 240. t. 10.* *Prin. De Pot. Ital.* p. 11. n. 10. *Reich. Cent.* 4. p. 31. t. 340. f. 521. bona.

P. hirta ♂ *obscura* De Cand. *Prodr.* 2. p. 579. sub n. 45. *Pentaphyllum*, vel melius *Heptaphyllum* rectum, caule rubente, hirsutius *Cup. Hort. Cath.* p. 165. in herb. Vaill. ex *Nestl.*

Quinquefolium montanum luteum erectum hirsutum
Bonann. Panph. tab. 80. bona.

Ital. *Fragolaccia irsuta*.

Perenn. Habui ex agro Ticinensi a Prof. BALBISIO, ex districtu Bassanensi in collibus d' Angarano a MONTINIO. Floret Majo, Junio.

Caule, et foliis simillima præcedenti, sed hirsutissima, pilis longis, canescentibus. Corolla luteo-aurea, calyci æqualis. Petala multo minora, obovata, emarginata.

Cultura persistentem vidi. In figura Floræ Ticinensis petala non satis saturate lutea exhibentur. Figura Reichenbachii superius a me allata est optima. Cur vero Cl. Auctor in Exc. 3. p. 595. transtulerit ad *Potentillam pilosam* suam n. 3853.; non satis intelligo.

7. *POTENTILLA hirta*: hirsuta; caule adscendente, erectove; foliis inferioribus septenatis, foliolis obverse lanceolatis, superioribus quinatis, foliolis anguste lanceolato-cuneatis, serratis omnibus; petalis obcordatis, aureis, calyce longioribus.

P. hirta Sp. pl. p. 712. Nestl. Pot. p. 46. n. 29. Lehm. Pot. p. 88. n. 35. tab. 8. pl. macrior. All. Ped. 2. p. 55. n. 1478. t. 71. f. 1. Re Seg. p. 43. Birol. Acon. 1. p. 175. Coll. Herb. Ped. 2. p. 316. n. 16. Prin. De Pot. Ital. p. 13. n. 13. Bert. Aman. Ital. p. 372. n. 157. Sav. Bot. Etr. 4. p. 113. Maur. Cent. XIII. p. 24.* Ten. Nap. 1. p. 285. A. B. Ab Ucr. Hort. Pan. p. 216. Moris. Stirp. Sard. el. fasc. 1. p. 18.* De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 457., et Prodr. 2. p. 578. n. 45. α. β. Lois. Deil. Gall. 1. p. 301.* et ed. 2. tom. 1. p. 367.* Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 520. α. β. γ. Koch. Syn. p. 213. α. β. γ. Reich. Exc. 3. p. 594. n. 3850. Host. Austr. 2. p. 37.

P. rubens All. Ped. 2. p. 58. n. 1486.* pl. luxur.

P. pedata Nestl. Pot. p. 44. n. 27. tab. 7. pl. luxur. Lehm. Pot. p. 84. n. 32. Coll. Herb. Ped. 2. p. 316. n. 15. Prin. De Pot. Ital. p. 12. n. 11. Ten. Syll. p. 252. n. 18. Guss. Fl. Sic. prod. 1. p. 583.* et Sup. 1. p. 159.* Reich. Exc. 3. p. 595. n. 3857.

P. pilosa Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 240. (non Willd.). Ten. Nap. 4. p. 296., et Syll. p. 252. n. 17. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 540.

P. recta Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 359. excl. syn.

P. læta Reich. Exc. 3. p. 595. n. 3858, pl. macr. Fide exempl. Sibenicensis a Prof. Visianio mihi concessi.

β foliolis inciso-dentatis.

Ital. Fragolaccia rossa.

Perenn. Copiosa in herbidis collium Ligurim, Italiæque temperatioris, nec deest in montanis. Legi Sarzanæ in *Montedarme*, et in *Nuda di Ponzano*, in alpinis Apuanis in vertice *Sagro*, in Apennino Florentino in monte *Beni* inter il *Covigliaio*, et *Pietramala*, Bononiæ ai *Gessi*, et a *Gaiolla*. Habui ex Liguria orientali in monte S. Jacobi districtus Clavarensis a TUAIO, ex collibus circa Genuam a Prof. DE NOTARIS, ex Liguria occidua in collibus di *Pegli* a VINCENTIO, ex collibus Niçænsibus ab Eq. Prof. MORISIO, ex collibus calidioribus Ligurim occidua, et Montisferrati a MOLINEAIO, ex Pedemontio a Prof. BALRISIO, ex districtu Bassanensi in collibus d'Angarano a MONTINIO, ex insula S. Andræ ad Istriam a TOMMASINIO, ex Engadina a MAJERO, ex districtu Faventino in monte MAURO a TASSINARIO, ex Piceno a *Montefortino alla Madonna della fonte* a MARZIALETTIO, ex Ducatu Lucensi ad cenobium Fratrum Franciscanum a S. *Cerbone* a Prof. PUCCINELLIO, ex Hetruria in monte Pisano a Prof. PETRO SAVIO, in colle Fesulano, in alpinis di *Bagno*, in monte *Calvi alla Sassetta*, et in *Montamiata* a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, Centumcellis, et Roma in monte Malo a Prof. MAURIO, ex Circeo a FIORINIA-MAZZANTIA, ex Sicilia in collibus Catana, et Panormi ab Eq. GUSSONIO, et in Nebrodibus all' *Ortaggio* a Prof. PARLATORE, ex saxosis siccis Sardinie ab Eq. Prof. MORISIO. Varietatem β accepi ex muro opidano Patavii a MONTINIO, ex districtu Viterbiensi a Canino a Rev. Fratre MAURITIO DE BAIXIA. Floret Majo, Junio.

Præcedentibus duabus minor. Radix lignosa, fusiformis, transversa, fusca, lateraliter crasse fibrosa. Caules nunc solitarii, nunc a radice plures, adscendentes, vel erecti, macriores subinde declinati, teretes, hirsuti, infra corymbum simplices, a paucis pollicibus ad pedem, et etiam quidquam ultra longi, in aprico semper rubro-purpurantes. Folia inferiora septenata, foliolis obverse lanceolatis, rarius obovatis, longius petiolata, non tamen adeo longe ut in duabus præcedentibus; caulina reliqua quinata, foliolis angustioribus, exquisito cuneatis, successive brevius petiolata, supremæque ternata, sessilia intra stipulam bifidam. Foliola omnia basi integra, relique margine, et quandoque tantum prope apicem profunde serrata, supra

pilosa, vel glabra, late, aut saturate viridia, subtus, et margine adspersa pilis numerosioribus, longis, adpressis, et pallidius virentia. Quandoque in minoribus individuis etiam folia inferiora sunt quinata. Petioli potius breves, hirsuti, supra canaliculati, orti e sinu stipulæ bipartitæ, segmentis lanceolatis, aut ovato-lanceolatis, hirsutis, indivisis, aut bifidis, lacinia externa brevior, Corymbus terminalis, compositus, hirsutus. Folia floralia sessilia intra stipulam bifidam, simplicia, tripartita, segmentis angustis, integris, incisive. Calyx quam in præcedentibus duabus paulo minor, hirsutus, laciniis lanceolatis, obtusiusculis, longitudine subæqualibus, externis angustioribus. Corolla calyce longior, etiam duplo, lateo-aurea. Petala obcordata. Receptaculum hirsutum. Nuculæ plicis arcuatis, subreticulatis instructæ, dorso cristulâ carinata. Hirsuties plantæ canescens, quandoque valde diminuta.

Varietas β habet foliola altius incisa, incisionibus in margine externo uno, alterove dente notatis. Hæc appropinquat *Potentillam lacinosam* Lehm. Pot. p. 86. n. 33. t. 7., quam tamen etiam juxta exemplar Hungaricum in meo herbario distinguunt foliola profunde pinnatifida, laciniis linearibus, iterum laciniatis, quam in nostra angustioribus, stipulæ quoque angustiores, et plurilaciniatæ.

Stirps polymorpha, ideo vexata, et in falsas species descripta.

8. *Potentilla canescens*: caule decumbente; ascendenteve; foliis inferioribus septenatis, quinatisve omnibus, foliolis obverse lanceolatis, cuneatis, grosse dentatis, supra pilosis, subtus cinereo-tomentosis, villosisque; petalis calyce sublongioribus, obovatis, leviter emarginatis.

P. canescens Nestl. Pot. p. 47. n. 31. Lehm. Pot. p. 92. n. 37. Re App. alt. in Accad. di Tor. an. 1827. tom. 31. p. 199. Prin. De Pot. Ital. p. 13. n. 14. De Cand. Franç. 5. p. 541., et Prodr. 2. p. 578. n. 42. Reich. Exc. 3. p. 594. n. 3848. Host. Austr. 2. p. 37.

P. inclinata Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 241. Vill. Dauph. 3. p. 567. t. 45. herb. ex Nestl. Hall. fil. Mus. Helv. 1. p. 55. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 461. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 522. Koch. Syn. p. 214. Reich. Exc. 3. p. 594. n. 3849. Gaud. Helv. 3. p. 389.

P. recta Jacq. Austr. 4. p. 43. t. 383.

P. intermedia *Lois. Desl. Gall. 1. p. 301.**, et *ed. 2. tom. 1. p. 367.**

Ital. Potentilla cenerognola.

Perenn. Habui Genuâ in herbidis extra portam degli Angeli, et ex Liguria occidua al *Ceriale* a Prof. SASSIO, Albâ Pompejâ a BEATENO, ex Pedemontio inter *Allesano*, et portum di *Caselle*, et in pratis prope la *Praglia di Pianezza* a Prof. RZ, iterum ex Pedemontio a LOISELEURIO DESLONGCHAMPSIO, Mediolano in muro oppidi a PPR. DE NOTARIS, et BALSAMO-CRIVELLIO, ex districtu Tergestino in pascuis montanis a BIASOLETTO, in monte *Spaccato*, in sylva *Farnedo*, et *Lippizza* a TOMMASINIO, ex Euganeis a *Torreglia* a MONTIRIO, ex Nursinis a *Castelluccio* ab OASINO, ex Ducatu Lucensi al *Bagno caldo*, et a *Montefegatesi* a Prof. PUCCELLIO, denuo ex *Montefegatesi* a Prof. PETRO SAVIO. Floret Majo, Junio.

Caules ut plurimum a radice plures, decumbentes, ascendentes, rarius erecti, cinereo-tomentosi, et insuper vilis longioribus adpersi, sæpe purpurantes, superne paniculato-corymbosi, a spithama ad duos pedes longi. Folia nunc omnia quinata, nunc inferiora septenata, supremis tantum ternatis. Foliola magnitudine varia, obverse lanceolata, vel ima obovata, omnia basi cuneata, integra, reliquo margine grosse dentata, idque plus minus profunde, supra viridia, et adpresse pilosa, subtus cinereo-tomentosa, villosaque, margine plana, et villosa, exteriora subinde bipartita. Foliola individuorum luxuriantium elongata, profundius dentata, dentibus subinde uno alterove dente minore insculptis. Petioli villosi, inferiores longi. Stipularum segmenta lanceolata, acuminata, villosa, integra, in plantis luxuriantibus grandiora, ovato-lanceolata, lacinulis nunc paucis, nunc pluribus plus minus profundius incisa. Panicula terminalis, dichotomo-corymbosa cum pedunculis alaribus, sæpe multiflora. Flores parvi. Calyx cinereo-tomentosus, villosusque, laciniis externis linearibus, vel lanceolato-linearibus, subinde paulo brevioribus, internis ovatis, aut ovato-lanceolatis, utrisque acutis, vel acutiusculis. Corolla saturate lutea, calyci æqualis, aut paulo longior. Petala obovata, leviter emarginata. Receptaculum villosum. Nuculæ rugis arcuatis plus minus prominentibus instructæ, et interdum fere læves, cristula carinali tenui. Reliqua ut in precedente. Dum macrior est, cave, ne confundas cum sequente.

9. *POTENTILLA argentea*: caule decumbente, ascendente-ve; foliis quinatis, inferiorum foliolis obovatis, dentatis, superiorum cuneatis, oblòngo-flabellatis, profunde dissectis, subtus niveo-tomentosis, margine revolutis; calycibus acutis, corollæ subæqualibus; petalis leviter emarginatis.

P. argentea *Sp. pl.* p. 712. *Smith. Engl. Fl.* 2. p. 418., et *Engl. bot.* v. 2. t. 89. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 250. *Fl. Dan.* t. 865. *Nest. Pot.* p. 48. n. 32. *a. Lehm. Pot.* p. 94. n. 38. *a. Hall. fil. in Mus. Helv.* 1. p. 55. *All. Ped.* 2. p. 55. n. 1477. *Balb. Taur.* p. 83.* *Re Seg.* p. 43., et *Tor.* 1. p. 276. *Birol. Acon.* 1. p. 174. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 317. n. 19. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 241., et 387. *Prin. De Pot. Ital.* p. 14. n. 15. *Comoll. Prodr.* p. 99. *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec.* 2. tom. 10. p. 288.* *Pollin. Ver.* 2. p. 158. *Nacc. Ven.* 3. p. 72. 73.* *Sav. Bot. Etr.* 2. p. 112. *Sang. Cent.* p. 73.* *Ten. Syll.* p. 604. *Jan. El. p. 8.* n. 7.* *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 461., et *Prodr.* 1. p. 576. n. 36. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 17. heft. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 523. *a. Koch. Syn.* p. 214. *a. Reich. Exc.* 3. p. 594. n. 3847. *a. Host. Austr.* 1. p. 38. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 360. *Gaud. Helv.* 3. p. 390.

Fragaria n. 1124. *Hall. Hist. stirp. indig. Helv.* 2. p. 50.

Pentastillo bianco Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 1074. fig. *Dur. Herb. ed. Rom.* p. 340. fig.

Quinquefolium folio argenteo Zannich. Op. posth. p. 83. *Segui Ver.* 1. p. 500. n. 4.

Pentaphyllum rectum, foliis profunde sectis, subtus argenteis, flore luteo *J. Bauh. Hist. pl.* 2. lib. 17. p. 398. fol. c. fig.

Ital. Cinquefoglio bianco Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 174.

Perenn. Legi Bononiæ in collibus alle Grotte, et extra portam Castiglione, in Apennino Florentino in monte Beni, et in monte Sasso Castro prope il Covigliaio. Habui ex Apennino Placentino a Bardi a Turio, Genuâ a Prof. VIVIANO, ex Pedemontio in rupestribus ad thermas Valderias a BERTERO, et circa Taurinum a Prof. BALBISIO, Mantuâ a Migliaretto a BARBERIO, ex Tyroli Italico in Fiemme circa Cavalese a FACCHINIO, ex districtu Bassanensi in viis, et locis siccis a MONTINIO, in Valsugana ab Eq. PAROLINIO, ex agro Tergestino in sylvâ Lippizza a TOMMASINIO, Fossâ Clodiâ a Ca-lin a Prof. NACCARIO, ex agro Parmensi a Prof. JANIO, ex Nursinis in monte di Capo d'Acqua

a Prof. MAURIO, ex Piceno in monte *Acuto* ab ORARNO, ex Hetruria in pratis arenosis sylvæ Pisanæ a Prof. PETRO SAVIO, in Apennino Pistoriensi a *Pracchia* a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, in *Montamiata* a Prof. GIULIO. Floret Majo, Junio, in editis Julio.

Caules a radice plures, decumbentes, ascendentes, palmares-pedales, teretes, inferne pubescentes, superne niveo-tomentosi, sæpe purpurantes, crebre foliosi. Folia quinata, inferiora longe petiolata, foliolis obovatis, dentatis, basi integris, alias reliqua referentibus, exterioribus subinde bipartitis, superiora foliolis cuneatis, oblongo-flabellatis, flabello profunde dissecto, laciniis linearibus, acutis, vel acuminatis, margine revolutis; omnia supra saturate viridia, parce, et adpresse pilosa, aut glabra, rarins tomentosula, subtus niveo-tomentosa. Petioli villosi. Stipularum segmenta lanceolata, acuminata, integra, vel margine externo laciniata, ciliata, extus niveo-tomentosa. Panicula terminalis, dichotomo-corymbosa cum pedunculis alaribus, multiflora. Pedunculi filiformes, breves. Flores parvi. Fulcra, et calyces niveo-tomentosi, villosique. Laciniæ calycinæ lanceolatæ, longitudine æquales, externæ angustiores, internæ subinde ovato-lanceolatæ, omnes acutæ, aut acuminatæ. Corolla saturate lutea, calyci æqualis, aut paulo longior. Petala obovata, leviter emarginata. Receptaculum villosum. Reliqua ut in præcedente.

10. *POTENTILLA calabra*: caule decumbente, ascendenteve; foliis quinatis, supra parcius, subtus dense niveo-tomentosis, foliolis cuneatis, subrotundo-flabellatis, multipartitis, margine revolutis; calycibus obtusis, corolla brevioribus; petalis integris, emarginatisve.

P. calabra Ten. Nap. 1. p. 287. tab. 45.* et Syll. p. 252. n. 14.* Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 584. a. b.* Prin. De Pot. Ital. p. 14. n. 16.

P. argentea η *calabra* De Cand. Prodr. 2. p. 577. sub n. 36.

Pentaphyllum foliis profunde sectis, enbtus argenteis flore luteo Cup. Hort. Cath. p. 164.

Ital. Cinquesoglio ventaglino.

Perenn. Habui ex Polino Lucaniæ, et ex Calabria ab Eq. Prof. ΤΕΡΟΔΙΟ, denuo ex Calabria ad *Aspramonte*; et alla *Sile*, nec non ex *Ætna*, et ex Nebrodibus Siciliæ ab Eq. GUSSONIO, iterum ex *Ætna* ab ORANGERO, et ex Nebrodibus al *Piano dello Sparviero* a Prof. PARLATORE. Floret Majo, Junio.

Valde similis præcedenti, a qua differt notis sequentibus.

Radix crassa, lignosa. Caules palmares-spithamales, subinde toti prostrati, rosulati. Folia nunc in pagina superiore leviter tomentosa, et viridi-albida, subtus dense niveo-tomentosa, nunc utrinque niveo-tomentosa. Foliola cuneato-flabellata, flabello dilatato, subrotundo, vel obovato, multipertito, laciniis linearibus, acuminatis, margine revolutis, interdum iterum incis. Stipulae lineares, acuminatae, integerrimae. Panicula contracta. Flos grandior. Calyx albo-tomentosus, et plerumque valde villosus, laciniis obtusis, externis paulo brevioribus, linearibus, internis ovatis. Corolla aurea, calyce longior etiam duplo, et triplo. Petala obovata, integra, aut leviter emarginata. Receptaculum globosum.

11. *Potentilla Dethomasi*: caule erecto; foliis septenatis, quinatisque, foliolis oblongo-obovatis, parvidentatis, cinereo-sericeis; corollis calyce multo longioribus; petalis obcordatis.

P. Dethomasi Ten. *Nap. I. p. 285. tab. 44.**, et *Syll. p. 251. n. 13.** *Sang. Cent. p. 73.**

P. Thomasii De Cand. *Prodr. 2. p. 576. n. 35.*

P. collina Prin. *De Pot. Ital. p. 14. n. 17. excl. syn.*

Ital. *Fragolona gialla*.

Perenn. Habui ex Lucania ab Eq. Prof. TENORIO, et a GASPARRINIO, Romæ alla *Caffarella*, ex monte Albano, ex Lucretili, et ex monte Velino in Prætutiis a Prof. MAURIO, ex eodem monte Velino ab ORSINO. Floret Junio, Julio.

Radix lignosa, crassa, fusiformis, extus fusce rubida. Caules solitarii, vel a radice plures erecti, aut ascendentes, teretes, valde villosi, villo molli, longo, patulo, palmares-pedales, et etiam paulo ultra. Folia quinata, vel ima septenata, inferiora longe petiolata, successiva brevius, suprema sessilia. Foliola oblongo-obovata, vel dum minora obovata, obtusa, fere toto margine dentata, dentibus parvis, obtusis, basi brevissimo tractu integra, vel utrinque, vel subtus molliissime cinereo-sericea, nitida, venis numerosis parallelis instructa, subinde supra plus minus denudata, et viridja. Petioli villosi, supra canaliculati, orti e sinu stipulae bipartitæ, villosæ, segmentis acuminatis, sæpe laciniatis, rarius integris, aut uno, alterovente insculptis. Panicula terminalis, dichotomo-corymbosa cum pedunculis alaribus, sæpe compacta,

valde villosa. Folia floralia simplicia, trifida, laciniis integris, incisive, sessilia inter segmenta stipulæ. Flos grandis, speciosus, diametri etiam pollicaris. Calyx villosissimus, glandulis exiguis stipitellatis plus minus villo interjectis, laciniis externa linearibus, paulo brevioribus, internis lanceolatis; ant ovato-lanceolatis, utrisque acuminatis. Corolla grandis, aurea, calyce duplo, et triplo longior. Petala late obcordata. Antheræ oordato-oblongæ. Receptaculum subconicum, villosum. Nucula obsoletissime rugulis arcuatis instructæ, cristulâ carinatæ. Villus totius plantæ cinereus, mollissimus.

12. *Potentilla grammopetala*: molliter villosa; caule erecto; foliis ternatis, oblongo-obovatis, serratis; calycibus corolla sublongioribus; petalis obverse lanceolato-linearibus, obtusis.

P. grammopetala Morett. *Bot. Ital. p. 4. n. 2. tab. 2.**, et in *Conf. e Brugn. Giorn. dec. 2. tom. 9. p. 67.* Prin. De Pot. Ital. p. 20. n. 34. Reich. Exc. 3. p. 590. n. 3826.*

P. Fantolii Coll. *Herb. Ped. 2. p. 326. n. 55.* etiam ex Prof. Morettio in litt.

Ital. Potentilla stellata.

Perenn. Habui ex alpinis di *Valsesia* a Prof. MORETTIO, ex valle *Intrasca* in summis montibus della *Zeda al Pizzo Marona*, et ex valle *Vegezzo al Pizzo d'Anzasco* in præruptis a Prof. DE NOTARIS. Floret Julio, Augusto.

Radix transversa, crassa, fusiformis, fusce rubens, lateraliter crasse fibrosa, collo tecta reliquiis stipularum siccatarum. Caulis teres, erectus, vel adscendens, leviter striatus, simplex, villosus, viscosus, a pollice ad apithamam longus. Folia omnia ternata, inferiora longe petiolata, successiva brevius, suprema sessilia. Foliola oblongo-obovata, vel obovata, obtusa, inferne cuneata, et integra, reliquo margine acute serrata, molliter, et adpresse villosa, sed magis subtus, nitidula, e viridi canescentia, impari subinde brevissime petiolulato, lateralibus basi quidquam obliquatis, et sæpe in margine externo tractu longiore serratis. Petioli villosi, supra canaliculati, orti e sinu stipulæ bipartitæ, segmentis potius grandibus, ovatis, aut lanceolatis, longe acuminatis, villosis, integris, vel uno, alterove dente inaculptis. Flores in corymbo terminali, composito, compacto, abbreviato, villosus, viscosus. Folia floralia parva, simplicia, trifida, sessilia inter segmenta stipulæ. Pedunculi calyce breviores. Calyx villosus, viscosus, circiter

quatuor lineas longus, lacinjiis subaequalibus, externis angustioribus, linearibus, internis lanceolatis, utrisque acuminatis. Corolla ochroleuca, calyce paulo brevior. Petala obverse lanceolato-linearia, obtusa, integra. Stili elongati, orti fere ex apice ovarii. Receptaculum villosum. Nuculae laeves, carina dorsali acuta. Villus totius plantae mollis, canescens.

13. *POTENTILLA caulescens*: caule decumbente; foliis quinatis, ternatisque, superne argute serratis, margine serricosis; petalis calyce sublongioribus, oblongis; filamentis hirsutis.

P. caulescens *Sp. pl.* p. 713. *Jacq. Austr.* 3. p. 11. t. 220. *Hall. fil. in Mus. Helv.* 1. p. 51. *Ser. ibid.* p. 63. *Nestl. Potent.* p. 59. n. 45. *Lehm. Pot.* p. 130. n. 55. *All. Ped.* 2. p. 56. n. 1482. *Re Seg.* p. 43. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 321. n. 35. *Prin. De Pot. Ital.* p. 16. n. 23. *Comoll. Prodr.* p. 100. *Barb. Agg.* p. 35. *Pollin. Ver.* 2. p. 161. *Suffr. Foroj.* p. 147. *Vitm. Sagg.* p. 21. *Bert. Amæn. Ital.* p. 372. n. 158. *Sav. Bot. Etr.* 2. p. 112. *Ten. Nap.* 1. p. 190., et *Syll.* p. 250. n. 7. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. p. 582.* *Moris. El. fasc.* 3. p. 8.* *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 464., et *Prodr.* 2. p. 584. n. 88. α . β . (excl. *Pot. Clusiana* Jacq., et var. γ). *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 1. heft. male petalis ochroleucis. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 540. *Koch. Syn.* p. 219. *Reich. Exc.* 3. p. 590. n. 3821. *Host. Austr.* 2. p. 42. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 361. *Gaud. Helv.* 3. p. 373.

P. petiolulata *Reich. Exc.* 3. p. 590. n. 3822. *Gaud. Helv.* 3. p. 374.* fide exemplarium a Bonjeannio.

Fragaria n. 1123. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 49. excl. syn. *Clus.*

Pentaphyllum minus rectum subtus incanum flore albo *Bon. Panph.* t. 165.

Quinquefolium album saxatile, non ramosum, et pendulum, caule sesquipalmari, foliis in apice altius incisus, petalis florum angustioribus *Mich. in Till. Cat. hort. Pis.* p. 141. *Zannich. Opusc. posth.* p. 51.

Q. umbellatum album, foliis in apice tridentatis *Segui. Ver.* 1. p. 498. n. 1.

Ital. Potentilla penzola.

Perenn. Legi in Alpibus Apuanis, ubi copiosa in rupibus marmoreis in Sagro occidentali al Poggio, in Sagro septentrionali secus viam di Vinca, in Pizzo d'ucello, alla Grotta de' Gracchi, et in Tambura, ex quo novissimo loco accepi quoque a Prof. PETRO SAVIO.

Flor. Ital. T. V.

Habui ex Liguria occidua a *Castellerno* a Prof. SASSO, ex Pedemontio in rupibus alpinis de la *Grotte* prope les *Echelles* a BONJEANNIO, ex *Valsassina* in districtu Comensi a Rev. ODESCALCHIO, ex monte *Susia* vallis *Brembana* in districtu Bergomensi a RAINERO, in *Servina* ejusdem vallis, et a *Zegno* a BERGAMASCHIO, ex rupibus vallis *Frigidæ* montis Baldi a MANGANOTTO, ex Tyroli Italico in alpinis calcariis di *Fiemme*, et *Fassa* a FACCHINIO, a *Cima d'Asta* ab Eq. PETRUCCIO, in *Vallarsa* a Prof. MENECHINIO, ex montibus di *Solagna* in districtu Bassanensi ab Eq. TREVISANO, ex eodem loco, ex Summano, et *Valsugana* a MONTINIO, et alle *Grotte d'Oliero* ab Eq. PAULINIO, ex Piceno in monte della *Sibilla alla Corona* a MARZIALETTO, et in *Vettore* ab ORSINO, ex Nebrodibus Siciliæ a *Rocca di Mele* a Prof. PARLATORE, et ab Eq. GUSSONIO, ex montanis calcariis d' *Oliena* in Sardinia ab Eq. Prof. MORISIO. Floret Julio, Augusto.

Radix lignosa, collo valde crassa, transversa, rubido-fusca, fibris lateralibus paucis, crassis, superne tecta squamis a reliquiis stipularum, aridis, rubido-fuscis, sæpe extra fissuras rupium surculis ascendentibus exerta, ut planta videatur suffruticosa. Caules plerumque a radice plures, cæspitosi, teretes, striati, pilosi, aut villosi, decumbentes, vel e rupibus penduli, pollicares-spithamales, subinde rubentes. Folia inferiora longe petiolata, quinata, superiora ternata, brevius petiolata, supremæque sessilia; interdum etiam inferiora ternata. Foliola oblongo-obovata, inferne integerrima, superne argute et incurve serrata, serratura terminali sæpe minore, quandoque tantum serraturis tribus-quinque, nunc sessilia, nunc intermedia brevissime petiolulata, late viridia, margine sericea, utrinque glabra, vel subtus nervo, et venis villosa, rarius, et juniora tantum tota sericea, instructa venis transversis paucis, tenuibus, inter se remotis. Petioli pilosi, vel villosi, supra canaliculati, orti e sinu stipulæ bifidæ, margine integerrimæ, et pilosæ, aut villosæ, laciniis stipularum inferiorum lanceolatis, superiorum ovatis, utrisque acuminatis. Corymbus terminalis, compositus, erecto-patens, villosus, subinde multiflorus. Folia floralia minora, simplicia, acute trifida, vel tridentata, sessilia inter segmenta stipulæ. Pedicelli alares calyci æquales, aut paulo longiores, reliqui breviores. Calyx villosus, laciniis lanceolatis, acuminatis,

longitudine aequalibus, externis angustioribus. Corolla alba, calyce paulo longior, aut saltem aequalis. Petala angusta, oblongo-obovata, integra, vel leviter emarginata. Stamina filamentis hirsutis. Stili elongati. Receptaculum parvum, globosum, villosum. Nucula apice villis longis barbata, reliqua superficie pilosa. Herba viscosa; villositas alba.

Potentilla petiolaris Ser. ex pluribus exemplaribus, quam habui ab ejus detectore Bonjeannio, est lusus adeo levis speciei foliolis brevissime petiolulatis, ut a typo nequeat sejungi, mihi quoque obvia in alpinis Apuanis. *Potentilla Clusiana* Jacq., quam obtinui a Römero f. r., et a Prof. Janio, nequit confundi cum *Potentilla caulescente* L., cum sit planta multo minor, praedita foliolis parvis, apice parca dentatis, petalis late obcordatis, et filamentis glabris. Etiam *Potentilla lupinoides* W., sive *Potentilla nivalis* De Cand., cujus specimina e Pyrenaeis accepi ab ipso De Candolleo f. r., nec non a Lamourouxio, et a Bonjeannio, differt a *Potentilla caulescente* L. hirsutiae totius herbae densa, et brevi, laciniis calycinis linearibus, petala obcordata superantibus, filamentis glabris.

14. *Potentilla crassinervia*: pubescens; caule ascendente; foliis quinatis, ternatisque, foliolis obovatis, obtuse dentatis, subtus crasse, crebreque venosis; petalis obcordatis, calyce longioribus, filamentis glabris; nuculis villosissimis.

P. crassinervia Fiv. *App. ad Fl. Cors. prodr.* p. 2.* *Prin. De Pot. Ital.* p. 11. n. 8. *De Sal. Marsh. in Bot. zeit.* an. 1834. p. 52. *Lois. Desl. Gall. ed. 2. tom. 1.* p. 369. *Duby. Bot. Gall. ed. 2. tom. 2.* p. 1009.

P. glauca Moris. *Stirp. Sard. el. fasc. 1. p.* 18.* *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 322. n. 36. *Prin. De Pot. Ital.* p. 17. n. 24. *Spr. fl. Tent.* p. 14. n. 49.

Ital. Potentilla costolosa.

Perenn. Habui ex rupestribus Sardiniae ab Eq. Prof. MORISIO, ex Corsica in monte *Coscione* ab Eq. Prof. VIVIANO, et in monte *Grosso* a SOLZIROLIO. Floret Julio, Augusto.

Radix ut in praecedente. Caules solitarii, vel plures caespitosi, teretes, ascendentes, subinde flexuosi, pubescentes, valde viscosi, a duobus pollicibus ad pedem longi. Folia inferiora quinata, quandoque mixta cum ternatis, longius petiolata, superiora ternata, supraeque sessilis. Foliola obovata, inferne cuneata,

integra, superne multidentata, dentibus parvis, obtusis, æqualibus, pubescentia, viscosa, venis numerosis, crassiusculis, parallelis subtus instructa, in foliis supremis angustiora, dentibus tribus, quatuor, acutis apice tantum insculpta: Petioli pubescentes, viscosi, orti e sinu stipulæ bifidæ, laciniis ovatis, vel inferioribus lanceolatis, acutis, aut acuminatis, integris. Corymbus terminalis, compositus, pubescens, viscosus, modo pauciflorus, compactus, modo multiflorus, laxior. Folia floralia sessilâ inter segmenta stipulæ, simplicia, trifida, laciniis integris, angustis, lanceolatis, acuminatis, impari majore. Pedicelli tenues, calyci subæquales, vel alares paulo longiores. Calycis laciniæ lanceolatae, acutæ, externæ angustiores, internis longitudine subæquales. Corolla alba, calyce paulo longior. Petala obovata, integra, aut emarginata. Filamenta glabra. Stili elongati. Receptaculum globosum, villosum. Nucula undique hirsutissimæ, villo longo, albo.

Petala apparent luteola in sioco, quod contingit etiam in specie præcedente; sed ita non sunt in planta viva; quare Vivianus male vocavit lutea, ut recte animadvertit De Salis l. c.

15. *POTENTILLA alba*: caule filiformi, decumbente, subnudo; foliis radicalibus, quinatis, foliolis oblongis, apice acute, incurveque dentatis, margine, subtusque serriceis; petalis late obcordatis; filamentis glabris; nuculis basi barbatis.

P. alba *Sp. pl.* p. 713. *Smith. Engl. Fl.* 2. p. 422., et *Engl. bot.* v. 20. t. 1384. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 251. *Jacq. Austr.* 2. p. 10. t. 115. *Nestl. Pöt.* p. 58. n. 44. *Lehm. Pot.* p. 132. n. 56. *Hall. fl. in Mus. Helv.* 1. p. 56. *All. Ped.* 2. p. 57. n. 1483. *Balb. Taur.* p. 84.* *Re Seg.* p. 43., et *Tor.* 1. p. 272. *Birol. Acon.* 1. p. 175. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 521. n. 32. *Prin. De Pot. Ital.* p. 17. n. 25. *Comoll. Prodr.* p. 100. *Barb. Agg.* p. 35.* *Pollin. Ver.* 2. p. 160. *Suffr. Foroj.* p. 147. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 466., et *Prodr.* 2. p. 584. n. 85. a. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 4. heft. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 539. *Koch. Syn.* p. 218. *Reich. Exc.* 3. p. 589. n. 3820. *Host. Austr.* 2. p. 42. *Gaud. Helv.* 3. p. 375.

P. nitida *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 362.

Pentafilo bianco *Calz. Viagg. di mont. Bald.* p. 13.

Quinquefolium Alpinum, album, ramosum, foliis amplioribus, in apice incis, superne glabris, inferne incanis, et lanuginosis, petalis florum cordiformibus *Mich. in Till. Cat. hort. Pis.* p. 141.

Q. rectum album *Segui. Ver. 1. p. 499. n. 2.*

Q. album, mejus, alterum *Segui. Sup. p. 217. Zannich. Opusc. posth. p. 20.*

Q. I. majus albo flore *Clus. Hist. pl. lib. 5. p. cr. fig.*

Ital. *Pentafillo bianco.*

Perenn. Habui ex collibus Taurinensibus a Prof. BALBISIO, ex Insubria Helvetica a *Lugano* a VINCENTIO, ex *Valtellina* a LANFOSSIO, ex districtu Mediolanensi in sylvis di *Magenta* prope Ticinum a PPET. BALSAMO-CRIVELLIO, et DE NOTARIS, ex *Valcamonica* supra *Ponte di legno* in districtu Bergomensi a BERGAMASCHIO, Mantuâ al *Bosco Fontana* a BARBIERIO, ex Baldo a RATNERO, ex eodem monte in valle *delle Ossa*, et ex sylva del *Mantico* prope Veronam a MANGANOTTO, ex Tyrolis meridionali in collibus graminosis prope Brixinam ab Eq. DE HAUFLERO, in viciniis di *Bolzano*, et ex demissis Tyrolis Italici a FACCHINIO, ex districtu Bassanensi in pratis di *Solagna*, et dei *Collalti* a MONTINIO, et ab Eq. PAROLINIO, ex districtu Forojuliensi a Prof. BRIGNOLIO, ex nemorosis Tergestinis alla *Lippizza*, et in monte *Kokuschi* a TOMMASINIO, et a BRASOLETTO. Floret Majo, Junio.

Radix longior, et minus crassa, quam in duabus præcedentibus. Ex ejus collo prodit cæspes foliorum, et caulium herbaceorum. Folia omnia radicalia, longe, et subinde longissime petiolata, quinata, foliolis lanceolatis, vel oblongis, obtusis, basi quidquam angustatis, apice acute, et incurve tri-novemdentatis, dente impari minore, supra saturate viridibus, glabris, subtus, margineque sericeo-argentinis. Petioli potius tennes, sericeo-villosi, supra canaliculati, orti e sinu stipulæ longæ, rufescentis, extus villosæ, bifidæ, segmentis lanceolatis, acuminatis, aut acutis, apice inæqualiter bidentatis, vel integris. Caules filiformes, sericeo-villosi, decumbentes, sæpe flexuosi, uni-pauciflori, infra pedunculum, vel corymbum plerumque nudi, aut folio parvo, subsessili, ternato inferne instructi, unguiculares-palmares, foliis radicalibus breviores, sed et æquales, vix longiores, occurrunt. Flores pauci, in corymbo potius longo, aut solitarii, longe pedicellati. Folia floralia minora, ternata, subsessilia inter segmenta stipulæ, supremæque in corymbo simplicia, lanceolata, acuminata, subintegerrima. Pedicelli tennes, sericeo-villosi; solitarius, vel alaris longus. Calyx sericeo-villosus, laciniis lanceolatis, acuminatis, aut acutis, externis

angustioribus, nunc internas æquantibus, nunc quidquam brevioribus. Corolla alba, calyci æqualis, aut paulo longior. Petala late obcordata. Filamenta glabra. Stili elongati. Receptaculum dense villosum. Nuculæ basi prope umbilicum barbatae, reliqua superficie nudæ, læves. Villus totius plantæ adpressus, sericeo-argentinus, nitens.

16. *POTENTILLA valderia*: dense tomentosa; caule ascendente; foliis septenatis, quinatisque, foliolis oblongis, multidentatis; corymbo compacto; petalis obcordatis, calyce brevioribus; filamentis hirsutis; nuculis laxè villosis.

P. valderia *Sp. pl.* p. 714. *Nestl. Pot.* p. 61. n. 48. *Lehm. Pot.* p. 124. n. 52. *All. Ped.* 2. p. 57. n. 1484. t. 24. f. 1.* *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 321. n. 33. *Prin. De Pot. Ital.* p. 16. n. 22. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 465., et *Prodr.* 2. p. 585. n. 90. *Reich. Exc.* 3. p. 590. n. 3824.

Ital. Potentilla vellutata.

Perenn. Habui ex Pedemontio in saxosis ad thermas Valderias a MOLINERIO, a Prof. BALBISIO, et a BERNERO, in viciniis di Vaudier ab Eq. Prof. MORISIO. Floret Julio, Augusto.

Radix fusiformis, crassa, collo tecta squamis extus sericeo-villosis. Caulis teres, crassus, firmus, ascendens, tomentosus, villosus, superne sæpe bifidus, spithamalis-pedalis. Folia inferiora longe petiolata, septenata, vel quinata, successiva brevius petiolata, quinata. Foliola crassiuscula, oblonga, obtusa, basi cuneata, et integra, reliquo margine multidentata, dentibus parvis, acutis, impari minimo, utrinque albo-tomentosa, sed subtus densius, et albidius, venis parallelis numerosis transverse instructa, interiora sæpius brevissime petiolulata. Petioli crassi, sericeo-villosi, supra canaliculati, inferiores orti e sinu stipulæ subrufescentis, bifidæ, valde elongatæ, laciniis lanceolatis, acuminatis, integerrimis, aut parce incisis, superiores e sinu stipulæ bipartitæ, segmentis latioribus, ovato-lanceolatis, acuminatis, integerrimis, tomentosulis, albo-viridibus. Corymbus terminalis, compositus, compactus, multiflorus, totus albo-tomentosus. Folia floralia simplicia, trifida, aut tripartita, laciniis acuminatis, integerrimis, aut parce incisis, e sinu stipulæ magnæ, subinde apice laciniatæ. Pedicelli crassi, breves. Calyx grandis, tomentosus, laciniis externis angustioribus, et brevioribus, lanceolato-linearibus, internis ovato-

- lanceolatis, utrisque acuminatis. Corolla alba, in sicco ochroleuca, calyce brevior. Petala obcordata, margine crispula. Filamenta hirsuta. Stili elongati, glabri. Receptaculum insigne, globoso-ovoidem, valde villosum: Nuculæ villo longo, laxo adpersæ.
17. *POTENTILLA apennina*: argenteo-tomentosa; caule erecto, subnudo, subbifloro; foliis ternatis, foliolis oblongo-obovatis, subtridentatis, integrisve; petalis spathulatis, longè unguiculatis; filamentis glabris; nuculis rugulosis, apice barbatis.
- P. apennina* Ten. *Nap.* 1. p. 291. (err. 191.) t. 46. excl. sin. Boco., male petala, et *Syll.* p. 249. n. 3. *Guss. Pl. rar.* p. 209.* excl. syn. Bocc. *Brocch. Oss. nat. in Bibl. Ital.* tom. 29. p. 81. *Morett. Bot. Ital.* p. 25., et in *Conf. e Brugn. Giorn. dec.* 2. tom. 9. p. 159. n. 6., et *De quib. pl. Ital. dec.* 5. p. 5. n. 46. *Prin. De Pot. Ital.* p. 21. n. 36. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 285.* *Sang. Cent.* p. 72.* *De Cand. Prodr.* 2. p. 585. n. 92. *Reich. Exc.* 3. p. 589. n. 3818.
- P. Bocconi* *Nestl. Pot.* p. 73. n. 63. tab. 10. fig. 2., in qua male calyx internus, et desunt petala. *Lehm. Pot.* p. 189. n. 86.
- Heptaphyllum trifoliatum*, argenteum, montanum, Italicum, longius radicatum, crassioribus, et rotundioribus foliis *Bocc. Mus. di piant.* p. 20.
- H. trifoliatum argenteum Italicum* *Bocc. l. c. tab.* 8. sine petalis.
- Fragaria alpina*, major, foliis argenteis, obtusis, flore roseo *Mich. in Till. Cat. hort. Pis.* p. 63. *Tourn. Inst.* p. 296.
- Ital. Potentilla argentata.*
- Perenn.* Habui ex Apennino Umbro al Sasso Borghese a Prof. OCTAVIANO, ab Eq. PETRUCCIO, et a MARZIALETTO, ex Piceno in Vettore a Prof. MAURIO, in monte Priore a MARZIALETTO, ex Prætutiis in monte Pelone, et Cornu al Morgone ab ORSINO, in eodem monte, in monte Costone, et in Maiella ab Eq. GUSSONIO. Floret Julio, Augusto.
- Radix lignosa, fusiformis, collo valde crassa, et tecta squamis aridis, rubido-fuscis, intus alba, extus rubido-fusca, sursum soluta in surculos plures, cauliferos, breves, crassos, cæspitosos. Caulis tenuis, filiformis, teres, erectus, siccando facile flexuosus, pollicaris-palmaris, niveo-tomentosus, prope basim, et sub pedunculo folio instructus, reliqua parte nudus. Folia

radicalia, et caulinum imum ternata, breviuscule petiolata, tomentosa, argentea, foliolis parvis, oblongo-obovatis, cuneatis, integerrimis, aut apice obiter tridentatis, dentibus conniventibus, intermedio minimo, subinde deficiente. Petioli tenues, niveo-tomentosi, orti e sinu stipulæ bifidæ, laciniis linearibus, sericeo-tomentosis, integerrimis. Pedunculus cauli terminalis, apice subbiflorus, vel triflorus, raro comitatus alio pedunculo. Folium florale sub pedunculo simplex, trifidum, laciniis integris, acutis, sessile inter segmenta stipulæ. Flores in apice pedunculi communis fere sessiles, suffulti bractea simplici, lanceolata, vel trisecta, acuminata, sericea. Calyx sericeo-tomentosus, tubo campanulato, laciniis limbi obtusiusculis, longitudine æqualibus, externis linearibus, internis ovatis. Corolla alba, erecto-patens, calyce paulo longior. Petala spatulata, lamina parva, obtusa, integra, aut leviter emarginata, longe unguiculata. Stamina alba, filamentis glabris. Receptaculum parvum, globosum, dense sericeum. Nuculæ arcuatim rugulosæ, prope apicem villo brevi barbatae, reliqua superficie nudæ. Tomentum hujus plantæ nitet colore argenteo, præsertim in foliis. Omnia exemplaria herbarii mei instruuntur corolla, quæ profecto quoad persistentiam sequitur morem aliarum specierum hujus generis. In hac evidenter dignoscimus, laciniis externas calycis oriri ex tubo calycino campanulato, ideo non esse bracteas, cum bracteæ profiscantur a fulcris. Id etiam in reliquis *Potentillis* contingere patebit, si recte observemus. Quare recentioribus botanicis assentiri nequeo, qui easdem laciniis bractearum nomine salutarunt.

In figura Tenoreana a me superius allata caulis flexuosus desumptus fuit a planta sicca, cum in planta recenti sit semper rectus, corolla vero exhibetur omnino fictitia et forma, et magnitudine. In figura Nestleriana deest corolla, et laciniæ calycis internæ nimis amplæ, et rotundatæ pinguntur. Ergo nulla hactenus figura bona hujus speciei.

18. *POTENTILLA nitida*: tomentosa; caule brevissimo; foliis ternatis, foliolis oblongo-obovatis, apice paucidentatis, integrisve; flore subsolitario; petalis calyce longioribus, late subrotundis; filamentis glabris; nuculis dense lanatis.

P. nitida *Sp. pl.* p. 714. *Jacq. Austr.* 5. p. 40. *app. t.* 25. *Nest. Pot.* p. 63. n. 51. *Lehm. Pot.* p. 187. n. 85. excl.

- syn. Ten. *Ser. Mus. Helv.* 1. p. 62. tab. 5. fig. 1. a-d. *All. Ped.* 2. p. 58. n. 1487. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 325. n. 47. *Morett. Mem.* 1. p. 271. *Prin. De Pot. Ital.* p. 21. n. 35. *Comoll. Prodr.* p. 100. *Pollin. Ver.* 2. p. 162. * *Suffr. Foroj.* p. 205. *De Cand. Franc.* 4. par. 2. p. 647., et *Prodr.* 2. p. 585. n. 91. α . β . γ . *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 22. heft. fig. transcripta a *Jacquini*ana. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 542. excl. syn. Ten. *Koch. Syn.* p. 219. *Reich. Exc.* 3. p. 589. n. 3817. *Host. Austr.* 2. p. 44. *P. subacaulis* Scop. *Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 364. *P. terglövensis* Hacq. *Pl. alp. Carn.* p. 15. tab. 4. fig. 2. *Trifoglio argentato alpino* Pon. *Mont. Bald.* p. 222. fig. *Heptaphyllum argenteum*, *Alpinum*, trifoliatum, longius radiculatum, saxatile *Sabandum* *Bocc. Mus. di piant.* p. 20. *H. alpinum*, trifoliatum *Sabandum* *Bocc. l. c. tab.* 9. *Comaroides alpina*, petræa, sericea, *Persici flore* *Ponted. Anthol.* p. 291. *Segui. Ver.* 1. p. 497. n. 2. *Trifolium argenteum alpinum*, *persici flore* *Tit. It. in calc. hort. Mauroc.* p. 20. non numer. *Zannich. Opusc. posth.* p. 53., et 62. *T. alpinum*, *argenteum* *Ponæ Zannich. l. c. p.* 35. *Ital. Potentilla persicina.* *Perenn.* *Habui* ex monte *Codeno* ad *Larium* a Prof. *BALSAMO-CRIVELLIO*, et a *RAINERO*, ex *Bencala* alpium *Bergomensium* a *BERGAMASCHIO*, ex *Baldo* a *POLLINIO*, ex eodem monte in valle *delle Ossa*, et in *Monte maggiore* a *MANGANOTTO*, ex alpiibus editissimis *Tyrolis meridionalis* a *RAINERO*, ex alpinis *Tyrolis Italici* in *Fiemme*, et *Fassa* a *FACCHINIO*, et in monte *Davoi* ab *Eq. PAROLINIO*, ex *Portole* in Septem Communibus *Vicetinarum* ab eodem, et a *MONTINIO*, ex *Vette di Feltræ* a *DE ROITIO*, et a Prof. *VISIARIO*, ex alpinis *Fo-rojuliensibus* a Prof. *BIGNOLIO*, ex vertice montis *Cren* a *TOMMASINIO*, ex *Apennino Pistoriensi alle Tre Potenze* a Prof. *PETRO SAVIO*. Floret Julio, Augusto. *Radix* ut in precedente. *Caulis* teres, tenuis, unguicularis-bipollicaris, simplex, albo-tomentosus, erectus, decumbens, vel ascendens. *Folia* omnia ternata, radicalia congesta, breviter petiolata, caulina panca, inter se remota, sessilia. *Foliola* ovato-oblonga, basi cuneata, nunc toto margine integra, nunc apice tri-quinquedentata, dentibus acutis, conniventibus, impari minore, sericeo-tomentosa, nitida, coloris ex albo in cinereum vergentis. *Petioles* vix unguiculares,

tomentosi, supra canaliculati, orti e sinu stipulæ grandis, bifidæ, laciniis ovato-lanceolatis, acutis, aut acuminatis, integerrimis, sericeo-tomentosis, margineque barbatis. Flos terminalis, solitarius, subinde cum laterali, axillari, breviter pedunculatus, grandis, patens. Folia floralia simplicia, integra, vel trifida, sessilia inter lacinias stipulæ. Calyx tomentosus, sæpe intus purpurascens; ejus lacinie externæ lineares, breviores, internæ lanceolatæ, aut ovato-lanceolatæ, utraque acuminatæ. Corolla ampla, calyce etiam duplo longior, late rosea, vel alba. Petala late subrotunda, obtusa, integra, aut emarginata, vel etiam obcordata, unguibus lamina multo brevioribus. Filamenta glabra, rosea; antheræ sæpe atrorubentes. Stili elongati, rosei. Receptaculum globosum, villosum. Nuculæ tota superficie densissime lanatæ. Tomentum hujus speciei non habet nitorem argentinum præcedentis, sed nitet cum cinerascencia. In multis exemplaribus, quæ coram habeo, nullum folium quinatum existit. Figuræ Jacquini, et Sturmii superius allatæ exhibent foliola acuta, et pluridenticulata, quæ ita raro contingunt, cum passim sint obtusa, et paucidentata.

19. *POTENTILLA subacaulis*: tomentosa, pilis stellatis, simplicibusque; caule decumbente, paucifloro; foliis ternatis, imisve quinatis, foliolis cuneatis, apice obtusodentatis; petalis calyce longioribus; nuculis lævibus.
- P. subacaulis* *Sp. pl.* p. 715. *Nestl. Pot.* p. 71. n. 62. *Jacq. Collect.* 2. p. 145., et *Ic. rar.* 3. p. 6. t. 491. *Lehm. Pot.* p. 120. n. 51. *Balb. Misc. bot.* 1. p. 24.,* et in *Mém. de l'Acad. de Tur. an. X-XI.* p. 340.* *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 319. n. 28. *Prin. De Pot. Ital.* p. 16. n. 21. *Host. Austr.* 2. p. 40.
- P. velutina* *Lehm. Pot.* p. 170. n. 74., et *Sup.* 1. p. 17. tab. 8. pl. lux., foliis ternatis. Fig. opt.
- P. cinerea* *Nestl. Pot.* p. 54. n. 37. *Hall. fil. in Mus. Helv.* 1. p. 53. *Ten. Nap.* 4. p. 269. *A. B.*, et *Syll.* p. 251. n. 11. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 460. *Koch. Syn.* p. 217. a. β . *Reich. Exc.* 3. p. 591. n. 3834. *Gaud. Helv.* 3. p. 399.
- P. grandiflora* *Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 363. tab. 22.* non optima.
- P. opaca* *Vill. Dauph.* 3. p. 566. non Linn.
- P. verna* β *cinerea* *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 534.
- P. verna* δ *cinerea* *De Cand. Prodr.* 2. p. 575. sub. n. 27. *Pentaphyllum* mont. minus luteo *Tormentilla* flore cineraceum *Barrel. Ic.* 709. fol. quin.

Trifolium mont. luteo Tormentilla flore cineraceum
Barrel. Ic. 710.

Fragaria affinis sericea incana C. B. P. p. 327. n. 8., et
Prodr. p. 139.

Pentaphylloides fruticosum minimum procumbens, flore luteo, foliis sericeis Fragarum ternis Pluk. Phyt. tab. 212.
fig. 3. bene planta macrior fol. ternat.

Fragaria sterilis, sylvestris, sericea, incana Moris. Oxon. 2. p. 187. *Garid. Aix. p.* 190. t. 109.

Ital. *Fragola vellutina.*

Perenn. Habui ex Pedemontio in valle Pisii a Prof. BAL-
BISIO, ex montibus Tergestinis, ubi copiosa, a TOM-
MASINO, et a BIASOLETTO, et in *Karsto* a RAINERO,
ex Piceno in *Monte de' fiori*, et ex Prætutis in monte
di Campil ab ORSINO. Floret Aprili, Majo.

*Radix fusiformis, longa, transversa, fibris lateralibus crassis, descenduntibus, sursum multiceps. Caulis cæspitose, decumbentes, vel ascendentes, teretes, fili-
formes, aut paulo crassiores, cinereo-tomentosi, vil-
losique, digitales-semipedales, superne parce ramosi. Folia nunc omnia ternata, nunc inferiora quinata, vel quaternata, radicalia, et caulina ima longe petiolata, successiva brevius, supremæque sessilia. Fo-
liola cuneata, obverse lanceolata, aut obovata, obtusa, et retusa, apice dentata, dentibus obtusis, nunc profundiusculis, nunc levioribus; mollissime cinereo-tomentosa, tomento brevi; stellato, pilis longioribus adpressis interjectis, nunc crassa, nunc tenuiora; ubi tomentum eorum minus stipatum est, tunc e cinereo virent præsertim in pagina superiore. Petioli tomentosi, et villosi, orti e sinu stipulæ bifidæ, laciniis lanceolatis, acuminatis, longis, integris; tomentosus, et sursum villosus. Flores pauci, parvi, longiuscule pedunculati, interdum solitarii. Folia floralia multo minora, simplicia, trifida, supremæque ramentacea, omnia sessilia inter lacinias stipulæ. Pedunculi, et calyces cinereo-tomentosi, villosique. Laciniæ calycinæ obtusæ, aut acutiusculæ, externæ lineares, et paulo breviores, internæ lanceolatæ. Corolla luteo-aurea, calyce longior, etiam duplo. Petala obovata, emarginata, vel integra. Receptaculum parvum, globosum, villosum. Nuculæ læves, acie carinali acuta.*

Stirps a reliquis probe distincta tomento stellato, velutino, cinereo, nec a numero, crassitie, vel tenuitate foliolorum in plures, falsasque species dilanianda.

20. *POTENTILLA nivea*: caule decumbenteſ paucifloro; foliis ternatis, foliolis obovatis, profunde, obtuſeque dentatis, margine planis; ſupra pilosis; ſubtus niveo-tomentosis; petalis obcordatis, calyce longioribus.

P. nivea *Sp. pl.* p. 715. *Fl. Dan.* t. 1035. *Nest. Pot.* p. 73. n. 64. *Lehm. Pot.* p. 184. n. 83. *a. Hall. fil. in Mus. Helv.* 1. p. 310. *Birol. Acon.* 1. p. 176.* herb. *Balb. El. in Accad. di Tor. ann.* 1818. tom. 23. p. 112. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 323. n. 42. *Prin. De Pot. Ital.* p. 20. n. 31. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 462., et *Prodr.* 2. p. 571. n. 1. *a. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 537. *a. Koch. Syn.* p. 218. *Reich. Exc.* 3. p. 591. n. 3828. *Gaud. Helv.* 3. p. 377.

Ital. Fragola canda.

Perenn. Habui ex alpinis di *Oulx* in Pedemontio ab Eq.

Prof. MORISIO, ex editis Apennini Pistoriensis a Prof.

PETRO SAVIO. Floret Julio, Augusto.

Radix liguosa, fusiformis, crassa, fusce rubens, collo squamis aridis, fusce rubidis tecta, sursum multiceps. Caules cæspitiosi, decumbentes, ascendentes, filiformes, pauciflori, paucifolii, sericeo-villosi, uni-triunciales, sæpe rubentes. Folia omnia ternata, brevissime petiolata, foliolis parvis, obovatis, cuneatis, profunde, obtuſeque dentatis, et veluti incisis, dente terminali paululum longiore, sessilibus, margine planis, supra saturate viridibus, et sericeo-villosis, ſubtus niveo-tomentosis. Petioli brevissimi, niveo-tomentosi, supra canaliculati, orti ex sinu stipulæ bifidæ, laciniis ovatis, latiusculis, acutis, vel acutiusculis, divergentibus, imis rubidis, villosis, superioribus foliaceis, extus niveo-tomentosis. Flores nunc solitarii, longiuscule pedunculati, nunc duo-tres, quorum unus longiuscule pedunculatus, reliqui brevissime. Folia floralia simplicia, lanceolata, integerrima, vel subtrifida, sessilia inter lacinias stipulæ. Pedunculi, et calyces sericeo-villosi. Lacinie calycinæ obtusiusculæ, aut vix acutæ, externæ lineares, et paulo breviores, internæ lanceolatæ. Corolla luteo-aurea, calyce longior, etiam duplo. Petala obcordata, cuneata. Stamina corolla multo breviora. Receptaculum convexum, brevissimo pilosum.

Plantula pygmaea, elegantissima. Habet nescio quid *Potentillæ argenteæ* L., sed differt statim, foliis ternatis, margine planis, supra villosis, caule paucifloro, corollis grandioribus.

21. *POTENTILLA Fragariastrum*: caulibus filiformibus, subbifloris, folio brevioribus; foliis ternatis, subrotundo-obovatis, serratis, villosis; petalis calyci æqualibus, brevioribusve, nuculis costa interna barbatis.
- P. Fragariastrum* Ehrh. *Herb.* 146. *Smith. Engl. Fl.* 2. p. 425. *Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 252. Hall. fil. in Mus. Helv.* 1. p. 49. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. p. 582., et *Sup.* 1. p. 159. *Hoffm. Fl. d' Allem. ann.* 1791. p. 178. *tab. 6. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 542. *Koch. Syn.* p. 219. *Reich. Exc.* 3. p. 589. n. 3815.
- P. Fragarioides* Seb. et Maur. *Fl. Rom. prodr.* p. 173.*
- P. Fragaria* Curt. *Lond. ed. Grav. v. 3. t. 83. Nestl. Pot.* p. 76. n. 68. *α. β. Lehm Pot.* p. 160. n. 69. *Ser. Mus. Helv.* 1. p. 59. *t. 4. f. 2. Coll. Herb. Ped.* 2. p. 324. n. 45. *Prin. De Pot. Ital.* p. 20. n. 32. *Ten. Nap. 4. p. 292., et Syll.* p. 249. n. 1. *A. B. Moris. Stirp. Sard. el. faso.* 2. p. 3.* *De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 468., et Prodr.* 2. p. 585. n. 96. *α. Gaud. Helv. 3. p. 370.*
- P. micrantha* Moris. *Stirp. Sard. el. faso.* 1. p. 18.* *De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 468., et Prodr.* 2. p. 585. n. 95.*
- Fragaria sterilis* Sp. pl. p. 709. *Engl. bot. v. 25. t. 1785. Fl. Dan. t. 1579. All. Ped.* 2. p. 60. n. 1492. *Re Seg. p. 43. Birol. Acon.* 1. p. 173. *Morett. Mem.* 1. p. 271. *Comoll. Prodr.* p. 99. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 282. *Sav. Bot. Etr. 4. p. 112. Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 215. *Host. Austr.* 2. p. 44.
- Comarum fragarioides* Nocc. et Balb. *Tic.* 1. p. 244., et 388. *Barb. Agg.* p. 36. *Pollin. Ver.* 2. p. 168. excl. syn. Vaill.
- Fragaria* n. 1113. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 45.
- Comaroides vulgaris* Segui. *Ver.* 1. p. 497. n. 1.
- Fragaria silvestris* minime vesca, sive sterilis *Lob. Ic.* 698. pl. luxur.
- Ital. *Fragola secca. Fragola sterile* Targ. Tozz. *Diz. bot.* 2. p. 174.
- Perenn.* Frequens in collibus, et sylvis Italiæ. Legi Sarzanæ in Montedarme, Bononiæ alle Grotte. Habui ex agro Mediolanensi a RAINERO, ex Tyroli Italico in valle di Vestino a FACCHINIO, ex Ducatu Parmensi in monte di Castel vecchio prope Pavarano a BERTEO, ex Piceno in montibus della Sibilla, et Vettore a MARZIALETTO, in monte de' Fiori, et Pelone ab OASINO, ex sylvaticis montis Pisani prope Rupe cava a Prof. PETRO SAVIO, ex monte Albano in Latio a Prof. MAURIO, ex montosis Lucaniæ a GASPARLINIO, ex Sardinia ab Eq.

Prof. MORISIO, ex Corsica in monte *Grosso* a SOLER-
NOLIO. Floret Februario, Martio.

Radix lignosa, fusiformis, crassa, perpendiculariter descensdens, vel transversa, fusce rubida, collo tecta squamis aridis, fusce rubidis, lateraliter fibrosa, subinde horizontalis, longa, deorsum hic illio radicans, supra emittens cespitulos foliorum, et caulium. Stolonibus herbacei e collo radicis omnino nulli. Caules filiformes, decumbentes, ascendentes, foliis breviores, et saepe multo, unguiculares-palmares, villosi, subinde rubescentes, uni-biflori, nunc omnino nudi, scapiformes, nunc inferne uno, alterove folio instructi. Folia ternata, radicalia petiolata, caulina subsessilia, et interdum ramentacea tantum. Foliola subrotundo-obovata, grosse, acute serrata, serratura impari minore, supra pilosa, viridia, subtus sericea praesertim ad nervos, et venas, albida, intermedio aequaliter cuneato, lateralibus basi obliquatis. Petioli longi, et in luxuriantibus plantis longissimi, hirsuti, villis patentissimis, supra canaliculati, orti e sinn stipula bifida, rufescentis, villosi, lacinia ovatis, aut ovato-lanceolatis, acuminatis, divergentibus. Flores parvi, solitarii, vel gemini, longe pedunculati. Folia floralia sub pedunculis ramentacea, parva, sessilia, aut subsessilia inter lacias stipulae. Pedunculi filiformes, hirsuti pilis patentibus, floriferi erecti, fructiferi oerui, aut declinati. Calyx campanulatus, sericeo-villosus, tubo intus rubente, orculo flavo receptaculum ambiente, lacinia viridibus, acutis, externis lanceolato-linearibus, vel linearibus, saepe brevioribus, internis lanceolatis, aut ovato-lanceolatis. Corolla alba, interdum suffusa levi rubore, et ex albo carnea, calyci aequalis, saepe vero brevior. Petala obcordata, vel obovata, integra. Stamina corolla multo breviora, incurva. Receptaculum parvum, globosum, exsiccum, villosum. Nucleus albus, basi, et costa interna barbatus, reliqua superfacie glaber, nunc prorsus laevissimus, nunc utrinque in lateribus instructus rugis simplicibus, ramosisque, dorso granulis scaberrimus.

Nullus unquam dubitavi, quin *Potentilla minorantha* De Cand. esset ipsamet *Potentilla Fragariastrum* Ehrh. in statu macroiore; sed nuperrime certior de hac re factus sum humanitate Cl. Alphonsi De Candollii filii, qui benevole mihi credidit exemplar unicum, et antopticum extans in herbario patris sui missum a Ramondio,

quod omnino pertinet ad *Potentillam Fragariastrum* in statu macriore, quo in statu hæc species mihi quoque sæpe obvia fuit.

22. *Potentilla reptans*: caule longe repente; foliis quinatis, ternatisque, foliolis oblongo-obovatis, dentatis, pilosis; pedunculis solitariis, axillaribus, unifloris; petalis obcordatis, calyce longioribus; nuculis scabris.

P. reptans *Sp. pl.* p. 714. *Smith, Engl. Fl.* 2. p. 423., et *Engl. bot.* v. 12. t. 86a. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 251. *Curt. Lond. ed. Grav.* v. 2. t. 65. *Plenok. Ic. pl. med.* 5. p. 19. t. 414. *Fl. Dan.* t. 1164. *Sv. bot.* v. 10. t. 709. *Nestl. Pot.* p. 66. n. 53. *Lehm. Pot.* p. 144. n. 62. *Hall. fil. in Mus. Helv.* 1. p. 54. *Ser. ibid.* p. 79. *All. Ped.* 2. p. 57. n. 1485. *Balb. Taur.* p. 84. *Re Seg.* p. 43., et *Tor.* 1. p. 272. *Birol. Acon.* 1. p. 175. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 320. n. 36. *Noco. et Balb. Tio.* 1. p. 243., et 387. *Prin. De Pot. Ital.* p. 17. n. 26. *Comoll. Prodr.* p. 100. *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec.* 2. tom. 10. p. 288. *Pollin. Ver.* 2. p. 163. *Moric. Ven.* 1. p. 224. *Nacc. Ven.* 3. p. 74. *Suffr. Foroj.* p. 147. *Ors. in Cap. Opus.* p. 285. *Sav. Pis.* 1. p. 482., et *Mat. med.* p. 5. tab. 41., et *Bot. Etr.* 2. p. 113. *Seb. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 172. *Ten. Nap.* 4. p. 297., et *Syll.* p. 250. n. 6. *Ab Uer. Hort. Pan.* p. 217. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. p. 583.* *De Cand. Franç.* 4. part. 2. p. 461., et *Prodr.* 2. p. 574. n. 21. a. β . *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 529. *Koch. Syn.* p. 215. *Reich. Exc.* 3. p. 591. n. 3832. *Host. Austr.* 2. p. 42. *Soop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 361. *Gaud. Helv.* 3. p. 404.

Fragaria n. 1118. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 47. *Cinquesoglio Matth. Valgr.* 1585. tom. 2. p. 1072. fig. *Ang. Semp.* p. 259.

Quinquefolium Cæsalp. De pl. lib. 14. cap. 19. p. 554.

Pentaphyllum minus, procumbens, flore luteo, vulgare, radicules emittens ex geniculis *Cup. Hort. Cath.* p. 164.

Quinquefolium minus, repens, luteum *Zannich. Ist.* p. 221. t. 263. excl. synonymis *Bauhinianis*.

Pentaphyllum majus repens Segui. Ver. 1. p. 500. n. 5. *Ital. Centofoglie. Cinquesoglie. Cinquesoglio. Erba peorina. Fragolaria. Pentafillo. Spillabuco Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 174.

Offic. Pentaphylli radix, herba *Linn. Mat. med.* p. 86. n. 247.

Perenn. Vulgaris in universa Italia in pratis, viis campestribus, marginibus agrorum, nec deest in montania. *Logi Sarzana, Bononis, et in Apennino Florentino in*

monte *Beni* inter *Pietramala*, et *il Covigliaio*. Habui Genuâ, et ex agro Mediolanensi a GRIOLETO, ex Tyroli Italico in *Fiemme* a FACCHINIO, ex agro Bassanensi a MONTINIO, ex agro Tergestino a TOMMASINIO, ex pratis Patavinis ab Eq. TREVISANO, ex *Arcevia* in districtu Anconitano a Prof. OCTAVIANIO, ex Piceno in monte *Birro* a MARZIALETTO, ex Sicilia ab Eq. GUSONIO. Floret Majo, Junio, in editis Julio.

Radix fusiformis, longa, gracilis. Caules prostrati, fere æqualibus intervallis nodosi, et in nodis ut plurimum radicanter, teretes, longi, et subinde longissimi, pubescentes, in aprico rubentes. Folia petiolata, quinata, inferiora rarissime septenata, nonnulla subinde ternata, alterna, vel geminata ex alio folio proficiscente a gemma axillari. Foliola magnitudine varia, obovata, aut oblongo-obovata, obtusa, et retusa, basi brevi tractu cuneata, et integra, reliquo margine acute, vel acutiuscule dentata, dente impari minore, supra late viridia, et pilis adpressis plus minus adpersa, subtus pallidiora, et villosiora præsertim in nervo, et venis, exteriora minora, et sæpe basi connata cum proximis. Petioli longi, pilosi, subinde rubentes, supra canaliculati, profecti a sinu stipulæ profunde bipartitæ, segmentis semiovatis, aut semilanceolatis, potius parvis, acutis, pilosis, ciliatis, integris, vel uno, alterove dente insculptis. In axillis foliorum passim occurrit gemma ferens unum, alterumve folium, aut ramenta foliacea, laciniata. Pedunculi solitarii, axillares, uniflori, nudi, pilosi, sæpe folio longiores. Flos potius grandis. Calyx pilosus, et magis basi, laciniis ovato-lanceolatis, longitudine æqualibus, aut internis paulo brevioribus, et angustioribus, utrisque acutis, aut acuminatis. Corolla luteo-aurea, calyce longior. Petala late obcordata. Filamenta glabra, subulata, basi dilatata. Stili brevissimi. Receptaculum globosum, pilosum. Nucula granulato-scabra, nitidula.

Usus. Ex vi vulneraria, adstringente adhibita in dysenteria. Nunc desueta.

23. *POTENTILLA norvegica*: villosa; caule adscendente, erectove; foliis ternatis, inferiorum foliolis obovatis, superiorum oblongo-lanceolatis, grosse dentatis omnibus; corollis calyce brevioribus.

P. norvegica *Sp. pl.* p. 715. *Fl. Dan.* t. 171. pl. macrior. *Nestl. Pot.* p. 66. n. 57. *Lehm. Pot.* p. 153. n. 65. *All. Ped.* 2. p. 58. n. 1488.* herb. Excl. syn. Hall. *Birol. Acon.* 1.

p. 176.* *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 323. n. 39. *De Cand. Prodr.* 2. p. 573. n. 10. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 545. *Koch. Syn.* p. 212. *Reich. Exc.* 3. p. 595. n. 3859. *Trifolium Norvegicum majus surrectum foliis crenatis* (err. crematis), flore luteo, a nullo descriptum *Barth. Act. Hafn. ann.* 1763. vol. 2. p. 346. tab. fig. D.

Ital. *Fragolaccia ruvida*.

Ann. Habui ex Pedemontio in monte *Turlo* a *CARESTIA* de herbario *BIROLI*, ex Tyroli Italico in campis di *Primiero* ad occidentem torrentis *Noana* a *FACCHINIO*. Floret Junio, Julio.

Radix gracilis, fusiformi-ramosa, lateraliter fibrillosa. Caulis teres, erectus, vel ascendens, simplex, aut ramosus, hirsutus, pilis patulis, scaber a bulbillis pilorum, palmaris-pedalis, et etiam quidquam ultra. Folia omnia ternata, inferiora longe petiolata, foliolis minoribus, obovatis, superiora brevius petiolata, foliolis oblongo-lanceolatis, suprema sessilia, sæpe opposita. Omnium foliola dentata, dentibus acutiusculis, subinde alio dente minore insculptis, impari lateralibus æquali, aut paulo longiore, supra saturate viridia, pilosa, pilis inæqualibus, subtus pallentia, subhirsuta. Petioli birsoti pilis patulis, supra canaliculati, orti o sinu stipulæ profunde bipartitæ, pilosæ, aut hirsutæ, laciniis anguste lanceolatis, acuminatis, longis, integris, vel uno, alterove dente notatis. Corymbus terminalis, dichotomus, hirsutus, modo pauciflorus, modo multiflorus. Folia floralia multo minora, sessilia inter segmenta stipulæ. Pedicelli potius breves, ludunt oppositifolii, vel extrafoliacei. Flores parvi. Calyx hirsutus, aut pilosus, laciniis externis lanceolato-linearibus, sæpe paulo brevioribus, internis ovato-lanceolatis, utrisque acutis, subinde longitudine æqualibus. Corolla pallide lutea, calyce brevior. Petala obovata, læviter emarginata. Receptaculum conicum, brevissime pilosum. Nucula arcuatim rugosæ, subinde læves, carinâ acutæ.

24. *POTENTILLA grandiflora*: pubescens; caule adscendente, erectove; foliis ternatis, foliolis subrotundo-obovatis, grosse dentatis; corymbo paucifloro; petalis obcordatis, calyce duplo longioribus; receptaculo breviter villoso.

P. grandiflora Sp. pl. p. 715. excl. syn. *Vaill. Nestl. Pot.* p. 69. n. 59. *Lehm. Pot.* p. 164. n. 71. *Hall. fil. in Mus. Helv.* 1. p. 50. *Ser. ibid.* p. 60. *All. Ped.* 2. p. 58. n. 1489. excl. syn. *Vaill.*, et *Scop. Re Seg.* p. 43.* *Birol. Acon.* 1.

Flor. Ital. T. V.

p. 176. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 323. n. 41. *Prin. De Pot. Ital.* p. 18. n. 29. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 463., et *Prodr.* 2. p. 572. n. 8. a. Röhl. cum Mert. et Koch. *Dents. Fl.* 3. p. 536. Koch. *Syn.* p. 218. Reich. *Exc.* 3. p. 591. n. 3831. *Gaud. Helv.* 3. p. 381.

Fragaria n. 1114. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 45.

F. Helvetica nana C. B. *Hall. l. c. tab.* 21. bona.

F. sterilis alpina angustifolia Magn. *Hort. reg. Monsp.* p. 80. fig. flore nimis parvo.

Ital. Fragolaccia trifogliata.

Perenn. Habui ex Pedemontio in rupestribus ad thermas Valderias a BERTERO, in Cenisio a Prof. BALBISIO, a Prof. RE, et a BONJEANNIO, in Pizzo d'Anzasco, et in montibus di Craveggia provincie Novariensis a Prof. DE NOTARIS, in Sempronio ab eodem, et a PESTALOZZA, ex Gothardo Italico ab Eq. BASSIO, ex Speluga in Rhætis a BERGAMASCHIO, ex Valtellina in monte Valdione ab eodem, in Stelvio, et in valle del Forno a RAINERO, ex Tyroli Italico in pascuis alpinis di Fassa præsertim a DURON, et Padon a FACCHINIO, et a Montalon a BEGGIATO, ex alpinis di Valsugana supra il Borgo a MONTINIO. Floret Julio, Augusto.

Radix fusiformis, transversa, rubido-nigricans, fibris lateralibus crassis, collo tecta squamis aridis, rubido-fuscis. Caules ex radice plures, vel solitarii, ascendentes, aut erecti, teretes, crassi, pubescentes, superne dichotomi, remote foliosi, a duobus, vel tribus pollicibus ad pedem longi, subinde rubentes. Folia omnia ternata, inferiora longe petiolata, successiva brevius. Foliola inferiorum subrotundo-obovata, superiorum obovata, aut oblongo-obovata, omnia basi cuneata, integra, reliquo margine grosse, profunde, acutiuscule dentata, dente terminali nunc cæteris æquali, nunc longiore, nunc brevior, foliolo impari petiolulato, vel sessili, utrinque viridia, plus minus pubescentia, margine, et subtus nervo, venisque villosa, venis pluribus, parallelis instructa. Petioli pubescentes, supra canaliculati, orti e sinu stipulæ grandis, pilosæ, bipartitæ, laciniis ovatis, ovato-lanceolatis, vel lanceolatis, acutis, vel acuminatis, integris. Flores grandes, in corymbo terminali, dichotomo, pubescente, sæpe longo. Folia floralia ad divisiones corymbi sessilia inter segmenta stipulæ, ternata, aut simplicia, tripartita; laciniis angustis, acuminatis, parce dentatis, vel integris, inque ramificationibus supremis sæpe bractæ duæ tantum, ovatæ, acutæ, integræ,

oppositæ, aut subalternæ. Pedicelli tennes, potius longi, uno, alterove ex inferioribus subinde oppositifolio. Calyx pilosus, laciniis acutis, externis angustioribus, lanceolato-linearibus, internis lanceolatis, omnibus longitudine æqualibus, vel externis paulo brevioribus. Corolla ampla, patens, luteo-aurea, calyce duplo longior. Petala late obcordata. Filamenta glabra. Stili longiusculi. Receptaculum parvum, globosum, villo brevi adspersum. Nuculæ arcuatim rugulosæ, glabræ.

25. *POTENTILLA alpestris*: hirsuta; caulibus cespitosis, decumbenti-ascendentibus; foliis inferioribus quinatis, superioribus ternatis, foliolis obovatis, grosse dentatis, retusis; petalis calyce duplo longioribus, late obcordatis.

P. alpestris Hall. fil. in *Mus. Helv.* 1. p. 53. *Smith. Engl. Fl.* 2. p. 419. *Hook. Brit. Fl. ed. 2.* p. 251.*

P. sabauda Ors. in *Cap. Opusc.* p. 285.* *De Cand. Franc.* 4. par. 2. p. 458.

P. crocea Ten. *Nap.* 4. p. 295., et *Syll.* p. 251. n. 12. *Lehm. Pot.* p. 111. n. 46. α. β.

P. aurea *Smith. Fl. Brit.* 1. p. 549., et *Engl. bot.* v. 8. t. 561. *Fl. Dan.* t. 114. *Ser. in Mus. Helv.* 1. p. 72. t. 8. *De Cand. Prodr.* 2. p. 576. n. 30. α. β. *Gaud. Helv.* 3. p. 393. n. I. II.

P. verna *All. Ped.* 2. p. 56. n. 1481. excl. var. B. *Nestl. Pot.* p. 52. β. γ.

P. salieburgensis *Haenk. in Jacq. Collect.* 2. p. 68. *Jacq. Ic. rar.* 3. t. 490. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 17. heft. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 530. *Koch. Syn.* p. 216. α. β. γ. *Reich. Exc.* 3. p. 592. n. 3839. *Schleich. Pl. sicc.**

Ital. *Fragolaccia alpestre*.

Perenn. Habui ex Apennino Ligurix orientalis ad S. Stephanum d' Aveto a TURIO, ex Pedemontio in alpinis editis della Madonna delle finestre ab Eq. Prof. MORISIO, ex Valtellina in valle S. Catharinæ a RAINERO, ex septem Communibus Vicetinarum in sylvis di Portolo a MONTINIO, et a Prof. VISIANIO, ex Grappa Bassanensium a MONTINIO, ex Tyroli Italico in Montalon a BEOCIATO, ex monte Birro Apennini Maceratensis a Prof. UTILI, ex Apennino Umbro al Sasso Borghese a Prof. OCTAVIANO, ex Nursinis in valle Canetra ab eodem, et ab Eq. PETRUCCIO, ex Piceno in montibus Priore, Pizzo, et della Sibilla alla Valleria a MARZIALETTO, in Vettore, et Vetoretto, in monte Pelone, in monte S. Bernardo, a Poggio di croce, et a Forea di

Corno ab ORSINO, denuo ex *Vettore* a Prof. OCTAVIANO, et ex vertice Velini a Prof. MAURIO. Floret Julio, Augusto.

Radix fusiformis; transversa, crassa, nigricans, fibris lateralibus crassis, collo tecta squamis aridis, fusce rubidis, passim sursum multiceps. Caules caespitosi, decumbentes, vel ascendentes, raro erecti, crassitie varia, hirsuti, a pollice ad spithamam longi. Folia inferiora quinata, subinde mixta cum ternatis, plus minus longe petiolata, successiva brevius, ternata, suprema sessilia. Foliola obovata, grosse dentata dentibus obtusis, vel acutis, interdum profundis, impari minore, utrinque viridia, sed supra saturatius, et plus minus pilosa, margine, et subtus praesertim in nervo, et venis hirsuta; lateralibus basi obliquata. Petioli hirsuti, supra canaliculati, orti e sinu stipulae hirsutae, bifidae, segmentis latis, ovatis, acutis, aut obtusis, integris, vel uno, alterove dente notatis. Corymbus terminalis, subdichotomus, hirsutus; interdum flores pauci, et etiam solitarii. Pedicelli praesertim alares potius longi. Folia floralia minora, sessilia inter segmenta stipulae, suprema simplicia, trifida, vel subtridentata. Calyx hirsutus, laciniis externis oblongis, angustis, et paulo brevioribus, internis ovato-oblongis, utrisque obtusis, vel acutis. Corolla potius grandis, plerumque calyce duplo longior, luteo-crocea, vel saturate lutea. Petala late obcordata. Receptaculum globosum, breviter hirsutum. Nuculae laeves, acie carinali acuta praesertim in latere interno, ubi latior. Villositas plantae rigidula.

Potentilla pyrenaica De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 459. valde accedit ad hanc speciem; sed juxta exemplar ejus autopticum e Pyrenaeis, quod olim obtinui ab amico De Candolleo f. r., habet foliola foliorum inferiorum minora, parvidentata, evidenter petiolulata, margine pilosa, in utraque superficie nuda, aut fere nuda, calyce, et corollam circiter duplo grandiores, quo novissimo caractere magis appropinquat *Potentillam grandifloram* L. Reapse ad neutram harum specierum pertinet, sed est inter illas intermedia, et probe distincta.

26. *Potentilla aurea*: caule ascendente, erectove; foliis quinatis, foliolis oblongis, apice argute, parceque serratis, margine sericeo-argenteis; petalis exquisito obcordatis, calyce duplo longioribus.

P. aurea Sp. pl. p. 712. Nestl. Pot. p. 57. n. 42. excl. Smith. Lehm. Pot. p. 116. n. 48. excl. Smith. Hall. fl.

in Mus. Helv. 1. p. 55. *All. Ped.* 2. p. 56. n. 1479. * herb. *Prin. De Pot. Ital.* p. 15. n. 20. *Fiv. Ann. bot.* 1. par. 2. p. 171. *Comoll. Prodr.* p. 100. *Bert. fl. It. in Apenn. Bonon.* p. 9. * *Jan. El.* p. 9. n. 11. * *De Cand. Franc.* 4. part. 2. p. 459. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 17. heft. Röhl. cum *Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 530. *Koch. Syn.* p. 216. *Reich. Exc.* 3. p. 593. n. 3841. *Host. Austr.* 2. p. 40.

P. Halleri Sav. Bot. Etr. 4. p. 113. *De Cand. Prodr.* 2. p. 576. n. 34. *Gaud. Helv.* 3. p. 403.

Fragaria n. 1122. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 49. *Quinaquefolium minus repens alpinum aureum* C. B. *Hall. l. c. tab.* 21.

Q. III. aureo flore *Clus. Hist. pl. lib. V. p. cvj. fig.* Ital. *Fragolaccia Fior d'oro*.

Perenn. Filius attulit ex Apennino Bononiensi in vertice *Corno alla scala*, ubi copiosa, et ex Apennino Mutinensi in *Cupola di Scaffaiolo*, unde habui quoque a MASQUILLIERIO. Accopi ex alpihus Pedemontanis de herbario ALLIIONII, ex Cenisio a BONJEANNIO, ex *Valtellina* a LANFOSSIO, ex monte *Codeno* ad *Larium* a RAYNERO, ex Baldo a Prof. JAVIO, ex Tyroli Italico in pascuis alpinis di *Fassa*, in monte *Giumello*, et *Duron* a FACCHINIO, a *Cima d'Asta* ab Eq. PETRUCCIO, in *Fiemme* in monte *Sadole* ab Eq. PAROLINIO, ex districtu Vicetino in pascuis di *Portole*, et *Marcetina* a MONTINIO, ex districtu Bassanensi nella *Grappa* ab eodem, et a BEGGIATO, et in montibus supra *Telve* in *Valsugana* a SARTORELLIO, ex Apennino Pontremulensi in monte *Orsaio* a Prof. PETRO SAVIO, ex Ducatu Lucensi in alpe di *Limone* a Prof. PUCCELLIO, ex Apennino Pistoriensi in *Val di Gorgi* a Prof. PETRO SAVIO. Floret a fine Junii in Augustum.

Radix fusiformis, transversa, gracilis, potius longa, fusco rubens, lateraliter capillata fibris tenuibus, ramulosus, collo tecta squamis fusco ruidis, subinde sursum in surculos cauliferos paucos divisa. Caulis teres, potius tenuis, erectus, vel ascendens, villis mollioribus, sursum versis plus minus adpersus, a pollice ad spithamam longus, uni-pauciflorus, et paucifolius. Folia quinata, inferiora longe petiolata, superiora brevius, vel sessilia, et subinde ternata, caulina inter se remota. Foliola oblonga, basi paululum angustata, apice acute dentata, retusa, sive dente impari minore, dentibus numero variis, plerumque paucis, reliquo

marginē longo tractu integerrima, ciliata villo sericeo, albo, argentino, sursum verso, supra saturate viridia, glabra, aut pilis raris, adpressis adpersa, subtus pallidiora, in nervo sericea, quandoque etiam in venis, aut in tota facie, præsertim juniora; valde referunt foliola *Alchemilla alpina* L. Petioli tenues, plus minus pilis arrectis adpersi, supra canaliculati, profecti e siuu stipulæ bifidæ, sericeo-ciliatæ, laciniis semiovatis, aut semilanceolatis, acutis, vel acuminatis, integris, divergentibus. Corymbus terminalis, subdichotomus, vel bifidus, semper pauciflorus, et subinde flos solitarius. Folia floralia inferiora ternata, sessilia, aut brevissime petiolata, foliolis angustis, apice subtridentatis, superiora minora, simplicia, integra, aut subtrifida, acuta, sessilia, utraque inter segmenta stipulæ. Pedicelli filiformes, adpresse sericeo-villosi, alii, et præsertim alares, longiusculi, reliqui breviores. Flos præ planta grandis. Calyx sericeus, præsertim margine, laciniis longitudine subæqualibus, obtusiusculis, vel acutis, externis angustioribus, lanceolatis, internis ovato-lanceolatis. Corolla calyce duplo longior. Petala late obcordata, cuneata, luteo-aurea, basi macula crocea. Receptaculum ovoideo-conicum, sericeum. Nuculæ plicis arcuatis nunc magis, nunc minus evidentibus instructæ, et subinde læves, carina acutiuscula, parum prominente.

Confer de hac specie, quæ est vera *Potentilla aurea* L., ea, quæ habet Smithius in Engl. Fl. 2. p. 420. sub *Potentilla alpestri*.

27. *Potentilla verna*: caulibus cæspitosis, decumbentibus, pubescentibus; foliis inferioribus quinatis, septenatisve, dentatis, retusis, subtus, margineque pilosis; petalis calyce sublongioribus, obovato-cuneatis, emarginatis, distantibus.

P. verna Sp. pl. p. 712. Smith. Engl. Fl. 2. p. 420., et Engl. bot. v. 1. t. 37. pl. macrior. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 260. Nestl. Pot. p. 51. n. 36. a. Lehm. Pot. p. 108. n. 45. Hall. fil. in Mus. Helv. 1. p. 52. Ser. l. c. p. 70. All. Ped. 2. p. 56. n. 1481. B. t. 24. f. 2.* excl. syn. Barrel. Herb. All. Birol. Acon. 1. p. 175. Prin. De Pot. Ital. p. 15. n. 18. Comoll. Prodr. p. 99. Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec. 2. tom. 10. p. 288. Pollin. Ver. 2. p. 158. a., et p. 160. γ.* excl. a varietate α syn. Zannichellii. Moric. Ven. 1. p. 224. Nacc. Ven. 3. p. 73.* Suffr. Foroj. p. 147. Bert. fil. It. in Apenn. Bonon. p. 9.*

- Ors. in Cap. Opusc. p. 285.* Ten. Nap. 1. p. 288. A., et Syll. p. 250. n. 8. A. De Cand. Franç. 4. part. 2. p. 459., et Prodr. 2. p. 575. n. 27. a. Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 17. heft. pl. macrior. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 533.. a. Koch. Syn. p. 217. a. Reich. Exc. 3. p. 591. n. 3833. Host. Aust. 2. p. 39. Gaud. Helv. 3. p. 396. n. I. P. aurea Pollin. Viag. p. 96. 98. 119.* pl. luxur.*
- P. opaca Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 17. heft. pl. luxur.*
- Fragaria n. 1119. a. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 48.*
- Quinquefol. III. flavo flo. II. species Clus. Hist. pl. lib. V. p. cvs. fig.*
- β hirsutissima, pilis longiusculis, patentibus.*
- Potentilla verna β Bert. Amæn. Ital. p. 155. n. 103. Poll. Ver. 2. p. 159.*
- P. verna β pilosissima Hall. fl. in Mus. Helv. 1. p. 52. Ser. ibidem p. 71.*
- P. verna Bert. Pl. Gen. p. 67. n. 143.*
- P. opaca All. Ped. 2. p. 56. n. 1480.* non Linn. Balb. Taur. p. 84.* Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 241. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 460., et Prodr. 2. p. 575. n. 29. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 535. Koch. Syn. p. 217. Gaud. Helv. 3. p. 402. γ.*
- Quinquefolium minus repens lanuginosum luteum Segui. Ver. 1. p. 501.*
- Pentaphyllum parvum hirsutum J. Bauh. Hist. pl. 2. lib. 17. p. 398. fol. a. fig.*
- Ital. Fragolaccia primaticcia.*
- Perenn. Filius attulit ex Apennino Mntinensi alla Cupola di Scaffaiolo. Habui ex Apennino Bononiensi in vertice Corno alla scala a Prof. PETRO SAVIO, et ex subapennino Bononiensi a Pianoro a Prof. PARLATORE, ex collibus Taurinensibus a Prof. BALBISIO, ex monte Biandino in Valsassina districtus Comensis a PPR. BALSAMO-CRIVELLIO, et DE NOTARIS, ex Baldo a POLLINIO, ex eodem monte, et ex viciniis Verone a RAINERO, ex Tyroli meridionali prope Bolzano, et ex Tyroli Italico in Fassa tam in pratis siccis, et collibus, quam in pascuis alpinis ai Monzoni a FACCHINIO, ex pascuis di Marcesina in Vicetinis, ex Montalon in Valsugana, ex collibus di Roman, et S. Michaelis d' Angarano a MONTINIO, ex ora Veneta a Campalto a Prof. NACCARIO, ex Piceno al Cordone d' Arquata vecchia ab ORSINO. Varietatem β legi Genus in collibus supra Oreggina. Habui ex collibus siccis Taurinensibus, ubi valde copiosa, a MOLINERIO, et a Prof.*

BALBISIO, ex collibus ad Albam Pompejam a BERTERO, ex nemoribus Ticini a *Buffalora* a PPFR. BALSAMO-CRIVELLIO, et DE NOTARIS, ex viciniis Bergomi a BERGAMASCHIO, ex Tyroli meridionali in collibus siccis prope Brixinam ab EQ. DE HEUFLERO, ex pratis, et pascuis agri Tergestini a TOMMASINIO, et a BIASOLETTO, Ravennâ alla *Possessionaccia* a DALLAQUATA, ex agro Volaterrano ab AMIDEO, ex Apennino Pistoriensi al *Libro aperto* a Prof. PETRO SAVIO. Floret Aprili, in editis serius.

Radix fusiformis, fusce rubida, collo tecta squamis aridis fusce rubidis, nunc longa, et gracilior, nunc brevis, crassa, semper sursum multiceps. Caules caespitosi, decumbentes, vel ascendentes, teretes, aut compressi, filiformes, pubescentes, pilis longioribus subinde pubescentiæ interjectis, sæpe rubentes, a pollice ad spithamam longi, superne soluti in corymbum dichotomum, nunc parce, nunc magis ramosum. Folia inferiora longe petiolata, plerumque quinata, rarius septenata, interdum mixta cum ternatis, superiora brevius petiolata, ternata, supremaque sessilia. Foliola obovata, vel obverse lanceolata, cuneata, margine superiore nunc obtuse, nunc acute dentata, sæpius retusa ex dente impari minore, supra viridia, glabra, et contra nervum, et venas lineata, subtus pallidiora, margineque plus minus pilis adspersa. Petioli pilosi, et quandoque hirti, supra canaliculati, orti e sinu stipulæ bifidæ, segmentis lanceolatis, aut ovatis, acuminatis, vel acutis, integris, aut uno, alterove dente insculptis. Folia floralia simplicia, trifida, sessilia inter segmenta stipulæ. Pedicelli filiformes, alares longiores, puberuli, et sæpe etiam pilosi. Flores parvi. Calyx pilosus, laciniis externis angustioribus, lanceolatis, et paulo brevioribus, obtusis, vel acutis, interioribus ovatis, aut ovato-lanceolatis, acutis, aut acuminatis, rarius obtusis. Corolla luteo-aurea, nunc calyci æqualis, nunc paulo longior. Petala obcordata, inter se quidquam distantia. Receptaculum globosum, villosum. Nuculæ rugis arcuatis plus minus evidenter instructæ. Herba subinde rubescens.

Varietas β est ipsamet species hirsutissima, præsertim in caule, pilis longiusculis, patentibus. Habentur individua intermedia, quæ nescias, an referas ad hanc varietatem, vel ad typum speciei. *Potentilla opuca* L. Smith. Engl. Fl. n. p. 421., et Engl. bot. v. 35. t. 2449.

ab hac varietate longe differt, neque hactenus in Italia reperta est. Eadem respondet *Potentillæ intermedie* Nestl. Pot. p. 49. t. 8.

28. *Potentilla frigida*: hirsuta; caule decumbente, paucifloro; foliis ternatis; foliolis obovatis, grosse, uniformiter dentatis; petalis late obcordatis, calyci subæqualibus.

P. frigida Vill. Dauph. 3. p. 563. Nest. Pot. p. 70. n. 60. t. 10. f. 3. Lehm. Pot. p. 177. n. 78. Balb. El. in Accad. di Tor. ann. 1818. tom. 23. p. 112. Coll. Herb. Ped. 2. p. 323. n. 43. Prin. De Pot. Ital. p. 19. n. 30. excl. syn. All. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 462. a., et Prodr. 2. p. 572. n. 7. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 538. Koch. Syn. p. 218. Reich. Exc. 3. p. 590. n. 3827. Gaud. Helv. 3. p. 378.

P. glacialis Hall. fil. in Mus. Helv. 1. p. 51. Ser. ibid. p. 69. t. 7. De Cand. Prodr. 2. p. 572. n. 6.

P. verna ♂ hirsuta De Cand. Franç. 5. p. 542.*

Fragaria n. 1115. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 46. excl. syn.

Ital. *Fragolina barbata*.

Perenn. Habui ex Cenisio a BONJEANWIO, ex monte Rosa ab Eq. DE WELDENIO, ex Stelvio in *Faltellina alla Quarta cantoniera* a RAINERO, ex Tyroli Italico in alpinis di Fassa, Vael, Monzoni a FACCHINIO. Floret Julio, Augusto.

Radix collo valde crassa, in cæteris ut in præcedente. Caules cæspitiosi, decumbentes, unguiculares-biunciales, crassiusculi, apice uni-triflori, vix ultra. Folia omnia ternata, foliolis parvis, obovatis, brevi tractu basi cuneatis, et integris, reliquo margine grosse, obtuse, et uniformiter dentatis, rarius dente impari minore. Petioli breves, vix semipollicares, superiores in caule brevissimi, aut nulli, supra canaliculati, orti ex sinu stipulæ bifidæ, laciniis præ plantula grandibus, ovatis, aut ovato-lanceolatis, obtusis, vel acutis. Flores unus-tres, breviter pedunculati. Folia floralia exigua, simplicia, trifida, sessilia inter segmenta stipulæ. Calycis laciniæ ovato-lanceolatæ, aut ovatæ, obtusæ, vel acutiusculæ, externæ paulo breviores, et aubinde quidquam latiores. Corolla saturate lutea; ludit calyce brevior, æqualis, aut paulo longior. Petala obcordata, vel leviter emarginata. Receptaculum globosum, pilosum. Nuculæ tumidæ, læves, aut obscure rugoso-reticulatæ, ecarinatæ. Planta pusilla, tota hirsuta, pilis longis, canescentibus.

29. *POTENTILLA minima*: pusilla; caule prostrato; foliis ternatis, foliolis obovatis, dentatis, subtus, apiceque dentium villosis; petalis leviter emarginatis, calyce sublongioribus.

P. minima Hall. fl. in Mus. Helv. 1. p. 51. Ser. ibid. p. 67. t. 8. De Cand. Prodr. 2. p. 572. n. 5. α. β. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 537. Reich. Exc. 3. p. 591. n. 3830. Gaud. Helv. 3. p. 380.

P. Brauniana Nestl. Pot. p. 70. n. 61. t. 10. f. 4. Lehm. Pot. p. 179. n. 79. Coll. Herb. Ped. 2. p. 324. n. 44. (err. typ. *Branneana*). Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 17. heft. Host. Aust. 2. p. 44.

P. frigida β De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 462.

Ital. *Fragolina piccina*.

Perenn. Habui ex Cenisio a ΒΟΝΙΕΑΝΝΙΟ, ex Tyroli Italico in alpinis di Fassa a FACCHINIO. Floret Julio, Augusto.

Planta vere pusilla, et præcedente adhuc minor. Differt ab illa caulibus prostratis, unguem-pollicem longis, sursum pilosis, foliolis supra glabris, margine, et subtus in nervo, venisque adpresso pilosis, dentibus apice barbatis, calyce piloso, petalis obovatis, leviter emarginatis, calyce quidquam longioribus, receptaculo villosiore.

TORMENTILLA.

Lin. Gen. p. 256. Tourn. Inst. 2. t. 153. Juss. Gen. p. 337. Lamck. Ill. 5. t. 444. Vent. Tabl. 3. p. 346. Smith. Engl. Fl. 2. p. 426.

Potentillæ species Nestl. Poten. p. 17. De Cand. Prodr. 2. p. 571.

Calyx perianthium monophyllum, liberum, patens, octopartitum, laciniis alternis externis, minoribus. Petala quatuor, obcordata, affixa contra laciniis minores calycis. Stamina sedecim, vel plura, corolla breviora, orta ex ambitu receptaculi discoidei prope petala, filamentis subulatis, antheris subrotundo-ovatis, bilocularibus, incurvatis. Ovaria plura, exigua, stilo laterali, longiusculo, stigmate obtuso. Receptaculum exsuccum, convexulum, dense, et breviter villosum. Nucula subreniformes, glabræ, nunc

evidenter rugis arcuatis instructæ, nunc obscure, et fere læves.

Habitus. Radix perennans, irregulariter tuberosa, colorata. Caules tenuēs, debiles, decumbentes, aut prostrati, crebre foliosi. Folia ternata, vel inferiora quinata, caulina, et sæpe plura, sessilia, foliolis acute serratis. Stipulæ foliaceæ, laciniatæ, vel integræ. Panicula dichotoma, vel flores solitarii, axillares. Pedunculi longi. Corollæ lutea. Raro calyx decempartitus, et petala quinque.

Observ. Ex facie a *Potentilla* quidquàm diversa, et ex numero partium constantius minore in calyce, et corolla genus hoc sat clare firmatur. Igitur naturæ ductum non sequuntur, qui ex fortuita calycis, et corollæ superabundantia, quæ quidem raro contingit, cum *Potentilla* confundunt.

Ord. nat. Ut in *Rubo* p. 217.

1. **TORMENTILLA erecta:** caule decumbenti-ascendente, superne dichotomo, foliis ternatis, serratis, caulinis crebris, multisque sessilibus; stipulis laciniatis.

T. erecta *Sp. pl.* p. 716. *Fl. Dan.* t. 589. *Sv. bot.* v. 1. t. 19. *Plenck. Ic. pl. med.* 5. p. 16. t. 411. *All. Ped.* 1. p. 295. n. 1072. *Balb. Taur.* p. 84. *Re Seg.* p. 43., et *Tor.* 1. p. 272. *Birol. Acon.* 1. p. 176. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 243., et 388. *Comoll. Prodr.* p. 100. *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec.* 2. tom. 10. p. 288. *Pollin. Ver.* 2. p. 152. *Moric. Ven.* 1. p. 225. *Nacc. Ven.* 3. p. 69.* *Suffr. Foroj.* p. 147. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 287.* *Bert. fil. It. in Apenn. Bon.* p. 9.* *Sav. Bot. Etr.* 2. p. 113. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 454. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 31. heft. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 546. *Koch. Syn.* p. 220. *Reich. Exc.* 3. p. 588. n. 3813. *T. officinalis* *Smith. Engl. Fl.* 2. p. 427. *Engl. bot.* v. 12. t. 863. *Curt. Lond. ed. Grav.* v. 3. t. 84. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 252. *Bert. Pl. Gen.* p. 67., et *Aman. Ital.* p. 155. n. 144., et p. 372. n. 159. *Host. Austr.* 2. p. 45. *Potentilla* *Tormentilla* *Nestl. Pot.* p. 65. n. 55. *Lehm. Pot.* p. 149. n. 64. *α. β. Coll. Herb. Ped.* 2. p. 322. n. 1. *Prin. De Pot. Ital.* p. 18. n. 28. *Sav. Pis.* 1. p. 483., et *Mat. med.* p. 5. t. 29. *Sang. Cent.* p. 73.* *Ten. Nap.* 4. p. 293., et *Syll.* p. 250. n. 4. *De Cand. Prodr.* 2. p. 574. n. 18. *α. β. γ. δ. Gaud. Helv.* 3. p. 382. *α. β.*

- P. Tormentilla erecta* Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 360.
P. sylvestris Ruch. Ven. p. 126.
P. tetrapetala Hall. fil. in Mus. Helv. 1. p. 51.
Fragaria n. 1117. a. β . Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 47.
Tormentilla Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 998. fig. Dur.
Herb. ed. Rom. p. 458. fig. Ang. Sempl. p. 241. Calz.
Viag. di mont. Bald. p. 11. Pon. Mont. Bald. p. 209.
Tormentilla Casalp. De pl. lib. 14. cap. 21. p. 556.
Potentilla sylvestris Zannich. Ist. p. 261. tab. 87. Segui.
Ver. 1. p. 413. Garid. Aix. p. 468. t. 103.

Ital. *Tormentilla* Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 227.

Offic. *Tormentilla radix*, herba Linn. Mat. med. p. 87. n. 248.

Perenn. Legi Sarzanæ, ubi copiosa in sylvis di Montedarme, Murano, Ghiggiolo, Montecavallo, et Caprione, in Liguria occidua inter Voltri, et l'Acqua santa, in alibus Aphanis in valle Catino montis Sagro. Filius attulit ex eadem valle, et ex Apennino Bononiensi in Corno alla scala, in Cimone di Caldaia, et in Gata di Castiglione de' Pepoli. Habui ex Insubria ad lacum d'Orta ab Eq. DE WELDENIO, ex Baldo in valle Frigida a MANGANOTTO, ex Tyrolis Italico in sylvis di Fiemme, et Fassa a FAGGINIO, et a RAISERO, ex pascuis Bassanensibus a MONTINIO, et alle Grotte d'Ogliero ab Eq. PAROLINIO, ex sylvaticis Tergestinis præsertim al Farnedo a TOMMASINIO, Fossà Clodià in litore, et in pascuis a S. Anna a Prof. NACCARIO, ex Apennino di Maradi in sylva del Baroccio a TASSINARIO, ex Nursinis in valle Canetra ab ORSINO, ex Picenò in monte Alpone a MARZIALETTO, ex Ducatu Lucensi a Forci a Prof. PUCCINELLIO, ex sylvis Mugellanis a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, ex provincia Aretina in herbis collium Plebis S. Stephani, et S. Sepulchri a CHIRICO, ex Calabria alla Sile, et Aspramonte ab Eq. GUSSONIO. Floret Aprili, Majo, serius in alpinis. Sæpe iterum floret autumnò.

Radix lignosa, horizontalis, irregulariter tuberosa, lateraliter fibrillosa, intus, et extus rubida, sed extus fusce. Caules a radice sæpe plures, debiles, decumbenti-ascendentes, tenues, teretes, pubescentes, plerumque apice dichotomi, et subinde ramosissimi, sed macriores simplices, in aprico rubentes, a duobus, tribusve pollicibus ad pedem, et etiam paulo ultra longi, crebre foliosi. Folia ternata, radicalia fugacia, longe petiolata, foliolis parvis, obovatis, basi cuneatis,

et integris, reliquo margine dentatis; eorum petioli pubescentes, supra canaliculati, basi dilatati, vel orti e sinu stipulæ bifidæ, laciniis lanceolatis, integris; caulina numerosa, ima brevissime petiolata, reliqua sessilia, cuncta inter stipulas foliaceas, laciniatas. Eorum foliola radicalibus longiora, et angustiora, lanceolata, acuta, et acute serrata, serraturis nuno profundis, nunc levioribus. Omnia foliola supra late, vel saturate viridia, subtus pallidiora, utrinque plus, minusve pubescentia, sed magis subtus. Flores parvi, modo pauci, et etiam solitarii, plerumque vero in panicula dichotoma cum pedunculis alaribus longis, patula, subinde ramosissima. Folia floralia inferiora caulinis supremis similia etiam quoad stipulas, reliqua minora, et suprema ramentacea, simplicia, trifida, vel tridentata, aut integra, sessilia inter stipulas. Calyx octopartitus, pubescens, laciniis externis linearibus, paulo brevioribus, internis ovato-lanceolatis, vel lanceolatis, utrisque acutis. Corolla tetrapetala, luteo-aurea, calyce longior. Petala obcordata, ungue croceo. Receptaculum breviter, et dense villosum. Nucula glabræ; ludunt obsolete rugosæ, et fere læves, vel rugis arcuatis insignibus instructæ. Pubescentia totius plantæ adpressa. Rarissime calyx ludit decem-partitus, tuncque corolla pentapetala.

Usus. Planta præstans virtute adstringente, præsertim in diarrhæa. Digna meliore sorte apud medicos hodiernos.

α. *TORMENTILLA reptans*: caule prostrato; foliis pedato-quinatis, ternatisque, foliolis obovatis, acute serratis, nitide, adpresseque villosis; stipulis lanceolatis, integris, bifidisve; pedunculis solitariis, unifloris, folio longioribus.

T. reptans *Sp. pl.* p. 716. *Smith. Engl. Fl.* 2. p. 428., et *Engl. bot.* v. 12. t. 864. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 252. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 548. *Koch. Syn.* p. 220. *Reich. Exc.* 3. p. 589. n. 3814.

Potentilla nemoralis *Nestl. Pot.* p. 65. n. 54. *Lehm. Pot.* p. 147. n. 63. t. 13. optima.

β *humilior*, pilosa, foliolis ovalibus; pedunculis abbreviatis; floribus minoribus.

Potentilla nemoralis *De Sal. in Bot. zeit. ann.* 1834. p. 52.*

Ital. Tormentilla sdraiata.

Perenn. Habni ex Ducatu Lucensi a Colle di Compito secus torrentem la Cerchia a Prof. PUCCINELLIO, ex

hummentibus sylvæ Pisauræ a Palazzetto a Prof. PETRO SAVIO. Varietatem β accepi ex pascuis montium *Coscione*, et *Nino* in Corsica a Dr. SALIS. Floret Majo, Junio.

Radix quam in præcedente gracilior. Caulis teres, plerumque paulo crassior, prostratus, nullibi radicans, simplex, aut vix ramosus, adpresse villosus, spithamalis-sesquipedalis. Folia parva, inferiora longe petiolata, pedato-quinata, subinde tantum ternata, superiora ternata, brevius petiolata, supremæque sessilia, sæpe opposita, interdum simplicia, bi-trifida. Foliola obovata, aut obverse lanceolata, basi cuneata, integra, reliquo margine argute, et plus minus profunde serrata, serratura impari paulo longiore, aut æquali, rarius brevior, adpresse pilosa, aut villosa, et magis subtns, villo nitido, et quidquam argentino, pallide viridia. Petioli villosi, supra canaliculati, orti ex sinu stipulæ bipartitæ, segmentis lanceolatis, aut ovato-lanceolatis, acutis, villosis, integris, aut bifidis, potius parvis præ illis præcedentis speciei. Sæpe in axilla folii est unum, alterumque folium e gemmula propria. Pedunculi tenues, folio multo longiores, uniflori, axillares, aut oppositifolii, adpresse villosi, nudi, in supremo caule approximati. Flores duplo grandiores, quam in *Tormentilla erecta* L., sed minores, quam in *Potentilla reptante* L. Calyx adpresse villosus, octopartitus, lacinii lanceolatis, acutis, externis angustioribus, nunc paulo brevioribus, nunc subæqualibus. Corolla saturate lnteo-aurea; calyce longior, aut subæqualis, plerumque tetrapetala, subinde in floribus inferioribus pentapetala cum calyce decempartito. Receptaculum breviter, et dense albo-villosum. Nuculæ arcuatim rugulosæ, vel læves. Exemplaria nostra sunt paulo villosiora, et nitidiora exemplaribus Germanicis ab Ill. Frölichio ad me missis, cæterum simillima.

Varietas β habet caulem tenuiorem, palmarem, vix ultra, pilis raris adpersum. Foliola sunt ovalia, et fere elliptica, parcius pilosa, pilis non, aut vix nitentibus, ideo opaco viridia. Stipulæ exiguæ, lanceolatæ, integerrimæ. Pedunculi abbreviati, vix longitudine folii, aut paulo breviores. Flos fere dimidio minor; calyx tamen est paululum grandior, quam in *Tormentilla erecta* L.; ejus lacinie externæ lanceolatæ, internæ ovatæ. Corollam non vidi. An propria, et distincta species? Videant autoptæ in loco natali.

Valde suspicor *Tormentillam reptantem* De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 454. esse lusum *Tormentillæ erectæ* L., cum auctor tribuat plantæ suæ caulem pluries bifurcatum.

GEUM.

Lin. Gen. p. 256. Juss. Gen. p. 338. Lamck. Ill. 5. t. 443. Vent. Tabl. 3. p. 348. Gærtn. De fruct. 1. p. 351. t. 74. Smith. Engl. Fl. 2. p. 428. De Cand. Prodr. 2. p. 550. Endl. Gen. p. 1246. n. 6386. Caryophyllata Tourn. Inst. 2. t. 151. f. A. D. F. G. Sieversia Willd. in Ber. mag. 5. p. 398. Oreogeam Ser. in Mém. de la soc. phys., et d'hist. nat. de Gen. tom. 2. sec. part. p. 139.

Calyx perianthium monophyllum, liberum, persistens, decemfidum, laciniis alternis externis, minoribus. Petala quinque, inserta oræ receptaculi discoidei contra lacinias externas calycis. Stamina numerosa, corolla breviora, affixa in ambitu receptaculi prope petala, filamentis subulatis, antheris ovatis, bilocularibus, incumbenibus. Ovaria numerosa, parva, stilo laterali, vel terminali, uncato, nunc superne articulato, et supra articulum refracto, nunc prorsus exarticulato. Stigma simplex, subinde crassiusculum. Receptaculum columnare, oblongum, vel cylindraceum, exsuccum, pilosum. Fructus capitatus. Nuculæ oblongæ, compressæ, hirsutæ, a stilo persistente, et post nuptias elongato caudatæ, cauda nuda, vel plumosa, in stilo articulato ad nodum uncato-refracto, vel cirroso-refracto, articulo refracto deciduo.

Habitus. Radix perennis, crassa, interdum e collo stolonifera. Caulis superne parce ramosus, vel simplex, uniflorus. Folia radicalia lyrato-pinnata, aut pinnata, raro bipinnata, vel simplicia, inciso-dentata, caulina stipulata, plerumque ternata, vel suprema simplicia. Corolla lutea, alba, cuprea, rubra. Herba virens, plus minus villosa.

Ord. nat. Ut in Rubo p. 217.

* *Stilo nodoso-refracto*. Geum.

1. *GEUM urbanum*: foliis imis pinnato-lyratis, foliolis oblongis, inciso-dentatis, impari majore; stipulis amplis, foliaceis; caule paucifloro; petalis calyci subæqualibus, nucularum caudis nudis.
G. urbanum *Sp. pl.* p. 716. *Smith. Engl. Fl.* 2. p. 429., et *Engl. bot.* v. 20. t. 1400. *Curt. Lond. ed. Grav.* v. 3. t. 85. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 252. *Fl. Dan.* t. 672. *Sv. bot.* v. 2. t. 94. *Plenck. Ic. pl. med.* 5. p. 20. t. 415. *Balb. Taur.* p. 84. *Re Seg.* p. 43., et *Tor.* 1. p. 273. *Birol. Acon.* 1. p. 176. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 309. n. 1. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 244., et 388. *Comoll. Prodr.* p. 101. *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec.* 2. tom. 10. p. 288. *Pollin. Ver.* 2. p. 165. *Nacc. Ven.* 3. p. 74.* *Suffr. Foroj.* p. 147. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 283.* *Sav. Pis.* 1. p. 484., et *Mat. med.* p. 7. tab. 8., et *Bot. Etr.* 2. p. 113. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 173.* *Ten. Nap.* 4. p. 297., et *Syll.* p. 252. n. 2. *Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 217. *Guss. Sup.* 1. p. 159. b. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 470. α. β., et *Prodr.* 2. p. 551. n. 9. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 5. heft.: *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 549. *Koch. Syn.* p. 209. *Reich. Exc.* 3. p. 598. n. 3878. *Host. Austr.* 2. p. 117. *Gaud. Helv.* 3. p. 411.
Caryophyllata urbana *All. Ped.* 2. p. 60. n. 1494. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 364.
Geum intermedium *Ten. Nap.* 4. p. 298., et *Syll.* p. 253. n. 3. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. p. 585.
G. n. 1130. α. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 52.
Gariophyllata *Matth. Valgr.* 1585. tom. 2. p. 1037. fig. *Dur. Herb. ed. Rom.* p. 197. fig.
Gariophyllata che nasce po' piani *Ang. Sempl.* p. 222.
Gariofilata vulgo in sylvis nascens herba *Cas. De pl. lib.* 14. cap. 12. p. 550.
Cariophyllata degli orti *Pon. Mont. Baldi* p. 140.
Caryophyllata vulgaris *Cup. Hort. Cath.* p. 38. *Segui. Ver.* 1. p. 493. n. 1. *Hort. Rom.* 5. tab. 43.
C. Matthioli *Castell. Hort. Mess.* p. 6.
Ital. Ambretta salvatica. Benedetta. Cariophyllata. Erba Benedetta. Giariophyllata. Garofanaia. Garofanata. Ghe-rofanella *Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 110.
Offic. Caryophyllatæ radix, herba *Lin. Mat. med.* p. 87. n. 249.
Perenn. Legi Bononiæ in sylvis di Montecastello, degli Arienti, et di Casalecchio. Habui ex Liguria occidua

in collibus di. Pegli a CATOLETO, ex Tyroli Italico prope Vigo, et in Fiemme a FACCHINIO, ex districtu Bassanensi in incultis d'Angarano a MONTINIO, ex agro Tergestino ad sepes a TOMMASINIO, ex agro Patavino ab Eq. PAROLINIO, Fossâ Clodiâ al Fossone a Prof. NACCARIO, ex montibus Camerinensibus a Prof. OCTAVIANIO, ex Piceno in montibus de' Fiori, Pelone, et Acuto ab ORSINO, et in monte Volubrio alle Svolte a MARZIALETO, ex provincia Senensi ad balnea S. Philippi a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, ex vicinis Romæ, ubi copiosum, a Prof. MAURIO. Floret Majo, Junio.

Rhizoma crassum, fusiforme, transversum, fuscum, lateraliter vestitum fibris numerosis, crassiusculis, grate aromaticum. Caulis teres, erectus, vel adscendens, pubescens, superne bifidus, vel ramis ternis, vel bis bifidus, et subinde simplicissimus, uni-bipedalis. Folia radicalia, et caulina ima longe petiolata, pinnato-lyrata cum impari, foliolis superioribus oblongis, inciso-dentatis, impari majore, sæpe trifido, aut trilobo, modo angustiore, basi cuneato, modo ampliore, subrotundo-ovato, basi cordato, foliolis inferioribus multo minoribus, ovatis, apice parce dentatis. Folia caulina superiora brevius petiolata, ternata, supremaque prædita foliolis oblongo-lanceolatis, acutis, cæterum et ipsa inciso-dentata. Omnia folia plus minus pubescentia, supra læte viridia, subtus pallentia. Petioli pubescentes, supra canaliculati, in foliis imis basi paulum dilatati, amplexicaules, expansione margine dense setosa. Petioli reliquorum foliorum basi utrinque aucti stipula grandi, foliacea, subrotunda, inciso-dentata. Pedunculi terminales cauli, ramisque, uniflori, nunc longi, nunc breves, pubescentes, vel pilosi, erecti, rarius cernui, inferne instructi uno, alterove folio simplici, lanceolato, acuto, aut acuminato, inæqualiter serrato, sessili inter stipulas, reliqua parte nudi. Flos parvus. Calycis lacinie externæ lanceolato-lineares, internæ ovato-lanceolatæ, vel lanceolatæ, utraque acutæ, aut acuminatæ, pilosæ, in fructu retroflexæ. Corolla luteo-aurea, modo calyce brevior, modo æqualis, modo quidquam longior. Petala obovata, obtusa. Fructus globosus. Receptaculum fructus oblongo-conicum. Nucula hirsuta, caudâ rubescente, recurva, nuda, vel basi pilosa, superne articulato-refracta, aut cirroso-refracta, articulo supra nodum refracto, nunc nudo, nunc basi pilosulo, facile deciduo. Herba in

Flor. Ital. T. V.

umbrosis minus pubescens, in asperis siccis villosior, pilis caulinis, et petiolorum reflexis, aut patentibus.

Usus. Ex qualitate aromatica, astringente, sudorifera radix in usu medico magni facienda, licet nunc parum adhibita. Laudatur præsertim in dysenteria.

2. *Geum rivale*: foliis imis pinnato-lyratis, foliolo impari maximo; floribus nutantibus; petalis calyci interno subæqualibus, longe unguiculatis; nucularum caudis basi hirsutis, articulo refracto plumoso.

G. rivale *Sp. pl.* p. 717. *Smith. Engl. Fl.* 2. p. 430., et *Engl. bot.* v. 2. t. 106. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 252. *Fl. Dan.* t. 722. *Sv. bot.* v. 4. t. 231. *Plenck. Ic. pl. med.* 5. p. 20. t. 416. *Re Seg.* p. 43., et *Tor.* 1. p. 273. *Birol. Acon.* 1. p. 177. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 310. n. 8. *Comell. Prodr.* p. 101. *Pollin. Ver.* 2. p. 165. *Morett. in Mem.* 1. p. 272. *Suffr. Foroj.* p. 147. *Sav. Bot. Etr.* 2. p. 114. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 471., et *Prodr.* 2. p. 551. n. 13. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 8. heft. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 552. *Koch. Syn.* p. 209. *Reich. Exc.* 3. p. 598. n. 3875. *Host. Austr.* 2. p. 18. *Gaud. Helv.* 3. p. 412. α.

Caryophyllata rivalis *All. Ped.* 2. p. 61. n. 1495. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 365.

Geum n. 1129. α. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 52.

Caryophyllata montana del Dalecampio *Pon. Mont. Bald.* p. 336.

Caryophyllata aquatica nutante flore *Tit. It. in calc. Hort. Maur.* p. 17. non num. *Zannich. Opusc. posth.* p. 59. *Segui. Sup.* p. 216.

C. montana I. *Clus. Hist. pl. lib. v. p. ciii.* fig.

III. *Caryophyllata aquatica* *C. B. in Matth.* p. 698. fig.

Ital. Benedetta. Caryophyllata aquatica *Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 110.

Perenn. Habui ex Apennino Liguriæ orientalis ad S. Stephanum d' Aveto in pratis humentibus di Roncolungo a TURIO, ex Liguria occidua a Prof. SASSIO, ex Pedemontio in udis ad thermas Valderias a BEATEO, ex agro Mediolanensi a GRIOLETO, ex monte Generoso ad Lerium, et ex fossis prope Comum a RAINEO, ex districtu Bassanensi in sylvis d' Angarano, et dei Collialti a MONTINIO, ex montibus Forojuliensibus a Prof. BRIGNOLIO, ex Ducatu Lucensi in Apennino prope S. Pelegrino a Prof. PUCCINELLIO. Floret Junio, Julio. Radix ut in præcedente, intus alba, extus fasce rubida, et adspersa squamis fusce rubidis, sapore aromatico

pradita. Caulis teres, erectus, vel adscendens, inferne scabridus, superne pubescens, et parce ramosus, interdum simplex, spithamalis-pedalis, vix ultra. Folia radicalia, et caulina ima pinnato-lyrata, longe petiolata, foliolo impari maximo, cordato-subrotundo, vel cuneato-oblongo, sæpe trilobo, inæqualiter acute serrato; foliolis lateralibus descendendo minoribus, ovatis, aut oblongis, acute incis, serratisque, imis tantum serratis, et subinde integris. Interdum foliolis istis intermiserunt ramentula foliacea, exigua, integerrima. Reliqua folia caulina pauca, remota, brevius petiolata, supremaque sessilia, ternata, foliolis oblongo-lanceolatis, acuminatis, plus minus inæqualiter serratis, floralia simplicia, angustissima, lanceolato-linearia, acuminata, integra. Omnia folia glabra, vel pilis raris adpersa, supra saturate viridia, subtus pallidiora. Petioli glabri, supra canaliculati, in foliis imis basi dilatati, in reliquis basi utriusque aucti stipula foliacea, multo minore quam in *Geo urbano* L., ovata, aut lanceolata, acuta, et in stipulis superioribus acuminata, serrata, subinde ad flores integerrima. Flores solitarii, terminales cauli, ramisque, longiuscule pedunculati, nutantes. Pedunculi pubescentes, fructiferi erecti. Calyx grandis, in anthesi campanulatus, in fructu reflexus, pubescens, atrovirens, laciniis internis lanceolatis, acuminatis, externis linearibus, plusquam dimidio brevioribus. Petala erecta, late obovata, leviter emarginata, longe, et late unguiculata, pallide, et sordide flavida, sæpe cum aliquo rubore, tuncque coloris cuprei, laciniis calycinis internis subæqualia, aut etiam quidquam longiora, rarius breviora, venis numerosis, ramosis longitudinaliter instructa. Receptaculum fructus cylindraceum, longitudine calycis interni, hirsutum. Fructus grandis, globosus, vel ovalis. Nucula hirsuta, cauda basi hirsuta, hinc ad nodum nuda, uncinato-refracta, vel cirroso-refracta, articulo supra nodum refracto plumoso, deciduo. Caudæ externæ recurvæ. Subinde in hac specie calycis laciniæ, et petala multiplicantur, aut flos fit prolifer; sed lusus istos nondum obtinui ex Italia.

** *Stilo enodi*. Oreogean.

3. *GEUM micropetalum*: hirsutum; foliis imis pinnato-lyratis, foliolis oblongis, acute inciso-dentatis, impari

maiore; caulibus cæspitosis, decumbentibus; petalis subrotundis, calyce dimidio brevioribus; nucularum caudis enodibus, hirtis.

G. micropetalum *Gasp. Piant. della Lucan. in Progress. delle scienz. lett. ed art. p. 171. n. 13.* Ten. Nap. 4. p. 300., et Syll. in add. et emend. p. 604.*

G. rivale *Ten. Syll. in add. et emend. p. 538. ex Auct. Ital. Gariophyllata minuta.*

Perenn. Habui ex Apennino Lucanæ inter Muro, et Laviano a GASPARRINIO. Floret Junio Julio.

Folia, et stipulæ *Gei urbani L.*, sed dentibus acutis.

Caules e radice plures, cæspitosi, crassiusculi, decumbentes, superne parce ramosi, palmarea-pedales. Pedunculi terminales, et alares, brevissimi, erecti. Calyces quam in *Geo urbano L.* minores, laciniis internis ovato-lanceolatis, vel lanceolatis, acuminatis, externis linearibus, dimidio, et ultra brevioribus. Petala exigua, subrotunda, integerrima, calyce dimidio breviora, sordide flava. Nuculæ, et caudæ hirtæ. Caudæ incurvæ, enodes. Tota planta hirsuta. Meliora ex sicco eruere non potui.

4. *Geum montanum*: foliis radicalibus pinnato-lyratis, foliolis obtuse dentatis, impari maximo, subrotundo; caule erecto, unifloro; petalis late obcordatis; nucularum caudis plumosis.

G. montanum *Sp. pl. p. 717. Jacq. Austr. 4. p. 38. t. 373.*

Lamck. Ill. 5. t. 443. Re Seg. p. 44. Birol. Acon. 1.*

p. 177. Comoll. Prodr. p. 101. Morett. in Mem. 1. p. 273.

Pollin. Ver. 2. p. 166. α. β. Suffr. Foroj. p. 205. Bert.*

fl. It. in Apenn. Bon. p. 10. Sav. Bot. Etr. 2. p. 115.*

Maur. Cent. xiii. p. 25. De Cand. Franç. 4. par. 2.

p. 472, et Prodr. 2. p. 553. n. 26. α. β. γ.* Sturm.*

Deuts. Fl. 1. abth. 14. heft. Röhl. cum Mert. et Koch.

Deuts. Fl. 3. p. 554. Koch. Syn. p. 210. Host. Austr. 2.

p. 19. Gaud. Helv. 3. p. 413. α. β.

Caryophyllata montana All. Ped. 2. p. 61. n. 1496. Scop.

Carn. ed. 2. tom. 1. p. 365.

Sieversia montana Coll. Herb. Ped. 2. p. 311. n. 1. Reich.

Exc. 3. p. 599. n. 3880.

Geum n. 1131. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 53.

Gariophyllata montana Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 1038.

fig. Ang. Sempl. p. 222.

Cariofillata alpina minima di prima specie Pon. Mont.

Bald. p. 203. fig. bona plantæ minoris.

C. alpina Pon. l. c. p. 188.

- C. alpina nostra *Pon. l. c. p. 214.*
 Caryophyllata alpina minima flore aureo *Barrel. Ic. 399.*
 C. alpina lutea *Tit. It. in calc. Hort. Maur. p. 17.* non
 num. *Segui. Ver. 1. p. 494. n. 2.*
 C. alpina, minor *Segui. l. c. p. 495. n. 3.*

Ital. *Gariofillata montana* Matth. l. c.

Perenn. Species copiosa in editis Apennini, et alpium
 Italiæ. Filius attulit ex Apennino Bononiensi *al Corno
 alla Scala*, in *Nuda di Vidicciatico*, et sub *la Cu-
 pola di Scaffaiolo*. Habui ex eodem Apennino, qua
 ex lacu *di Scaffaiolo* descenditur ad Fananum a MAS-
 QUILLIERIO, et ex monte *Gennaro* prope *la Culdaia* ab
 herborario nostro, ex *Cenisio* a BONJEANNIO, et a Prof.
 RE, ex alpinis vallis *Intrasca* provinciæ Novariensis
 a Prof. DE NOTARIS, ex *Valtellina alla Ghiacciaia
 del Forno* a RAINERO, et in valle *Malenco* prope *Son-
 drio* a BERGAMASCHIO, ex montibus ad *Larium* a Rev.
 ODESCALCHIO, et in monte *Legnone* a PPR. BALSAMO-
 CRIVELLIO, et DE NOTARIS, ex *Baldo* a POLLINIO,
 a MANGANOTTO, et a BARBIERO, ex Tyroli Italico in
 alpinis *di Fiemme* præsertim *al Feudo* a FACCHINIO,
 in monte *Sadole* ab EEQQ. PAROLINIO, et PETRUCCIO,
ai Monzoni a Prof. MENECHINIO, ex *Portole*, et *Mar-
 cesina* Vicetinarum, et ex monte *Agaro* in *Valsugana*
 Bassanensium a MONTINIO, ex alpinis Belnensibus
 a Prof. VISIANIO, ex Apennino Pistoriensi a Prof. PE-
 TRO SAVIO, ex Corsica in monte *Rotondo* a SOLEIRO-
 LIO. Floret Julio.

Rhizoma præcedentium, fuscum. Caules solitarii, vel
 plures cæspitosi, erecti, aut ascendentes, simplices,
 uniflori, paucifolii, longitudine mirimode varii, un-
 guiculares-pedales, et etiam paulo ultra pedem. Folia
 radicalia pinnato-lyrata, foliolis subrotundis, obtuse
 dentatis, impari maximo, sæpe cordato, et lobato,
 reliquis parvis, descendendo decreascentibus, interdum
 deorsum versis, fere totum petiolum vestientibus. Inter
 hæc foliola habentur ramentula foliacea, minima. Pe-
 tioli basi quidquam dilatati, striati. Folia caulina præ
 radicalibus minima, sessilia, inter se remota, ternata,
 supremaque simplicia, trifida, foliolis, laciniisque
 angustis, acutis, incis, vel dentatis. Utrinque ad
 basim foliorum caulinarum stipula foliacea, semiovata,
 incisa, aut dentata. Omnia folia læte viridia. Flos
 solitarius, terminalis, grandis, nutans, patens, modo
 breviter, modo longe pedunculatus, pedunculo fructifero

erecto. Calycis lacinia interna lanceolata, vel ovato-lanceolata, acuta, externa angustiores, et breviores. Corolla luteo-aurea, calyce longior, etiam duplo. Petala late obcordata. Stilus terminalis. Capitulum fructus globosum, et ob caudas elongatas amplum. Receptaculum oblongum, breviter hirtum. Nucula hirsuta, apice barbatæ, terminatæ cauda tenui, longissima, enodi, scabra, tota plumosa, vel apice solum nuda, sæpe demum rubescente, et incurva. Tota planta hirsuta, villo molliusculo. Numerus petalorum subinde augetur.

5. *GEUM reptans*: stolonibus subsolitariis; caule unifloro; foliis subuniformibus, acute incis, radicalibus multijugis.

G. reptans *Sp. pl.* p. 717. *Jacq. Austr.* 5. p. 38. *app. t.* 22. *Re Seg.* p. 44. *Birol. Acon.* 1. p. 177. *Pollin. Ver.* 2. p. 167. *Brocch. Mem. miner. sulla valle di Fass.* p. 226. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 472., et *Prodr.* 2. p. 553. n. 22. a. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 14. heft. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 554. *Koch. Syn.* p. 210. *Host. Austr.* 2. p. 19. *Gaud. Helv.* 3. p. 414.

Caryophyllata reptans *All. Ped.* 2. p. 61. n. 1497.

Sieversia reptans *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 311. n. 2. *Reich. Exc.* 3. p. 599. n. 3881.

Cariofillata alpina minima di seconda specie *Pon. Mont. Bald.* p. 205. fig. bona.

Caryophyllata alp. tenuifol. incan. flore lut. longius radicata *Barrel. Ic.* 400. *Bocc. Mus. di piant.* p. 160.

C. alpina tenuifolia *Bocc. l. c. t.* 128.

C. alpina, *Apii folio Segui. Ver.* 1. p. 495. n. 4.

Ital. Cariofillata flagellosa.

Perenn. Habui ex Cenisio a Prof. BALBISIO, a BONJEAN-
NIO, et a BERTERO, ex pascuis Sempronii versus *Fras-
sinone* a Prof. DE NOTARIS, ex Tyroli Italico in pratis
alpinis di *Fiemme al Feudo* a FACCHINIO, et al *Botro
destro dei Monzoni* a Prof. MENECHINIO, ex *Montalon*
in *Valsugana*, et ex *Vette di Feltre* a MONTINIO. Flo-
ret Julio, Augusto.

Radix fusiformis, crassa, longa, perpendicularis, aut obliqua, rubide-fusca, squamisque rubido-fuscis superne tecta, fibris lateralibus destituta, ex apice emittens caules, et unum, rarius duos stolones. Caules nunc solitarii, nunc duo-tres, teretes, erecti, vel decumbenti-ascendentes, flexuosi, uniflori, subpalmares, subinde rubentes. Flagella subsolitaria, teretia,

prostrata, vel ascendentia, remote foliosa, non radicans, nec florifera, caule, et foliis radicalibus plerumque multo longiora, sæpe rubescentia. Eorum folia similia caulinis. Folia radicalia pinnata cum impari, multijuga, foliolis approximatis, subuniformibus, subrotundis, profunde inciso-dentatis, dentibus acutis, impari quidquam latiore, tri-quinquefido, basi cordato, vel cuneato, reliquis descendendo paulo minoribus, ramentulis exiguis, integerrimis sæpe interjectis. Petioli inferne brevi tractu nudi, basi insigniter dilatati. Folia caulina pauca, remota, parva, simplicia, trisecta, laciniis integris, vel impari trifida, lateralibus bifidis, aut indivisis, brevissime petiolata, vel sessilia. Ad eorum basim utrinque stipula parva, ovato-lanceolata, acuta, integra, aut dente laterali insculpta. Omnia folia saturate viridia. Flos solitarius, terminalis, grandis, erectus, brevissime pedunculatus, pedunculo apice incrassato, et dense villosus. Calyx virens, interdum atrorubens, patens, laciniis internis lanceolatis, aut ovato-lanceolatis, acuminatis, integris, externis linearibus, vel lanceolato-linearibus, plerumque bifidis, rarius integris, circiter dimidio brevioribus. Corolla luteo-aurea, siccando luteo-pallens, calyce longior, vel æqualis. Petala oblonga, obcordata, non tam lata ac in præcedente. Stylus terminalis. Nucula hirsuta, terminata caudis tenuibus, elongatis, sed minus quam in *Geo montano* L., enodibus, scabris, plumosis, vix apice nudis, erecto-patulis, sæpe flexuosis, subinde rubescentibus. Tota planta nunc hirsuta, nunc parce pilosa, et ferè denudata præsertim in foliis. Hæc species quoque ludit petalis multiplicatis, et laciniis calycinis externis subquadrifidis.

DRYAS.

Lin. Gen. p. 256. Juss. Gen. p. 338. Lamck. Ill. 5. t. 443. Vent. Tabl. 3. p. 349. Gærtn. De fruct. 1. p. 352. t. 74. Smith. Engl. Fl. 2. p. 431. De Cand. Prodr. 2. p. 549. Nest. Pot. p. 16. Endl. Gen. p. 1247. n. 6389.

Caryophyllata Tourn. Inst. 2. tab. 151. fig. B. E. I K. Calyx perianthium monophyllum, liberum, persistens, patens, octofidum, laciniis æqualibus,

uniseriatis. Petala octo, oræ receptaculi discoidei affixa, alternantia cum laciniis calycinis, oblongo-obovata, calyce longiora, subintegra. Stamina numerosa, corolla breviora, sita in ambitu receptaculi prope petala, filamentis subulatis, antheris parvis, subrotundo-didymis, bilocularibus, incumbentibus. Ovaria plura, exigua, stilo producto ex apice lateris interni, in fructu elongato, stigmate simplici, obtuso. Receptaculum depressum exsuccum, foveolatum, villosum. Nuculæ semiobovatae, sericeae, latere dorsali convexo, latere interno recto, apice producto in caudam elongatam, enodem, rectam, plumosam.

Habitus. Plantæ suffruticosæ, caule prostrato, ramoso. Folia simplicia, petiolata, dentata, vel integra. Petioli basi stipulati. Pedunculi solitarii, terminales, uniflori. Corolla alba. Fructus coma plumosa, erecto-patula. Calyx ludit novem-decemfidus, corolla novem-decempetala.

Ord. nat. Ut in *Rubo* p. 217.

1. *DRYAS octopetala*: foliis ellipticis, pectinato-serratis, subtus tomentosis.

D. octopetala *Sp. pl.* p. 717. *Smith. Engl. Fl.* 2. p. 432., et *Engl. bot.* v. 7. tab. 451. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 253.* *Fl. Dan.* t. 31. *Sv. bot.* v. 6. t. 427. *All. Ped.* 2. p. 169. n. 1916. *Re Seg.* p. 44. *Biol. Acon.* 1. p. 177. *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 304. n. 1. *Comoll. Prodr.* p. 101. *Pollin. Ver.* 2. p. 153. *Suffr. Foroj.* p. 148. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 281.* *Brocc. Oss. in Bibl. Ital.* tom. 29. p. 81. *Vitm. Sagg.* p. 16., et 46. *Viv. Ann. bot.* 1. part. 2. p. 172. *Bert. Aman. Ital.* p. 372. n. 160. *Sav. Bot. Etr.* 2. p. 115. *Sang. Cent.* p. 74. *Ten. Nap.* 4. p. 301., et *Syll.* p. 253. n. 1. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 473., et *Prodr.* 2. p. 549. n. 1. *Wahlenb. Lap.* p. 249. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 20. heft. *Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl.* 3. p. 555. *Koch. Syn.* p. 209. *Reich. Exc.* 3. p. 599. n. 3882. *Host. Austr.* 2. p. 20. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 366. *Gaud. Helv.* 3. p. 416.

D. n. 1133. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 54.

Cariofilluta montana di Carlo Clusio *Pon. Mon. Bald.* p. 209.

Chamædryas alpina Cisti flore *Tit. It. in calc. Hort. Maur.* p. 20. non num.

Caryophyllata alpina, *Chamedrys folio Zannich. Opusc. posth. p. 44., et 58.*

Dryas Segui. Ver. 1. p. 512.

Chamedrys III. sive montana *Clus. Hist. pl. lib. 3. p. 351. fig.*

Ital. Camedrio alpino. Camedrio cervino.

Perenn. Legi in Tambura suprema alpium Apuanarum, ubi copiosa. Filins attulit ex valle Catino retro verticem *Sagro*, et ex *Pisanino* earundem alpium. Habui ex Genisio a Prof. BALDISIO, et a BONJEANNIO, ex editis montium supra *Finero* vallis *Veggezzo* in provincia Novariensi a Prof. DE NOTARIS, ex *Speluga* in Rhætis a Rev. ODESCALCHIO, ex *Braulio* in *Valtellina* a BERGAMASCHIO, ex monte *Codeno* ad Larium a RAINERO, ex monte *Vezagno*, et sub *Guglielmo* in provincia Brixiensi a ZANTEDESCHIO, ex Baldo a BARBIERIO, et præsertim in culmine di *Coval santo*, et *Costa bella* a MANGANOTTO, ex Tyroli Italico in alpinis di *Fiemme*, et *Fassa* a FACCHINIO, ab Eq. PAROLINIO, et a RAINERO, ex *Portole* Vicetinarum, ex *Grappa Bassanensis*, et ex *Vette di Feltre* a MONTINIO, ex alpinis Forojuliensibus a Prof. BRIGNOLIO, ex Piceno in *Vettore* a Prof. OCTAVIANO, et a MARZIALETTO, in montibus della *Sibilla alla Corona* ab eodem MARZIALETTO, ex Præstutiis in monte Cornu al *Morgone* ab OSIMO, denuo in monte Cornu, et in monte *Costone* ab Eq. GUSSONIO. Floret Junio, Julio.

Radix lignosa, crassa, fusiformis, extus rubida, fibris lateralibus ramulosis. Caules suffruticosi, valde ramosi, subdichotomi, prostrati, inferne sæpe radículas agentes, foliosi, cortice fusco facile secedente tecti, palmares-dodrantales. Folia parva, crebra, petiolata, alterna, elliptica, vel oblonga, obtusa, rarius acuta, basi rotundata, vel subcordata, pectinato-serrata, et sæpe profunde, margine subrevoluta, supra saturate viridia, glabra, subtus niveo-tomentosa, nervo sæpe rubello dirempta, venis parallelis, prominentibus, numerosis. Petioli longiusculi, pilosi, basi utrinque aucti stipula lineari-subulata, adnata, pilosa. Pedunculi solitarii, terminales, erecti, uniflori, albo-tomentosi, insuper setis apice glanduliferis superne hirti, modo brevissimi, subnulli, modo pollicares-tripollicares, basi una, alterave bractea lineari, villosa adpersi, reliqua parte nudi. Calyx octofidus, insu novemfidus, hirtus setis purpurantibus, apice glanduliferis, laciniis

subæqualibus, lanceolato-linearibus, acutiusculis, margine albo-villosis, dorso inter setas pubescentibus. Corolla alba, calyce etiam duplo longior. Petala octo, lusu novem, oblongo-obovata, obtusa, integra, vel subserrata, rarius emarginata. Stamina inflexa. Antheræ didymæ. Ovaria numerosa, sericeo-villosa. Stilus productus ex apice lateris interni ovarii, intortus, villosus, in fructu elongatus. Stigma simplex. Receptaculum fructus depressum, exsuccum, foveolatum, dense villosum. Nuculæ villosæ, caudatæ, cauda longissima, enodi, erecta, flexuosa, tota dense plumosa, vix apice nuda. Fructus cum caudis simul sumptis sistit comam erecto-patulam, non inelegantem.

COMARUM.

Lin. Gen. p. 257. Juss. Gen. p. 338. Lamck. Ill. 5. t. 444. Vent. Tabl. 3. p. 347. Gartn. De fruct. 1. p. 349. t. 73. Smith. Engl. Fl. 2. p. 433. Endl. Gen. p. 1242. n. 6362.

Potentillæ species *Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 357. Nestl. Pot. p. 17. De Cand. Prodr. 2. p. 571.*

Calyx perianthium monophyllum, liberum, persistens, coloratum, decemfidum, laciniis alternis externis, minoribus. Petala quinque, lanceolata, acuta, aut acuminata, calyce multo breviora, affixa oræ receptaculi discoidei contra lacinias minores calycis. Stamina numerosa, longitudine corollæ, orta ex ambitu receptaculi prope petala, filamentis crassis, subulatis, antheris lunulatis, bilocularibus, incumbenibus. Ovaria exigua, numerosa, in capitulum collecta. Stilus lateralis, crassiusculus, glaber. Stigma simplex. Receptaculum fructus grande, globosum, spongiosum, persistens, non succosum, nec edule, breviter villosum, dense tectum nuculis parvis, ovatis, compressis, glabris, stilo persistente, immutato instructis.

Habitus. Planta palustris. Radix repens, verticillata. Caulis decumbens, adscendens. Folia inferiora impari-pinnata, longe petiolata, superiora

ternata, breviter petiolata, aut sessilia, orta ex sinu stipulae bifidae. Panicula pauciflora, subcorymbosa. Calyx, corolla, stamina, et stili atrorubentes.

Ord. nat. Ut in *Rubo* p. 217.

1. *COMARUM palustre*.

C. palustre Sp. pl. p. 718. Smith. Engl. Fl. 2. p. 433., et Engl. bot. v. 3. t. 172. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 250. Fl. Dan. t. 636. Sv. bot. v. 5. t. 310. Lamck. Ill. 5. t. 444. All. Ped. 2. p. 60. n. 1493. Re Seg. p. 44. Comoll. Prodr. p. 101. Pollin. Ver. 2. p. 167. Suffr. Foroj. p. 147. De Cand. Franc. 4. par. 2. p. 469. Hoffm. Fl. d'Allem. ann. 1791. p. 182. tab. 7. Röhl. cum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 3. p. 514. Koch. Syn. p. 212. Reich. Exc. 3. p. 596. n. 3865. Hort. Austr. 2. p. 45. Gaud. Helv. 3. p. 409.

Potentilla palustris Lehm. Pot. p. 52. n. 13. & Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 159. Coll. Herb. Ped. 2. p. 315. n. 12.

P. Comarum Nestl. Pot. p. 36. n. 15. & De Cand. Prodr. 2. p. 583. n. 80.

P. rubra Hall. fil. in Mus. Helv. 1. p. 56.

Fragaria n. 1128. & Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 51.

Quinquesfolium palustre Camer. Epit. p. 762. fig.

Ital. Cinquesfoglio d'acqua. Cinquesfoglio di padule Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 76.

Perenn. Habui ex Cenisio a Prof. BALBISIO, et a BONJEANNIO, ex Insubria ad lacum di Montorfano a RAJNERO, ex Tyroli Italico in alpinibus di Fiemme a PARENREGGIO, et inter Fiemme, et Tridentum ad lacus di Pinè a FACCHINIO, et ad lacum delle Buse in valle di Cadin di Fiemme a MONTINIO. Floret ab Junio in Septembrem secundum loca.

Radix longa, repens, rubescens, nodosa, et ad nodos instructa fibris verticillatis, tenuibus, ramulosis. Caulia decumbens, vel ascendens, simplex, rubens, inferne glaber, superne pubescens, palmaris-pedalis, vix ultra. Folia impari-pinnata, pinnis approximatis, duabus-tribus, inferiora longo petiolata, successiva brevius, suprema ternata, et saepe sessilia. Foliola oblongo-lanceolata, argute equaliter serrata, supra late viridia, et subinde rubentia, subtus glauca, ntrinque glabra, aut pilis raris adspersa. Folia subinde ludunt pedato-quinata. Petioli supra canaliculati, in foliis inferioribus longo tractu dilatati ex stipulis totis adnatis,

basi amplexicaules, in foliis superioribus producti e sinu stipulæ bifidæ, segmentis latis, acutis, integerrimis. Flores pauci, subcorymbosi, siti in supremo caule. Folia floralia ternata, aut simplicia, subsessilia inter segmenta stipulæ. Pedunculi breves, pubescentes, nudi, aut una, alterave bracteola exigua, lanceolata, acuta instructi, sæpe rubescentes. Calyx grãdis, plus minus pubescens, laciniis internis ovato-lanceolatis, externis linearibus, et multo brevioribus, utrisque acuminatis. Color calycis interni, corollæ, staminum, et stilorum atosanguineus. Nuculæ glabræ, fulvæ, aut purpureæ. Reliqua generis.

CLASSIS XIII. POLYANDRIA.

ORDO I. MONOGYNIA.

CAPPARIS.

Lin. Gen. p. 261. Juss. Gen. p. 243. Vent. Tabl. 3. p. 120. (ab omnibus excl. Breynia). Tourn. Inst. 2. tab. 139. Lamck. Ill. 5. tab. 446. Smith. Gramm. tab. 2. fig. 20. De Cand. Prodr. 1. p. 245. Endl. Gen. p. 893. n. 300. (ab utroque exclusis plantis fructu capsulari).

Calyx perianthium tetraphyllum, liberum, deciduum, foliolis concavis. Petala quatuor, grandia. Stamina numerosa, elongata, affixa thoro receptaculari parvo, convexo, decidua, filamentis filiformibus, antheris oblongis, bilocularibus, incumbentibus, versatilibus. Thecaphorum e medio thori, filiforme, longum. Ovarium ovoideum, in apice thecaphori. Stilus nullus. Stigma simplex, acutum. Bacca unilocularis, oblonga, pyriformis, aut cylindracea, polyspermia, seminibus parieti corticoso undique affixis, intra pulviam nidulantibus, suffulta thecaphoro post nuptias magis adhuc elongato.

Habitus. Plantæ perennes, suffruticosæ, aut fruticossæ. Folia simplicia, alterna, petiolata, petiolis basi

auctis aculeis stipularibus duobus aduncis, vel rectis, subinde abortivis, vel citissime deciduis. Flores solitarii axillares, aut terminales corymbosi. Corolla speciosa, alba, albo-rosea, vel pallens. Stamina filamentis sæpe apice coloratis.

Observ. Ad hoc genus referendæ solæ *Capparides* baccam habentes; reliquæ, quæ donantur fructu capsulari, pertinent ad nostrum genus *Uterveria* dictum. Vide Bert. Hort. bot. Bonon. pl. nov. vel min. cogn. fasc. 2. p. 7., ubi corrigendus error de stilo, et stigmate, quo deleta, substituitur: Thecaphorum filiforme, longum, crassiusculum, apice gerens ovarium cylindraceum. Stilus nullus. Stigma obtusum.

Ord. nat. Putaminæ *Lin. Ord. nat. n. XXV., et Præl. p. 376.* *Capparides Juss. Gen. p. 242. Smith. Gramm. p. 140.* *Capparidées Juss. in Annal. du Mus. d'hist. nat. tom. 18. p. 474.* *Capparidæ Vent. Tabl. 3. p. 118. De Cand. Prodr. 1. p. 237. Rich. Fam. in Él. éd. 5. p. 188. R. Brown. in Denh. and Clapp. trav. p. 220. Bartl. Ord. nat. p. 265. Schultz. Nat. syst. p. 449.*

1. *CAPPARIS spinosa*: foliis subrotundis, obtusis; aculeis stipularibus geminis, aduncis, basi incrassatis, persistentibus; baccis ovato-oblongis.

C. spinosa Sp. pl. p. 720. in herb. Banksii. Deest in herb. Linnæi ex Guss. *Smith. Spicil. p. 18. tab. 20. Lamck. III. 5. tab. 446. Nouv. Duñ. 1. p. 137. t. 34.* male aculeis stipularibus solitariis. *Bert. Pl. Gen. p. 67., et Amæn. Ital. p. 155. n. 145. excl. syn. Savii. Ten. Nap. 4. p. 301., et Syll. p. 253. n. 2. Ab Ucr. Hort. Pan. p. 218. Guss. Fl. Sic. prodr. 2. p. 3.**, et *Sup. 2. p. 171.* Desf. Atl. 1. p. 403. De Cand. Franc. 4. par. 2. p. 724.*

Capparidis aliud genus spinosis ramis *Casalp. De pl. lib. 15. cap. 6. p. 568.*

Cappar retuso folio *Lobel. Ic. p. 635.* male aculeis solitariis; cæterum figura bona.

C. spinosa fructu minore, folio rotundo *Segui. Fer. 1. p. 408. n. 2.*

Ital. Cappar. Cappero. Cappero de' muri Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 44.

Offic. Capparidis (radicis) cortex Linn. Mat. med. p. 91. n. 259.

Perenn. Legi in Luna portu, et Genus in muro oppidi ad mare. Habui ex *Cesenatico* in fissuris rupium montis *Giagiolo* a *BARBIERIO*, ex *Æoliis* in insulis *Strongyle*, et *Didyme* ab *Eq. Guasorio*. Floret a Majo in autumnum.

Radix ramosa. Caules a radice plurimi, cæspitiosi, externi ascendentes, interni erecti, teretes, simplices, subflexuosi, albentes, sesqui-bipedales, et etiam quidquam ultra. Folia alterna, petiolata, subrotunda, vel ovato-subrotunda, crassiuscula, obtusa, quandoque emarginata, mucronulo brevissimo, vix visibili, crassiusculo, conico, recto terminata, integerrima, viridi-glaucescentia, sæpe basi paululum angustata, subtus nervo dirempta; venisque parallelis, remotis, tenuibus instructa. Petioli teretes, supra planiusculi, duas-quatuor lineas longi. Ad eorum basim aculei geminati, recurvi, basi conico-incrassati, flavescentes. Pedunculi solitarii, axillares, uniflori, crassiusculi, nudi, plerumque folio subæquales, sed ludunt breviores, vel paulo longiores. Alabastrum globosum. Flos grandis, speciosus. Calycis foliola ovata, vel ovato-oblonga, obtusa, quandoque subciliata, uno longiore. Petala obovata, alba, integra, calyce multo longiora, duo basi connata convoluta a foliolo calycino longiore. Stamina valde numerosa, corollam æquantia, aut superantia, filamentis albis, superne e roseo purpurantibus, antheris saturate purpureis. Thecaphorum staminibus demum longius. Bacca ovata, aut ovato-oblonga, acuta, basi angustata. Tota planta glabra.

Usus. Ex quinque radicibus aperientibus ob vim diureticam.

2. *CAPPARIS rupestris*: foliis subrotundis, obtusis; caule adulto inermi; aculeis stipularibus tenuibus, brevissimis, tectis, citissime diffusis; baccis elongatis, cylindraceis.

C. rupestris *Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr.* 1. p. 355., et *Fl. Græc.* 5. p. 71. t. 487. *Ten. Nap.* 4. p. 302., et *Syll.* p. 253. n. 1. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 3.,* et *Sup.* 2. p. 171.* *De Cand. Prodr.* 1. p. 245. n. 3. *Reich. Exc.* 3. p. 703. n. 4488., et *1c. Fl. Germ. et Helv.* v. 3. p. 3. *Cappar.* t. 19. f. 4488.

C. spinosa inermis *Coll. Herb. Ped.* 2. p. 233. sub n. 1. *Pollin. Ver.* 2. p. 177. pl. inerm. *Sav. Pis.* 2. p. 2., et *Bot. Etr.* 4. p. 116. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 175.* apud omnes correcta synonymia,

- C. spinosa* β Koch. *Syn.* p. 79.
C. peduncularis Presl. *Del. Prag.* p. 20., et *Fl. Sic.* 1. p. 111.
C. orientalis Nouv. Duh. 1. p. 142.
C. italica Cæsalp. *De pl. lib.* 15. cap. 6. p. 568.
C. non spinosa Bellonij, fructu majore *Cup. Sup. alt.* p. 14.
C. non spinosa fructu majore Tourn. *Inst.* 1. p. 261. *Segui.*
Ver. 1. p. 408. n. 1. *Hort. Rom.* 5. tab. 8.
C. non spinosa Castell. *Hort. Mess.* p. 5.
Ital. Capperio maggiore. Capperio senza spine.

Perenn. Suffrut. Frequentior cæteris in Italia. Legi Lucæ in muro oppidi. Habui ex Vernazza nelle Cinque terre in Liguria orientali a GUIDONIO, Veronâ in muro oppidi a MANGANOTTO, ex arce di Monselios in districtu Patavino a MONTINIO, ex muris, et rupibus sub arce Duini a TOMMASINIO, ex arce Ravennæ a DALLAGATA, ex arce Luci in Æmia a BUBANIO, Florentiâ in muro oppidi a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTO, ex districtu di Chianti in muris di Prolio, et Cacchiano ab Eq. RICCASOLO, Viterbio a CAMILLIO, ex ditione Aretina a Montaroni a MASQUILLIERIO, Româ ubi vulgaris in rupibus, et muris a Prof. MAURIO, Terracinâ a FIORINIA-MAZZANTIA, ex Gargano a GASPARRINIO, ex Sicilia ab Eq. GUSSONIO, ex Sardinia ab Eq. Prof. MONTISIO. Floret a Majo in autumnum.

Præcedente paulo grandior omnibus partibus, et viridior, sive minus glauca. Caules passim cæspitosi, ut in illa; rarius caulis solitarius, crassus, brevis, perennans, dense ramosus, et cæspitem simulans. Folia vel omnia subrotunda, integerrima, obtusa, aut emarginata, mucronata, vel mucronulo brevissimo, conico, recto terminata, sæpe basi subcordata, aut superiora ovata, acutiuscula, et quandoque etiam acuta. Petioli teretes, tres-quatuor lineas longi, passim basi inermes ab aculeis stipularibus abortivis, aut cito diffusis, subinde tamen hi occurrunt in foliis supremis, suntque geminati, tennes, subulati, brevissimi, recti, erecti, vel patuli, flavescentes. Pedunculi plerumque folio longiores, nec tamen semper. Alabastrum duplo grandius. Foliola calycina sæpe margine, et apice rubentia. Bacca duplo longior, pollicaris, cylindracea, basi et apice angustata, acuta. Tota planta glabra.

Preslius l. c. exacte indicavit aculeos stipulares hujus speciei, quos quidem ego quoque observavi. *Capparis* Camer. *Epit.* p. 375., et *Capparis non spinosa* J. Bauh. *Hist. pl.* 2.

lib. 14. p. 63. potius ad *Capparidem rupestrem*, quam ad *Capparidem spinosam* L. mihi pertinere videntur, cum figura ab eisdem auctoribus data caules inermes exhibeant. Idem juvat aspicari de figura Matthioli sub nomine *Capparo* Disc. ed. Valgr. 1585. tom. 1. p. 640.; sed in hac plura sunt prorsus fictitia, veluti aculei sparsi in caule, nec siti in basi foliorum, folia sessilia, et fructus pyriformis; quare hæc figura a prolationibus excludenda. Fere omnes auctores nostri una specie comprehenderunt *Capparidem spinosam* L., et *Capparidem rupestrem*; hinc eorum synonyma ad neutram seorsim sumptam faciunt.

3. *CAPPARIS sicula*: pubescens; foliis ovatis, acutis, ellipticisve, utrisque aculeolo incurvo terminatis; aculeis stipularibus geminis, aduncis, basi dilatatis, persistentibus; bacca pyriforimi.

C. sicula Nouv. Duh. 1. p. 159. Guss. Sup. 2. p. 171.* Ten. Nap. 4. p. 302.

C. ovata Guss. Pl. rar. p. 210.* excl. syn. præter Boccon., et Cupan., et Fl. Sic. prodr. 2. p. 4.* Ten. Syll. p. 253. n. 3. A. excl. syn. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 11. excl. nonnull. syn. Koch. Syn. p. 79. excl. syn. Desf., et De Cand. ...

C. Fontanesii Presl. Fl. Sic. 1. p. 111. non De Cand.

C. spinosa Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 355. α. β., et Fl. Græc. 5. p. 70. α. β. tab. 486. excl. plurib. syn. Reich. Exc. 3. p. 703. n. 4487., et Ic. Fl. Germ. et Helv. v. 3. p. 3. Cappar. t. 19. f. 4487.

C. sicula, duplicata spina, folio acuto Bocc. Sic. p. 79.

C. duplicata spina, folio acuto Bocc. Ibid. p. 78. tab. 42. fig. 111. 111c.

C. duplicata spina, folio acuminato Cup. Hort. Cath. p. 36.

C. spinosa Castell. Hort. Mess. p. 5.

C. folio acuto Lob. Ic. 634. male aculeis solitariis, cæterum fig. bona.

Ital. *Cappero di Sicilia*.

Perenn. Frut. Habui ex oris Larii in muris vetustis a Villa d'Este, ubi probabiliter culturâ introducta, a RAINKNO, ex litore di Pescara ab Onasio, ex Apulia a GASPARRINIO, ex Calabria a Bove, et ex argillosis maritimis Siciliæ ab Eq. GUSSONIO. Floret ab Aprili in Augustum.

Caules nunc pereunt hyeme, nunc persistunt; ludunt simplicibus, vel ramosi. Cæterum sunt magis flexuosi,

inferne pilosi, superne pubescentes. Folia quam in præcedente multo minora, ovata, acuta, vel elliptica, sive etiam apice rotundata, utraque terminata aculeolo conico, crassiusculo, incurvo, flavicante, integerrima, pilosa, et juniora pubescentia, nervo, et venis magis prominentibus subtus instructa. Petioli pubescentes, supra canaliculati. Ad eorum basim aculei stipulares gemini, adunci, basi incrassati, et compresso-teretes, apice exquisite attenuati, et valde pungentes, persistentes, flavidi, quorum qui supremi subinde fere recta patent. Pedunculi passim folio longiores, supremis exceptis, qui etiam breviores interdum occurrunt, plus minus pubescentes. Calycis foliola oblonga, puberula, præcipue in basi, et margine, nunc tota viridia, nunc apice rubentia. Petala obcordata, ciliata, extus pilosa, et, quæ foliolum calycinum majus amplectitur, extus dense pubescentia. Filamenta apice rosea. Bacca minor, pyriformis. Reliqua ut in præcedentibus.

Capparis ovata Desf. Atl. 1. p. 404. excl. syn. juxta exemplar autopticum, quod vidi apud Eq. Gussonium differt a *Capparide sicula* foliis subcordato-ovatis, pollicem, et æquipollicem longis, longiusque petiolatis, aculeis stipularibus setaceis, rectis. *Capparis egyptiaca* Délil. Descr. de l'Égypt. éd. 2. tom. 19. p. 294. tab. 31. fig. 3., cujus exemplar e Raddianis in Egypto lectis possideo, habet folia exigua, subrotunda, apice integra, vel emarginata, semper in medio acutata mucrone insigni, recto, aculeos stipulares validiores, pedunculos breves, folio subæquales, flores minores, petala obovata, baccam oblongam, utrinque angustatam. Hæc magis appropinquat *Capparidem spinosam* L., a qua tamen recedit caule fruticoso, foliis multo minoribus, apice quidem rotundatis, sed in medio apicis acutato-mucronatis, flore dimidio minore, brevius pedunculato.

Usus. Tres hic descriptæ *Capparidis* species suppeditant alabastra, quæ aceto, et sale condita præstant ad usum culinæ pro obsouitiis grate acidulis. In Italia præferuntur alabastra *Capparidis rupestris*, in Sicilia alabastra *Capparidis sicula*.

ACTÆA.

Lin. Gen. p. 201. Juss. Gen. p. 235. Lamck. Ill. 5. t. 448. Vent. Tabl. 3. p. 66. Gærtn. De fruct. 2. Flor. Ital. T. V.

p. 154. *t.* 114. *Smith. Engl. Fl.* 3. *p.* 3., *et Gramm. tab.* 17. *fig.* 217. *De Cand. Syst. nat.* 1. *p.* 131. *Endl. Gen.* *p.* 850. *n.* 4799.

Calyx perianthium tetraphyllum, liberum, caducum. *Petala* (*nectaria* Endl.) quatuor, parva, longitudine calycis, spathulata, triplinervia, decidua. *Stamina* numerosa, orta e thoro parvo, convexo, paulatim corolla longiora, decidua, filamentis filiformibus, apice incrassatis, antheris ovatis, erectis, bilocularibus, loculo quovis utrinque adnato apici filamenti. *Ovarium* basi angustato-substipitatum, ovoideum, apice arcuatum. *Stilus* nullus. *Stigma* oblongum, horizontali-obliquum, supra canaliculatum, papillosum. *Bacca* ovoidea, succosa, lateraliter unisulcata, unilocularis, polyspermia, stigmate persistente coronata, maturitate nigra, succo sanguineo. *Semina* semiorbiculata, faciebus planis in series duas longitudinales superimposita, lateri sulcato baccae affixa, lævia.

Habitus. Rhizoma carnosum, repens, gemmiferum. *Folia* bi-tripinnata, inferiora longe petiolata, caulina pauca, foliolis ovatis, inciso-serratis. *Flores* parvi, racemosi, albi. *Baccae* nigrae, vel rubrae.

Ord. nat. Multisiliquæ *Linn. Ord. nat. n. XXV.*, *et Præl. p.* 376. *Ranunculaceæ Juss. Gen. p.* 231. *Smith. Gramm. p.* 136. *Vent. Tabl.* 3. *p.* 52. *Rich. Famill. in Élé. éd.* 5. *p.* 155. *Ranunculaceæ spuria De Cand. Syst. nat.* 1. *p.* 131. *Pæoniaceæ Bartl. Ord. nat. p.* 251. *Papaveraceæ Schultz. Nat. syst. p.* 452.

1. *ACTÆA spicata*: foliis subtripinnatis, foliolis ovatis, inciso-serratis; racemo densifloro; staminibus post anthesim corolla longioribus.

A. spicata Sp. pl. p. 722. *Smith. Engl. Fl.* 3. *p.* 3., *et Engl. bot. v.* 13. *tab.* 918. *De Cand. Syst. nat.* 1. *p.* 384., *et Franç. 4. par. 2. p.* 920., *et Prodr.* 1. *p.* 65. *n.* 8. *Bull. Pl. ven. tab.* 83. *Lamck. Ill.* 5. *tab.* 448. *fig.* 1. *Fl. Dan. t.* 498. *Sv. bot. v.* 5. *t.* 291. *All. Ped.* 1. *p.* 294. *n.* 1070. *Balb. Taur. p.* 85. *Re Seg. p.* 44., *et Tor.* 1. *p.* 275. *Biol. Acon.* 1. *p.* 178. *Coll. Herb. Ped.* 1. *p.* 71. *n.* 1. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. *p.* 246., *et* 388. *Comoll. Prodr. p.* 102. *Pollin.*

- Ver.* 2. p. 178. *Jan. El.* p. 8. n. 1.* *Suffr. Foroj.* p. 148.
Orsin. in Cap. Opusc. p. 278.* *Bert. fl. It. in Apenn.*
Bon. p. 20. Sav. Bot. Etr.* 2. p. 117. *Sang. Cent.* p. 74.
Ten. Nap. 4. p. 302., et *Syll.* p. 254. n. 1. *Sturm. Deuts.*
Fl. 1. abth. 21. heft. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 12.
Koch. Syn. p. 25. *Reich. Exc.* 3. p. 751. n. 4739., et *Id.*
Fl. Germ. et Helv. v. 3. p. 28. *Ranunc.* t. 121. f. 4739.
Host. Austr. 2. p. 47. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 368.
Gaud. Helv. 3. p. 424.
A. n. 1076: *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 24.
 Quædam planta in alpihus, quam quidam Barbam Ca-
 pri appellant *Casalp. De pl. lib.* 5. cap. 25. p. 217.
 Napello racemoso del Dodoneo *Pon. Mont. Bald.* p. 236.
 Christophoriana *Zannich. Opusc. posth.* p. 44.
 Aconitum racemosum, seu Christophoriana Clusii *Zan-
 nich. l. c.* p. 60.
A. racemosum; an *Actæa* Plinii, et *Costus niger* quo-
 rundam *Zannich. l. c.* p. 72.
 Christophoriana vulgaris nostras racemosa et ramosa *Mich.*
Cat. hort. Flor. p. 26., et in *app.* p. 128.
Ch. vulgaris, bacca nigra, folio ex viridi candicante
Agost. De re bot. p. 89.
Ch. vulgaris racemosa et ramosa Segui. Ver. 1. p. 409.
Ch. Clus. Hist. pl. lib. v. p. LXXXV. lig.
Ital. Barba di capra Targ. Tozz. *Diz. bot.* 2. p. 5. *Napel-
 lo racemoso* Pon. l. c.
Perenn. Legi in Apennino Florentino in cacumine mon-
 tis Beni inter Pietramala, et il Covigliaio. Filius at-
 tulit ex Apennino Bononiensi in sylva dell' Acero, et
 in monte Barba bianca prope Castiglione de' Pepoli,
 unde accepi quoque a MATTHEO. Habui ex Apennino
 Ligurizæ orientalis ad S. Stephanum d' Aveto a TURIO,
 ex sylvis umbrosis Genisii a BONJEANNIO, ex Corni di
 Canzo ad Larium a RAINERO, ex valle Taleggio in di-
 strictu Bergomensi a BERGAMASCHIO, ex sylvis fagineis
 Baldi circa vallem Artillona a MANGANOTTO, ex eo-
 dem monte a Prof. JANIO, et a BARBIERIO, ex Tyroli
 Italico in sylvis di Fiemme, et Fassa a FACCHINIO,
 iterum ex Fassa a RAINERO, ex districtu Bassanensi
 in sylvis di Vallerana ab Eq. PAROLINIO, et a MONTINIO,
 ex sylvis umbrosis Tergestinis a BRASOLETTO, et in Carso
 in valle Braga a TOMMASINO, ex Apennino di Ser-
 nano ab Eq. NARDUCCIO, ex districtu Camerinensi in
 monte Regnola a Prof. OCTAVIANO, ex eodem monte
 alla Mucchia di Trocca, et ex sylvis fagineis in monte

di Capo di Tenna a MARZIALETTO, ex *Vettore* ab On-
sino, ex Ducatu Lucensi in sylvis *di Benabbio* a Prof.
PUCCINELLIO, ex plebe S. Stephani in provincia Aretina in fagetis prope *Alfero* ab AMIDEO. Floret a Majo in Julium.

Rhizoma carnosum, tyllindraceum, non valde crassum, repens, modo simplex, modo ramosum, ramis subfasciculatis, adpersum gemmis ovoideis, alternis, obductis squamis rubido-fuscis. Caulis erectus, angulatus, striatus, interdum ad folia refractus, inferne longo tractu nudus, parce foliosus, simplex, vel ramo oppositifolio instructus, a spithama ad duos pedes longus. Folia bi-tripinnata, decompositione ternata, foliolis ovatis, aut ovato-oblongis, magnitudinis variz, acutis, aut acuminatis, argute, et inæqualiter inciso-serratis, supra saturate viridibus, subtus pallidioribus, impari sæpe trifido, basi cuneato, lateralibus plus minus oblique subcordatis, unicum radicale, longissime petiolatum, petiolo basi dilatato, amplexicauli, caulina pauca, vel etiam solitaria, brevius petiolata; ubi plura, suprema multo minora, sessilia, vel subsessilia, simpliciter pinnata, aut ternata. Racemus terminalis, subinde cum racemo axillari, vel laterali oppositifolio, plus minus longe pedunculatus, simplex, aut inferne ramo auctus, parvus, in anthesi densiflorus, ovatus, in fructu laxatus, cylindraceus, et patens. Pedunculi, et pedicelli sæpe pubescentes. Sub quovis pedicello bractea lanceolata, vel lanceolato-linearis, canaliculata, decidua. Interdum sub ramo racemi, vel sub pedicellis inferioribus folium parvum, ternatum loco bractæ. Calycis foliola subrotunda, vel oblonga, obtusa, concava, nunc omnia margine late albo-membranacea, dorso pallide virentia, nunc externa duo tota pallide virentia, interna alba. Petala alba, parva, spathulata, obiter emarginata, triplinervia, nervis immersis, lateralibus subinde ramulosis. Stamina alba, in anthesi corollæ æqualia, postea elongata, et etiam duplo longiora. Herba glabra.

Planta acris, suspecta. Linnæus non ex hac, sed ex planta Americana, quæ est *Actæa spicata* Michx., desumpsit radicem officinalem. Vide Lin. Mat. med. p. 89. n. 253.

CHELIDONIUM .

Lin. Gen. p. 262. (excl. Glaucio). Tourn. Inst. 2. t. 116.
Juss. Gen. p. 236. Lamck. Ill. 5. tab. 450. fig. 1.

- (excl. fig. 2.) *Vent. Tabl. 3. p. 92. Cærtn. De fruct. p. 164. t. 115. Smith. Engl. Fl. 3. p. 4. De Cand. Syst. nat. 2. p. 98. Endl. Gen. p. 855. n. 4819.*
 Calyx perianthium liberum, diphyllum, foliolis ovatis, concavis, caducis. Petala quatuor, obovata, calyce longiora, decidua. Stamina plura, orta e thoro exiguo, convexo, corollæ æqualia, decidua, filamentis filiformibus, antheris linearibus, bilocularibus, erectis, loculis longitudinaliter dehiscentibus, connectivo diremptis. Ovarium sessile, cylindraceum, apice attenuatum, stiliforme. Stigma capitatum, bilobum, obtusum, persistens. Capsula siliquæformis, subcylindrica, torulosa, rostro stiliformi, brevi terminata, unilocularis, bivalvis. Semina parva, subreniformia, punctata, supra hilum strophiolâ cristata, biseriata, inter se alterna, utrinque affixa tæniolâ placentari, lineari, applicitæ contra suturas capsulæ.
Habitus. Radix perennis. Herba tenera, intus succo croceo turgens. Folia impari-pinnata, subirregularia. Flores umbellati, lutei.
Ord. nat. Rhoeadeæ *Lin. Ord. nat. n. XXVII., et Præl. p. 283. Papaveraceæ Juss. Gen. p. 235. Smith. Gramm. p. 137. Vent. Tabl. 3. p. 88. De Cand. Syst. nat. 2. p. 67. Rich. Fam. in Él. éd. 5. p. 185. Bartl. Ord. nat. p. 260. Schultz. Nat. syst. p. 452.*

1. CHELIDONIUM majus L.

- Ch. majus Sp. pl. p. 723. Smith. Engl. Fl. 3. p. 4., et Engl. bot. v. 22. t. 1581. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 257. De Cand. Syst. nat. 2. p. 98., et Franç. 4. par. 2. p. 634., et Prodr. 1. p. 123. n. 1. Fl. Dan. t. 542. Sv. bot. v. 1. t. 67. Plenck. Ic. pl. med. 5. p. 32. t. 419. Lamck. Ill. 5. t. 450. f. 1. Bull. Pl. ven. t. 61. All. Ped. 1. p. 290. n. 1061. Balb. Taur. p. 85. Re Seg. p. 44., et Tor. 1. p. 275. Birol. Acon. 1. p. 179. Coll. Herb. Ped. 1. p. 107. n. 1. Nocc. et Balb. Ticin. 1. p. 246., et 388. Comoll. Prodr. p. 102. Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec. 2. tom. 10. p. 289. Pollin. Ver. 2. p. 175. Ruch. Ven. p. 127. Moric. Ven. 1. p. 226. Nacc. Ven. 3. p. 79.* Suffr. Foroj. p. 148. Ors. in Cap. Opusc. p. 281. Sav. Pis. 2. p. 3., et Bot. Etr. 2. p. 116. Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 175. Ten.*

- Nap.* 4. p. 303., et *Syll.* p. 254. n. 1. *Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 219. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 5. *Presl. Sic.* 1. p. 34. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 14. *Koch. Syn.* p. 31. *Reich. Exc.* 3. p. 699. n. 4466., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* vol. 3. p. 2. *Papaver.* t. 10. f. 4466. *Host. Austr.* 2. p. 47. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 369. *Gaud. Helv.* 3. p. 425. *Ch.* n. 1059. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 13. *Chelidonia major Plin. Nat. hist. lib.* 25. cap. 8. ed. *Paul. Man.* 1559. column. 670. *Chelidonia maggiore Matth. Valgr.* 1585. tom. 1. p. 664. fig. *Ang. Sempl.* p. 181. *Dur. Herb. ed. Rom.* p. 120. fig. *Chelidonium majus Casalp. De pl. lib.* 6. cap. 73. p. 269. *Castell. Hort. Mess.* p. 7. *Hort. Rom.* 4. t. 46. *Ch. majus vulgare Cup. Hort. Cath.* p. 48. *Zannich. Ist.* p. 61. t. 212. *Segui. Ver.* 1. p. 399. β foliolis pinnatifidis, dentatis; petalis laciniatis. *Chelidonium majus β Sp. pl.* p. 724. *Smith. Engl. Fl.* 3. p. 4. β . *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 257. β . *Fl. Dan.* t. 676. *De Cand. Franc.* 4. par. 2. p. 634. β . *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 15. β . *Koch. Syn.* p. 31. β . *Ch. laciniatum De Cand. Syst. nat.* 2. p. 99., et *Prodr.* 1. p. 123. n. 3. *Reich. Exc.* 3. p. 699. n. 4467., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* v. 3. p. 2. *Papaver.* t. 10. f. 4467. *Ch. majus foliis quernis C. B. P.* p. 144. n. 2. *Ch. majus laciniato flore Clus. Hist. pl. lib.* vi. p. cccij. fig. pl. luxur. *Ch. folio laciniato J. Bauh. Hist. pl.* 3. lib. 30. p. 483. fig. *Ital. Cinerognola. Cenerognola maggiore. Celidonia. Chelidonia maggiore. Erba da porri. Erba da volatiche. Erba marchesa. Erba nocca. Irundinaria Targ. Tozz.* Diz. bot. 2. p. 57. *Offic. Chelidonii majoris radix, herba Lin. Mat. med.* p. 89. n. 252. *Perenn.* Frequens in ruderatis, ad sepes, et in umbrosis sylvarum Italiæ. Legi Sarzanæ ad sepes, Bononiæ in sylvaticis di Zolla predosa. Habui ex Tyroli Italico in Fiemme a FACCHINIO, ex incultis Bassanensibus ab Eq. PAROLINIO, et a MONTINIO, ex agro Tergestino in Lippizza a TOMMASINIO, Fossâ Clodiâ in ruderatis a Prof. NACCARIO, ex agro Florentino a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, ex Canino in districtu Viterbiensi a Rev. Fratre MAURITIO DE BRIXIA, ex ditione Romana a Nepi a MASQUILLIERIO. Varietatem β legi Sarzanæ ad sepes cum specie. Floret Aprili, Majo, et per æstatem.

Radix fusiformi-ramosa. Caulis teres, adscendens, vel erectus, tamen debilis, prope nodos tumens, alterne ramosus, a spithama ad duos pedes longus, glaber, vel plus, minus pilosus. Folia impari-pinnata, tenuia, glabra, supra saturate viridia, subtus glauca, foliolis inæqualibus, ovatis, obtuse lobatis, obtuseque dentatis; petiolis sæpe basi expansione foliacea marginatis, et veluti auriculatis; foliolo impari majore; subinde trifido, reliquis descendendo minoribus. Petioli plus minus pilosi. Umbellæ simplices, solitariae, terminales, et axillares, aut etiam oppositifoliae, nunc longe, nunc brevius pedunculatae. Involucrum breve, polyphyllum, deciduum, foliolis lanceolato-linearibus. Umbellæ radii longi, sæpe inæquales. Calycis foliola ovata, obtusa, concava, e viridi luteola. Petala obovata, luteo-aurea, obtusa, integra, cruciatim patentia. Reliqua generis. Tota planta intus turgit succo croceo, foetido.

Varietas β est levis lusus speciei foliolis pinnatifidis, obtusis, obtuseque dentatis, petalis apice lacinulatis.

Usus. Veteres proutabant, succum, florente planta, expressum, et in æreo vase cum melle Attico leniter cinere feruenti decoctum esse remedium, singulare contra caligines oculorum. Conf. Plin. l. c. Recentiores medici non approbant, cum sit succus causticus, et saltem caute adhibendus. Sunt quoque, qui eo utantur in odontalgia a carie, ut hanc destruant. Alii laudant in ictero, hydropse, œdema, herpese ob virtutem diureticam, et diaphoreticam. Conf. Allion. Fl. Ped. l. c. Nunc tamen vix in usu.

CLAUCIUM.

Tourn. Inst. 2. t. 130. *Juss. Gen. p.* 236. *Vent. Tabl.* 3. p. 92. *Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p.* 369. *Cartn. De fruct.* 2. p. 165. t. 115. *Smith. Fl. Brit.* 2. p. 563., et *Engl. Fl.* 3. p. 5. *Willd. En. pl. hort. Berol.* 1. p. 561.

Chelidonii species *Lin. Gen. p.* 262. *Lamck. Ill.* 5. t. 450. f. 2.

Calyx perianthium liberum, diphyllum, foliolis ovatis, acutis, concavis, caducis. **Petala** quatuor, obovata, æqualia, in crucem patentia, decidua. **Stamina** numerosissima, inserta thoro parvo,

convexo, decidua, interiora successive longiora, filamentis filiformibus, antheris oblongo-linearibus, bilocularibus, impositis apici filamentis, erectis. Ovarium sessile, cylindraceum, apice paululum attenuatum. Stigma sessile, capitatum, supra pubescens, bi-tri-quadrilobum, et a lobis demum retrorsis sagittæforme. Siliqua cylindracea, vel cylindraceo-compressiuscula, longissima, bilocularis, bivalvis, dissepimento utrinque margine incrassato valvis interposito, reliqua parte fungoso, et alterne scrobiculato ad semina scrobiculo excipienda. Semina grandiuscula, reniformia, ecristata, plicis, et foveolis quadratis per areus, et series concentricas instructa, margini placentifero dissepimenti utrinque alterne affixa.

Habitus. Plantæ annuæ, vel biennes. Caulis alterne ramosus, aut dichotomus. Folia pinnatifida, laciniiis acute angulatis, dentatis, superiora basi lata caulem amplexantia. Flores solitarii, terminales. Corolla lutea, crocea, rubra, violacea. Herba succo decolore pollens.

Ord. nat. Ut in *Chelidonio* p. 276.

1. *GLAUCIUM luteum*: intense glaucum; foliis undulatis, inferioribus pinnatifidis, angulato-dentatis, supremis subsimpliciter dentatis; siliquis tuberculato-scabris, glabrisve.

G. luteum Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 369. Gartn. De fruct. 2. p. 166. Smith. Engl. Fl. 2. p. 6. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 257., et in Fl. Lond. ed. Grav. v. 4. t. 64. Coll. Herb. Ped. 1. p. 106. n. 1. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 247., et 388. Ruch. Ven. p. 127. Moric. Ven. 1. p. 226. Nacc. Ven. 3. p. 80. Suffr. Foroj. p. 148. Bert. Pl. Gen. p. 67., et Amæn. Ital. p. 155. n. 146. Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 176. Ten. Nap. 4. p. 303., et Syll. p. 254. n. 1. Guss. Fl. Sic. prodr. 2. p. 5., et Sup. 1. p. 172. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 16. a. Koch. Syn. p. 30. Reich. Exc. 3. p. 699. n. 4468., et Ic. Fl. Germ. et Helv. v. 3. Papaver. t. 11. f. 4468. Host. Austr. 2. p. 48. Gaud. Helv. 3. p. 427.

G. flavum All. Ped. 1. p. 291. n. 1062. De Cand. Syst. nat. 2. p. 94., et Prodr. 1. p. 122. n. 1. Presl. Sic. 1. p. 33.

- Chelidonium Glaucium* *Sp. pl.* p. 724. *Engl. bot.* v. 1. t. 8. *Fl. Dan.* t. 685. *Sv. bot.* v. 3. t. 171. *Pollin. Ver.* 2. p. 176. *Sav. Pis.* 2. p. 3., et *Bot. Etr.* 2. p. 117. *Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 219. *Desf. Atl.* 1. p. 405. *De Cand. Franc.* 4. par. 2. p. 635.
- Glaucium* n. 1060. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 14.
- Papavero cornuto* *Matth. Valgr.* 1585. tom. 2. p. 1116. fig. *Dur. Herb. ed. Rom.* p. 334. fig.
- Papaver corniculatum* *Casalp. De plant. lib.* 6. cap. 74. p. 270.
- P. corniculatum*, luteum *Cup. Hort. Cath.* p. 161. *Castell. Hort. Mess.* p. 42.
- Glaucium flore luteo* *Zannich. Ist.* p. 114. t. 166. *Hort. Rom.* 4. t. 87.
- G. foliis multum laciniatis et crispis, flore luteo, siliqua prælonga glabra* *Mich. Cat. hort. Fl.* p. 41., et p. 139. n. 1.
- Papaver corniculatum flavo flo.* *Clus. Hist. pl. lib.* 7. p. xes. fig.
- Ital. Papavero cornuto* *Matth. l. c.*
- Ann. Bienn.* Passim occurrit in omnibus litoribus marinis Italiae, nec tamen deest in locis a mari remotis. Legi Sarzanæ in litore *alla Marinella*, et in Liguria occidua in litore *a Sestri di ponente*. Observavi in litore Massensi, in litoribus portus Lunæ, et in litore Clavarensi. Habui ex Liguria orientali *alle Cinque terre* a GUIDONIO, Veronæ in vullo oppidi ad portam S. Zenonis a MANGANOTTO, ex litore Tergestino in *Parietto* a TOMMASINIO, ex litore Ariminensi a Prof. ANT. TARCIONIO-TOZZETTIO, ex Piceno ad portum *di Civitanova* ab ONSINO, ex litore *di Livorno* ab Eq. RICCASOLO, et a Prof. GIULIO, Terracinæ a FIORINIA-MAZZANTIA, ex insula Caprearum a Prof. GIRALDIO, ex insula Accipitrum ad Sardiniam a Prof. DE NOTARIS, ex Corsica a SOLEIROLIO. Floret a Majo in autumnum usque.
- Radix fusiformis, longa, crassa, perpendicularis, lateraliter fibrillosa. Caules sæpe plures e radice, cespitosi, decumbentes, ascendentes, teretes, glabri, alterno ramosi, et dum luxuriant dichotomi, dodrantes-bipedales. Folia radicalia petiolata, caulinaque ima pinnatifido-lyrata, et quandoque fere bipinnatifida, undulata, laciniis acute, et inæqualiter angulato-dentatis, impari majore, sæpe trifida, reliquis descendendo minoribus, et inter se remotioribus, ala costali foliaceâ, ipsa quoque grosse, et inæqualiter dentata. Eorum petioli basi dilatati, amplexicaules, brevi tractu nudi.

Folia caulina suprema lata, et brevia, basi dilatato-cordata amplexicaulia, subsimpliciter angulata, vel grosse dentata, rarius pinnatifida, laciniis angustis. Omnia folia ludunt glabra, vel hirsuta. Flores grandes, solitarii, terminales, breviter pedunculati, pedunculo crasso, glabro, nudo. Calycis foliola glabra, vel strigis raris adpersa. Petala calyce multo longiora, late obovata, obtusa, luteo-aurea, et senescendo saturatius colorata. Siliqua cylindracea, longissima, quandoque fere pedalis, sæpe curva, plerumque tuberculis scabra, quandoque tamen omnino lævis, semper setis, pilisve destituta. Tota herba intense glauca, et fere albens. Folia radicalia primi anni hyeme plerumque perennant in annum secundum.

- a. *GLAUCIUM phœniceum*: foliis pinnatifidis omnibus, laciniis angustis, remotis, leviter argute dentatis, caulique pilosis; siliquis hispidis.

G. phœniceum Willd. *En. hort. Berol.* 1. p. 56a. *Gærtn. De fruct.* 2. p. 165. t. 115. *Smith. Fl. Brit.* 2. p. 564., et *Engl. Fl.* 3. p. 7., et *Engl. bot. v.* 20. t. 1433. *Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr.* 1. p. 357., et *Fl. Græc.* 5. p. 72. t. 489. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 257. *All. Ped.* 1. p. 290. n. 1063. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 106. n. 2. *Guss. Sup.* 2. p. 172.* *Host. Austr.* 2. p. 48.

G. rubrum Ten. *Syll.* p. 254. n. 2. ex ipso Auct. *Reich. Icon. Fl. Germ. et Helv.* v. 3. p. 2. *Papaver. tab.* 11., et 12. f. 4470.

G. corniculatum Curt. *Lond. ed. Grav. v.* 1. t. 65. *De Cand. Syst. nat.* 2. p. 96. a., et *Prodr.* 1. p. 122. n. 3. a. *Ten. Nap.* 4. p. 304. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 17. *Koch. Syn.* p. 30. *Reich. Exc.* 3. p. 700. n. 4471., et *Icon. Fl. Germ. et Helv.* v. 3. p. 2. *Papaver. t.* 12. f. 4471. pl. macr.

Chelidonium corniculatum *Sp. pl.* p. 724. *Desf. Atl.* 1. p. 404. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 635.

Papaver cornutum phœniceo flo. *Clus. Hist. pl. lib.* v. p. xox. fig.

Ital. *Chelidonio scarlatto*.

Ann. Habui ex Calabria ab Eq. GUSONIO, et a BERGERO. Floret Aprili, Majo.

Habitu graciliore, minusque glaucescente, quam in præcedente, pollet. Radix tenuior. Caulis erectus, pilis patentibus adpersus. Folia omnia pinnatifida, plana, pilosa, vel hirsuta, laciniis angustis, inter se distantibus, horizontaliter patentibus, leviter, inæqualiter,

remote, acute dentatis. Flores brevius pedunculati, pedunculo piloso, aut hirsuto. Flores dimidio minores. Calyx hirsutus. Petala obovata, cruciatim patentia, rubra cum macula oblonga, e purpureo nigra, nitida in basi. Siliqua gracilior, hispida, scabra, setis e tuberculo ortis, sursum versis.

PAPAYER.

Lin. Gen. p. 463. Tourn. Inst. 2. t. 119. Juss. Gen. p. 236. Lamck. Ill. 5. t. 451. Vent. Tabl. 3. p. 91. Gærtn. De fruct. 1. p. 289. t. 60. Smith. Engl. Fl. 3. p. 8., et Gramm. tab. 17. f. 218. De Cand. Syst. nat. 2. p. 69. Endl. Gen. p. 856. n. 4823.

Calyx perianthium liberum, diphyllum, foliolis ovatis, æqualibus, obtusis, concavis, caducis. Petala quatuor, late obovata, brevissime unguiculata, æstivantia corrugata, in anthesi plana, patentia, post nuptias decidua. Stamina numerosa, corolla multo breviora, filamentis filiformibus, vel dilatatis, apice antherifero attenuato, antheris oblongis, obtusis, compressis, erectis, bilocularibus. Ovarium globosum, vel oblongum. Stigma pelta sessilis, persistens, sæpe umbonata, in facie superiore instructa plicis stigmatoideis quatuor-viginti, radiatis, margine integra, lobata, vel partita. Capsula globosa, ovata, oblonga, aut oblongo-clavata, in centro unilocularis, in ambitu instructa dissepimentis parietalibus, incompletis, placentiferis, tot, quot sunt plicæ stigmatoideæ, maturescente capsula protractis, et peltam stigmatum plus minus elevantibus, quas inter capsula apice hiat foraminibus infra univalvibus. Semina exigua, reniformia, foveolata.

Habitus. Plantæ annuæ, vel perennes, succo lacteo, fætido, narcotico fætæ, pilosæ, aut glabræ. Caulis teres, simplex, vel alterne ramosus. Folia incisa, pinnatifida, bipinnatifida, serrata, serraturis plerumque pilo terminatis, rarissime lusu indivisa, integerrima. Pedunculi terminales cauli,

ramisque, solitarii, uniflori, longi, nudi. Alabastra nutantia. Flores erecti, sæpe grandes. Corolla rubra, alba, violacea, flava, colore facile mutabili; cultura subinde multiplicatur, petalis variicoloribus, integris, aut fimbriatis, quod fit magno hortorum ornamēto. Capsula setosa, vel glabra.

Ord. nat. Ut in Chelidonio p. 276.

* *Capsulis setosis.*

1. *PAPAYER hybridum*: caule superiore adpresso setoso; filamentis superne tenuiter clavatis; capsulis subglobosis, hispidis.
- P. hybridum* *Sp. pl.* p. 725. *Smith. Engl. Fl.* 3. p. 9., et *Engl. bot.* 9. 1. t. 43. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 256. *De Cand. Syst. nat.* 2. p. 73., et *Prodr.* 1. p. 118. n. 5., et *Franç.* 4. par. 2. p. 631. *All. Ped.* 1. p. 291. n. 1064. *Birol. Acon.* 1. p. 179. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 100. n. 1. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 247. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 285. *Sav. Pis.* 1. p. 5., et *Bot. Etr.* 1. p. 151. *Maur. Cent.* XIII. p. 25. *Ten. Nap.* 4. p. 305., et *Syll.* p. 254. n. 6. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 6., et *Sup.* 2. p. 172. *Presl. Sic.* 1. p. 31. *Moris. Sard.* 1. p. 72., *Moris. et De Not. Capr.* p. 11.* *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 22. *Koch. Syn.* p. 29. *Reich. Exc.* 3. p. 701. n. 4476., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* v. 3. p. 2. *Papaver.* t. 14. f. 4476. *Host. Austr.* 2. p. 49.
- P. argemonoides* *Cesat. Stirp. Ital. fasc.* 1. fol. 4. cum tab.* juxta exemplar Mediolanense a Rainero.
- P. Argemone* dictum; capitulo hirsuto, rotundo, torulis canaliculato *Cup. Hort. Cath.* p. 163.
- P. erraticum*, folio magis inciso *Cast. Hort. Mess.* p. 42.
- P. capitulo torulis canaliculato sive Argemone* *Lacuna Lob. Ic.* p. 276. fig. bona.
- Ital. Papavero spinoso* *Sav. Pis.* 1. p. 5.
- Ann. Legi Sarzanæ inter sata collina.* Habui ex Liguria occidua in campis prope *Noli*, et ex arvis Mediolanensibus secus torrentem *Seveso* a RAINERO, ex arvis di *Bagnacavallo* prope *S. Potito* a BUBANIO, ex Ducatu Lucensi a *S. Maria del Giudice* a Prof. PUCCINELLIO, ex arvis prope *Livorno* a Prof. PETRO SAVIO, Fesulis a Prof. ANT. TARCIONIO-TOZZETTIO, Volaterris sub arce inter segetes ab AMIDEO, ex agro Viterbiensi

a CAMILLIO, Romæ a Barbierio, ex segetibus Siciliæ ab Eq. GUSSONIO, ex Capraria a PPFF. DE NOTARIS, et Eq. MORISIO, ex Corsica a Calvi a SOLEIROLIO. Floret Majo, Junio.

Radix fusiformis, gracilis. Caulis teres, erectus, alterne ramosus, setosus, setis vel omnibus adpressis, vel inferioribus patulis, a spithama ad duos pedes longus. Folia bipinnatifida, supra late viridia, glabra, subtus pallidiora, hirsuta, aut saltem in nervo, et venis scotosa, inferiora longe petiolata, laciniis brevioribus, latioribus, obtusiusculis, aut vix acutis pollentia, superiora sessilia, laciniis longioribus, angustioribus, linearibus, acutis, suprema ad flores quandoque simpliciter pinnatifida. Omnium foliorum laciniæ margine subciliatæ, et subrevolutæ, sæpe apice seta terminatæ. Flores minores quam in *Papavere Rhœade*, solitarii, terminales cauli, ramisque, longe pedunculati, pedunculis setis numerosis, adpressis adpersis. Calyx setis rariusculis scatens. Petala coccinea, sæpe basi atropurpurea. Filamenta filiformia, atropurpurea, prope apicem aliquo tractu paululum dilatata, fistulosa, et tenuiter clavata, apice antherifero setaceo. Antheræ ovatæ, cæruleæ. Pelta stigmatifera margine subcrenata, vel integra, centro umbonata. Rimæ stigmatoides quatuor-octo, papillosæ, papillis cylindraceis, brevibus, tenuibus, erectis. Capsula parva, ellipsoidea, vel subglobosa, sulcata, hispida, setis arescentibus rigidis, patenti-ascendentibus, flavidis.

III. Eq. Cesates tribuit *Papaveri argemonoidi* suo: capsulam ellipsoideam cum setis tenuioribus, et *Papaveri hybrido* L. capsulam globosam cum setis paulo crassioribus, quas res ostendit in tabula analytica *Papaverum* fig. 2., et 3. Sed passim, imo frequentius, occurrit capsula ellipsoidea cum setis crassioribus, et ita se habet ipsum exemplar ex Capraria, quod obtinui a Cl. De Notaris. Ergo nulla essentialis distinctio inter plantam Cesatianam, et Linnæanam; setæ vero tenuiores, vel paulo crassiores pendent a loco, et circumstantiis, neque hujusmodi characteri quis unquam credat speciem.

2. *PAPAVER apulum*: caule superiore adpresse setoso; filamentis crasse, longeque clavatis, mucrone antherifero brevissimo; capsulis ellipsoideis, hispidis.

P. apulum Ten. *Nap.* 4. p. 305. t. 238. f. 1., et *Syll.* p. 255. n. 7., et *App.* 5. p. 14. excl. syn. Cesat.

Ital. *Papavero di Puglia*.

Ann. Habui ex arvis Calabriæ, ubi occurrit inter segetes, a GASPARRINIO. Floret Aprili, Majo.

Planta humilior, et tenuior, quam præcedens species, cui cæterum similis. Caules a radice sæpe plures, subpedales. Flos grandior, fere magnitudine floris *Papaveris Rhoeados* L., aurantiacus, petalis basi atro-purpureis. Stamina numerosiora, et breviora, filamentis crasse, et longius clavatis, clava fistulosa, mucrone antherifero brevissimo, atropurpureis, similibus illis *Papaveris Argemones* L., sed paulo brevioribus. Antheræ oblongæ, cæruleæ. Capsula parva, ellipsoidea, hispida, setis albidioribus.

Optima species, nullimode cum aliis confundenda.

3. *PAPAVER Argemone*: setis caulinis subpatulis; capsulis elongato-clavatis, hispidis.

P. Argemone Sp. pl. p. 725. Smith. Engl. Fl. 3. p. 10., et Engl. bot. v. 9. t. 643. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 256. Curt. Lond. ed. Grav. v. 1. t. 67. Fl. Dan. t. 867. Sv. bot. v. 8. t. 538. De Cand. Syst. nat. 2. p. 74., et Prodr. 1. p. 118. n. 6., et Franç. 4. par. 2. p. 631. All. Ped. 2. p. 291. n. 1066. Balb. Taur. p. 85. Re Seg. p. 44., et Tor. 1. p. 275. Birol. Acon. 1. p. 179. Coll. Herb. Ped. 1. p. 100. n. 2. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 248. Comoll. Prodr. p. 102. Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec. 2. tom. 10. p. 289. Pollin. Ver. 2. p. 171. Nacc. Ven. 3. p. 75. Suffr. Foroj. p. 148. Sav. Bot. Etr. 4. p. 113. Ten. Nap. 4. p. 305., et Syll. p. 254. n. 5. Ab Ucr. Hort. Pan. p. 220. Guss. Fl. Sic. prodr. 2. p. 7. Presl. Sic. 1. p. 31. Moris. Sard. 1. p. 73. Desf. Atl. 1. p. 406. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 21. a. Koch. Syn. p. 29. a. Reich. Exc. 3. p. 701. n. 4475., et Ic. Fl. Germ. et Helv. v. 3. p. 2. *Papaver*. t. 14. f. 4475. Host. Austr. 2. p. 49. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 370. Gaud. Helv. 3. p. 428.

P. n. 1061. (err. typ. 1063.) Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 15.

P. erraticum alterum capitulo aspero, oblongiore *Cæsalp. De pl. lib.* 15. cap. 10. p. 572.

P. Argemone dictum, capitulo tenuiore, hirsuto *Cup. Hort. Cath.* p. 163.

Argemone sylvestris *Castell. Hort. Mess.* p. 33.

A. capitulo longiore *Lob. Ic.* p. 276. fig. bona.

Ital. Papavero salvatico *Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 161.

Ann. Habui ex Apennino Liguriæ orientalis ad S. Stephanum d'Aveto a TURIO, Albâ Pompejâ in arvis secus Tanarum a BERTERO, ex Cenisio a BONJEANNIO,

ex agro Mantuano *al Bosco Fontana*, et a *Migliaretto* a BARBIERIO, Veronâ in Campo Martio a MANGANOTTO, ex collibus Volaterranis ab AMIDEO, ex Corsica, a Caloi a SOLBIROLIO. Floret Majo, Junio.

Herba *Papaveris hybridi* L., sed passim hirsuta setis longioribus, in caule inferiore erecto-patulis, in superiore erecto-patentiusculis, et interdum adpressis, præsertim in pedunculis. Latinæ foliorum magis approximatæ, et scitiores. Flos potius parvus. Calyx hirsutus. Petala pallide miniacea, basi atropurpurea. Filamenta ut in *Papavere apulo* Ten., sed paulo longiora. Plicæ stigmatoides plerumque quinque, rarius quatuor-sex. Capsula elongato-clavata, nervoso-angulata, nervis tot, quot plicæ stigmaticæ, hispida, setis patulis, pallide flavidis, in apice capsulæ crebrioribus, demum rigidulis. In exemplaribus macris canlis passim simplex, uniflorus.

Habui quoque ex Anglia ab Woodsio.

4. *PAPAYER pyrenaicum*: pedunculis subradicalibus; foliis hirsutis, bipinnatifidis, pinnatifidiave, laciniis latiusculis, approximatis; capsulis obovatis.

P. pyrenaicum De Cand. *Syst. nat.* 2. p. 71., et *Prodr.* 1. p. 118. n. 3. α. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 101. n. 4. Ten. *Syll.* p. 255. n. 9. Reich. *Cent.* 8. p. 17. t. 743. f. 986., et *Exc.* 3. p. 700. n. 4472., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* v. 3. p. 2. *Papaver.* t. 13. f. 4472. ex loco in Tyrol.

P. aurantiacum Comoll. *Prodr.* p. 102. *Poll. Ver.* 2. p. 172. *Lois.* Not. p. 84. De Cand. *Franç.* 5. p. 585.*

P. alpinum All. *Ped.* 1. p. 291. n. 1067. excl. syn. Birol. *Acon.* 1. p. 179. Sav. *Bot. Etr.* 2. p. 116. Sturm. *Deuts. Fl.* 1. abth. 17. heft. Röhl. cum Koch. *Deuts. Fl.* 4. p. 20. β. Koch. *Syn.* p. 29. β. Reich. *Ic. Fl. Germ. et Helv.* v. 3. p. 2. *Papav.* t. 13. f. 4473., excl. var. subminiata. Scop. *Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 371. var. 1.

Argemone pyrenaica Sp. pl. p. 728. in herb. Banks. ex De Cand.

Argemone (err. typ. *Argemene*) giallo Pon. Mont. Bald. p. 100. fig.

Argemone lutea Ponæ Barrel. *Ic.* 764.

A. alpina Coriandri folio Tit. It. in calc. Hort. Maur. p. 14. non num. Zannich. *Opusc. posth.* p. 63.

Papaver alpinum saxatila, Coriandri folio Segui. *Ver.* 1. p. 416. n. 2. t. 4. f. 4.

P. Argemone dictum flore flavo perpusillum Pluk. *Phyt.* t. 247. f. 3.

β petalis albis, basi citrinis.

Papaver alpinum Ten. *Nap.* 4. p. 304., et *Syll.* p. 255. n. 8. Röhl. cum Koch. *Deuts. Fl.* 4. p. 19. α. Koch. *Syn.* p. 29. α. Reich. *Cent.* 8. p. 18. t. 745. f. 988., et *Exc.* 3. p. 700. n. 4473., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* v. 3. p. 2. var. *bicolor* *Papaver.* t. 4473. b. Scop. *Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 371. var. 2. *Gaud. Helv.* 3. p. 429.

P. Burseri Reich. *Cent.* 8. p. 18. t. 744. f. 987., et *Exc.* 3. p. 700. n. 4774., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* v. 3. p. 2. *Papav.* t. 13. f. 4474. non Crantz.

P. n. 1062. (err. typ. n. 1064.) *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 15.

Ital. Argemone giallo. Pon. Mont. Bald. p. 100.

Perenn. Habui ex alpibus Pedemontanis a Prof. BALBISIO, ex Baldo a Prof. JAMIO, ex Tyroli Italico, ubi copiosum, in omnibus alpibus di *Fiemme*, et *Fassa*, in *Schleren*, et *Duron*, ubi Reichenbachius indicat *Papaver pyrenaicum* suum, in alpe di *Sojal*, *Kissel*, *Larsec*, in alveo Avisii supra *S. Pelegrino*, et in *Padon Italiano* provincie Belunensis a FACCHINIO, in monte *Davoi* prope *Vigo*, et iterum in alpe *Sojal*, et *Duron* ab Eq. PAROLINIO, denuo ex *Val di Fassa* a RAINARO, ex districtu Vicetino al *Firozzo di Portole*, et ex districtu Bassanensi a *Montalon* in *Valugana* a MONTINIO, et in montibus di *Tesin* a SANTORELLIO, ex *Vette di Feltr*e ab Eq. PAROLINIO, et a MONTINIO, et in *Valle del ciel*, et *Morsopian* ab Eq. CONTARENO, ex Prætutius in monte Cornu ab ORSINO, in eodem monte, in monte *Costone*, in *Maiella a Monte Amaro*, et al *Maiellone* ab Eq. GUSSONIO. Varietatem β accepi ex monte *Velino* Prætutiorum ab ORSINO. Floret Julio, Augusto.

Radix fusiformis, vel fusiformi-ramosa, gracilis, longissima, subinde pedalis, et ultra. Ex ejus collo prodeunt plures surculi caulini perennantes, cæspitosi, decumbentes, ascendentes, plerumque brevissimi, interdum vero duos-tres pollices longi, inferne vestiti reliquiis petiolorum siccatorum, superne foliosi, apice terminati pedunculo unifloro, tereti, erecto, nudo, hirsuto, setis nunc patulis, nunc adpressis, a pollice ad spithamam longo. Folia congesta, petiolata, plus minus hirsuta, setis longis, rarius fere glabrata, pinnatifida, vel bipinnatifida, laciniis integris, aut bi-tridentatis, parvis, modo latiusculis, obovatis, præsertim supremis, modo angustioribus, obverse lanceolatis, aut lanceolatis, rarius lanceolato-linearibus, omnibus approximatis,

obtusiusculis, aut vix acutis, sæpe seta terminatis. Petioli latiusculi, lamina depressa, plus minus hirsuti, supra canaliculati, basi dilatati, longitudine varii, subinde insigni. Flos præ reliquis speciebus parvus, solitarius, terminalis, suaveolens. Calycis foliola ovata, concava, obtusa, hirsuta, margine anguste membranacea. Petala calyce longiora, etiam duplo, latissime obovata, obtusissima, flava, vel alba basi citriniæ ut in varietate β , senescendo, et siccando crocea. Stamina filamentis tenuibus, vix superne inflatis, apice antherifero longo, valde attenuato, e citrino viridulis, antheris oblongis, luteis. Stigma peltato-conicum, quadri-quinque-sexradiatum, radiis linearibus, exterius divisis, liberis, reliqua parte connexis, supra papillois. Capsula initio brevis, turbinata, paulatim augetur, et fit obovata, vel oblongo-obovata, stigmatе persistente coronata, hirsuta setis adpressis, instructa nervis quatuor-sex juxta numerum radiorum stigmatis, quadri-sexsulcata. Nervi ejus prius apice inflexi, maturescente capsula, eriguntur, et elevant stigma, et ita capsula hiat fenestris inter hos apices per valvas brevissime sectas. Tota differentia varietatis β stat in colore petalorum; ideo hæc varietas vix distinctione digna, et rectius comprehendenda cum specie.

Papaver alpinum Sp. pl. p. 725. (excl. syn. præter unum C. B. et Burs.). De Cand. Syst. nat. 2. p. 72, sive *Papaver Burseri* Crantz. Austr. 2. p. 138. t. 6. f. 4. differt a *Papavere pyrenaico* De Cand. foliis glabris, bipinnatis, pinnis insigniter inter se distantibus, foliis longioribus, lanceolato-linearibus, apice angustatis, acutiusculis, muticis, vel pilo terminatis, petiolis glabris, multo tendioribus, et fere filiformibus, angustissime canaliculatis, pedunculo tecto setis arcuissime adpressis, calycibus molliter pilosis, pilis fere dimidio brevioribus, petalis grandioribus, niveis, ungue fusco-viridulis, antheris longioribus, capsulis ovato-oblongis, valvis profundius sectis. Possideo exemplaria ejus lecta in Transylvania, et ab Ill. Eq. De Weldenio ad me humanissime missa, quæ profecto non habent herbam puberulam, qualis exhibetur a Jacquinio in Fl. Austr. 1. tab. 83. Hæc species nondum reperta est in Italia. Passim vero sub nomine *Papaveris alpini* tam ex Italia, quam ex Helvetia, ex Sabaudia, imo ex Pyrenæis ipsis accepi *Papaver pyrenaicum* De Cand.

* * *Capsulis glabris.*

5. *PAPAVER dubium* : foliis superioribus bipinnatifidis, lacinii linearibus; pedunculis adpresso setosis; capsulis elongato-clavatis, angulatis.
- P. dubium* *Sp. pl.* p. 726. *Smith. Engl. Fl.* 3. p. 10., et *Engl. bot.* v. 9. t. 644. capsula nimis brevi. *Hook. Brit. Fl. ed. 2.* p. 256. *Curt. Lond. ed. Grav.* v. 1. t. 66. *Jacq. Austr.* 1. p. 17. t. 25. fl. albo. *Fl. Dan.* t. 902. *Sv. bot.* v. 7. t. 457. capsula nimis brevi. *De Cand. Syst. nat.* 2. p. 75., et *Prodr.* 1. p. 118. n. 8., et *Franç. 4. par. 2.* p. 633. *All. Ped.* 1. p. 291. n. 1065.,* et *Auct.* p. 20.* *Balb. Taur.* p. 85. *Re Seg.* p. 44., et *Tor.* 1. p. 276. *Birol. Acon.* 1. p. 179. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 102. n. 6. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 249. *Pollin. Ver.* 2. p. 173. *Sav. Bot. Etr.* 1. p. 150. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. Prodr.* p. 176. *Ten. Nap.* 4. p. 306. *B. Moris. et De Not. Capr.* p. 11. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 24. *α. Koch. Syn.* p. 30. *α. Reich. Exc.* 3. p. 701. n. 4477., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 2. *Papav. t.* 15. f. 4477. pl. macrior. *Host. Austr.* 2. p. 50. *Gaud. Helv.* 3. p. 431.
- P. frentanum* *Ten. Syll. app.* p. 554.
- P. n.* 1063. (err. typ. n. 1065.). *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 15.
- P. erraticum*, capitulo longissimo glabro *Segui. Sup.* p. 170.
- β capsulis elongato-clavatis; foliis superioribus subsimplicibus, grosse, acuteque incis.
- Papaver dubium* *Ten. Nap.* 4. p. 306. *A.*, et *Syll.* p. 254. n. 4. *Guss. Sup.* 2. p. 172. *b.* Moris. Stirp. Sard. el. fasc. 1.* p. 3.*
- P. pinnatifidum* *Moris. Sard.* 1. p. 74.*
- α foliis superioribus bipinnatifidis; capsula abbreviata, ovata, vel turbinata.
- Papaver dubium* β *Moris. et De Not. Capr.* p. 12. *Guss. Sup.* 2. p. 172. *α.**
- P. obtusifolium* *Desf. Atl.* 1. p. 407. *De Cand. Syst. nat.* 2. p. 75., et *Prodr.* 1. p. 118. n. 8. *Moris. Stirp. Sard. el. fasc. 1.* p. 3.
- P. Rubizi* *De Cand. Franç.* 5. p. 585., et *Syst. nat.* 2. p. 78., et *Prodr.* 1. p. 119. n. 13. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 8., et *Sup.* 2. p. 173. pl. macrior.
- δ foliis superioribus pinnatis, pinnis dentatis, latis; pedunculis adpresso setosis; capsulis parvis, ovatis.
- Papaver Rhæas* β strigosum *Boning. Fl. Monast. Prodr.* p. 157. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 23. *Koch. Syn.* p. 29. *Moris. et De Not. Capr.* p. 12.

Ital. *Rosolaccio a mazza*. *Tignosella*.

Ann. Habui ex Liguria orientali in campis ad S. Stephanum d' Aveto a TURIO, ex viciniis Genue a RATNERO, ex Pedemontio a MOLINERIO, Albâ Pompejâ a BERTERO, ex Tyroli Italico in *Fiemme* prope *Tesero* a FACCHINIO, ex districtu Urbinati in campis di *Montegrimano* ab AZZAROLIO, Fesulis, et a S. Felice a EMA prope Florentiam a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO. Varietatem β accepi ex Ustica ab Eq. GUSSONIO, ex Sardinia inter segetes ab Eq. Prof. MORISIO, ex Corsica a CALOI a SOLEINOLIO. Varietatem α legi Bononiæ in collibus di *Roncorio*. Obtinui Fesulis, et ex agro Florentino a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, ex Cosyra, et ex Insula sacra in *Ægadibus* ab Eq. GUSSONIO, ex Sardinia in arenis maritimis, et inter segetes ab Eq. Prof. MORISIO. Varietatem δ legi Sarzanæ inter sata. Habui ex Tyroli Italico in *Fiemme* a FACCHINIO, ex campis circa Florentiam a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO. Floret Majo, Junio.

Radix ramosa. Caulis tores, erectus, hirsutus, pilis patulis, alterne ramosus, vel maerior simplex, pedalis-bipedalis. Folia inferiora pinnatifida, laciniis latiusculis, aliis integris, aliis apice subtridentatis, breviter petiolata; superiora sessilia, bipinnatifida, laciniis longioribus, et angustioribus, linearibus, acutis; omnia hirsuta, et magis subtns, scabra, laciniis sæpe seta terminatis. Pedunculi solitarii, terminales cauli, ramisque, longissimi, tecti setis adpressis, vel inferioribus subinde patulis. Calyx hirsutus, pilis basi dilatatis, erecto-patulis. Corolla minor quam in *Papavere Rhœade* L., coccinea, raro alba, petalis subinde extus ornatis. Filamenta filiformia, violacea. Antheræ oblongæ. Pollen luteum. Stigma peltatum, obtuse lobatum, umbone acuto, plicis stigmatoideis sex-octo, radiantibus, rimis papillois, demum applanatum. Capsula glabra, glauca, elongato-clavata, vel elongate oblonga, longitudinis mire ludibunda, et quandoque in eodem individuo habentur capsulæ breves cum capsulis elongatis, tot nervis instructa, quot sunt radii stigmatoidei. Semina nigra. Habui quoque e Sussexia ab Woodsio.

Varietas β habet folia superiora simplicia, lanceolata, incisionibus latis, acutis, veluti grandidentata; pilos inferiores pedunculorum constantius patentes, superiores adpressos. Reliqua ut in specie.

In varietate α est herba speciei; subinde folia suprema ludunt pinnatifida, laciniis anguste lanceolatis, crebre, et argute serratis, aut basi tantum iterum pinnatifidis. Capsula parva, turbinata; hæc quoque gaudet magnitudine varia, ita ut capsula speciei, cum decrescit, fiat capsula hujus varietatis.

Varietas δ appropinquat forma foliorum *Papaver Rhoeas* L., scilicet habet folia superiora pinnatifida, laciniis lanceolatis, longis, serratis, patentibus, et subinde falcatis, impari longiore, plerumque basi incisa, superne serrata. Pedunculi sunt adpresse setosi, sed inter setas adpressas dantur setæ quidquam patulæ, nunquam tamen patentissimæ. Flos, et capsula ut in varietate α . Ad hanc varietatem δ , ni fallor, pertinet *Papaver intermedium* Beck. Reich. Ic. pl. Fl. Germ. et Helv. v. 3. p. 3. *Papav.* t. 16. f. 4478.

6. *PAPAVÉR Rhœas*: caule, pedunculisque patentissimo setosis; foliis pinnatifidis, laciniis serratis, incisive; stigmate multiradiato; capsulis abbreviatis, subrotundo-ovatis.

P. Rhœas Sp. pl. p. 726. *Smith. Engl. Fl.* 3. p. 11., et *Engl. bot.* v. 9. t. 645., ubi deest capsula. *Hook. Brit. Fl. ed. 2.* p. 256. *Curt. Lond. ed. Grav.* v. 2. t. 66. *Fl. Dan.* t. 1580. *Sv. bot.* v. 8. t. 519. *Plenck. Ic. pl. med.* 5. p. 31. t. 418. *De Cand. Syst. nat.* 2. p. 76., et *Prodr.* 1. p. 118. n. 9., et *Franç. 4. par. 2.* p. 632. *All. Ped.* 1. p. 292. n. 1068. *A. B. Balb. Taur.* p. 85. *Re Seg.* p. 44., et *Tor.* 1. p. 276. *Birol. Acon.* 1. p. 180. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 102. n. 5. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 248., et 389. *Comoll. Prodr.* p. 102. *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec.* 2. t. 10. p. 289. *Pollin. Ver.* 2. p. 172. *Ruch. Ven.* p. 128. *Moric. Ven.* p. 227. *Nacc. Ven.* 3. p. 76. *Suffr. Foroj.* p. 148. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 285.* *Sav. Pis.* 2. p. 5., et *Bot. Etr.* 1. p. 159. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 176. *Ten. Nap.* 4. p. 306. *A., et Syll.* p. 264. n. 2. *A. Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 220. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 7. a., et *Sup.* 2. p. 173. *Presl. Sic.* 1. p. 32. a. *Moris. Sard.* 1. p. 77. a. *Rehl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 22. a. *Koch. Syn.* p. 29. a. *Reich. Exc.* 3. p. 701. n. 4479., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* v. 3. *Papaver.* t. 15. f. 4479. (err. typ. f. 4470.) *Host. Austr.* 2. p. 50. *Scop. Carn. ed. 2. tom. 1.* p. 372. *Gaud. Helv.* 3. p. 430. a.

P. n. 1064. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 16.

Papavero salvatico Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 112. fig.

P. erratico Dur. Herb. ed. Rom. p. 333. fig.

- Papaver erraticum* *Cesalp. De pl. lib. 15. cap. 10. p. 571. Hort. Rom. 4. t. 87.*
P. erraticum majus *Cup. Hort. Cath. p. 162.*
P. erraticum, majus, rheas Dioscoridi, Theophrasto, Plinio *Zannich. Ist. p. 203. t. 261.*
P. erraticum majus, pœnœ Dioscoridis Theophrasti et Plinii *Segui. Ver. 1. p. 415. n. 1.*
P. erraticum majus, floribus minoribus absque maculis *Segui. Supl. p. 170. n. 1.*
P. erraticum primum *Fuchs. Hist. p. 515. fig.*
P. Rhœas prius *Lugd. Hist. 1. p. 439. fig.*
P. Rhœas, sive caduco flore puniceo *Lob. Ic. p. 175.*
γ laciniis foliorum elongatis, simplicibus, impari longissima, serratis omnibus.
Papaver Rhœas γ *Sp. pl. p. 726. Ten. Nap. 4. p. 306. B., et Syll. p. 354. n. 2. B. Guss. Fl. Sic. prodr. 2. p. 73 b. Presl. Sic. 1. p. 32. β.*
P. erraticum alterum *Fuchs. Hist. p. 516. fig. 8.*
P. Rhœas minus *Lugd. hist. 1. p. 439. fig.*
λ foliis simplicissimis, spathulatis, integerrimis.
Papaver integrifolium *De Cand. Syst. nat. 2. p. 85., et Prodr. 1. p. 120. n. 26.*
P. erraticum, foliis non dissectis *Tourn. Inst. 1. p. 218.*
P. rhœas integro folio hisp. *Barrel. Ic. 1191. Bocc. Mus. di piant. p. 77. t. 65. fig. ex Barrel.*
Ital: Bambagelle. Bubboline. Citole. Papavero. Papavero salvatico. Pâstriccia. Reas. Rosillaccio, Rosolaccio
Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 161.
Offic. Rhœadis herba, flores *Lin. Mat. med. p. 88. n. 251.*
Ann. Vulgare inter sata Italix. Legi Bononiæ in atris, et in alveo Lavini. Habui ex campis Mediolanensibus secus torrentem Seveso a RAINERO, ex Tyroli meridionali in vicinis di Bolzano, et Tridenti a FACCHINIO, ex arvis Bassanensibus, et S. Michaelis d' Angarano a MONTINIO, Ferrariâ ad propugnacula S. Pancratii a FERRARIO, ex districtu Urbinati in Montegrimano ab AZZAROLIA, ex Piceno a Montefortino a MARZIALETTO, et in Vettore a S. Gemma ab ORSINO, Terracinâ a FIORINIA-MARZANTIA, ex cultis Lucanix a GASPARRINIO. Varietatem β legi Sarzanâ inter sata. Varietatem δ obtinui ex arvis Tarvisinis prope Mogliano, ubi tamen rara, a MAJERO. Floret Majo, Junio, et in editis Julio. Radix fusiformis, gracilis. Caulis teres, erectus, scaber, hirsutus, vel pilosus, pilis patentissimis, alterne ramosus, macrior simplex, uni-bipedalis. Folia inferiora

obverse lanceolata, obtusa, serrata, aut leviter incisa, petiolata, superiora sessilia, pinnatifida, laciniis acutis, grosse, et acute serratis, lateralibus patentibus, et subinde falcatis, sed macriora, inferioribus similia; omnia scabra, plus minus hirsuta, laciniis, serraturisque plerumque pilo terminatis. Pedunculi longissimi, uniflori, solitarii, terminales cauli, ramisque, hirsuti, vel pilosi, pilis patentissimis. Foliola calycina hirsuta, pilis patulis. Corolla grandis. Petala latissima, obtusissima, integra, vel crenata, vel crenata, basi atrorubentia, vel immaculata. Filamenta tota tenuia, filiformia. Antheræ subrotundæ, atrorubentes. Stigma orbiculatum, breviter umbonatum, margine lobatum, plicis stigmatoideis decem-duodecim, radiantibus, rima papillois. Capsula parva, ovata, basi rotundata, glabra, glaucescens, instructa nervis tot, quot sunt radii stigmatoidei. Pili totius herbæ lutescentes.

Varietas β differt foliis veluti decussive pinnatis, pinnis longis, acutis, subæqualiter, arguteque serratis, subinde basi incisis, impari longissima. Ludit macrior, et luxurians magnitudine speciei, sed forma foliorum imponit pro specie distincta.

Varietas β habet folia omnia simplicissima, spatulata, integerrima, venosa, venis majoribus alternis, sursum versis, minoribus reticulatis, inferiora obtusa, petiolata, reliqua sessilia, acuta, et pilo longiusculo terminata. Reliqua omnia ut in specie. Lusus vero singularis, quod demonstrat, quam parum fidendum sit formæ foliorum in statuendis *Papaverum* speciebus. Olim suspicatus eram, figuras Barrelieri, et Bocconii ad hanc varietatem pertinentes potius referre *Seriolam atnensem* L. flore inaperto, quam opinionem meam De Candolleus patefecit in *Syst. nat.* 2. p. 85. n. 24., sed postquam vidi plantam, sententiam dimisi.

Usus. Herba, et flores sudorem leniter movent, tussim sedant, somnum conciliant. Præstant in affectionibus rheumaticis lævibus, et magno in usu sunt, præsertim flores.

7. *PAPAYER setigerum*: foliis simplicibus, superioribus oblongis, basi lata, subcordata amplexicaulibus, argute inciso-serratis; pedunculis setosis; capsulis obovatis.

P. setigerum De Cand. *Franc.* 5. p. 585., et *Syst. nat.* 2. p. 81., et *Prodr.* 1. p. 119. *Deless. Ic. select.* v. 2. p. 3. t. 7. *Guss. Sup.* 2. p. 173. *Moris. stirp. Sard. el. fasc.* 1. p. 3.* *Sav. Bot. Etr.* 4. p. 114. *De Sal. in Bot. zeit.* ann. 1834. p. 82. *Ten. Syll. app.* p. 605.

P. somniferum Bad. in Moret. Bot. Ital. p. 10. n. 28.* Moris. Sard. 1. p. 78.* excl. pl. sativa. Moris. et De Not. Capr. p. 12.* Ten. Nap. 4. p. 307. A., et Syll. p. 254. n. 1. A. Ital. *Papavero setoloso*.

Ann. Habui ex viciniis Genum a Prof. SASSIO, ex Liguria occidua in olivetis di Laigueglia a BADAROO, et a Loano a Prof. GHERARDIO, ex Etruria alla Sassetta a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTO, ex Gorgonia a Prof. GIULIO, ex Capraria ab Eq. Prof. MORISIO, et a Prof. DE NOTARIS, ex Sardinia ad margines agrorum in litore orientali ab Eq. Prof. MORISIO, ex Corsica a Calvi a SOLEIROLIO. Floret Junio.

Radix fusiformis, gracilis, longa. Caulis teres, erectus, simplex, vel parce, et alterne ramosus, glaber, a dorso ad duos pedes longus. Folia ima obverse lanceolata, obtusiuscula, serrata, petiolata, cæteris minora, superiora oblonga, sessilia, basi lata, subcordata amplexicaulia, acuta, argute inciso-serrata, laciniiis, et serraturis seta longa rigida terminatis, reliqua superficie glabra, vel superiora nervo setosa. Pedunculi uniflori, solitarii, longi, terminales cauli, ramisque, adpersi setis erecto-patulis, aut adpressis. Calycis foliola subsetosa, vel glabra. Petala grandia, violacea, basi macula atropurpurea. Filamenta ejusdem coloris, tenuia, sed superne paululum latiora, apice iterum attenuata. Antheræ oblongæ, flavæ. Stigma peltatum, convexum, plicis stigmatoideis octo-decem, radiatis, rima papillosis, margine lobatum. Capsula parva, obovata, basi veluti substipitata, leviter, et obsolete nervosa, glauca, maturans stigmatibus elevato, applanato coronata. Valvæ obtusissimæ. Tota planta glauco-virens.

Papaver somniferum L. non est indigenum Italiæ, sed per culturam inlatum. Differt habitu grandiore, glabritie totius plantæ, foliis minus profunde, et minus argute inciso-dentatis, incisionibus, et dentibus seta terminali carentibus, capsula multo grandiore, globosa, valvis profundius sectis, herba intenso glauca. Duplex hujus speciei varietas occurrit in hortis, quarum altera habet capsulam grandiore, altera minorem, sed utraque multo grandiore, quam in *Papavere setigero* DC. Passim quoque ludit culturâ floribus plenis, variicoloribus, petalisque fimbriatis. Ex hoc educitur opium, remedium magni momenti, sine quo medicina non esset.

NYMPHÆA.

*Lin. Gen. p. 264. partim. Tourn. Inst. 2. t. 137. f. A. C. G., et t. 138. f. I. L. N. excl. fig. 2. Vent. Tabl. 2. p. 214. Gærtn. De fruct. 1. p. 72. t. 19. (excl. *Nymphæa lutea*). Smith. Fl. Brit. 2. p. 569., et Engl. Fl. 3. p. 13. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 360. De Cand. Syst. nat. 2. p. 49. Endl. Gen. p. 900. n. 5020.*

Castalia Salisb. in Annal. of. bot. 2. p. 71.

Calyx perianthium liberum, tetraphyllum, coriaceum, persistens. Petala plura, affixa seriebus pluribus faciei externæ receptaculi ovarium vestientis. Stamina plurima, inserta eidem faciei receptaculi supra petala, petalis multo breviora, libera, filamentis planis, dilatatis, apice attenuatis, antheris linearibus, elongatis, filamento interno superiori totis adnatis, bilocularibus, introrsis, loculis longitudinaliter dehiscentibus. Ovarium globosum, tectum, et connatum cum receptaculo urceolari. Stilus nullus. Stigma peltatum, radiatum, radiis extrorsum liberis, acutis, centro glandula globosa umbonatum. Baccæ subglobosa, intra receptaculum adhærens contenta, cicatricibus petalorum, et staminum delapsorum notata, stigmate persistente coronata, cortice coriaceo, intus pulposa, multifocularis, maturitate in pulpam colliquescent. Scimina plurima in quovis loculo, parva, ovato-oblonga, obtusa, intra pulpam nidulantia.

Habitus. Plantæ perennes, paludosæ, vel fluviatiles. Rhizoma crassum, horizontale, repens. Caulis nullus. Gemmæ radicales, ferentes folia, et scapos floriferos. Folia longe petiolata, peltata, vel peltæ modo petiolo insidentia, natantia, aut extra aquam exerta, subrotunda, integra, vel basi fissa, aut cordata, margine integerrima, vel dentata, glabra, aut subtus pubescentia, sæpe grandia. Petioli, et pedunculi teretes, intus

lacunosi. Flores solitarii, albi, rosei, cærulei, subinde suaveolentes, noctu, et cælo nubilo clausi, et intra aquam sepulti, sub sole natantes, et peracta sæcundatione iterum, et semper immersi, *Ord. nat. Miscellaneæ Lin. Ord. nat. n. LIV. Succulentæ Lin. Præl. p. 315. Hydrocharides Juss. Gen. p. 67. Smith. Gramin. p. 85. Hydrocharidæ Vent. Tabl. 2. p. 212. Nymphææ Salisb. in Ann. of bot. 2. p. 69. Smith. Gram. p. 188. Nymphæaceæ De Cand. Syst. nat. 2. p. 39. Rich. Famill. nat. in Él. éd. 5. p. 108. Bärth. Ord. nat. p. 88. Schultz. Nat. syst. p. 327.*

1. *NYMPHÆA alba*: foliis cordato-subrotundis, sinu angusto, subparallelo, integerrimis, lævibus, floribusque natantibus; petalis oblongis; stigmate sedecimradio, radiis incurvis.

N. alba Sp. pl. p. 719. Smith. Engl. Fl. 3. p. 14., et Engl. bot. v. 3. t. 160. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 259., et in Fl. Lond. ed. Grav. v. 4. t. 65. Fl. Dan. t. 602. Sv. bot. v. 2. t. 92. Plenck. Io. pl. med. 5. p. 44. t. 429. Læmck. Ill. 5. p. 453. f. 1. De Cand. Syst. nat. 2. p. 56. α. β., et Prodr. 1. p. 115. n. 14., et Franç. 4. part. 2. p. 630. All. Ped. 2. p. 174. n. 1934. Re Seg. p. 44., et Tor. 1. p. 277. Birol. Acon. 1. p. 180. Coll. Herb. Ped. 1. p. 97. n. 3. Noëc. et Balb. Tic. 1. p. 249., et 389. Comoll. Prodr. p. 103. Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec. 2. tom. 10. p. 289. Pollin. Ver. 2. p. 190. Ruch. Ven. p. 129. Moric. Ven. 1. p. 228. Nace. Ven. 3. p. 84. Suffr. Foroj. p. 148. Sav. Pis. 2. p. 7., et Bot. Etr. 4. p. 114. Mauri. Cent. XIII. p. 26. Ten. Nap. 4. p. 308., et Syll. p. 255. n. 1. Ab Uer. Hort. Pan. p. 221. Guss. Fl. Sic. prodr. 2. p. 8. α. β. Præsl. Sic. 1. p. 29. Moris. Sard. 1. p. 68. Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 30. heft. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 28. Koch. Syn. p. 27. Reich. Eng. 3. p. 15. n. 59. Host. Austr. 2. p. 51. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 373. Gaud. Helv. 3. p. 434.

N. n. 1067. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 20.

Nimphæa bianca Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 944. fig.

N. dal fiore bianco Ang. Sempl. p. 235. Dur. Herb. ed. Rom. p. 310. fig.

Nymphæa flore candido, ampliore Cæsalp. De pl. lib. 15. cap. 7. p. 569.

N. alba major, et minor Cup. Hort. Cath. p. 154.

N. alba major Segui. *Ver.* 1. p. 514. n. 1.

Ital. *Carfano*. *Carfaro femmina*. *Cappero di padule*. *Copripentole*. *Erculea bianca*. *Nannufero*. *Nanufero*. *Nenufari*. *Ninfea*. *Ranocchiai doppi*.

Offic. *Nymphææ albæ radix*, flores Lin. Mat. med. p. 91. n. 258.

Perenn. Vulgaris in paludibus, et lacubus Italiæ. Legi Bononiæ in paludibus di *Gandazollo*. Habui ex lacu di *Segrino* in districtu Comensi a RAINERO, ex fossis Patavinis a MONTINIO, ex Apennino Umbro in lacu di *Colfiorito* a Prof. OCTAVIANO, ex Pontinis a FIORINIA-MAZZANTIA. Floret ab Aprili in Junium.

Rhizoma crassissimum, longum, horizontale, fibris apice ramulosis repens. Gemmæ sparsæ, simul foliiferae, et floriferae. Folia subrotundo-ovata, obtusissima, integerrima, cordata, sinu angusto, auriculis subparallelis, acutis, vernantia involuta, explicata natantia, plus minus longe, et subinde longissime petiolata juxta minorem, vel majorem aquæ altitudinem, glabra, lævia, glutine lubrico, tenui obducta, squallide virentia, subtus pallidiora, et nervis, venisque radiantibus, tenuibus, confluentibus instructa, magnitudine variantia, diametro longitudinali a tribus ad octo pollices longo. Petioli teretes, crassi, glabri. Scapi pariter teretes, crassi, uniflori, nudi, juxta profunditatem aquæ longi. Flores grandes, in anthesi sub sole aperti, et natantes, noctu, et in umbra clausi, immersi. Calycis foliola coriacea, oblonga, obtusa, patentia, extus viridia, margine, et intus alba, subinde cum levi rubedine. Petala oblongo-lanceolata, vel ovato-oblonga, obtusa, alba, interiora breviora. Reliqua generis.

Usus. Radix, et flores olim adhibebantur in feбри, et in gonorrhœa ob vim refrigerantem, saponaceam, sedantem; nunc vero remedium exoletum.

NUPHAR.

Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 361. *Dryand. in Hort. Kew. ed.* 2. v. 3. p. 295. *Smith. Engl. Fl.* 4. p. 14., et *Comp. ed. ann.* 1829. p. 103. *De Cand. Syst. nat.* 2. p. 59., et *Prodr.* 1. p. 116. *Endl. Gen.* p. 900. n. 5021.

Nymphææ species Lin. *Gen.* p. 264. *Tourn. Inst.* 2. t. 137. f. B. D. E. F., et t. 138. f. K. M. O. *Juss.*

Gen. p. 68. Lamck. Ill. 5. t. 452. f. 2. Vent. Tabl. 2. p. 214. Gærtn. De fruct. 1. p. 73. t. 19. f. g-M.

Calyx perianthium liberum, penta-hexaphyllum, coriaceum, persistens, coloratum. Petala plura, calyce breviora, dorso mellifera, multiseriatim inserta receptaculo abbreviato, excipiente basim ovarii. Stamina plurima, affixa receptaculo statim supra petala, corollæ æqualia, filamentis compressis, latis, recurvis, antheris linearibus, longis, filamento superiori interno adnatis, bilocularibus, loculis discretis, introrsis, longitudinaliter deliscentibus. Ovarium circa basim tantum receptaculo vestitum, reliqua parte nudum. Stigma sessile, peltatum, orbiculatum, supra plicis stigmatoides multiradiatum, margine integrum, vel sublobatum, nectario centrali nullo. Bacca cortice coriaceo, ampullacea, collo constricta, præter basim nuda, lævis, stigmate persistente coronata, multilocularis, loculis tot, quot radii stigmatoides, intus pulposa, maturitate irregulariter disrupta. Semina in quovis loculo multa, grandiuscula, ovata, acuta, et veluti septis partialibus subdistincta.

Habitus Nymphææ. Hinc genus per se artificiale, tamen sat distinctum.

Ord. nat. Ut in *Nymphæa* p. 329.

1. *NUPHAR lutea*: foliis cordato-ovalibus, sinu angusto, auriculis obtusis; petiolis acute marginatis; stigmate integerrimo.

N. lutea Sibth. et Smith. *Fl. Græc. prodr.* 1. p. 361. Smith. *Engl. Fl.* 3. p. 15., et *Comp. ed. ann.* 1829. p. 105. Hook. *Brit. Fl. ed.* 2. p. 260., et in *Fl. Lond. ed. Grav.* v. 4. t. 66. *De Cand. Syst. nat.* 2. p. 60., et *Prodr.* 1. p. 116. n. 1. Sav. *Bot. Etr.* 4. p. 115. Guss. *Fl. Sic. prodr.* 2. p. 9. Presl. *Sic.* 1. p. 29. Röhl. cum Koch. *Deuts. Fl.* 4. p. 30. *N. luteum* Coll. *Herb. Ped.* 1. p. 98. n. 1. Ten. *Nap.* 4. p. 308., et *Syll.* p. 255. n. 1. Koch. *Syn.* p. 28. Reich. *Exc.* 1. p. 14. n. 56. Host. *Austr.* 2. p. 52. Gaud. *Helv.* 3. p. 436.

Nymphæa lutea *Sp. pl.* p. 729. *Engl. bot.* v. 3. t. 159. *Fl. Dan.* t. 603. *Sv. bot.* v. 4. t. 266. *Plenck. Ic. pl. med.* 5.

p. 44. t. 430. *All. Ped.* 2. p. 173. n. 1933. *Balb. Taur.* p. 86. *Re Ter.* 1. p. 277. *Birol. Acon.* 1. p. 180. *Noec. et Balb. Tic.* 1. p. 249., et 389. *Comoll. Prodr.* p. 103. *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec.* 2. tom. 10. p. 289. *Pollin. Ver.* 2. p. 190. *Ruch. Ven.* p. 129. *Moric. Ven.* 1. p. 223. *Nacc. Ven.* 3. p. 83. *Suffr. Foroj.* p. 143. *Sav. Pis.* 1. p. 7. *Maur. Cent.* xiii. p. 26. *De Cand. Franc.* 4. part. 2. p. 630. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 30. heft. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 372.

N. n. 1066. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 20.

Nimphaea lutea *Matth. Valgr.* 1585. tom. 2. p. 945. fig.

N. dal fiore giallo *Ang. Sempl.* p. 235. *Dur. Herb. ed. Rom.* p. 310. sine fig.

Nymphaea altera flore ex toto luteo *Casalp. De pl. lib.* 15. cap. 7. p. 569.

N. lutea major *Cup. Hort. Cath.* p. 154. *Segui. Ver.* 1. p. 514. n. 2.

Ital. *Cappero di padule. Carfaro. Carfaro maschio. Er-
culea gialla. Nannufero. Nenufar. Nenufaro. Nenu-
fero. Nenuferi. Ninfca. Ranocchiai gialli. Zucchetti-
ne da tabacco* *Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 153.

Perenn. Provenit in eisdem locis cum præcedente. Legi Bononiæ in paludibus di *Gandazollo*. Filius attulit ex paludibus di *Saletto*. Habui ex lacu di *Segrino*. in provincia Comeusi a *RAINERO*, ex Tyrolî meridionali in staminis prope *Salorno* a *FACCHINIO*, ex paludosis Patavinis prope thermas Aponis a *MONTINIO*, ex paludosis Ferrariensibus a *Argenta* ab herborario nostro, et a *Massa Lombarda* in rivulis vallium a *TASSINARIO*, ex canalibus Pontinis, ubi copiosa, a *FIORINIA-MAZZANTIA*. Floret Majo, Junio.

Radix ut in *Nymphaea alba* L. Folia cordato-ovalia, obtusa, integerrima, sinu baseos nunc angustissimo, nunc quidquam divergente, auriculis obtusis, subtus instructa nervis, venisque radiantibus, crebrioribus, et evidentioribus, quam in illa, prima, et immersa tenuiora, tenerrima, pellucida, seriora natantia coriacea. Petioli supra planiusculi, dorso convexi, lateribus utrinque attenuatis, acutangulis. Scapi teretes. Flores odore aquæ ardentis pollentes, minores, quam in *Nymphaea alba* L. Calycis foliola quinque-sex, e subrotundo ovata, obtusa, concava, dorso inferne virescentia, reliquo tractu, et facie superiore luteo-aurea. Petala exigua, obovata, obtusa, luteo-aurea. Reliqua generis. Capsula senio non fatiscit in massam pulposam.

TILIA.

Lin. Gen. p. 267. Tourn. Inst. 3. t. 381. Juss. Gen. p. 292. Lamck. Ill. 5. p. 467. Vent. Tabl. 3. p. 215. Gærtn. De fruct. 2. p. 150. t. 113. Smith. in Rees's Cycl. v. 35., et Engl. Fl. 3. p. 16., et Gram. tab. 19. f. 235. De Cand. Prodr. 1. p. 512. Endl. Gen. p. 1008. n. 5373.

Calyx perianthium liberum, quinquepartitum, corollæ subæquale, coloratum, deciduum. Petala quinque, obverse lanceolata, apice crenata, alternantia cum segmentis calycinis, ungue nuda, vel instructa squamula nectariiformi. Stamina plura, libera, aut per phalanges basi coalita, corollæ subæqualia, filamentis subulatis, glabris, antheris didymis, bilocularibus, incumbenibus, loculis in facie superiore dehiscenibus. Ovarium subrotundum, tomentosum. Stilus simplex, filiformis, crassiusculus, stamina subæquans, deciduus. Stigma capitatum, quinquelobum. Nux coriacea, vel chartacea, pentagona, aut subrotunda, tomentosa, quinquelocularis, loculis bi-ovulatis, dissepimentis destructilibus, ut capsula unilocularis evadat. Semen sæpius solitarium, obovatum, reliquis abortivis.

Habitus. Arborea excelsæ, ramis patulis. Folia alternata, petiolata, basi oblique, vel æqualiter cordata, aut oblique truncata, cuspidata, dentata, decidua. Stipulæ citissime difflue. Umbellæ, vel corymbi pedunculati, solitarii, axillares, pedunculo inferne alato bractea adnata, oblongo-lingulata, obtusa, superne libera. Flores suaveolentes. Petala albida, vel luteola.

Ord. nat. Columnifera Lin. Ord. nat. n. XXXVII., et Præl. p. 451. Tiliaceæ Juss. Gen. p. 289. Smith. Gram. p. 155. Vent. Tabl. 3. p. 204. De Cand. Prodr. 1. p. 503. Rich. Famill. in Él. éd. 5. p. 170. Bartl. Ord. nat. p. 339. Schultz. nat. syst. p. 480.

* *Corollis nectario destitutis.*

Tiliæ europææ.

1. *TILIA europæa*: foliis cordatis, serratis, utrinque glabris, axillis venarum parvispongiosis; nuce coriacea, ovata, obscure costata.

T. europæa *Sp. pl.* p. 733. *Smith. Engl. Fl.* 3. p. 17., et *Engl. bot.* v. 9. t. 610. *Höck. Brit. Fl. ed. 2.* p. 259. *Sv. bot.* v. 1. t. 40. *Reich. Exc.* 3. p. 828. n. 5138. excl. syn. Bull., et Plenck.

T. microphylla *Spad. Xil.* 3. p. 204.* herb.

T. intermedia *De Cand. Prodr.* 1. p. 513. n. 2. *Spach. in Annal. des scienc. nat. sec. ser. tom. 2.* p. 335. tab. 15. fig. 8.

T. femina *Ger. em.* p. 1843. fig. 1.

Ital. *Tilia. Tiglia. Tiglia femmina. Tiglio. Tiglio femmina* Targ. Tozz. *Diz. bot.* 2. p. 226.

Offic. *Tiliæ carbo, cortex interior, flores* Lin. *Mat. med.* p. 94. n. 262.

Arb. Habui ex agro Tergestino, ubi frequens circa pagos, a TOMMASINIO, ex Apennino di Sernano ab Eq. NANBUCCIO. Floret Junio, Julio.

Arbor excelsa, cortice trunci senescentis rimoso, junioris lævi. Rami patuli, glabri, fusce rubidi, juniores virides. Folia oblique, vel æqualiter cordata, basi integra, reliquo margine subinæqualiter argute serrata, rarius angulata, plus minus longe cuspidata, cuspidate superne integerrimo, subinde abortivo, supra late viridia, subtus pallidiora, utrinque glabra, sed subtus in axillis venarum instructa spongiolis parvis et villis densis, brevibus, pallentibus. Petioli teretes, folio dimidio breviores, glabri. Stipulæ in basi petioli dum, ovales, glabræ, cito diffusæ. Pedunculi axillares, solitarii, simpliciter, vel composite umbellati, semper pauciflori, umbella, aut radiis subtrifloris, glabri, nutantes, inferne instructi bractea membranacea, oblongo-lingulata, obtusa, plana, integerrima, glabra, pallente, eisdem aliquo tractu adnata, deinde libera, flores subæquans, aut superans. Flores gratissime odorati, præsertim primo mane. Calycis segmenta oblonga, obtusa, vel acutiuscula, margine pubescentia. Petala luteola. Nux parva, coriacea, ovoidea, tomentosa, obscure costata.

Usus. Flores tantum nunc in usu medico, leniter diaphoretici, præstantissimi in affectionibus rheumaticis, sed æque utiles sunt flores specierum sequentium.

2. *Tilia grandifolia*: foliis æqualiter, obliqueve cordatis, serratis, pubescentibus, axillis venarum parvispongiosis; umbella subtriflora; nuce lignosa, turbinato-ovata, exquisite costata.
- T. grandifolia* Ehrh. Beitr. 5. p. 158. Smith. Engl. Fl. 3. p. 18. Engl. bot. sup. v. 2. t. 2720. Coll. Herb. Ped. 1. p. 443. n. 2. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 34. Koch. Syn. p. 132. Host. Austr. 2. p. 59.
- T. platyphyllos* Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 373. Vent. Mém. de l'Institut. scienc. mathém. et phys. 4. p. 6. t. 1. f. 2. Nouv. Duh. 1. p. 226. t. 50. Pollin. Ver. 2. p. 189. excl. syn. Linn. Spad. Xil. 3. p. 210.* herb. Sav. Bot. Etr. 1. p. 151.* Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 176. excl. nonnull. syn. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 826. Reich. Exc. 3. p. 828. n. 5139. Gaud. Helv. 3. p. 440.
- T. platyphylla* De Cand. Prodr. 1. p. 513. n. 4. Sav. Tratt. degli alb. ed. 2. tom. 1. p. 213.* excl. syn. Matth. Ten. Nap. 4. p. 309., et Syll. p. 255. n. 2.
- T. europæa* Bull. Herb. de la Franc. t. 175. All. Ped. 2. p. 94. B. excl. syn. Matth. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 250., et 389. excl. plur. syn. Comoll. prodr. p. 103. a.
- T. mollis* Spach. in Ann. des scienc. nat. sec. ser. tom. 2. p. 336. tab. 15. f. 6.
- T. triflora* Puer. in. Horn. Cat. 2. p. 493.*
- T. n.* 1030. a. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 1.
- T. silesiaca*, folio maximo, varie et profunde secto, fructu subrotundo, anguloso et lanuginoso Mich. in Till. Cat. hort. Pis. p. 165.
- T. folio majore*, quæ mas Agost. De re bot. p. 362.
- T. maximo folio* Segui. Sup. p. 293. J. Bauh. Hist. pl. 1. lib. 8. p. 137. fig.
- T. vulgaris platyphyllos* J. Bauh. l. c. p. 133. fig. fol. minorib.
- Ital. Tiglio d' Olanda. Tiglio nostrale Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 226.
- Arb. Legi Bononiæ all' Eremo; et a Zolla predosa alla Ca-bianca, in primo loco forte culta. Habui ex districtu Bassanensi in sylvis di Vallerana, et Campese a MONTINO, ex pineto Ravennati ad Classem a DAL-LACATA, ex Piceno in monte Volubrio a MARZIALETTO, et a Cavaceppo ab ORSINO, ex Montamiata in provincia Senensi ab Eq. Prof. CAJ. SAVIO, ed ad balnea S. Philippi a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO: Floret Junio. Disert. a præcedente ramis junioribus plerumque pubescentibus, foliis sæpe, non semper, grandioribus, supra

pilosis, margine plus minus ciliatis, subtus pubescentibus, præsertim in nervis, et venis, et subinde in his tantum; ludunt quoque utrinque fere glabrata. Spongiosæ in axillis venarum exiguæ, pallentes. Petioli pubescentes, quandoque glabrati. Pedunculi longiores. Umbella sæpe simplex, triflora, rarius composita, radiis subbifloris. Bracteolæ lineares ad basim pedicellorum, citissimæ diffusæ. Flores paulo grandiores. Corolla albidæ. Stamina corolla longiora. Nux grandior, cortice duro, lignoso, turbinato-ovata, acuta, albotomentosa, exquisite quinquecostata. Ludit costis quatuor, vel sex.

Cum folia, petioli, et rami juniores hujus speciei glabrescunt, ægre distingueretur a *Tilia europæa* L., nisi capsula evidentissime eam patefaceret. *Tilia triflora* Puer. juxta exemplar autopticum, quod obtinui ab auctore, est ipsamet *Tilia grandifolia* Ehrh.

3. *TILIA parvifolia*: foliis firmis, argute serratis, basi cordatis, truncatisve, utrinque glabris, subtus glaucis, albis, axillis venarum ferrugineo-spongiosis; umbellis compositis, multifloris; nuce chartacea, subrotunda, pubescente, obscure costata.

T. parvifolia Ehrh. Beitr. v. 5. p. 159. Smith. Engl. Fl. 3. p. 20., et Engl. bot. v. 24. t. 1705. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 259. Coll. Herb. Ped. 1. p. 443. n. 1. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 36. Koch. Syn. p. 133. Reich. Exc. 3. p. 828. n. 5137. Host. Austr. 2. p. 62.

T. europæa Fl. Dan. t. 553. Plenck. Ic. pl. med. 5. p. 36. t. 424. All. Ped. 2. p. 94. n. 1626. A. excl. syn. Balb. Taur. p. 86. Re Seg. p. 44. Birol. Acon. 1. p. 180. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 250., et 389. excl. nonnull. syn. Comoll. Prodr. p. 103. β.

T. microphylla Vent. in Mém. de l'Inst. mathém. et phys. tom. 4. p. 5. tab. 1. f. 1. excl. syn. Linn. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 825., et Prodr. 1. p. 513. n. 1. Re Tor. 1. p. 278. Pollin. Ver. 2. p. 188. Sav. Tratt. degli alb. ed. 2. tom. 1. p. 214., et Bot. Etr. 1. p. 252. Ten. Nap. 4. p. 310., et Syll. p. 255. n. 1. Gaud. Helv. 3. p. 441.

T. crispissima Spad. Xil. 3. p. 212.* herb., ubi est sub nomine *Tilia xyloborricos*, quod sonat lignum crispum.

T. ulmifolia Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 374.

T. sylvestris Spach. in Ann. des scienc. nat. ser. sec. tom. 2. p. 333. tab. 15. fig. 7.

T. n. 1030 β. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 1.

Tilia femina Matth. Valgr. 1585. tom. 1. p. 191. fig.

T. Calz. Viag. di mont. Bald. p. 10.

T. arborea Calz. l. c. p. 11.

T. Bohemica, foliis minoribus, glabris, fructu oblongo, utrinque acuminato, minime costulato Mich. in Till. Cat. hort. Pis. p. 165. t. 49. f. 3. in herb. Vaill. ex Vent.

T. folio minore, flore albo, quæ fœmina Agost. De re bot. p. 362.

T. femina, folio minore Segui. Ver. 2. p. 295.

T. folio minore J. Bauh. Hist. pl. 1. lib. 8. p. 137. fig.

Ital. Tiglio maremmano. Tiglio riccio. Tiglio salvatico Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 226.

Arb. Legi a Caprino contra Lugano in Insubria Helvetica. Filius attulit ex Apennino Pistoriensi a S. Pellegrino Cassero. Habui ex Tyroli meridionali in monte Ritten prope Bolzano ab Eq. DE HEUFLERO, ex montibus Bassanensibus ab Eq. PAROLINIO, et in sylvis della Campesana, et Vallerana a MONTINIO, ex rupestribus calcariis del Carso circa Basovizza a TOMMASINIO, ex Piceno a Sasso a MARZIALETTO. Floret Junio.

Differt a præcedentibus duabus notis sequentibus. Caulis, et rami glabri. Folia multo minora, substantiæ durioris, basi æqualiter, vel oblique cordata, et subinde truncata, integra, reliquo margine crebre, argute, et inæqualiter serrata, longiuscule cuspidata, supra glabra, nitida, atrovirentia, subtus glauco-albentia, et pariter glabra, spongiolis latiusculis, saturate ferrugineis in axillis venarum, inque eadem pagina sæpe *Erineo tiliaceo* Pers. infestata. Petioli longiusculi, glabri. Umbella composita, multiflora. Flores minores, fragrantissimi. Petala luteola, ovarium exiguum, depressum, dense tomentosum. Nux ovoidea, parva, cortice chartaceo, apice, et basi angustata, sordide pubescens, in statu perfecto magis oblongata, rostrata, et fere denudata.

Smithins in Engl. Fl. 3. p. 21. tribuit huic speciei *broad hairy blotches scattered over the surface* in pagina inferiore foliorum, nec novit esse *Erineum tiliaceum* Pers. hic loci parasiticum, non partem propriam folii.

Usus. Lignum Tiliarum omnium leve, facile poliendum, præstans ad jugum aratri:

ceditur et Tilia ante jugo levis.

Virg. Georg. lib. 1. v. 173.

Flor. Ital. T. V.

Idem lignum facile tornari, et scalpi potest:

*Nec tiliæ leves, aut torno rasile buxum
Non formam accipiunt, ferroque curvantur acuto*

Virg. Georg. lib. 2. v. 449-450.

Apes prædiligunt flores Tiliarum, et nectar hauriunt ad
mel conficiendum:

*pascuntur et arbuta passim
Et glaucos salices, casiamque crocumque rubentem
Et pinguem tiliam.*

Virg. Georg. lib. 4. v. 181-183.

Ob hano florum suavitatem elegantissimus Fenelonius
Tiliis ornavit insulam Caplypsus: « d'un autre côté on
« voioit une riviere où se formoient des isles bordées
« de tillieuls fleuris, et de hauts peupliers qui por-
« toient leurs têtes superbes jusques dans les nuées ».
Telem. (éd. de Paris 1730. 4.^o) liv. 1. p. 6.

CISTUS.

*Lin. Gen. p. 271. partim. Tourn. Inst. 2. t. 136. Juss.
Gen. p. 294. Lamck. Ill. 5. t. 477. fig. 2. 3. excl.
reliq. Vent. Tabl. 3. p. 220. Gærtn. De fruct. 1.
p. 370. t. 76. Smith. Engl. Fl. 3. p. 22. partim. De
Cand. Prodr. 1. p. 263. Endlich. Gen. p. 904. n. 5028.
Spach. in Ann. des scienc. nat. sér. sec. tom. 6. p. 367.*

Ladanium Spach. l. c. p. 366.

Rhodocistus Spach. l. c. p. 367.

Stephanocarpus Spach. l. c. p. 368.

Ledonia Spach. l. c. p. 369.

Calyx perianthium liberum, pentaphyllum, folio-
lis duobus externis. Corolla pentapetala, patens,
plana, petalis subrotundo-obovatis, ungue bre-
vi. Stamina numerosa, corolla breviora, fila-
mentis filiformibus, antheris ovatis, biloculari-
bus, incumbantibus. Ovarium subrotundum. Sti-
lus rectus, subinde brevissimus, vel nullus. Sti-
gma capitatum. Capsula calyce connivente tecta,
dura, complete quinquelocularis, rarius decemlo-
cularis, dehiscens valvis quinque, vel decem, ere-
cto-patulis, concavis. Dissepimenta medio valva-
rum hærentia. Semina plura, utrinque opposita,

vel alterne affixa oræ internæ dissepimentorum
ope pedicelli funicularis, arcte arillata, ovoideo-
trigona.

Observ. Si volumus discernere hoc in plura genera,
et petere differentiam eorum a forma embrionis,
incidimus in genera artificialia a caractere pe-
tita, quæ scientiam reddunt difficillimam præ-
sertim tyronibus.

Habitus. Frutices, vel suffrutices. Folia opposita,
exstipulata, integra, aut subdentata. Flores so-
litarii, racemosi, umbellati, corymbosi. Corolla
rosea, aut alba plerumque basi maculata.

Ord. nat. Rotacæ *Lin. Ord. nat. n. XX., et Præl. p. 346.*
Cisti Juss. Gen. p. 294. Smith. Gramm. p. 156. Cistoidem Vent. Tabl. 3. p. 219. Cistineæ De Cand. Prodr. 1. p. 263. Barth. Ord. nat. p. 282. Cistæ Rich. Fam. nat. in Él. de bot. éd. 5. p. 191. Schultz. Nat. syst. p. 446. Spach. Consp. Cist. in Ann. des scienc. nat. sér. sec. tom. 6. p. 358.

1. *Cistus monspeliensis*: caule erecto, foliis sessilibus,
lanceolatis, linearibusve, rugosis, margine revolutis;
racemis secundis, hirsutis.

C. monspeliensis Sp. pl. p. 737. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 363., et Fl. Græc. 5. p. 75. t. 493. Jacq. Collect. 2. p. 120. t. 8. Cav. Ic. 2. p. 31. t. 137. All. Ped. 2. p. 101. n. 1654. Coll. Herb. Ped. 1. p. 242. n. 9. Sav. Pis. 1. p. 9., et Bot. Etr. 2. p. 127. Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 176. Ten. Nap. 1. p. 294., et Syll. p. 256. n. 1. Ab Ucr. Hort. Pan. p. 223. Guss. Fl. Sic. prodr. 1. p. 13.,* et Sup. 2. p. 176.* Presl. Sic. 1. p. 117. Moris. Sard. 1. p. 198.* Moris. et De Not. Capr. p. 18.* Boiss. Voyag. en Esp. 2. p. 59. Desf. Atl. 1. p. 409. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 814.,* et Prodr. 1. p. 265. n. 19.* Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 38. Koch. Syn. p. 79. Reich. Exc. 3. p. 716. n. 4561., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 8. Cist. t. 37. f. 4561. Host. Austr. 2. p. 54.*

C. affinis Bert. in Guss. Fl. Sic. prodr. 2. p. 12., et Sup. 2. p. 175.* Ten. Nap. 4. p. 311. Sang. Cent. p. 75.**

C. florentinus Lamck. Enc. méth. bot. éd. de Pad. 2. p. 17. n. 18. De Cand. Prodr. 1. p. 265. n. 18.

Ladanium Cæsalp. De pl. lib. 15. cap. 16. p. 575.

Ladon Cord. in Gesn. Op. bot. ed. Schmied. par. 1. p. 14. ex loco.

Cistus ladanifera Monspelienſium *Cup. Hort. Cath. p. 5a.*

Mich. Cat. hort. Flor. p. 27. n. 4.

C. ladanifera, Florentina, foliis rugosioribus, et paulo angustioribus *Mich. in Till. Cat. hort. Pis. p. 4a.*

Lodon V. Clus. Hist. pl. lib. 1. p. 79. fig.

Ital. *Brentine. Cisto. Imbrentano. Imbrentine. Mucchio.*

Mustio. Pisciacane. Rimbretano. Rimbrentine. Tigna-

mica Tignamicone Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 61.

Frut. Frequens in ora maris mediterranei, inque insulis nostris, nec respuit loca a mari remota. Legi in insulis Palmaria, et Tyro Portus Lunæ, et in monte S. Juliani supra thomas Pisanas. Habui ex Liguria occidua in sylvis di Pegli a Prof. DE NOTARIS, et a RAINERO, ex Istria ad Polam a BIASOLETTO, et in insula S. Andræ prope Rovigno a TOMMASINIO, ex monte Pisano a Cucigliana ab AMIDEO, ex agro Florentino a Trespiano, et al Pian di Mugnone a PIRAZZO-LIO, in latere meridionali montis Fesulani, ubi legerat Cordus, a BARONIO, a Careggi a VANDERLINDE-
NIO, in monte Rinaldo prope Fesulas, a S. Martino alla Palma, a Poggio Corneto alla Sassetta in Maremma a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTO, a Cala di Forno, et in monte Argentario proximo a Prof. GIULIO, et ab Eq. PAROLINIO, Centumcellis a BARBIERIO, Centumcellis, et Ostiâ a Prof. MAURIO, Terracinâ ab eodem, et a FIORINIA-MAZZANTIA, ex monte supra Cajetam iterum a FIORINIA-MAZZANTIA, ex radicibus meridionalibus Gargani, ex viciniis Panormi, et ex insulis Ericusa, et Lopadusa ab Eq. GUSONIO, iterum Panormo a Gibilrossa a TODARO, Capreis a Prof. GIRALDIO, ex insulis Montecristo, Giannutri, et Gorgonia a Prof. GIULIO, ex Capraria, et ex Sardinia in dumetis Calaritanis ab Eq. Prof. MORISIO, et a Prof. DE NOTARIS, ex Corsica a Bastia a SOLEIROLLO. Floret Majo, Junio.

Radix ramosa, fusca. *Caulis* teres, erectus, ab uno ad tres, quatuorve pedes longus, brachiatus, aut interdum ramis alternis, opposito abortientio, rubens, inferne glabratus, superne plus minus pubescens, aut villosus, viscosusque. *Folia* opposita, sessilia, lanceolata, lanceolato-linearia, vel linearia, acuta, aut acutiuscula, margine revoluta, integra, supra intente viridia, rugosa, pilosa, subtus pallidiora, tri-quinque-nervia, et exquiste reticulato-venosa, pubescentia, pilis aliis stellulatis in superficie, aliis longioribus,

simplicibus in nervis, venisque, viscosa, superiora plerumque basi paulo latiora. Stipulæ nullæ. Racemi terminales cauli, ramisque, solitarii, simplices, secundiflori, nubiles apice recurvi, nunc, et sæpius longo pedunculati, nunc breviter, et quandoque etiam sessiles, hirsuti pilis patulis, ebracteati, viscosi. Calycis foliola hirsuta, viscosa, subcordato-ovata, ovata, ovato-lanceolata, et etiam lanceolata, semper acuminata, exteriora internis paulo longiora, aut æqualia. Flos potius parvus. Corolla alba, calyce longior, etiam duplo, petalis obovatis, integris, vel subemarginatis, subcrenatis, basi luteo-maculatis. Antheræ oblongæ, flavæ. Stilus brevissimus, et quandoque nullus. Stigma capitatum, quinquelobum, lobis conniventibus. Capsula calyce brevior, ovoideo-pentagona, apice pilis stellulatis adpersa, cæterum glabra, quinquelocularis, quinquevalvis. Semina parva, triquetra, fusca, sub vitro scabrida, placentæ oppositæ affixæ.

Tota planta resinosa, odore *Rosmarini officinalis* L. intense pollens.

2. *Cistus incanus*: foliis obovato-spathulatis, rugosis, uninerviis, villosis-incanis, petiolis trinerviis, basi latioribus, vaginantibus; pedunculis subunifloris; calycibus dense sericeis.

C. incanus *Sp. pl.* p. 737. herb. ex Guss. *Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr.* 1. p. 363., et *Fl. Græc.* 5. p. 76. t. 494. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 177.* fol. superior. angustis. *Reich. Exc.* 3. p. 716. n. 4566., et *l.c. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 8. *Cist.* t. 39. f. 4566.

C. villosus *Sav. Bot. Etr.* 2. p. 125.* *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 176.* *Ten. Nap.* 4. p. 310., et *Syll.* p. 256. n. 3. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. p. 10., et *Sup.* 1. p. 174. a. b.* *Presl. Sic.* 1. p. 114. *Moris. Sard.* 1. p. 195.* *Desf. Atl.* 1. p. 408. herb. ex Guss. *De Cand. Prodr.* 1. p. 264. n. 5. a. *Lois. Desl. Not.* p. 85.*

C. eriocephalus *Viv. Fl. Cors. diagn.* p. 8. *De Sal. in Bot. zeit. ann.* 1834. p. 74.*

Alterum genus *Cisti* in arenosis maritimis *Cæsalp. De pl. lib.* 15. cap. 15. p. 574.

Cisto maschio *Ang. Sempl.* p. 61. ex loco.

Cistus mas folio subrotundo hirsutissimo *Cup. Sup. alt.* p. 19.

- β herba viridior, pilis brevioribus rarioribus adpersa.

Cistus villosus (*err. pilosus*) *Sp. pl.* p. 736., et *Mant. alt.* p. 402. *Reich. Exc.* 3. p. 716. n. 4567., et *l.c. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 8. *Cist.* t. 40. f. 4567.

C. villosus β *De Cand. Prodr.* 1. p. 264.

Cisto maschio Matth. Valgr. 1585. tom. 1. p. 194. fig.

Ital. Cisto. Cisto maschio. Cisto rosso. Rosalaio Targ. Tozz.
Diz. bot. 2. p. 61.

Frut. Legi in litore Lunensi alla Marinella, et in insula Palmaria Portus Lunæ. Habui ex Istria ad Polam a Prof. VISIANIO, et in insula S. Andræ prope Rovigno a TOMMASINIO, ex maritimis Tergestinis a BIASOLETTO, ex ora circumpadana prope Magnavacca a DALLAGATA, ex monte Anconitano ab Eq. NARDUCCIO, ex districtu Maceratensi a Prof. UTILI, ex agro Camerinensi a Prof. OCTAVIANIO, et al Ponte della trave a MASQUILLIERIO, ex Piceno ad portum S. Elpidii a Rev. Fratre MAURITIO DE BRIXIA, a Montefortino a MARZIALETTIO, Interamnâ in rupibus ad Narem a FIORINIA-MAZZANTIA, ex districtu Pistoriensi in sylvis prope Serravalle a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, in collibus agri Florentini ab Eq. RICCASOLO, ex maritimis Etruriæ ab Eq. Prof. CAS. SAVIO, Volaterris in valle S. Margaritæ ab AMIDEO, ex provincia Senensi a Montecalvi alla Sassetta a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, ad balnea di Vignoni, a Montalcino, et in viciniis Senarum in sylva del Mattioli, et della Monaca a Prof. GIULIO, ex agro Viterbiensi a CAMILLIO, ex via inter Etruriam, et Romam a BRUNNERO, Româ in collibus ad urbem a Prof. MAURIO, Ostiâ ab eodem, et a BARRIERIO, ex litore Terracineni a FIORINIA-MAZZANTIA, ex arenis circa Acherusiam a RAINERO, ex radicibus Taburni, ex collibus Panormitanis, et ex insulis Phœnicusa, et Didyme ab Eq. GUSSONIO, Capreis a Prof. GIRALDIO, ex Sardinia in pascuis maritimis, et montanis ab Eq. Prof. MORISIO, in collibus d' Iglesias a Prof. DE NOTARIS, ex Corsica prope Bastia a DE SALIS. Varietatem β accepi ex montibus Faventinis a Campra prope Brisighella a TASSINARIO, ex Etruria in montibus supra Ponte a Sieve a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO. Floret Majo, Junio.

Radix ramosa. Caulis teres, erectus, vel, abolito caule principe, cespitosus, decumbens, adscendens, inferne rubens, glabratus, superne incano-villosus, villis aliis longioribus, fasciculatis, aliis brevioribus interjectis stellatis, a spithama ad duos, vel tres pedes longus. Rami brachiati, subinde alterni, opposito abortiente. Folia petiolata, opposita, rugosa, incano-tomentosa, tomento stellato, densiore in pagina inferiore, ideo

supra magis virentia, subtus uninervia, crebre reticulato-venosa, in nervo, et venis villosa, margine integra, plana, vel quidquam undulata, inferiora subrotunda, obtusa, et quandoque retusa, superiora obovato-spathulata, acuta, suprema subinde angustiora, et sæpe etiam longiora, lanceolata, acuminata. Petioli dilatati, trinervii, margine revoluti, basi sua caulem amplexantes, et sæpe inter se connati. Pedunculi potius breves, uniflori, rarius biflori, solitarii, vel duotres umbellati in apice caulis, et ramorum, sæpe cum axillaribus proximis solitariis, unifloris, incano-tomentosi more foliorum, nudi, vel bracteolis duabus, oppositis, exiguis paulo infra florem instructi. Calyx villo longo, sericeo, denso, incano tectus, et magis in basi, interjectis pilis brevissimis, stellatis, rarius denudatus. Calycis foliola ovata, longe acuminata, præsertim interiora, quæ nunc paulo longiora, nunc externis æqualia. Corolla grandis, rosea. Petala obovata, subcrenata, et subinde emarginata, calyce etiam duplo, et quidquam ultra longiora. Ovarium villosissimum. Stylus rectus, longitudine staminum, superne crassior. Stigma depresso-capitatum. Capsula ovoideo-pentagona, villosa, demum fusca, calyce paulo brevior, quinquelocularis, quinquevalvis, hians valvis erectis. Semina parva, obtuse trigona, lævia, ferruginea. Herba tam inter digitos fricata, quam in ignem injecta omnino inodora.

Varietas β est minus villosa, et potius pilis brevibus, rarioribus birta, hinc tota herba viridior. Calyces quoque minus villosi, pilis multo brevioribus adpersi. Reliqua ut in specie.

Nonnulli botanicorum, qui inciderunt in formam præditam foliis superioribus angustis, lanceolatis, acuminatis, putarunt, hanc solam respondere *Cistò incano* L., et retulerunt formam foliis latioribus ad *Cistum villosum* L., quamvis utraque sit æque incano-villosa, et eandemque speciem sistat; imo exemplar herbarii Linnæani, et figura Floræ Græcæ superius allata ostendunt, verum *Cistum incanum* inniti plantæ foliis latioribus pollenti.

3. *Cistus creticus*: pilosus, foliis petiolatis, inferioribus ovatis, superioribus ovato-lanceolatis, acuminatis, margine crispo-undulatis, petiolis uninerviis; pedunculis unifloris.

C. creticus *Sp. pl. p. 718.* herb. ex *Guss. Sibth. et Smith.*

- Fl. Græc. prodr.* 1. p. 364., et *Fl. Græc.* 5. p. 77. t. 495. herb. ex Guss. *Jacq. Collect.* 1. p. 80., et *Ic. rar.* t. 95. *Ten. Nap.* 4. p. 30., et *Syll.* p. 256. n. 5. Guss. *Fl. Sic. prodr.* 2. p. 10.,* et *Sup.* 2. p. 175.* *De Cand. Prodr.* 1. p. 264. n. 6. α. β. Röhl. cum Koch. *Deuts. Fl.* 4. p. 39. Koch. *Syn.* p. 79. Reich. *Exc.* 3. p. 717. n. 4568., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 8. Cist. t. 40. f. 4568. fol. plurim. late ovatis. *Host. Austr.* 2. p. 53. *G. garganicus* *Ten. Nap.* 4. p. 311. t. 235. f. 1.,* et *Syll.* p. 256. n. 6.* *Gasp. Descr. delle isol. di Trem.* p. 18.* *G. undulatus* Reich. *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 8. Cist. t. 38. f. 4564. b.
- G. ledon* sive viscosus, salvifolius, crispus purpureus humilis *Cup. Sup. alt.* p. 19.
- G. ladanifera*, Cretica, flore purpureo *Tourn. Coroll.* p. 19. herb. ex Guss. *Buxb. Cent.* 3. p. 34. t. 64. f. 1.
- Ladanum creticum* *Alp. Exot.* p. 89. fig. p. 88.
- Ital. *Ladano*. *Ladano di Creta*.
- Offic. *Ladani gummi* Lin. *Mat. med.* p. 92. n. 263.
- Frut.* Habui ex Gargano ab Eq. Prof. TENORIO, ex insulis Diomedeis proximis a GASPARRINIO, ex Calabria a BOVA, et ex Sicilia ab Eq. GUSSONIO, ex collibus siccis Panormitanis a TONANO, et ex collibus inter Avo-la, et Noto a Prof. BALSAMO-CRIVELLIO. Floret Majo, Junio.
- Caulis teres, erectus, ramosissimus, brachiatus, pilosus, pilis patentibus, solitariis, aut fasciculatis, interjectis pilis brevioribus, stellatis, rubens, bipedalis, et etiam quidquam ultra. Folia opposita, longiuscule petiolata, exstipulata, margine exquisite crispo-undulata, hirta pilis brevibus, stellatis, viridia, supra rugosa, subtus crebre reticulato-venosa, uninervia, inferiora late ovata, obtusa, superiora angustiora ovato-lanceolata, acuminata; quandoque sere omnia ovata. Petioli angusti, basi quidquam dilatati, longiusculi, subtus uninervii, margine revoluti, hirti, liberi, vel superiores inferne brevi tractu eonnati. Pedunculi terminales, breves, solitarii, vel duo-tres umbellati, uni-biflori, villosi, villis patentibus. Calyx virens, basi pilosus, superne hirtus, foliolis ovatis, longe acuminato-cuspidatis, multinerviis, internis subinde paulo longioribus. Corolla grandis, rosea, calyce duplo, et ultra longior, petalis obovatis, plus minus emarginatis. Anthera ovata. Stylus rectus, longitudine staminum, apice crassior. Stigma depresso-capitatum. Capsula ovoideo-pentagona, villosa,

quinquelocularis, quinquevalvis, ut in præcedentibus. Semina parva, trigona, ferrugineo-rubida, sub forti vitro scabra. Villositas plantæ albida. Planta inter digitos fricata, vel in ignem injecta gratum odorem fundens. Guttulæ concretæ ladani, albæ, semidiaphanæ interdum hærent apici pilorum, et superficiiei plantæ superioris, et ita est in meo exemplari ex insulis Diomedeis.

Ex duplici aspectu, quem species hæc more *Cisti incani* L., cui valde proxima est, assumit, scilicet foliis fere omnibus late ovatis, vel superioribus pluribus ovato-lanceolatis, perperam in species duas discerpta fuit.

Usus. Cretenses ladanum colligunt ex hac planta ad usum suffitum odoratorum, et medicinæ, in qua quidem præstat in dysenteria, et catharro, licet apud nos nunc vix in usu.

4. *Cistus albidus*: erectus, tomentosus; foliis oppositis, sessilibus, oblongo-lanceolatis, inferne trinerviis, superioribus acutiusculis; pedunculis subunifloris, geniculatis.

C. albidus *Sp. pl.* p. 737. *Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr.* 1. p. 363. *Atl. Ped.* 2. p. 102. n. 1658. *Pollin. Ver.* 2. p. 179.* *Moris. Sard.* 1. p. 169.* *Boiss. Voy. en. Esp.* 2. p. 59. *Desf. Atl.* 1. p. 411. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 818., et *Prodr.* 1. p. 264. n. 10. *Reich. Exc.* 3. p. 716. n. 4565., et *1c. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 8. *Cist. t.* 39. f. 4565.

C. mas I. *Clus. Hist. pl. lib.* 1. p. 68. fig.

Ital. Nasc.

Frut. Legi Sarzanæ in monte *Caprione*, ubi copiosus, et in Lunæ portu ad arcem S. Theresiæ. Habui ex Liguria occidua ab Eq. *Riccasolo*, ex pascuis agri Nicæensis ab Eq. Prof. *Morisio*, ex collibus Bonacensibus a *Pollinio*. Floret Majo.

Frutex erectus, totus tectus tomento albido, brevi, denso, stellato. Caulis teres, brachiatus, uni-bipedalis. Folia opposita, sessilia, oblongo-lanceolata, ima obtusa, reliqua acutiuscula, integerrima, plana, subtus exquisite reticulato-venosa, inferne trinervia, et, dum latiora, quinque-septemnervia. Flores terminales, pedunculati, solitarii, vel duo-tres umbellati, subinde cum uno, alterove flore solitario in axillis proximis. Pedunculi ad medium, aut infra medium geniculati. Calycis foliola grandia, ovata, acuminata, longitudine subæqualia. Corolla grandis, rosea, subcrenata, calyce

longior. Stylus longitudine staminum, aygmoideus, apice crassior. Stigma depresso-capitatum, quadrilobum. Capsula ovoideo-pentagona, calyce brevior, villosa. Semina ovata, obtuse trigona, sub vitro scabra, fusce ferruginea.

5. *Cistus crispus*: villosus, decumbens; foliis sessilibus, lanceolatis, trinerviis, margine crispo-undulatis; floribus subsessilibus.

C. crispus *Sp. pl.* p. 738. *Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr.* 1. p. 364. *Cav. Ic.* 2. p. 57. t. 174. *All. Ped.* 2. p. 102. n. 1659. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 241. n. 5. *Bert. Lucubr.* p. 8. n. 23. *Ab. Ucr. Hort. Pan.* p. 223. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 11.* *Presl. Sic.* 1. p. 115. *Boiss. Voy. en. Esp.* 2. p. 59. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 811,* et *Prodr.* 1. p. 264. n. 9.* *Reich. Exc.* 3. p. 716. n. 4564., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 8. *Cist. t.* 38. f. 4564.

C. mas foliis *Chamædrys* *Cup. Hort. Cath.* p. 51.

C. ledon foliis undulatis et crispis, humilis *Bonnan. Panph. tab.* 10.

C. mas *V. Clus. Hist. pl. lib.* 1. p. 69. fig.

Ital. Cisto crespo.

Frut. Habui ex collibus Messanensibus ab *Eq. Gussone*. Floret Aprili, Majo.

Caulis teres, decumbens, ascendens, villosus, pilis aliis longis, simplicibus, patentibus, aliis brevissimis, stipatis, stellatis, alterne, vel opposite ramosus, ramis inferioribus plerumque abortivis, subpedalis. Folia opposita, sessilia, oblongo-lanceolata, vel etiam ovato-lanceolata, margine crispo-undulata, tri-quinque-septemnervia, supra saturate viridia, rugosa, hirtaque pilis brevissimis, stellatis. interjectis pilis simplicibus, longioribus, raris, subtus reticulato-venosa, pallidius virentia, densius hirta pilis stellatis, pilis longioribus simplicibus, vel geminatis paucis, inferiora acuta, suprema angustiora, acuminata. Flores subsessiles, terminales, pauci, fasciculati, subinde cum axillaribus proximis, solitariis. Foliola calycina lanceolata, acuminata, nervosa, hirta, et pilosa more foliorum. Corolla purpurea, quam in præcedente minor, petalis obovatis, eroso-crenatis. Herba viscida, odoris grati.

6. *Cistus salvifolius*: erectus, decumbensve, hirtus; foliis ovatis, petiolatis; pedunculis subunifloris, elongatis, articulatis, solitariis; floribus nubilibus nutantibus.

C. salvifolius *Sp. pl.* p. 738. *Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr.* 1. p. 364., et *Fl. Græc.* 5. p. 78. t. 497. *Jacq.*

- Collect.* 2. p. 120. t. 8. *Cav. Ic.* 2. p. 31. t. 137. *All. Ped.* 2. p. 101. n. 1655. *Re Seg.* p. 44. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 243. n. 12. *Comoll. Prodr.* p. 103. *Pollin. Ver.* 2. p. 180. *Nacc. Ven.* 3. p. 81.* *Suffr. Foroj.* p. 149. *Bert. Mant. Fl. Apuan.* p. 33. n. 52. *Sav. Pis.* 2. p. 10., et *Bot. Etr.* 2. p. 126. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 177.* *Ten. Nap.* 1. p. 294., et *Syll.* p. 256. n. 2. *Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 223. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 11., et *Sup.* 2. p. 175. *Presl. Sic.* 1. p. 116. *Moris. Sard.* 1. p. 197.* *Moris. et De Not. Capr.* p. 17.* *Boiss. Voy. en Esp.* 2. p. 59. *Desf. Atl.* 1. p. 410. *De Cand. Prodr.* 1. p. 265. n. 16. α . β . γ .* *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 38. *Koch. Syn.* p. 79. *Reich. Exc.* 3. p. 716. n. 4559., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 8. *Cist.* t. 36. f. 4459. *Gaud. Helv.* 3. p. 44a.
- C. salvifolia* *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 374.
- C. salviefolius* *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 813. α .* *Host. Austr.* 2. p. 53.
- C. sideritis* *Presl. Sic.* 1. p. 116. pl. macrior.
- C. corbariensis* *Reich. Exc.* 3. p. 716. n. 4560., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* v. 3. p. 8. *Cist.* t. 36. f. 4560.
- C. n.* 1031. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 2.
- Cisto femina* *Dur. Herb. ed. Rom.* p. 137. fig. *Ang. Sempl.* p. 61.
- Cistus Casalp.* *De pl. lib.* 15. cap. 15. p. 574.
- C. femina folio* *Salvis Cup. Hort. Cath.* p. 51. excl. var. fl. purp.
- C. femina flore albo* *Castell. Hort. Mess.* p. 7.
- C. Salvis folio*, elatior, et rectis virgis *Zannich. Opusc. posth.* p. 24.
- C. femina* *Clus. Hist. pl. lib.* 1. p. 70. fig. *Cord. in Gesn. Op. bot. ed. Schmied. par.* 1. p. 4.
- Ital. Brentine. Cisto. Cisto femina. Muccoli. Scornabecco. Spazzaberette* *Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 61.
- Frut. Copiosus in sylvis Italis. Legi Sarzanæ in Montedarme, in Lunæ portu in insula Tyro, Genus in sylvis supra Marassi, Bononiæ al Farnè. Filius attulit ex subalpinis Apuanis a Fornole. Habui ex Apennino de' Giovi prope Genuam a RAINERO, ex agro Nicænsi ab Eq. Prof. MORISIO, ex provincia Bergomensi supra Villa d'Adda a BERGAMASCHIO, ex insula S. Andree prope Rovigno ad Istriam, et ex sylvis Tergestinis inter Opicina, et Roiano a TOMMASINIO, et a BIASOLETTO, ex Euganeis prope Praggia, et Torreglia a MONTINIO, et prope Este a RAINERO, Fossâ Clodiâ a Prof. NACCARIO, ex Piceno in rupestribus di Grottamare,*

et Asculo ab ORSINO, a Montefortino a MARZIALETTO; ex Etruria in sylva della Doccia ab Eq. RICCASOLO, a Serravalle prope Pistorium, a Monte Rinaldi prope Fesulas, a S. Martino alla Palma in collibus Florentinis, a Campiglia in Maremma a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, Senis in sylva del Mattioli, et della Monaca a Prof. GIULIO, in monte Argentario ab Eq. PAROLINIO, Ostiâ a BARBIERIO, Româ alla Valle dell'inferno a Prof. MAURIO, et a MASQUILLIERIO, Terracina a FIORINIA-MAZZANTIA, Capreis a Prof. GIRALDIO, ex Sicilia in collibus siccis Panormitanis a TODARO, a Biscari ab Eq. PAROLINIO, ex Ericusa ab Eq. GUSSONIO, ex Capraria ab Eq. Prof. MORISIO, et a Prof. DE NOTARIS, ex Sardinia in pascuis ad Calarim ab eodem Prof. DE NOTARIS, ex Corsica a Calvi a SOLERIO. Floret Aprili, Majo.

Caulis teres, erectus, subinde decumbens, brachiatus, rubens, inferne senio glabratus, superne hirtus, pilis brevibus, fasciculato-stellatis. Folia opposita, petiolata, ovata, vel elliptica, obtusa, aut superiora acuta, integra, vel denticulata, denticulis pilo stellato terminatis, supra læte viridia, rugosa, hirta, pilis brevibus, fasciculato-stellatis, subtus uninervia, valde reticulato-venosa, albida, densius eisdem pilis hirta, et juniora tomentosa. Pedunculi laterales, solitarii, axillares, approximati, et sæpe numerosi, elongati, unibiflori, canescenti-hirti, pilis stellatis, inferne bracteati, bracteis foliaceis, parvis, oblongis, oppositis, conjugationibus una-tribus, approximatis, superne longo tractu nudi, aliqua a flore distantia articulati. Flores grandes, nobiles nutantes. Calyx virens, hirtus, pilis stellatis, foliolis externis latioribus, cordato-ovatis, acutis, internis acuminatis, utrisque longitudine subæqualibus. Corolla calyce longior, alba, basi luteo-aurea, sicca tota lutescens. Petala obovato-cuneata, crenulata, interdum subemarginata. Stamina lutea, antheris oblongis. Stigma sessile, globosum, fungosum. Capsula calyce brevior, subrotundo-pentagona, obtusa, villosa, quinquelocularis, quinquevalvis. Semina grandiuscula, globoso-trigona, scabra, matura, et sicca arcte obducta arillo reticulato-rugoso. Foliola calycina, dum capsula matura siccatur, flavescent, et demum decidunt.

7. *Cistus complicatus*: caule ramosissimo, patulo; foliis subrotundo-ovatis, obtusiusculis, albo-tomentosis,

conduplicatis, basi trinerviis, petiolis æqualibus; corymbis terminalibus, subtrifloris, brevissime pedunculatis, stigmate sessili.

C. complicatus Lamck. *Enc. méth. bot. éd. de Pad.* 2. p. 14. n. 5. *Pers. Syn. pl.* 2. p. 75. n. 16. *Guss. Sup.* 2. p. 174.*

C. folio rotundiore, incano, quasi complicato *Tourn. Coroll.* p. 19.

C. folio rotundiore, quasi complicato, *Cycladum Tourn. Herb. in Mus. hort. Paris. ex Guss.*

Ital. *Cisto felpato*.

Frut. Habui ex *Lopadusa* ab *Eq. Gussone* 10. Floret Aprili, Majo.

Caulis teres, erectus, ramosissimus, brachiatus, ramis patulis, fusce rubens, inferne glabratus, superne stipate tomentosus, tomento stellato, albo, interjectis pilis paulo longioribus, fasciculatis. Folia opposita, breviter petiolata, parva, ovata, obtusiuscula, conduplicata, integerrima, margine plana, albo-tomentosa, sed densius, et albidius in pagina inferiore, dum in superiore ex albo virent, subtus reticulato-venosa, et basi trinervia. Petioli breves, ab imo ad summum æquales, nec basi dilatati, dense tomentosi. Corymbi terminales, solitarii, breves, et brevissime pedunculati, subtriflori; subinde loco corymbi pedunculus solitarius, uniflorus. Pedunculi, pedicelli, calyces pilis stellatis, fasciculatisque, patulis tecti. Calycis foliola ovata, acuta. Corollam non vidi. Stigma sessile, capitatum, quinquelobum. Capsula parva, ovoidea, obscure pentagona, longitudine calycis, adpersa pilis stellatis, in apice ejus densioribus, maturitate rubido-fusca, quinquelocularis, quinquevalvis. Semina parva, ovoideo-trigona, scabra, matura rubido-fusca.

Cistus complicatus Dun. in *De Cand. Prodr.* 1. p. 264. n. 4. differt a nostro ob petiolos basi dilatatos, et ob flores fasciculatos, non corymbosos. Dunalinus videtur hic confudisse plantas duas, alteram ex Oriente, alteram ex montibus regni Valentini, ex qua sola forte deduxit characteres plantæ suæ.

8. *Cistus fastigiatus*: erectus; ramis brachiatis, ascendentibus; foliis subsessilibus, linearibus, margine revolutis, supra glabris, subtus canescentibus, trinerviis; umbellis terminalibus, longe pedunculatis; calycibus adpresse setosis.

C. fastigiatus *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 13.*, et *Sup.* 2. p. 176.*

C. Libanotis Desf. *Atl.* 1. p. 412. herb. ex Guss.

C. Clusii Cambess. *Balear.* in *Mémoir. du Mus.* tom. 14. p. 214. n. 59. herb. ex Guss. *De Cand. Prodr.* 1. p. 266. n. 28. Boiss. *Foy. en Esp.* 2. p. 60.

C. rosmarinifolius Pourr. in herb. Banks., et Lagasc. in herb. *De Cand.* ex Guss.

Helianthemum umbellatum Presl. *Sic.* 1. p. 118. excl. syn.

Cistus angusto libanotidis folio flore singulari Barrel. *lc.* 294. fig. incompleta quoad flores.

Ledon X. Clus. Hist. pl. lib. 1. p. 81. fig. bona.

Ital. *Cisto ramerino*.

Frut. Habui ex Sicilia in collibus siccis di Vittoria, et del Comiso ab Eq. Gussonio. Floret Majo, Junio.

Caulis teres, erectus, ramosissimus, ramis brachiatis, ascendentibus, tenuissime albo-tomentosulus, subpedalis. Folia subsessilia, opposita, linearia, obtusiuscula, margine revoluta, supra viridia, glabra, aut punctulis albidis adpersa, subtus albo-tomentosula, et subinde etiam pilosa, trinervia, reticulato-venosa, juniora viscosa, in caule principe remotiora, et cito diffusa, in ramulis valde approximata, diutius perdurantia. Basis foliorum est verus petiolus dilatatus, brevissimus, subconnatus cum petiolo opposito. Umbellæ terminales, solitariae, nobiles breviter, postea longe pedunculatae, pedunculo una, vel duabus bractearum foliacearum conjugationibus remotis instructo, cæterum nudo, incano-villosulo, villis fasciculatis, adpressis. Umbella tri-sexflora, subinde aucta pedunculo brevi, uniflora in axilla bractæ, involuorata, involuero deciduo. Bractæ omnes basi latæ, et dense ciliatæ. Pedicelli villosi more pedunculorum. Calyx triphyllus, adpersus setis simplicibus, adpressis, tres-quatuor lineas longus, foliolis ovatis, concavis, acutis, apice margine membranaceis. Corolla alba. Stylus brevissimus, vix lineam longus. Stigma capitatum; quinquelobum. Capsula ovoidea, obscure pentagona, pilis stelulatis adpersa, quinquelocularis, quinquevalvis, calyci subæqualis. Semina exigua, trigona, sub fortiori vitro scabrida, matura fusco-ferruginea.

Cl. Eq. Gussonius in Sup. 2. p. 176. observat, *Cistum Libanotidem* herbarii Linnæani, et horti Regii Matritensis omnino similem esse *Cisto fastigiato* suo. Restat tamen, ut dignoscatur, num capsula sit in utroque ejusdem structuræ, ut certi simus de identitate speciei. Neque *Ledon VII.* Clus. *Hist. pl. lib.* 1. p. 80. fig.,

quod Dunalius refert ad *Cistum Clusii* suum in De Cand. Pr. 1. p. 266. n. 28., neque *Ledon VIII.* Clus. Hist. pl. lib. 1. p. 80. fig., quod idem Dunalius attribuit *Helianthemo Libanotidi* in De Cand. Prodr. 1. p. 267. n. 1., pertinet ad plantam nostram. Huic propinquior est *Cistus umbellatus* Sp. pl. p. 739.; sed juxta exemplaria ejus, quæ obtinui e Pyrenæis orientalibus a Bonjeannio, ex agro Ruseinonensi a Dubyo, et Parisiis in sylva Fontebellovacensi a Prof. Achille Richardio distat habitu minore, ramis patulis, distortis, foliis brevioribus, in ramulis densioribus, sæpe basi ciliato-barbatis, pedunculis brevioribus, calycibusque adspersis pilis patentibus, calycibus fere dimidio minoribus, capsula incomplete triloculari, trivalvi.

Boissierius l. c. dubitat de synonymo Clusii, quod Dunalius in De Cand. Prodr. l. c. affert ad hanc speciem, et recte, ni fallor.

HELIANTHEMUM.

Tourn. Inst. 2. t. 128. *Juss. Gen.* p. 294. *Vent. Tabl.* 3. p. 221. *Gærtn. De fruct.* 1. p. 371. t. 76. *De Cand. Prodr.* 1. p. 266. *Endlich. Gen.* p. 905. n. 5029. *Spach. in Annal. des scienc. nat. second. sér. tom.* 6. p. 360. *Cistus* partim *Lin. Gen.* p. 271. *Lamck. Ill.* 5. t. 477. f. 1. *Smith. Engl. Fl.* 3. p. 22., et *Gramm.* t. 19. f. 236.

Fumana Spach. l. c. p. 359. *Endl. Gen.* p. 904. n. 5027.

Rhodax Spach. l. c. p. 363.

Tuberaria Spach. l. c. p. 364.

Halimium Spach. l. c. p. 365.

Calyx perianthium liberum, pentaphyllum, foliolis duobus externis, vel triphyllum, post fecundationem connivens, capsulam tegens, nubile sæpe apice spiraliter contortum. *Corolla* pentapetala, plana, patens. *Stamina* plura, corolla breviora, filamentis filiformibus, externis subinde castratis, antheris ovatis, bilocularibus, incumbens. *Ovarium* subrotundum. *Stilus* rectus, vel inferne sygmoideus, superne declinans, subinde nullus. *Stigma* capitatum. *Capsula* ovoideo-trigona, plerumque chartacea, raro coriacea, trivulvis, valvis

intus longitudinaliter diremptis septo nunc incompleto, nunc fere completo, ideo unilocularis, vel trilocularis. Semina parva, subrotunda, aut trigona, granulata, aut lævia, subinde-reticulato-foveolata, opposita, vel alterne placentæ affixa.

Habitus. Plantæ annuæ, suffruticosæ, vel fruticosæ. Folia opposita, aut alterna, stipulata, vel exstipulata. Flores umbellati, paniculati, racemosi, raro solitarii. Corolla lutea, rarius alba, aut rosea.

Obs. Genus quidquam artificiale, et per *Helianthemata* fruticosa exstipulata cum *Cisto* stricto connexum.

Ord. nat. Ut in *Cisto* p. 339.

* *Exstipulati fruticosi.*

1. *HELIANTHEMUM halimifolium*: caule erecto, ramoso, superne cinereo-leproso; foliis obverse lanceolatis, obovatisve, planis, tomentosulis; pedunculis bifloris, paniculatis; foliolis calycinis externis brevioribus, linearibus.

H. halimifolium Willd. *En. hort. Berol.* 1. p. 569. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 244. n. 3. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 177.* *Ten. Nap.* 1. p. 295., et *Syll.* p. 257. n. 1. *Presl. Sic.* 1. p. 119. *Moris. Sard.* 1. p. 200.* *Boiss. Voy. en Esp.* 2. p. 62. *De Cand. Franç.* 5. p. 621., et *Prodr.* 1. p. 268. n. 13. α . β .

Cistus halimifolius *Sp. pl.* p. 738. *Cav. Ic. et desc.* 2. p. 31. t. 138. *Sav. Bot. Etr.* 1. p. 153.* *Viv. Fl. Cors. diag.* p. 8.* *Desf. Atl.* 1. p. 412.

C. halimi minoris folio *Barrel. Ic.* 287.

C. Halymi fol. flore luteo maj. *Italicus Barrel. Ic.* 291. pl. luxur.

C. folio Halimi I. *Clus. Hist. pl. lib.* 1. p. 71. fig.

Ital. Cisto maremmano *Sav. Bot. Etr.* 1. p. 153.

Frut. Habui ex Etruria ad turrin S. Vincentii in *Maremma* ab Eq. Prof. CAJ. SAVIO, Ostiâ a *Castel Fusano* a Prof. MAURIO, ab Eq. PAROLINIO, ab ORSINO, et a BARBIERIO, ex litore Terracinensi, ubi valde copiosum, a FIORINIA-MAZZANTIA, ex Apulia in fruticetis maritimis prope *Lesina* a GASPARRINIO, ex Sardinia occidentali a *Portoscuso* a Prof. DE NOTARIS, ex Corsica

a Bonifacio ab Eq. Prof. VIVIANO, et a SERAFFINIO, ad Aiaccio ab Eq. GUSSONIO, a Bastia a SOLERIOLIO. Floret Junio.

Caulis teres, erectus, ramosissimus, brachiatus, rubescens, superne cinerascens-leprosa, tri-quadrupedalis-orgyalis. Folia exstipulata, opposita, breviter petiolata, obverse lanceolata, vel obovata, obtusa, et interdum retusa, integerrima, plana, trinervia, nervia lateralibus obsoletis, parce, tenuiterque venosa, incano-tomentosula, et magis subtus, tomento brevissimo, atellato, stipato, et valde adpresso; quam ad flores lanceolata, acutiuscula, inferiora opposita, superiora alternata. Pedunculi axillares, subbiflori, pedicellis inaequalibus, saepe in paniculam coadunati, incano-leprosi, lepra in ambitu stellulata, oppositi, vel superiores alterni. Bracteolae exiguae, lanceolatae, aut lineares, tomentosae, sitae ad divisionem pedunculorum, et etiam in eorum longitudine. Calyx pentaphyllus, incanus, leproso-tomentosus, nubilus pyramidatus, et apice subspiraliter contortus; ejus foliola duo exteriora linearia, obtusa, dimidio, vel triplo breviora, tria interiora ovato-lanceolata, cuspidata, apice cuspidis obtuso, margine membranacea, rubida. Corolla lutea, calyce etiam triplo, et quadruplo longior, petalis obovato-cuneatis, subcrenatis, basi macula atro-sanguinea pictis, vel immaculatis. Ovarium subrotundum, tomentosum. Stigma sessile, capitatum, quinquelobum, papillosum. Capsula parva, ovoidea, obscure trigona, fere longitudine calycis, coriacea, pilis stellatis adspersa, et superne densius, trivalvis, dehiscens valvis erectis more *Cistorum*, incomplete trilocularis, loculis intus purpurantibus, vitidia, dissepimento medianorum prominente. Semina minuta, angulata, scabra, e ferrugineo cinerea, funiculo umbilicali capillari, longo, recurvo, purpureo. Lepra caulis superioris, pedunculorum, et calycis fit e pulvinulis exiguis, sub vitro pallide flavis, in ambitu stellulatis pilis cinereo-albis.

** *Exstipulati suffruticosi.*

2. *HELIANTHEMUM laevis*: caule ramosissimo, ascendente, erectove; foliis alternis, setaceis, glabris; calycibus pilosis; stilo longitudine staminum; seminibus reticulato-foveolatis.

Flor. Ital. T. V.

- H. lavipes* Willd. *En. hor. Ber.* 1. p. 570. *Bad. in Morett. Bot. Ital.* p. 18. n. 81.* *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 249. n. 24. *Fior. in Giorn. Arcad. tom.* 18. p. 165.* *Ten. Nap.* 1. p. 296., et *Syll.* p. 258. n. 10. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 16.,* et *Sup.* 2. p. 176.* *Presl. Sic.* 1. p. 125. *Moris. Sard.* 1. p. 207.* *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 816., et *Prodr.* 1. p. 275. n. 51. *Reich. Exc.* 3. p. 713. n. 4540., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 7. *Cist. t.* 29. f. 4540.
- Cistus lavipes* *Sp. pl.* p. 739. *Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr.* 1. p. 365. *Jacq. Hort. Vind.* 2. p. 74. t. 158. *Cav. Ic.* 2. p. 56. t. 173. *All. Ped.* 2. p. 102. n. 1660. *Viv. Ann. bot.* 1. par. 2. p. 172.* *Boiss. Voyag. en Esp.* 2. p. 65. *Desf. Atl.* 1. p. 413.
- C. n. 6. *Ger. Gallopr.* p. 394. t. 14. optim.
- Chamaeistus capillaceis*, seu *Camphorata foliis*, pluribus ad unum exortum, uno aliis longiore *Cup. Hort. Cath.* p. 46.
- Helianthemum saxatile*, luteum, foliis *Coridis*, longioribus et glabris, caulibus in summitate villosis *Mich. in Till. Cat. hort. Pis.* p. 78. herb. Bonon.
- Cistus humilis* *Massiliotica* *Camphorata tenuissimis foliis glabris* *Pluk. Phyt. t.* 84. f. 6.
- Ital. Eliantemo capellino.*
- Suffr.* Habui ex promontorio Delphini in Liguria orientali ab Eq. Prof. VIVIANO, a TURIO, et a RAINERO, ex Liguria occidua in collibus di *Laigueglia* a BADAROO, et Albingauni a Prof. SASSIO, ex agro Nicmensi ab Eq. Prof. MORISIO, ex rupibus Terracinensibus a FIORINIA-MAZZANTIA, Capreis a Prof. GIRALDIO, Panormo in monte Gallo a Prof. PARLATORE, et denno ex collibus Panormitanis a TODARO, et ab Eq. PAROLINIO, ex collibus siccis di *Val di Mazzara*, et di *Val di Noto* ab Eq. GUSSONIO, ex Sardinia in rupestribus Calaritanis ab Eq. Prof. MORISIO, et a Prof. DE NOTARIS. Floret Aprili, Majo.
- Radix* nunc gracilis, nunc crassa, longa, fusiformi-ramosa, vel simplex, flexuosa, fusce rubida. Caulis teres, ramosissimus, adscendens, vel erectus, glaber, palmaris-pedalis, fusce rubidus. Rami alterni, approximati, patuli, in parte annotina tenues, e viridi glaucescentes, sæpe superne adpersi pilis patentibus, apice glanduliferis. Folia sessilia, alterna, filiformia, brevissime mucronulata, aut obtusa, glabra, glauco-viridia, inter se approximata, nunc patentia, nunc fere imbricata, superiora sæpe stipulata. Paucim in axillis

omnium sunt caespituli foliorum brevium e ramulo abortivo. Racemi terminales, solitarii, simplices, pedunculati, laxiflori. Bractesæ exiguae, foliaceae, lanceolatae, aut lanceolato-lineares, obtusae, sitæ sub pedicellis, et etiam extra. Pedicelli tennes, fructiferi recurvati. Rachis, bractesæ, et pedicelli sæpe adsperguntur pilis apice glanduliferis. Flores parvi, nubiles nuntantes. Calyx plus minus pilosus, ante floris anthesim apice spiraliter connivens, foliolis duobus externis linearibus, vel lanceolatis, viridibus, dimidio, vel triplo brevioribus, internis late ovatis, obtusis, quadri-quinquenerviis, margine, et inter nervos submembranaceis, sæpe rubescentibus, aut in umbrâ pallentibus. Corolla lutea, immaculata, calyce longior, petalis obovato-cuneatis, suberenatis. Stamina filamentis externis brevioribus, castratis. Stilus stamina longiora æquans, incurvus. Stigma depresso-capitatum. Capsula chartacea, ovoideo-trigona, obtusa, glabra, longitudine calycis, matura flava, nitida, fere complete trilocularis, trivalvis, valvis demum totis patentissimis. Placentæ filiformes. Semina triquetra, acuta, reticulato-foveolata, fusca cum nebula cinerea, plus minus complete obducente.

3. *HELIANTHEMUM Fumana*: caule procumbente, tortuoso, erectove; foliis alternis, semiteretibus, rigidis, ciliatis; pedunculis solitariis, unifloris; seminibus lævibus.
- H. *Fumana* Willd. *En. hor. Berol.* 1. p. 570. *Viv. Ann. bot.* 1. par. 2. p. 172. *Re Tor.* 1. p. 278. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 247. n. 17. *Nooc. et Balb. Tic.* 1. p. 251., et 389. *Barb. Agg.* p. 36. *Pollin. Ver.* 2. p. 181., et *Ver.* 3. app. p. 798. *β. Ruch. Ven.* p. 129. *Moric. Ven.* 1. p. 229. *Nacc. Ven.* 3. p. 81. A. B. Bert. *Amæn. Ital.* p. 155. n. 147., et p. 242. n. 51., et p. 373. n. 161. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 177. *Ten. Nap.* 4. p. 312. A. B., et *Syll.* p. 258. n. 8. *Presl. Sic.* 1. p. 124. *α. β. Moris. Sard.* 1. p. 208. *α. β. γ.* Boiss. Voy. en Esp.* 2. p. 65. *α. β. De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 816. *α. β.*, et *Prodr.* 1. p. 274. n. 48. *α. β. γ. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 43. *α. β. Koch. Syn.* p. 80. *Reich. Exc.* 3. p. 712. n. 4531., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 6. *Cist. t.* 26. f. 4531. *Gaud. Helv.* 3. p. 443. H. *ericoides* Cav. *Ic.* 2. p. 56. t. 172. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 247. n. 16. *Ten. Nap.* 4. p. 312. A. B., et *Syll.* p. 257. n. 7. *Guss. Pl. rar.* p. 214. b., et *Fl. Sic. prodr.* 2. p. 17. b., et *Sup.* 2. p. 176. b. *De Cand. Prodr.* 1. p. 274. n. 47. *α. β. Reich. Exc.* 3. p. 712. n. 4530., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 6. *Cist. t.* 26. f. 4530.

- H. procumbens* *De Cand. Prodr.* 1. p. 275. n. 49. *Ten. Nap.* 4. p. 313., et *Syll. app.* p. 63a.
- Cistus Fumana* *Sp. pl.* p. 740. *Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr.* 1. p. 365. *Jacq. Austr.* 3. p. 29. t. 25a. *All. Ped.* 2. p. 102. n. 1661. *Balb. Taur.* p. 86. *Re Seg.* p. 44. *Birol. Acon.* 1. p. 181. *Comoll. Prodr.* p. 103. *Suffr. Foroj.* p. 149. *Bert. Pl. Gen.* p. 68. n. 147. *Sav. Pis.* 2. p. 11., et *Bot. Etr.* 2. p. 127. α . β . *Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 223. *Desf. Atl.* 1. p. 414. α ., et *A. tab.* 105. *Host. Austr.* 2. p. 54. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 375.
- C. Fumana* $\frac{1}{2}$ *siculus Jan. El.* p. 8. n. 30.* *caulib. annot. puberul.*
- C. calycinus* *All. Ped.* 2. p. 102. n. 1662.
- C. ericoides* *Bad. in Morett. Bot. Ital.* p. 13. n. 80.*
- C. n.* 103a. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 2.
- Simillimus* *Cori frutex Cæsalp. De pl. lib.* 9. cap. 45. p. 396.
- Cistus minor* *brevi vermiculatoque folio hisp. Barrel.* *Ic.* 286. *macrior.*
- Chamæcistus luteus* *vermiculato folio, maj. Barrel.* *Ic.* 445. *luxur.*
- Ch. brevis* *vermiculatoque folio, minor, hisp. Barrel.* *Ic.* 446. *humilior.*
- Helianthemum* *perenne, erectum, luteum, prorsus glabrum, foliis Coridos alternis, longioribus, surrectis, et quasi ad caulem contractis Mich. Cat. hort. Flor. app.* p. 141. n. 8.
- H. tenuifolium*, *glabrum, luteo flore, per humum sparsum Zannich. Ist.* p. 136. t. 116. *Segui. Ver.* 1. p. 443. n. 4.
- Cistus* u. 5. *Gin. Pin. Rav.* p. 240.
- Ital. Fumana. Erba Fumana.*
- Suffr.* *Legi in alpibus Apuanis supra scaturigines Frigidæ, et in Lunensium lapidicinia di Misaia, in litore Massensi a S. Giuseppe, Genus in collibus al Lagazzo, Bononiæ in collibus della Crovara ad gypsa, et al Sasso, Pisauri in litore marino. Habui ex Liguria occidua a Laigueglia a Badaroo, ex agro Nicmensi ab Eq. Prof. MORISIO, Alba Pompejâ in apriciis a BENTERO, ex Valtellina a LANTOSSIO, ex viciniis Comi al Colletto a RAINERO, ex collibus Veronensibus a MANGANOTTO, ex Tyroli meridionali in apriciis Brixinensibus ab Eq. DE HEUFLERO, ex Tyroli Italico in Val di Fassa ab Eq. PAROLINIO, in Fiemme sub Tesero, et Cavallese a FACCHINIO, ex collibus Bassanensibus, et præsertim la Grappa a MONTINIO, ex monte Spaccato,*

et ex aliis locis siccis districtus Tergestini a TOMMASINO, Fossà Clodià a Prof. NACCARIO, ex pineto Cerviensi ab Eq. PAROLINIO, ex litore Ariminensi a Prof. ANTONIO TARGIONIO-TOZZETTIO, ex Petra pertusa in Apennino Urbinati a Prof. OCTAVIANO, ex Piceno ad Cupram maritimam ab ORSINO, et in montibus della Sibilla a MARZIALETTO, ex monte Pisano a Prof. PUCCINELLIO, ex Etruria in monte dell'Incontra prope Florentiam, et in sylva del Manganello ab Eq. RICCASOLO, in collibus dell'Imprunetta ab Eq. PAROLINIO, in tophis Volaterranis a Grignano ab AMIDEO, Ostià ab ORSINO, et a BARBIERIO, ex Lucretili a Prof. MAURIO, ex Valcimara a MASQUILLIERIO, ex radicibus meridionalibus Gargani ab Eq. GUSSONIO, ex maritimis Apuliam a Lesina a GASPARRINIO, ex Sicilia a POF. JANIO, Capreis a Prof. GIRALDIO, ex Sardinia ab Eq. Prof. MORISIO, ex Corsica a SOLEIROLIO. Floret ab Aprili in æstatem, et subiunde etiam Septembri.

Radix longa, sæpe crassa, fusiformi-ramosa, vel lateraliter ramulosa, flexuosa, fusca. Caulis teres, inferne lignosus, durus, modo prostratus, et tortuosus, modo ascendens, vel erectus, valde ramosus, fuscus cum nebula glauca, a paucis pollicibus ad pedem, et ultra longus. Rami alterni, annotini glabri, vel in parte superiore pubescentes, glauco-virentes. Folia sessilia, alterna, sparsa, crebra, crassiuscula, semiteretia, rigida, brevissime mucronulata, plerumque spinulis ciliata, viridi-glauca, glabra, inferiora breviora, fere imbricata, superiora erecto-patula, vel stricta, item quandoque falcata, et secunda, subiunde tenuissime puberula. In axillis eorum rarius occurrit unus, alterve fasciculus foliorum ex ramo abortivo. Pedunculi uniflori, potius breves, nudi, glabri, aut puberuli, in flore erecti, in fructu recurvi, modo solitarii, terminales, modo pauci, approximati, singuli in axilla folii, vel folio oppositi. Calyx glaber, aut puberulus, foliolis duobus externis linearibus, viridibus, dimidio, aut triplo brevioribus, internis late ovatis, quadrinerviis, nervis sæpe ciliatis, margine, et inter nervos submembranaceis, in apice e purpureo rubidis, nubilibus spiralliter conniventi-contortis. Corolla lutea, immaculata, calyce longior, petalis obovatis, integris, obtusis, vel cum mucronulo in medio. Stamina lutea, exteriora sæpe castrata. Stylus longitudine staminum, erectus, vel declinatus. Stigma depresso-capitatum.

Capsula chartacea, ovoideo-trigona, obtusa, glabra, nitida, matura saturate flava, vel flavo-fusca, fere longitudine calycis, aut quidquam brevior, quasi complete trilocularis, trivalvis, valvis demum totis patentissimis. Semina grandiuscula, ex ovoideo obsolete trigona, lævia, glabra, matura nigra.

Stirps falsis speciebus deturpata, sed exacte restituta ab accuratissimis Eq. Prof. Morisio, Kochio, et Boissierio.

4. *HELIANTHEMUM alpestre*: fasciculate pilosum, glabrumv; caule decumbenti-ascendente, ramoso; foliis oppositis, petiolatis, oblongis, basi angustatis; racemo terminali, laxo; pedicellis fructiferis declinato-ascendentibus.

H. alpestre *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 248. n. 19. *Pollin. Ver.* 2. p. 183. *α. Bert. Aman. Ital.* p. 373. n. 162. *γ. Ten. Nap.* 4. p. 315., et *Syll.* p. 258. n. 14. *De Cand. Franç.* 5. p. 622. *α. β. γ.*, qui mecum legit in Lunensium lapidicinis, et *Prodr.* 1. p. 276. n. 62. *α. β. γ. Reich. Cent.* 1. p. 3. t. 1. f. 2., et *Exc.* 3. p. 713. n. 4536., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 7. *Cist.* 1. 28. f. 4536.

H. italicum *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 248. n. 21. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 175.* *Reich. Exc.* 3. p. 712. n. 4532., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 6. *Cist.* 1. 27. f. 4532.

H. olandicum *Willd. En. hort. Ber.* 1. p. 570. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 817. *Röhl. cum Koch. Deut. Fl.* 4. p. 45. *α. β. Koch. Syn.* p. 80. *α. β. Gaud. Helv.* 3. p. 446. *α. β. Fries Novit. Fl. Suec. ed. alt.* p. 168. *α. Sv. bot. v. 7. t. 499. Reich. Cent.* 1. p. 3. t. 1. f. 1.

Cistus alpestris Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 365. *Comoll. Prodr.* p. 104.* *Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 375. t. 23. Jacq. En.* p. 93., et 248.

C. italicus *Sp. pl.* p. 740. *All. Ped.* 2. p. 103. n. 1665. *Sav. Bot. Etr.* 2. p. 128.

C. olandicus *Sp. pl.* p. 741., et *Fl. Suec. ed. 2. p. 184. Jacq. Austr.* 4. p. 54. t. 399.

C. n. 134. *Lin. Suec. ed. 1. p. 158.*

C. n. 1034. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 3.

C. Serpilli folio villos. flor. pallido Italic. *Barrel, Ic.* 366.

Helianthemum alpinum, Serpilli folio nigricante et hirsuto *Segui. Sup.* p. 195. tab. 6. f. 2. ex autops. Smithii, sed figura parum exacta.

Ital. *Eliantemo rupino*.

Suffr. Legi in alpihus Apuanis in *Tambura*, in Lunensium lapidicinis, ubi copiosum, et in vertice *Bruciana*. Habui ex Liguria occidua al *Capo di Noli* a

Prof. DE NOTARIS, in montibus *del Ceriale* a Prof. SASSIO, ex Cenisio a BONJEANNIO, ex monte *S. Bernardino* in Rhætia Italica, ex monte *S. Martino*, et ex *Corni di Canzo* ad Larium a RAINERO, denuo ex *Corni di Canzo* a Prof. COMOLLIO, et ab Eq. DE WELŮRWIO, ex vertice Baldi *al Telegrafo*, et in valle *delle Ossa* a MANGANOTTO, et a Prof. VISIANIO, ex Tyroli Italico in alibus *di Fiemme*, et *Fassa* a FACCHINIO, ex districtu Bassanensi in montibus *di Valsugana* prope *il Borgo* a SARTORELLIO, in montibus *di Cismon* ab Eq. PAROLINIO, in *Grappa*, in montibus supra *Solagna* prope *S. Giorgio*, in valle *di S. Felicità*, ex *Portole* Vicetinarum, et ex *Vette di Feltre* a MONTINIO, ex rupestribus montis Majoris in districtu Tergestino a TOMMASINIO, ex montibus prope Nursiam, et Interamnem a Prof. MAURIO, ex monte *li Catini*, et ex monte Cornu Prætoriorum *ad Arapietra* ab OASINO, ex eodem monte Cornu, et ex monte *Costone* ab Eq. GUSONIO, ex Ducatu Lucensi in monte *Penna* a *S. Lorenzo* a VACCOLI a Prof. PUCCINELLIO, ex Etruria *alla Sassetta* in *Maremma* a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTO, Ocriculo a Prof. MAURIO. Floret Majo, Junio, Julio.

Radix ut in præcedente. Caulis basi prostratus, vel e decumbenti ascendens, inferne valde ramosus, cespitosus, teres, potius tenuis, a palmo ad spithamam longus, in parte lignosa senescente fuscus, glabratus, in parte media rubens, in superiore virens; pube tenui adpersus, cui sæpe, non semper, sunt interjecti pili longiores, geminati, vel tres-quatuor fasciculati, sursum versi; ludit quoque in parte annotina inferiore glaber. Folia opposita, petiolata, aut suprema sessilia, utrinque viridia, et interdum saturate, tres-sex lineas longa, unam-duas lata, inferiora breviora, crebriora, obovata, successiva longiora, oblonga, oblongo-lanceolata, vel lanceolato-linearia, basi quidquam angustata, nunc omnia obtusa, nunc superiora acutiuscula, vel acuta, cæterum multinervia, plana, vel margine subrevoluta, supra contra nervum sulco lineari dirempta, utrinque plus minus adpersa pilis longis, adpressis, geminatis, vel tribus-quatuor fasciculatis, alias, et præsertim in locis frigidis, glabra, eisdem pilis ciliata, aut etiam nervo adpersa, juniora semper villosiora. Petioli nunc breves, nunc longiusculi, plus minus pilosi. Racemus terminalis, simplex, nubilis breviter pedunculatus, cernuus, floribus approximatis, in anthesi pedunculo elongato instructus,

erectus, laxiflorus, et magis in fructu. Bracteolæ parvæ, lanceolatæ, vel lineares sub pedicellis, aut extra. Pedicelli tenues, filiformes, longi, nudi, floriferi erecto-patuli, fructiferi declinato-ascendentes, nonnullis subinde recurvis. Calyx parvus, plus minus fasciculatè pilosus, aut hirsutus, alias tantum breviter pubescens, foliolis duobus externis obverse lanceolatis, obtusis, dimidio, vel triplo brevioribus, internis ovato-oblongis, obtusis, vel acutis, multinerviis, inter nervos pallentibus, nervis viridibus. Calyx ante anthesim connivet foliolis erectis, nec spiraliter contortis. Corolla nunc pallide, nunc saturate lutea, immaculata, calyce longior, petalis obovato-cuneatis, plus minus evidenter emarginatis, subcrenatis. Stylus staminibus brevior, inclinatus. Stigma depresso-capitatum, papillosum. Capsula subcoriacea, ovoideo-oblonga, calycem æquans, aut paulo brevior, ab eodem arcte tecta, pubescens, et magis in apice, incomplete trilocularis, trivalvis, dehiscens valvis semper erectis. Semina parva, ex ovoideo obsolete trigona, acuta, sub vitro scabrida, matra rufo-fusca. Villi totius plantæ incani. Raro habentur individua, quæ undique teguntur villo denso.

Hæc quoque stirps in falsas species dilaniata ob habitum nunc graciliorem fere glabrum, quod evenit in locis frigidis, et ita est in *Cisto alandico* L., nunc grandiore, villosiore, hirsutie tamen varia, quod in plagis calidioribus habetur, et sic contingit in *Cisto alpestri* Jacq., et in *Cisto italico* L.

5. *HELIANTHEMUM marifolium*: caule decumbenti-ascendente, ramoso; foliis oppositis, petiolatis, ovatis, oblongisve, utrinque angustatis, supra subpilis, subtus dense, brevissimeque tomentosis; racemo terminali, laxifloro; pedicellis patenti-ascendentibus; calycibus villoso-tomentosis.

H. marifolium Coll. *Herb. Ped.* 1. p. 248. n. 22. *Barb. Agg.* p. 36.* *Pollin. Ver.* 2. p. 182. α. β. *Sang. Cent.* p. 76. α. β.* *De Cand. Franç.* 4. part. 2. p. 817. α. β. *Ten. Syll.* p. 259. n. 16. *Moris. Stirp. Sard. el. fasc.* 2. p. 1.* *H. canum* Hook. *Brit. Fl. ed.* 2. p. 258. Coll. *Herb. Ped.* 1. p. 248. n. 20. *Ten. Nap.* 4. p. 316. *Moris. Sard.* 1. p. 201.* *Boiss. Voy. en Esp.* 2. p. 66. *De Cand. Prodr.* 1. p. 277. n. 67. *Reich. Exc.* 3. p. 713. n. 4534., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* v. 3. p. 7. *Cist. t.* 27. f. 4534. *Gaud. Helv.* 3. p. 445.

H. italicum *Ten. Nap.* 4. p. 316. excl. syn., et *Syll.* p. 259. n. 15.

- H. cinereum* Ten. Prodr. in *Fl. Nap.* 1. p. xxxi.*
H. vineale De Cand. Prodr. 1. p. 277. u. 66. Reich. Exc. 3. p. 712. n. 4533., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 7. *Cist.* t. 27. f. 4533.
H. oelandicum β Fries. Novit. *Fl. Suec. ed. 2.* p. 168. Röhl. cum Koch. Deuts. *Fl.* 4. p. 46. γ . Koch. Syn. p. 81. γ .
Cistus marifolius Sp. pl. p. 741. non recentior. Smith. Engl. *Fl.* 3. p. 23., et Engl. bot. v. 6. t. 396. Hook. in *Fl. Lond. ed. Grav.* v. 5. t. 40. Comoll. Prodr. p. 103. Sav. Bot. Etr. 2. p. 128. Host. Austr. 2. p. 55.
C. anglicus Mant. alt. p. 245.
C. canus Jacq. Austr. 3. p. 42. t. 277. non Liun. All. Ped. 2. p. 103. n. 1664. A. B. t. 45. f. 3. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 377.
C. vinealis Willd. Sp. pl. 2. par. 2. p. 1195.
C. n. 1035. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 4.
 Il III. Cisto picciolo Ongarico del Clusio Pon. Mont. Bald. p. 150.
 Cisto picciolo con foglia mirtina del medesimo Autore (Clusio) Pon. l. c. p. 241.
Cistus Oleæ folio villos. flore aur. Italicus Barrel. *Ic.* 365. pl. luxur.
Helianthemum foliis Myrti minoris, subtus incanis Segui. Fer. 1. p. 442. n. 3.
H. alpinum, foliis Pilosellæ minoris Fuchsi Segui. Sup. p. 196. n. 5.
H. serpylli folio incano, flore minore luteo, inodoro Dill. Elth. 1. p. 177. t. 145. f. 173.
Chamaecistus III. Clus. Hist. pl. lib. 1. p. 74. fig. 2
 Ital. *Eliantemo teucrio*.
Suffrut. Habui ex Liguria occidua in monte Gazo supra Sestri di Ponente a Prof. DE NOTARIS, Mantua in collibus della Volta a BARBIERO, ex districtu Veronensi in radicibus Baldi a Caprino, et in collibus d' Avesa, et Stallavena a RAINERO, denuo in collibus circa Verouam, d' Avesa, et in valle Donega a MANGANOTTO, ex præruptis ad Benacum in finibus Tyrolensibus, et Brixienisibus a FACCHINIO, a FOX-STRANGWEJO, et a Prof. VISIANIO, ex Tyroli meridionali in districtu Tridentino a FACCHINIO, ex montibus Vicetinis prope Recoaro a Prof. NACCARIO, ex districtu Bassanensi in Valsugana prope il Borgo a MONTINIO, ex sterilibus montis Spaccato in ditione Tergestina a BIASOLETTO, ex Petra pertusa (Furlo) in Apennino Urbinati ab Eq. NARDUCCIO, et a Prof. OCTAVIANO, ex Piccio alla Madonna

dell' Ambro, in monte della Sibilla, et in monte Pizzo a MARZIALETTO, in monte Priore, in monte de' Fiori alla Cirella, et in Vettore ab ORSINO, denuo ex Vettore a Prof. MAURIO, ex Pratutius in monte Cornu, et in monte Costone ab Eq. GUSSONIO, et in monte Morrone prope la Maiella ab ORSINO, ex monte S. Angelo di Castellamare ab Eq. Prof. TENORIO, ex rupes-tribus Lucanæ prope Castelgrande a GASPARRINIO, ex editis Gargani ab Eq. GUSSONIO, ex Pollino Calabrim ab Eq. PAROLINIO, ex Sardinia ab Eq. Prof. MORISIO. Floret ab Aprili in æstatem.

Simillimum præcedenti, sed differt evidentissime notis sequentibus. Pars caulis annotina obducitur vel pubescentia, vel tomento brevi, incano, hic illic interjectis pilis paulo longioribus, solitariis, geminatis, vel fasciculatis. Folia utrinque angustata, sæpe, non semper, acuta, nunc in facie superiore satnrate viridia, et adpersa pilis raris, longiusculis, adpressis, solitariis, vel geminatis, insuper sub vitro minute punctata granulis substellatis, margine eisdem pilis ciliata, subtus albo-tomentosa, tomento brevissimo, stipato, stellato, inque nervo adpersa pilis geminatis, vel fasciculatis, nunc etiam in facie superiore præter pilos geminatos tecta tomento plus minus stipato, et ideo plus minus cana. Calyx tomentoso-villosus, in fructu tumidior. Capsula magis turgida, ex subrotundo ovata. Pedicelli fructiferi patenti-ascendentes, sed minus declinati; iidem ludunt hic quoque recurvati. Smithius in Engl. Fl. l. c. nos docuit, hanc, non illam Cavanillesii, esse plantam, cui Linnæus in Sp. pl. l. c. tribuit nomen *Cisti marifolii*, quam rem eo magis demonstrant verba ipsius Linnæi, qui indicat Veronam pro loco natali stirpis suæ, et profecto Veronæ frequens est planta a me hic descripta, nec alia, quacum commutari possit. *Cistus marifolius* Cav. Ic. a. p. 34. t. 143. omnino non provenit in Italia.

6. *HELIANTHEMUM rubellum*: caule decumbenti-ascendente, ramoso; foliis late ovatis, longiuscule petiolatis, ciliatis, supra glabris, subtus dense tomentosis, inferioribus obtusis; racemis compositis, simplicibusque; pedicellis fructiferis basi recurvata sursum convolutis-arcuatis.

H. rubellum Spreng. Syst. veg. a. p. 591. n. 69. Presl. Del. Prag. p. 25., et Sic. 1. p. 126. Guss. Fl. Sic. prodr. a. p. 18.,* et Sup. a. p. 176.* Boiss. Voy. en Esp. a. p. 66. β.

H. rotundifolium *De Cand. Prodr.* 1. p. 277. n. 69.

H. nummularium *Guss. Cat. di Boccadif.* p. 30.*

Cistus paniculatus *Jan. El.* p. 8. n. 36.*

C. nummularius *Cav. Ic.* 2. p. 34. t. 142. non *Liun. Desf.*

Atl. 1. p. 423.

Ital. *Eliantemo roncigliato*.

Suffr. Habui Rhegio Julio in Calabria, et ex collibus editis Sicilia ab. Eq. Gussonio, ex montibus *Cana*, et *Pizzuta* prope Panormum a TODARO, ex Nebrodibus a Prof. JANIO, et a monte *Quecedda* a Prof. PARLATORE. Floret Junio, Julio.

Radix fusiformi-ramosa, crassa, tecta cortice fusce rubido, intus alba. Caulis inferne lignosus, crassus, ramosus, tortuosus, decumbens, fusce rubidus, aut nigricans, teres, a cicatricibus petiolorum crebre exasperatus, emittens caules annotinos ascendentes, tenues, superne fere denudatos, pubescentes, o viridi canescentes. Totus caulis a duobus, vel tribus pollicibus ad spithamam longus. Folia opposita, longiuscule petiolata praesertim intermedia, inferiora crebra, imaque minora, subrotunda, obtusa, successiva late ovata, exquisite acuta, suprema lanceolata; omnia plana, supra viridia, glabra, vel uxo alterove pilo adpresso adpersa, margine ciliata pilis plerumque geminatis, sulco mediano contra nervum dirempta, subtus dense albotomentosa, tomento stipato, brevissimo, saepe in nervo, et venis plus minus pilosa, in caulibus annotinis inferiora plura, approximata, reliqua conjugationibus duabus-tribus, inter se valde remotis, stipulatis. Petioli tomentosuli, et insuper subinde pilosi. Racemus terminalis, simplex, vel basi ramo auctus, nubilis contractus, cernuus, postea laxatus, erectus, longe pedunculatus. Bractea foliaceae, lanceolatae, sitae sub divisione racemi, et sub pedicellis, imae longiores, stipulae, reliquae exiguae. Pedicelli albo-tomentosuli, et saepe pilosi, inferiores duplo, et triplo longiores calyce, reliqui decrescentes, in anthesi erecto-patuli, fructiferi plerumque basi recurvantur, et arcu facto convolvuntur, et ascendunt. Flores parvi. Calyx sesquilineam-duas lineas longus, nunc tantum albo-tomentosulus cum vel sine pilis paucis longioribus interjectis, nunc vere hirsutus, pilis canescentibus, foliolis externis duobus lanceolatis, obtusis, saepe ciliatis, paulo brevioribus, internis late ovatis, obtusis, crasso quadrinerviis, in flore nubili erecto-conniventibus.

Corolla calyce quidquam longior, luteo-aurea, immaculata, senio crocea, petalis obovatis. Stylus staminibus æqualis, sygmoideus, superne inclinatus. Stigma depresso-capitatum, papillosum. Capsula subcoriacea, ovoidea, calyci subæqualis, aut paulo brevior, pilosa præsertim apice, et prope marginem valvarum, matura lutea, incomplete trilocularis, trivalvis, dehiscens valvis semper erectis. Semina ovoideo-trigona, sub vitro grauiolata. Folia senescendo fiunt rubella.

7. *HELIANTHEMUM lunulatum*: erectum, ramosissimum, patulum, subglabrum; foliis oppositis, breviter petiolatis, elliptico-oblongis; pedunculis terminalibus, unifloris, solitariis, subternisve fasciculatis; foliolis calycinis externis lineari-filiformibus, recurvis.

H. lunulatum Coll. Herb. Ped. 1. p. 246. n. 8. De Cand.

Franc. 4. par. 2. p. 816., et Prodr. 1. p. 271. n. 30. Reich.

Exc. 3. p. 712. n. 4529., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 6.

Cist. 1. 26. f. 4529. transcripta a signa Allionii.

Cistus lunulatus All. Auct. p. 30. tab. 2. fig. 3.*

Ital. *Eliantemo lunulato*.

Suffr. Habui ex Liguria occidua in monte Galè a Prof.

SASSO, ex montibus supra Ormea a MOLINARIO, et a

Prof. BALBISIO. Floret Majo, Junio.

Suffrnticulus humilis, erectus, ramosissimus, patulus, subpalmaris, vel paulo ultra. Caulis teres, multa parte glaber, apice tantum pilis exiguis, stellulatis, adpressis scatens, quibus interdum interjiciuntur pili alii pauci, longiores, geminati, vel fasciculati, inferne fusce rubens. Rami oppositi, vel terni, rarius solitarii. Folia opposita, breviter petiolata, elliptico-oblonga, obtusa, aut superiora acutiuscula, late viridia, nunc utrinque glabra, vel nervo, et margine, rarius in reliqua superficie, scatentia pilis solitariis, aut geminatis, nunc veluti lepidota pilis stellulatis, valde adpressis præsertim in pagina inferiore, dum in superiore sunt potius punctulato-scabra a rudimentis stellarum non evolutarum; ea, quæ in extremitate ramulorum, sæpe sunt utrinque incano-tomentosa. Pedunculi terminales, uniflori, filiformes, puberuli, et pilosi, longiusculi, solitarii, vel subterni fasciculati, floriferi erecti, fructiferi recurvati. Flos parvus. Calyx pilis stellulatis puberulus, et insuper in nervis scatens pilis longioribus, foliolis duobus externis lineari-filiformibus, obtusis, subpilosis, paulo brevioribus, recurvis, internis tribus ovatis, acutiusculis, multiuerviis,

in anthesi retroflexis. Corolla calyce longior, luteo-aurea, maculis quinque lunulatis, croceis prope unguem petalorum. Petala obovata, crenulata. Stilus longitudine staminum, flexuosus. Stigma capitatum. Capsulam perfectam non vidi.

Species profecto diversa a tribus præcedentibus, quamvis sint, qui suspicentur esse lusum *Helianthemum italicum*, sive *Helianthemum alpestre*, sed immerito. In figura Allionii folia nimis acutata.

*** *Exstipulati herbacei.*

8. *HELIANTHEMUM Tuberaria*: perenne; caule erecto; foliis radicalibus elliptico-oblongis, petiolatis, tomentosis, subquinquenerviis, caulinis sessilibus, oppositis, superioribus alternis; racemo bracteato; calycibus glabris; stigmate subsessili.

H. *Tuberaria* Willd. *En. hort. Berol.* 1. p. 570. *Bad. in Morett. Bot. Ital.* p. 13. n. 79.* *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 244. n. 4. *Ten. Nap.* 4. p. 311., et *Syll.* p. 257. n. 2. *Guss. Pl. rar.* p. 212.* et *Fl. Sic. prodr.* 2. p. 22.* *Presl. Sic.* 1. p. 120. *Moris. Sard.* 1. p. 209.* *Boiss. Voy. en Esp.* p. 62. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 818., et *Prodr.* 1. p. 270. n. 22. *Reich. Exc.* 3. p. 712. n. 4528., et *l.c. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 6. *Cist.* 1. 25. f. 4528.

Cistus Tuberaria Sp. pl. p. 741. *Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr.* 1. p. 366. *Cav. Ic.* 1. p. 65. t. 97. *All. Ped.* 2. p. 103. n. 1666.* *Sav. Bot. Etr.* 1. p. 153.* *Desf. Atl.* 1. p. 415.

Tuberaria nostras J. Bauh. *Hist. pl.* 2. lib. 13. p. 12. fig. *Ital. Tuberaria.*

Perenn. Habui ex Liguria occidua in valle Albingaunensi a BADAROO, et a Prof. SASSIO, Nicmâ a MOLINERIO, ex Ducatu Lucensi in sylvis di S. Maria del Giudice a Prof. PUCCINELLIO, ex monte Pisano ab Eq. Prof. CAJ. SAVIO, ex Calabria al Piano della Melia, et Messanâ ab Eq. GUSSONIO, ex rupestribus Sardinis ab Eq. Prof. MORISIO, ex Corsica a Calvi a SOLERIOLO. Floret Aprili, Majo, Junio.

Radix fusiformi-ramosa, crassa, flexuosa, fusca. Caulis teres, erectus, vel ascendens, inferne villosus, reliqua parte glaber, simplex, vel uno, alterove ramo instructus, a palmo ad pedem, et etiam quidquam ultra longus. Folia radicalia majora, rosulata, elliptico-oblonga, acuta, tomentosa, et plus minus villosa, basi

in petiolum brevem, latum angustata, subtus crasso tri-quinquenervia, et reticulato-venosa, supra totidem sulcis insculpta, quot sunt nervi, margine integra, caulina minor, sessilia, trinervia, inferiora approximata, oblongo-lanceolata, tomentoso-villosa, ut radicalia, reliqua oblongo-lanceolata, valde acutata, glabra, intermedia opposita, superiora alterna, amplexicaulia, utraque inter se passim remota, subinde tamen numerosiora, et magis approximata. Racemus terminalis, glaber, ramosus, vel simplex. Bractea lanceolata, superiores successive decrescentes. Pedicelli nudi, inferiores longi, remotiores, omnes apice incrassati, cum flore nubili nutantes, in anthesi erecti, in fructu recurvi. Calyx glaber, tres-quinque lineas longus, nitens, senio flavescens, aut e flavo rubescens, foliolis duobus externis lanceolato-linearibus, acutis, dimidio, et triplo brevioribus, internis ovato-lanceolatis, acuminatis, obscure nervosis, ante florum anthesim erecto-conniventibus. Corolla pallide flava, calyce multo longior, petalis obovatis, longe cuneatis, integris, vel crenatis. Ovarium dense tomentosum. Stigma subsessile, capitatum, papillosum. Capsula subcoriacea, ovoideo-pentagona, calyce brevior, et tecta, pubescens, et ad oras valvarum ciliata, incomplete trilocularis, trivalvis, dehiscens valvis totis erectis. Semina exigua, trigona, sub vitro scabra, matura fusco-ferruginea, scabritie cinerascens.

9. *HELIANTHEMUM guttatum*: annuum, pilosum; caule erecto; foliis sessilibus, oblongo-lanceolatis, trinerviis, oppositis; supremis alternis; racemis solitariis, paniculatisque, subnudis; calycibus hirtis; stigmate subsessili.

H. guttatum Hook. *Brit. Fl. ed. 2. p. 258. Re Tor. 1. p. 279. Coll. Herb. Ped. 1. p. 246. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 251., et 390. Pollin. Ver. 2. p. 184. Bert. Mant. Fl. Apuan. p. 34. n. 53. Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 178. a. β. γ. Ten. Nap. 1. p. 297. A. B., et Syll. p. 257. n. 3. A. B. Guss. Fl. Sic. prodr. 2. p. 23., et Sup. 2. p. 180. b. bb. Presl. Sic. 1. p. 120. a. β. γ. δ. Moris. et De Not. Capr. p. 18. Moris. Sard. 1. p. 210. a. β. γ. Boiss. Voy. en Esp. 2. p. 62. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 819. a. β., et Prodr. 1. p. 270. n. 26. a. β. γ. δ. e. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 41. a. β. Koch. Syn. p. 80. a. β. γ. Reich. Exc. 3. p. 711. n. 4526., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 6. Cist. 1. 25. f. 4526. flore parvo, et veluti abortivo.*

- H. plantagineum* Guss. *Fl. Sic. prodr.* 2. p. 22., et *Sup.* 2. p. 180.
- H. Vivianii* Pollin. *Ver.* 3. p. 799. *Reich. Exc.* 3. p. 712. n. 4527., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 6. *Cist.* t. 25. f. 4527. fig. mutuata a Vivianio, sed nimis viridis, nec villosa-incana, ut est planta Vivianii.
- Cistus guttatus* Sp. pl. p. 741. *Smith. Engl. Fl.* 3. p. 24., et *Engl. bot.* v. 8. t. 544. *Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr.* 1. p. 366., et *Fl. Græc.* 5. p. 79. t. 498. *Curt. Lond. ed. Grav.* v. 2. t. 67. *All. Ped.* 2. p. 103. n. 1667. *Balb. Taur.* p. 86. *Re Seg.* p. 44. *Birol. Acon.* 1. p. 181. *Viv. Ann. bot.* 1. par. 2. p. 173. *Sav. Pis.* 1. p. 12., et *Bot. Etr.* 2. p. 129. *Host. Austr.* 2. p. 55.
- C. acuminatus* Viv. *Ann. Bot.* 1. par. 2. p. 172., et *Fl. Ital. Fragm. fasc.* 1. p. 13. t. 14. f. 1.* herb.
- C. serratus* Cav. *Ic.* 2. p. 57. t. 175. f. 1.
- Xolantha racemosa* Raf. *Caratt.* p. 74. t. 18. f. 1. sine corolla.
- Helianthemum* flore maculoso *Column. Ecphr.* 2. p. 78. fig. p. 77.
- Cisto annuo con fiore guttato *Pon. Mont. Bald.* p. 19. fig.
- Cistus* flore pallido, punicante macula insignito *Cup. Hort. Cath.* p. 52.
- Ital. Fior gallinaccio* Targ. Tozz. *Diz. bot.* 2. p. 61.
- Ann. Vulgare* in herbis Italiae. Legi Sarzanæ in collibus, et in litore Lunensi alla *Marinella*, in Ducatu Massensi in sylvis editioribus montis *Bruciana*. Filius attulit ex alpinis Apuanis humilioribus in castaneis supra *Fornole*, et ex Ducatu Lucensi in arenis di *Viareggio*. Habui Genuâ in herbis al *Lagazzo* a RAINERO, ex Liguria occidua in vertice montis *Gazo*, ubi Vivianius, et in alveo torrentis *Varena* prope *Pegli* a VINCENTIO, ex *Consienza* in *Lomellina* ab Eq. CESATE, ex colliculo *la Cava* prope Ticinum a PPrr. BALSAMO-CRIVELLIO, et DE NOTARIS, ex monte *S. Eutichio* prope Comum a RAINERO, Veronâ in sylva *del Mantico* a MANGANOTTO, ex monte *Ricco* prope *Monselice* a MONTINIO, ex Piceno in monte *Acuto* ab ORSINO, ex Etruria in vicinis di *Filigne* ab Eq. RICCASOLD, in collibus circa Florentiam a REBOULIO, a *Maiano*, et alla *Sassetta* a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTO, in monte *S. Savino*, et a *Monterchi* ab AMIDEO, ex *Canino* a Rev. Fr. MAURITIO DE BRIXIA, Româ a Prof. SEBASTIANO, item alla *Valle dell' Inferno* a Prof. MAURIO, et in monte *Malo* a BARBIERO, Terracinâ nella *Maocchia*

a *FIORINIA-MAZZANTIA*, ex *Montenuovo* prope *Bajas* ab *ORSINO*, et a *RAINERO*, *Brundusio* ab *Eq. PAROLINIO*, ex insula *Caprearum* a *Prof. GIRALDIO*, ex *Inarime*, ex collibus *aiccia Siciliae*, praesertim in collibus *arenosis del Comiso*, et *Vittoria* ab *Eq. GUSSONIO*, ex collibus *Panormitania* a *Prof. PARLATORE*, ex pascuis *Sardiniae* ab *Eq. Prof. MORISIO*, ex *Sardinia septentrionali*, et ex *Corsica* a *Bonifacio* a *SERAFFINIO*, a *Calvi* a *SOLEIROLIO*. Floret Majo, Junio.

Radix tenuis, fusiformis, aut fusiformi-ramosa, flexuosa, fusce rubida. Caulis teres, erectus, simplex, vel ramosus, subinde jam a basi, ramis alternis, pilosus, pilis patentibus, pluribus fasciculatis, interdum cum pubescentia brevi albida stellata pilis interjecta, a palmo ad pedem longus. Folia sessilia, oblongo-lanceolata, trinervia, nunc tantum echinulata pilis stellantibus, nunc adspersa pilis longioribus interjectis, nunc hirsuta; dantur quoque albido-pubescentia, et canescenti-villosa; inferiora acutiuscula, exstipulata, lusu latiora, oblonga, tri-quinquennervia; successiva angustiora, acuta, pariter exstipulata, supremaque lanceolata, acuminata, saepe stipulata; quandoque in individuis macris omnia folia sunt angusta, lanceolata, acuminata. Stipulae lineares, lanceolato-lineares, acuminatae, inaequales, longae, raro longissimae, et folio subaequales. Racemi terminales cauli, ramisque, simplices, nobiles apice recurvi, in anthesi erecti, nunc solitarii, nunc duo in apice caulis, nunc plures in caule ramo, paniculati, ceterum nudi, aut inferne bracteati bractea foliacea, stipulata, alias sub uno, alterove pedicellorum, raro sub omnibus, bracteola ovato-lanceolata instructi, hirti pilis patentibus, rarius cum pubescentia albida immixta. Pedicelli tenues, filiformes, nudi, floriferi erecti, fructiferi patentes, aut recta retroflexi, aut recurvi, vix erecto-patuli, inferiores inter se remotiores, longiores, etiam pollicares. Calyx parvus, hirsutus pilis patentibus, e bulbillo subinde nigrescente profectis, raro pubescentia albida interjecta, foliolis duobus externis lanceolatis, ovato-lanceolatis, vel linearibus, nunc paulo, nunc dimidio, nunc triplo brevioribus, internis ovato-lanceolatis, acutis, aut acutiusculis, in flore núbili erecto-conniventibus. Corolla calyce longior, pallide flava, petalis cuneatis, truncatis, crenulatis, aut serrulatis, vel obovatis, integris, aut emarginatis, basi pictis macula sanguineo-rubella,

subinde immaculatis, citissime diffuis. Stigma sessile, subglobosum, papillosum. Capsula chartacea, calyce brevior, raro æqualis, ovoideo-trigona, obtusa, apice pilosula, ad oras valvarum ciliata, matura flava, incomplete trilocularis, trivalvis, dehiscens valvis erecto-patulis. Semina exigua, numerosa, trigona, sub vitro granulata, matura flavo-ferruginea. Funiculi umbilicales longi, crassiusculi. Herba viscida.

Stilum post nuptias elongatum, quem Smithius indicat in Engl. Fl. 3. p. 24., mihi nunquam videre datum est. *Cistus acuminatus* Viv. juxta exemplar autopticum in herbario ejus est hæc ipsamet species macra, et villosa-incana, petalis immaculatis.

**** *Stipulati herbacei.*

10. *HELIANTHEMUM ledifolium*: annuum, pubescens; caule ascendente, erectove; foliis inferioribus oppositis, elliptico-oblongis, superioribus lanceolatis, supremis alternis; racemo foliato; pedicellis oppositifoliis, calyce acuminato brevioribus; stilo elongato.

H. ledifolium Willd. *En. hort. Berol.* 1. p. 571. Hook. *Brit. Fl. ed. 2. p. 258.* Coll. *Herb. Ped.* 1. p. 246. n. 10. *De Cand. Franç. 4. part. 2. p. 819.* herb. ex Guss.

H. niloticum Coll. *Herb. Ped.* 1. p. 246. n. 9. *Ten. Nap. 4. p. 312., et Syll. p. 257. n. 4. B. Guss. Fl. Sic. prodr. 2. p. 24.,* et Sup. 2. p. 180.* Presl. Sic. 1. p. 121. α. β. Moris. Sard. 1. p. 214.* Boiss. Voy. en Esp. 2. p. 64.*

Cistus ledifolius Sp. pl. p. 742. herb. ex Guss. Smith. *Engl. Fl. 3. p. 24., et Engl. bot. v. 34. t. 2414. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 366. All. Ped. 2. p. 104. n. 1668.*

C. annuus folio Ledi Lob. *Ic. p. 118. fig.*

C. annuus Clus. *Hist. pl. lib. 1. p. 76. fig. pl. macrioris.*

Ital. *Eliantemo Falsoledo.*

Ann. Habui ex Calabria, et ex Sicilia ab Eq. Gussone, Panormo a *Catalfano* a Prof. PARLATORE, ex collibus siccis Sardinie ab Eq. Prof. MORISIO. Floret Aprili, Majo.

Radix brevis, fusiformi-ramosa, flexuosa, fusce rubens. Caulis erectus, vel adscendens, sæpe basi emittens ramum unum, vel duos oppositos, ipso breviores, adscendentes, reliqua parte ferens ramulos plerumque abortivos, teres, pubescens, pilis fasciculatis, patulis, a spithama ad pedem, et ultra longus. Folia inferiora elliptico-oblonga, acutiuscula, brevissime petiolata, *Flor. Ital. T. V.*

opposita, suprema lanceolata, sessilia, alterna, omnia uninervia, sursum venosa, integerrima, pubescentia, pilis brevibus, fasciculatis, et quandoque veluti tomentosula, subtus albidiora. Stipula lanceolata, acuta, folio circiter dimidio breviores. Racemus terminalis, longus, simplex, foliatus, inferne remotiflorus. Folia floralia reliquis angustiora, pari modo stipulata. Pedicelli crassi, oppositifolii, calyce multo breviores. Calyx fere quinque lineas longus, more pedicellorum pubescens, vel tomentosulus, scatenis pilis fasciculatis, præsertim in nervis, foliolis duobus externis lanceolatis, acuminatis, uninerviis, paulo brevioribus, internis ovato-lanceolatis, longe acuminatis, crasse trinerviis, in flore núbili erecto-conniventibus. Corolla pallide flava, calyce brevior, petalis obovatis, integris, fugacissimis. Stylus longus, rectus, apice crassior. Stigma capitatum. Capsula subcoriacea, grandis, ovoideo-trigona, obtusa, glabra, ad oram valvarum ciliata, calyce paulo brevior, aut æqualis, matura flava, incomplete trilobularis, trivalvis, valvis in dehiscencia totis divisis, erecto-patentibus. Semina exigua, ovoidea, rostello apiculata, lævia, matura flavo-ferruginea. Funiculi umbilicales longiusculi, clavati, erecto-patuli. Pubescentia totius plantæ albida, mollis.

11. *HELANTHEMUM salicifolium*: erectum, ramosum, patulum, pubescens; foliis oppositis, petiolatis, obtusis, inferioribus obovatis, superioribus oblongo-lanceolatis; racemo foliato; pedicellis calyce longioribus, fructiferis patentibus.

H. salicifolium Coll. Herb. Ped. 1. p. 246. n. 11. Pollin. Ver. 2. p. 184. Barb. Agg. p. 36.* Sang. Cent. p. 75.* Ten. Nap. 1. p. 297.* et Syll. p. 257. A. B. C.* Guss. Fl. Sic. prodr. 2. p. 24.* Presl. Sic. 1. p. 122. Moris. Sard. 1. p. 213. α. β.* Boiss. Voy. en Esp. 2. p. 64. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 830., et Prodr. 1. p. 273. n. 37. α. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 47. Koch. Syn. p. 81. Reich. Exc. 3. p. 713. n. 4538., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 2. p. 7. Cist. t. 28. f. 4538. Gaud. Helv. 3. p. 451.

H. intermedium Presl. Sic. 1. p. 121. De Cand. Prodr. 1. p. 272. n. 35. Boiss. Voy. en Esp. 2. p. 64.

H. denticulatum Presl. Sic. 1. p. 122. De Sal. in Bot. zeit. ann. 1834. p. 74.* De Cand. Prodr. 1. p. 272. n. 36.

H. retrofractum Reich. Exc. 3. p. 713. n. 4539., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 7. Cist. t. 28. f. 4559.

H. sanguineum Lag. in De Cand. Prodr. 1. p. 273. n. 38.

Cistus salicifolius *Sp. pl. p. 742. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 367., et Fl. Græc. 5. p. 80. t. 499. Cav. Ic. 2. p. 35. t. 144. All. Ped. 2. p. 104. n. 1669. Ab Ucr. Hort. Pan. p. 224. Desf. Atl. 1. p. 424. Host. Austr. 2. p. 56.*

H. annuum humile, foliis ovatis, flore fugaci Segui. Sup. p. 197. t. 6. f. 3.

Ital. Eliantemo salcerello.

Ann. Habui ex Liguria occidua in maritimis ad Albinaunum a Prof. GHERARDIO, et in planitie del Cerialo a Prof. SASSIO, ex Pedemontio a Prof. BALEISIO, Veronâ al Campo Marzio a MANGANOTTO, et al Porto dell'Adige a RAINERO, ex Istria in amphitheatro Pola a MAJERO, in viciniis Pola, et in fruticetis inter Polam, et Dignano a TOMMASINIO, et a BIASOLETTO, ex Præstutiis a Rocca di mezzo ab ORSINO, Ostiâ a BARBIERO, ex viciniis lacus dei Tartari, et circa Tibur a Prof. MAURIO, et a FIORINIA-MAZZANTIA, Salerno, et ex Gargano ab Eq. Prof. TENORIO, ex Apulia al Tavoliere, ex collibus Calabria, et Panormo alla Consolazione ab Eq. GUSONIO, iterum Panormo a Prof. PARLATORE, ex collibus Sardinia ab Eq. Prof. MORISIO, et in collibus Calaritanis a Prof. DE NOTARIS, ex Corsica a Bastia a DE SALIS. Floret Aprili, Majo.

Radix ut in præcedente. *Caulis* teres, erectus, cinereo-pubescentia, raro simplex, plerumque basi, et subinde etiam reliqua parte, vel superne ramosus, ramis omnibus patenti-ascendentibus, intermediis sæpe abortivis, brevibus, et tantum foliatis, mire varians longitudine a pollice ad pedem. *Folia* opposita, breviter petiolata, obtusa, plana, integra, rarius subdenticulata, viridia cum pubescentia cinerea, et magis subtus, uninervia, sursum venosa, inferiora breviora, obovata, superiora elliptico-oblonga, basi tamen quidquam angustata; omnia in individuis macrioribus angustiora, oblongo-lanceolata, præsertim superiora. *Stipulae* lanceolatae, inferiores triplo, superiores dimidio breviores folio. *Racemus* terminalis, simplex, foliatus, laxiflorus, pubescens, sæpe longus, et multiflorus, in plantis macria tantum brevis, et pauciflorus. *Folia* floralia alterna, lanceolata, acutiuscula, inferiora stipulata, reliqua nuda. *Pedicelli* oppositifolii, aut siti extra folia, plerumque calyce paulo longiores, pubescentes, nudi, fructiferi patenti-ascendentes, raro recurvati. *Flores* parvi. *Calyx* cinereo-pubescentia pilis stellatis,

in nervis villosus, foliolis duobus externis linearibus, fere dimidio brevioribus, internis ovatis, aut ovato-lanceolatis, acutis, in flore nubili erecto-conniventibus. Corolla pallide flava, calyce paulo longior, petalis obovatis, integris, aut crenulatis. Stylus brevis, erectus, apice crassior. Stigma depresso-capitatum, papillosum. Capsula calyci æqualis, aut paulo brevior, cartilaginea, ovoideo-trigona, obtusa, glabra, ad oram valvarum ciliata, incomplete trilobularis, trivalvis, matura flava, et dehiscens valvis erecto-patentibus. Semina exigua, ovoidea, brevissime apiculata, sub vitro granulata, maturitate ferruginea, vel ferrugineo-rufescentia. Funiculi umbilicales longiusculi, clavati, patenti-ascendentes.

12. *HELIANTHEMUM ægyptiacum*: caule erecto; foliis oppositis, breviter petiolatis, lanceolato-linearibus, margine revolutis; racemo secundifloro, simplici; pedicellis bractea brevioribus; calycibus fructus scariosis, inflatis.

H. ægyptiacum Willd. *En. hort. Berol.* 1. p. 571. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 246. n. 12. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 25.* *Presl. Sic.* 1. p. 123. *Moris. Sard.* 1. p. 212.* *Desf. Atl.* 1. p. 424. *De Cand. Prodr.* 1. p. 273. n. 39.

Cistus ægyptiacus Sp. pl. p. 742. *Jacq. Obs.* 3. p. 17. t. 68. *Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 224.

Chamæcistus Rosmarini foliolis, vesicarius *Cup. Hort. Cath.* p. 46.

Ital. *Eliantemo vescicoso*.

Ann. Habui ex radicibus Vulturis a GASPARRINIO, ex Sicilia meridionali ab Eq. GUSSONIO, et in montosis a Cotrano a Prof. PARLATORE, ex pascuis siccis Sardinie ab Eq. Prof. MORISIO. Floret Aprili, Majo.

Radix gracilis, fusiformis, lateraliter parce ramulosa. Caulis teres, erectus, vel ascendens, puberulus pilis incurvis, palmaris-pedalis, virens, aut inferne rubescens, modo solitarius, simplex, aut superne ramosus, modo e collo radice plures, cæspitosi, inferne ramosi. Folia opposita, breviter petiolata, anguste lanceolato-linearibus, obtusiuscula, margine revoluta, supra late viridia, adpresse pilosa, subtus pallidiora, tomentosa, tomento stellato, cinereo, sex-decem lineas longa. Stipulae lineares, folio quadruplo, et quintuplo breviores. Racemus terminalis, simplex, laxiflorus, foliatus, secundiflorus. Bractea foliaceæ, anguste lineares, longæ, alternæ, basi stipulatæ. Pedicelli

bracteis, et calyce breviores, oppositifolii, hirtuli, fructiferi recurvati. Calycis foliola duo exteriora lanceolato-linearia, viridia, pilosa, fere triplo breviora, interiora tria grandia, ovata, acuta, quadrinervia, nervis hispidis, viridibus, aut rubentibus, inter nervos scariosa, pellucida, pallentia, vel rubescentia, glabra, nitida, in fructu aucta, conniventia, et calycem scarioso-vesiculosum sistentia. Corolla pallide flava, calyce brevior, petalis ellipticis, integris, vel apice crenulatis. Stilus erectus, apice crassior. Stigma capitatum. Capsula calyce vesicario tecta, chartacea, ovoideo-trigona, pubescens, incomplete trilocularis, trivalvis, matura flava, et dehiscens valvis erectis. Semina ovoideo-trigona, sub vitro scabra, granulis cinerascensibus.

***** *Stipulati, suffruticosi.*

13. *HELIANTHEMUM semiglabrum*: inferne pubescens, superne glabrum; caule decumbente, erectove, ramosissimo; foliis oppositis, lanceolato-linearibus, oblongisve, margine revolutis; racemo secundifloro, simplici, pedicellis bractea longioribus, fructiferis recurvatis; calycibus glaberrimis.

H. semiglabrum *Bad. in Morett. Bot. Ital. p. 14. n. 87.**
non Morisii.

Ital. *Eliantemo persichino*.

Suffr. Habui ex Liguria occidua *al Capo di Noli a RANERO*, et in collibus vallis Albingaunensis a *BADAROD*.
Floret Majo, Junio.

Radix fusiformis, aut fusiformi-ramosa, potius gracilis, flexuosa, rubido-fusca. Caulis decumbens, vel erectus, inferne ramosissimus, et pubescens, pilis stellatis, aut fasciculatis, rubido-purpurascens, reliqua parte glaber, viridis, nitens, circiter spithamalis. Folia opposita, brevissime petiolata, nunc longiora, anguste lanceolato-linearia, acutiuscula, nunc breviora, oblonga, aut oblongo-lanceolata, utraque margine revoluta, et saepe ciliata, inferiora supra late viridia, et adspersa pilis solitariis, aut geminatis, subtus pallidiora, et pilis exiguis, stellulatis scatentia, inque nervo pilis longioribus, ut plurimum geminatis, superiora utrinque viridia, glabra, nitida, aut vix ciliata, et in nervo pilosa. Stipulae lineares, subinde angustissimae, inferiores erebre ciliatae, folio triplo, et quadruplo breviores, superiores paulo longiores, glabrae, aut pile

terminatæ. Racemus terminalis, simplex, breviter pedunculatus, secundiflorus, nubilus nuntans, in anthesi erectus, laxatus. Calyx totus glaberrimus, foliolis duobus externis linearibus, triplo, vel quadruplo brevioribus, internis ovatis, obtusiusculis, quadrinerviis, nervis crassis, sæpe e rubido purpurantibus, inter nervos pallentibus, ante anthesim contorto-conviventibus. Corolla rosea, calyce longior. Stylus staminibus longior, inferne sygmoideus, superne declinans, apice incrassatus. Stigma depresso-capitatum, papillosum. Capsula chartacea, calyce paulo brevior, pube stellata minima adspersa, ovoideo-trigona, obtusa, incomplete trilocularis, trivalvis, matura flava, aut flavo-fusca, valde patens. Semina grandiuscula, ovoideo-trigona, apice angustata, sub vitro minutissime granulata, matura fusce ferruginea. Funiculi umbilicales erecti, clavato-triquetri.

Helianthemum semiglabrum Reich. Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 8. Cist. t. 35. f. 4558. corolla lutea profecto non respondet *Helianthemum semiglabrum* Bad., quod habet corollam roseam; figura tamen bene exhibet plantam Badaroi, colore floris excepto.

14. *HELIANTHEMUM Morisianum*: totum pilis stellatis adspersum; caule decumbente, inferne ramosissimo; foliis brevibus, angustis, oblongo-lanceolatis, obtusiusculis, margine revolutis, subtus tomentosis; nervis calycinis ciliatis; capsulis dense pubescentibus.

H. ciliatum *Moris. Stirp. Sard. et. fasc. 1. p. 6.** non De Cand. Prod.

H. semiglabrum *Moris. Sard. 1. p. 202. t. 13.** non Bad. Ital. *Eliañtemo Sardo*.

Suffr. Habui ex montibus d' Arcidano in Sardinia ab Eq. Prof. MORISIO. Floret Majo, Junio.

Radix fusiformi-ramosa, fusce rubida. Caules a radice plures, decumbentes, inferne brevi tractu lignosi, plerumque crassi, tortuosi, rubido-fusci, glabrati, ramosissimi, ramis ascendentibus, palmares-pedales. Rami annotini tenues, tecti pilis stellatis, brevibus, canescentibus. Folia opposita, brevissime petiolata, angustata, oblongo-lanceolata, obtusiuscula, supremis tantum acutiusculis, margine revoluta, quatuor-quinque lineas longa, supra late viridia, pilisque stellatis, vel fasciculatis, raris adspersa, subtus cano-tomentosa, tomento stipato, stellato, et insuper in nervo pilis fasciculatis scatentia. Stipulae lineares, acutæ, ciliatæ,

sæpe pilo, aut fasciculo pilorum terminatæ, inferiores triplo, superiores dimidio breviores folio. Racemus ut in præcedente, sed pilis stellatis, fasciculatisque pubescens, pedicellis plerumque purpurantibus. Calycis foliola duo externa ciliata, interna adpersa in tota superficie pilis exiguis stellulatis, et in nervis ciliata pilis longioribus geminatis, aut fasciculatis. Corolla calyce longior, pallide rosea, ungue petalorum luteo. Petala obovata, subcrenata. Capsula dense pubescens, et fere tomentosula, pilis fasciculatis, stellatisque. Reliqua omnia ut in præcedente specie.

Hæc stirps est intermedia inter *Helianthemum semiglabrum* Bad., et *Helianthemum ciliatum* De Cand. Prodr. 1. p. 283. n. 110., sive *Cistum ciliatum* Desf. Atl. 1. p. 421. tab. 109. Quantum recedat a primo, liquet ex characteribus specificis, et ex descriptione datis. Planta vero Desfontainesii differt a nostra foliis duplo longioribus, inferioribus acutis, superioribus acuminatis, foliolis calycinis internis pariter acuminatis, nervis, sive angulis, glandulosis, et pilosis.

15. *HELIANTHEMUM thymifolium*: caule ramosissimo, decumbente, erectove, inferne lignoso; foliis sessilibus, sublinearibus, obtusiusculis, margine exquisite revolutis, pubescentibus, glabrisque, inferioribus oppositis, superioribus alternis; racemo simplici; capsula complete triloculari; seminibus reticulatis.

H. *thymifolium* Bad. in Morett. Bot. Ital. p. 13. n. 83.* De Cand. Prodr. 1. p. 276. n. 56. Reich. Exc. 3. p. 714. n. 4543., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 7. Cist. t. 29. f. 4543.

H. *Barrelieri* Fior. in Giorn. de' Lett. Pis. ann. 1827. tom. 17. p. 121.* Ten. Nap. 4. p. 314. t. 145.* et Syll. p. 258. n. 13.* Guss. Fl. Sic. prodr. 2. p. 20. a. b.* et Sup. 2. p. 179.* Presl. Sic. 1. p. 125. De Cand. Prodr. 1. p. 276. n. 55.

H. *glutinosum* Coll. Herb. Ped. 1. p. 250. n. 28. Ten. Syll. app. p. 632. n. 12. bis. Presl. Sic. 1. p. 126. Moris. Sard. 1. p. 205. a. β. γ.* Boiss. Voy. en Esp. 2. p. 55. De Cand. Franc. 4. part. 2. p. 821. a. β., et Prodr. 1. p. 276. n. 57. Reich. Exc. 3. p. 714. n. 4544., et Ic. Fl. Germ., et Helv. 3. p. 7. Cist. t. 30. f. 4544.

H. *juniperinum* Ten. Nap. 4. p. 314. Lagasc. in De Cand. Prodr. 1. p. 275. n. 54.

H. *viride* Bad. in Morett. Bot. Ital. p. 13. n. 82. Fior. in Giorn. de' Lett. Pis. ann. 1828. tom. 17. p. 14. Ten. Nap. 1.

p. 299. t. 47., et Syll. p. 258. n. 11. Guss. Pl. rar. p. 214*, et Fl. Sic. prodr. 2. p. 19*, et Sup. 2. p. 179*. Presl. Sic. 1. p. 125. De Cand. Prodr. 1. p. 275. n. 53. Reich. Exc. 3. p. 714. n. 4542., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 7. Cist. t. 29. f. 4542.

H. læve Pers. Syn. pl. 2. p. 78. n. 55. Reich. Exc. 3. p. 713. n. 4541., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 7. Cist. t. 29. f. 4541.

Cistus thymifolius Sp. pl. p. 743. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 367., et Fl. Græc. 5. p. 81. t. 500. All. Ped. 2. p. 104. n. 1671. A. C. Desf. Atl. 1. p. 420.

C. glutinosus Mant. alt. p. 246. Cav. Ic. et descr. 2. p. 36. t. 145. f. 2. All. Ped. 2. p. 106. n. 1677.

C. lævis Cav. Ic. 2. p. 35. t. 145. f. 1.

Chamaecistus Thymi foliis, tenuioribus, ex quolibet oculo multis, uno aliis elatiori Cup. Hort. Cath. p. 46.

Ch. angusto Thymi folio, hisp. Barrel. Ic. 416.

Cb. luteus Thymi folio polyanthos seu major Barrel. Ic. 443.

Cb. luteus Thymi folio *ελαττωδης* seu minor Barrel. Ic. 444. Ital. *Eliantemo Peverella*.

Suffr. Legi in monte Pisano prope *Caldaccoli*. Habui ex Liguria occidua ab Eq. RICCASOLO, in collibus di *Lai-gueglia* a BADAROO, al *Capo di Noli* a RAINERO, ex collibus Nicænsibus a Prof. BALBISIO, et ab Eq. Prof. MORISIO, ex Piceno in rupibus ad Cupram maritimam, in monte *Leone*, et in viciniis Interamne Præstutæ ab ORSINO, ex monte Pisano in montibus d' *Avane* ab Eq. Prof. CAJ. SAVIO, et a Prof. PETRO SAVIO, Ostiâ a Prof. MAURIO, ex Circro, et Terracinâ a FIORINIA-MAZZANTIA, ex oris Acherusim ab Eq. Prof. TENORIO, et a RAINERO, ex eodem loco, et ex oris lacus di *Ligola* ab ORSINO, ex radicibus meridionalibus Gargani, ex collibus di *Lecco*, ex Sicilia in calcariis di *Val di Mazzara* ab Eq. GUSSONIO, Panormo a S. Martino ab ORANGERO, in monte dell' *Occhio*, et a Gimilmessa a Prof. PARLATORE, a Biscari ab Eq. PAROLINIO, ex insula Caprearum a Prof. GIRALDIO, ex Sardinia ab Eq. Prof. MORISIO, et in pascuis di *Siligua* a Prof. DE NOTARIS, ex Corsica a Bonifacio, et a Ostriconi a SOLEIROLIO. Floret April, Majo.

Radix fusiformis, longa, flexuosa, crassiuscula, rubido-fusca, lateraliter plus minus ramosa, senio epidermide secedente, frustulosa obducta. Caulis teres, inferne lignosus, durus, ætate crassus, rimosus, fuscus, cæterum

ramosissimus, nunc decumbens, et basi tortuosus, nunc erectus, palmaris-spithamalis. Rami annotini tenues, cinereo-pubescentes, pubescentia insigni, aut brevior, et fere pulveracea, præsertim inferne, interdum quoque ibidem glabri; in parte superiore indunt viscosi, vel non. Folia sessilia, approximata, inferiora opposita, superiora alterna, utraque angusta, brevía, lanceolato-linearía, vel linearía, obtusiuscula, margine exquísite revoluta, nervo crasso dirempta, pubescentia, vel inferiora farinosa, aut glabra, nuda, vel ciliata, et subinde pilo terminata, superiora viscosa, vel non, prout ludit caulis, longitudine mire ludentia a æsquilinea ad lineas quatuor, vel quinque etiam in eodem individuo, ima quandoque brevissima, et elliptico-lanceolata. In axillis foliorum plerumque est cespitulus aliorum foliorum breviorum ex ramulo abortivo. Stipulæ lineares, folio breviores, in reliquis eisdem similes, sæpe pilo terminatæ. Racemus terminalis, simplex, breviter pedunculatus, pubescens, viscosus, vel non, nubilus cernuus, postea erectus, laxatus, subsecundiflorus. Bractæ alternæ, similes foliis caulinis, sed breviores, imæ stipulatæ. Pedicelli tenues, axillares, vel extra bractæas, eisq. longiores, floriferi erecti, fructiferi patenti-recurvi. Flos parvus. Calyx pubescens, et in nervis hirtus, viscosus, foliolis duobus externis linearibus, aut lanceolato-linearibus, triplo, vel dimidio brevioribus, internis ovatis, superne angustatis, tamen obtusis, quadrinerviis, nervis viridibus, margine, et inter nervos membranaceis, pallentibus, et sæpe rubescentibus, in flore núbili apice conniventi-contortis. Corolla luteo-aurea, calyce paulo longior, petalis obovatis, emarginatis, aut rotundatis, cum vel sine acuminulo in medio. Stylus staminibus sublongior, declinatus, apice crassior. Stigma depresso-capitatum. Capsula chartacea, ovoideo-trigona, obtusa, longitudine calycis, glabra, nitida, lutea, senio ferruginea, complete trilobularis, trivalvis, dehiscens valvis totis patentissimis, et calyci patentissimo arcte adpressis. Semina grandiuscula, trigona, acuta, subsemilunata, dorso lato, acie interna, undique reticulata, reticulo albo, cæterum levia. In planta glutinosa sæpe pili apice capitati guttula glutinis condensati.

Hæc species a diverso statu pubescentiæ, a præsentia, vel defectu glutinis, a longitudine foliorum mire ludibunda, a colore cinereo, vel viridi herbæ in falsas species

discerpta est, quas rectissime in unum conjunxerunt Spachius in Ann. bot. sec. ser. tom. 6. p. 359., et Boissierius Voy. en Esp. 2. p. 55. Linnæus in Sp. pl. l. c. vocavit *Cistus thymifolium*, eo quod folia ejus valde referunt folia *Thymi vulgaris* L., et hoc nomen longe antiquius, et præstantius est nomine *Cisti glutinosi*, quod innititur characteri sæpe deficienti.

16. *HELIANTHEMUM Savii*: caule suffruticoso, ascendente, erectove; foliis alternis, lanceolatis, acutis, planis, pubescentibus; racemo laxifloro, simplici; calycibus acuminatis, hirsutis; seminibus lævibus, tomentosulis.

H. Savii Bert. *Amæn. Ital.* p. 78. n. 5. *Sang. Cent.* p. 76.*

H. arabicum B. *Ten. Nap.* 4. p. 314., et *Syll.* p. 258. n. 9. *B.*

Cistus Savii Bert. *Rar. Ital. pl. dec.* 2. p. 36. n. 5. *Sav. Bot. Etr.* 1. p. 154.

Ital. Eliantemo Pisano.

Suffr. Legi in monte Pisano supra *Caldaccoli*. Habui ex *lo Scaricatoio* prope Amalphim a Prof. MAURIO. Floret Majo.

Radix fusiformi-ramosa, crassa, longa, fusca, obducta cortice senectute fungoso-rimoso. Caulis erectus, vel ascendens, inferne lignosus, ramosus, spithamalis-dodrantalis. Rami sparsi, annotini pubescentes, pube patente. Folia alterna, lanceolata, acuta, plana, pubescentia, uninervia, brevissime petiolata, utrinque viridia, ima minora, creberrima, ut subopposita videantur, successiva longiora, et remotiora. Sæpe in axillis inferioribus adest cæspitulus foliorum exiguum ex ramulo abortivo. Stipula lanceolata semicordata, folio quadruplo, rarius triplo breviores. Racemus terminalis, simplex, laxiflorus, pauciflorus, foliatus. Pedicelli tenues, axillares, vel extra axillas, folio, et calyce longiores, pubescentes, nudi, fructiferi recurvi; subinde inter florem, et florem habentur plura folia sine floribus. Folia floralia suprema basi nuda, reliqua stipulata. Calyx hirsutus, foliolis acuminatis, externis duobus lanceolatis, dimidio brevioribus, internis ovatis, quadrinerviis, sæpe atrorubentibus. Corolla pallide lutea, calyce parum longior. Capsula chartacea, ovoideo-trigona, calyci subæqualis, semitrilocularis, trivalvis, apice puberula, reliqua parte glabra, nitida, matura lutea. Semina grandiuscula, triquetra, lævia, tenuissime albo-tomentosula. Pubescentia plantæ simplex, albida, sæpe apice glandulosa; tamen herba virens, viscida.

Sunt, qui confundant hanc speciem cum sequente, sed perperam.

17. *HELANTHEMUM arabicum*: canescenti-stellulatum, pilosumque; caulibus decumbentibus; foliis alternis, anguste lanceolatis, planis; stipulis minimis; racemo foliato, simplici; calycibus acutis, nervis pilosis; seminibus reticulatis, glabris.

H. arabicum Pers. Syn. pl. 2. p. 80. n. 80. Ten. Nap. 4. p. 313. A. et Syll. p. 258. n. 9. A.* Guss. Pl. rar. p. 215.* et Fl. Sic. prodr. 2. p. 21.* et Sup. 2. p. 180.* Presl. Sic. 1. p. 124. De Cand. Prodr. 1. p. 275. n. 50. excl. syn. Bert.*

Cistus arabicus Sp. pl. p. 745. Vahl. Symb. 2. p. 62. t. 35. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 369., et Fl. Græc. 6. p. 2. t. 503. Desf. Atl. 1. p. 419.

C. ericoides Jan. El. p. 8. n. 40. juxta exempl. apud Guss.

C. ferrugineus Lamck. Enc. méth. bot. éd. de Pad. tom. 2. p. 25. n. 32.

C. minor Thymi folio ferrugin. Barrel. Ic. 285.

Helianthemum Creticum, Linaria folio, flore croceo Tourn. Coroll. p. 18. herb. ex Guss.

Ital. *Eliantemo bianchiccio.*

Suffr. Habui ex collibus Reginis ab Eq. Prof. ΤΑΧΩΡΙΟ, et ab Eq. GUSSONIO, ex Sicilia meridionali denno ab Eq. GUSSONIO. Floret Aprili, Majo.

Præcedenti proximum, sed certissime diversum hisce notia. Caulis, ramique decumbunt, inferne glabri, reliqua parte canescentes pubescentia brevi. Folia anguste lanceolata, acuta, canescentia pilis exiguis stellulatis, adpressis, et insuper pilosula præsertim in nervo, et margine, sed non semper. Stipulae folio sextuplo breviores, ideo minimæ. Pedicelli quidquam longiores, quod bene demonstrat allata Barrelierii figura. Calyx pilis stellulatis, exiguis, adpressis adpersus, in nervis, præsertim inferne, pilis longis, simplicibus acutis, plerumque late purpurascens, inter nervos membranaceus, foliolis internis late ovatis, acutis. Corolla grandiniscula, saturate lutea, petalis basi ciliatis. Semina reticulato-foveolata, glabra, reticulo albo.

18. *HELANTHEMUM sessiliflorum*: canescenti-tomentosum; canle ramoso, erecto; foliis alternis, oppositisque, lanceolato-linearibus, margine revolutis; floribus apicatis, secundis; capsulis villosis, calyce sublongioribus.

H. sessiliflorum Pers. Syn. pl. 2. p. 78. n. 44. Ten. Nap. 4. p. 312., et Syll. p. 257. n. 6. Guss. Pl. rar. p. 213. et Fl. Sic. prodr. 2. p. 17.* Presl. Sic. 1. p. 123. De Cand. Prodr. 1. p. 273. n. 41.*

Cistus sessiliflorus Desf. *Atl.* 1. p. 417. t. 106. *Willd. Sp. pl.* 2. par. 2. p. 1262.

Ital. *Eliantemo spicato*.

Suff. Habui Tarento in Japygia, et ex Sicilia ad Comiso, et Vittoria ab Eq. Gussone. Floret Aprili, Majo.

Caulis erectus, vel adscendens, subspithamalis, teres, inferne lignosus, crassiusculus, rubido-fuscus, valde ramosus. Rami annotini tenues, incano-tomentosuli.

Folia alia alterna, alia opposita, brevissime petiolata, lanceolato-linearia, rarius lanceolata, obtusiuscula, margine revoluta, incano-tomentosula. Subinde in eorum axillis est cæspitulus foliorum breviorum ex ramulo abortivo. Stipulæ lineares, tomentosulæ, ciliatæ, et sæpe apice barbata, folio quintuplo, et sextuplo breviores. Spica terminalis, pedunculata, secundiflora, superne densiflora. Flores sessiles, exigui. Bractes lanceolata, vel lanceolato-lineares, calyce breviores, sæpe oppositifloræ. Calyces nobiles globulosi, incano-villosi, foliolis duobus externis lanceolato-linearibus, obtusis, vel acutiusculis, circiter dimidio brevioribus, internis ovatis, obtusis, quadrinerviis. Corolla flava, calyce paulo longior, fugax, petalis obovatis, exiguis. Stylus flexuosus, longitudine staminum. Stigma depresso-capitatum. Capsula exigua, globuloso-trigona, obtusa, incano-villosa, calyce sublongior, incomplete trilocularis, trivalvis. Semina numerosa, minuta, ferruginea, lævia, glabra. Tomentum plantæ stellatum.

Species *Helianthemo Lippii* Pers. valde proxima.

19. *HELIANTHEMUM vulgare*: caule procumbente, ramoso; foliis oppositis, petiolatis, supra pilosis, subtus tomentosis, inferioribus ovatis, superioribus oblongatis; stipulis ciliatis; nervis calycinis hirsutis; fructibus pendulis.

H. vulgare Pers. *Syn. pl.* 2. p. 79. n. 69. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 258. *α. Re Tor.* 1. p. 279. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 251., et 389. excl. *syn. Seguier., et Vivian. Bert. Rar. Ital. pl. dec.* 3. p. 24. n. 1. *α., et Amæn. Ital. p.* 31. n. 1. *α. Ten. Nap.* 4. p. 317. *De Cand. Franc.* 4. par. 2. p. 841., et *Prodr.* 1. p. 280. n. 85. *α. β. Lois. Desl. Gall. ed.* 2. tom. 1. p. 384.* *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 49. *Koch. Syn. p.* 81. *α. Reich. Exc.* 3. p. 714. n. 4547. *α. discolor, et Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 7. *Cist. t.* 30. f. 4547. *α. discolor. Gaud. Helv.* 3. p. 448.

H. arcuatum Presl. *Sic.* 1. p. 128. *Guss. Sup.* 2. p. 179.,* et *Fl. Sic. prodr. ed.* 2. tom. 2. p. 21.*

- H. serpyllifolium* Reich. Exc. 3. p. 714. n. 4550., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 7. t. 32. f. 4550.
- Cistus Helianthemum* Sp. pl. p. 744. Smith. Engl. Fl. 3. p. 26., et Engl. bot. v. 19. t. 1321. Curt. Lond. ed. Grav. v. 2. t. 68. Fl. Dan. t. 101. Sv. bot. v. 6. t. 391. Sav. Pis. 2. p. 13. Lois. Desl. Gall. 1. p. 316.*
- C. tomentosus* Smith. Engl. Fl. 3. p. 27., et Engl. bot. v. 31. t. 2208. pl. luxur.
- C. n. 1033. a.* Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 3.
- β foliis pilosis, utrinque viridibus, vel subtus albescentibus, tomento nullo.
- Helianthemum vulgare* Bert. Rar. Ital. pl. dec. 3. p. 25. n. 1. β. x., et Amæn. Ital. p. 31. n. 31. β., et p. 236. n. 24. β., et p. 373. n. 163. β. Pollin. Ver. 2. p. 185. α. β. γ. Ruch. Ven. p. 130. Moric. Ven. 1. p. 229. Nacc. Ven. 3. p. 82.* Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 178. β. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 51. β. γ. δ. Koch. Syn. p. 81. β. γ. δ. Reich. Exc. 3. p. 714. n. 4547. β. concolor., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 7. Cist. t. 30. f. 4547. β. concolor.
- H. obscurum* Pers. Syn. pl. 2. p. 79. n. 70. α. β. Re Tor. 1. p. 280., et Ad Fl. Ped. app. alt. in Accad. di Tor. ann. 1827. tom. 31. p. 199. De Cand. Franç. 5. p. 624. α., et Prodr. 1. p. 280. n. 89. Reich. Exc. 3. p. 714. n. 4548., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 7. Cist. t. 31. f. 4548.
- H. grandiflorum* Ten. Nap. 4. p. 317.,* et Syll. p. 259. n. 19.* De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 821., et Prodr. 1. p. 280. n. 88. Reich. Exc. 3. p. 714. n. 4549., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 7. Cist. t. 31. f. 4549. Gaud. Helv. 3. p. 449. α. β. γ.
- H. Seguierii* Pollin. Viag. al lag. di Gard. p. 98.
- Cistus Helianthemum* Willd. Sp. pl. 2. par. 2. p. 1209. β. All. Ped. 2. p. 105. n. 1673. A.* Comoll. Prodr. p. 104.
- C. grandiflorus* All. Ped. 2. p. 105. n. 1674. Re Seg. p. 45. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 377. tab. 25. pl. luxur.
- C. ovatus* Viv. Annal. bot. 1. par. 2. p. 174., et Fl. Ital. fragm. fasc. 1. p. 6. t. 8. f. 2. pl. macrior.
- C. barbatus* Sav. Pis. 2. p. 13.*
- C. hirsutus* Thuill. Paris. p. 266. Lois. Desl. Gall. 1. p. 317.
- C. n. 1033. γ.* Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 3.
- Panace Chironio* Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 785. fig. Dur. Herb. ed. Rom. p. 331. fig.
- Chironia*, quam quidam inter Panaces numerant Cæsalp. De pl. lib. 10. cap. 46. p. 397.

Helianthemum Venetum erectum elatius, et ferme glabrum, foliis oblongis atroviridibus quasi lucidis, flore luteo minore *Mich. Cat. hort. Flor. p. 48. n. 2., et ibid. app. p. 141. tab. 6.*

H. vulgare flore luteo *Zannich. Ist. p. 135. Hort. Rom. 4. t. 78.*

H. luteum glabrum Zannich. Ist. tab. 21. pl. macrior. Bonon. Herb.

H. alpinum vulgari simile, latioribus foliis *Segui. Sup. p. 193. n. 1. tab. 6. fig. 1.*

H. Serpilli folio, flore amplo, sulphureo *Segui. l. c. p. 195. n. 3.*

Ital. *Eliantemo. Panace chironio* Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 61.

Suffr. Legi in Liguria occidua in summis alpibus della *Scaggia* retro *Pegli*, in Insubria Helvetica prope *Lugano* in monte *S. Salvatore*. Habui ex Pedemontio in pascuis saxosis ad *Thermas Valderias* a *Bertero*, *Ticino*, ubi ego quoque olim legeram in colliculo *alla Cava*, et ex *Valsassina* in districtu *Comensi* a *PPrr. Balsamo-Crivellio*, et *De Notaris*, ex Tyroli meridionali in monte *Kankefal* prope *Bolzano* ab *Eq. De Heuflero*, ex Tyroli Italico in pratis alpibus *di Padon Fassano*, et *Italiano* a *Facchinio*, ex *Vette di Feltre Vallazza*, *Morsopian*, et in semita, quæ ducit ad *Aune* ab *Eq. Contareno*, ex Campania felici a *Cuserta* ab *Orsino*, ex collibus *Apulie* a *Gravina* a *Gasparri-*
nio, ex radicibus *Taburni*, et ex *Nebrodis* *Sicilie* ab *Eq. Gussonio*, ex insula *Caprearum* in vertice villæ *Tiberianæ* *Jovis* dictæ prope rudera *phari* a *Prof. Grimaldio*. Varietas β valde copiosa in sylvis, et collibus totius *Italie*. Legi *Sarzanæ* in *Montedarme*, in promontorio *Lunensi alla Bianca*, in provincia *Lunensi* in vertice *Cornoviglia*, et in monte prope dirutam arcem *di Montignoso*, *Bononiæ* in sylvis *degli Arienti*, in monte *Mariano*, *al Sasso*, et *Zolla predosa*. Filii attulit ex sylva *di Viareggio* in Ducatu *Lucensi*. Habui ex Liguria orientali in sylvis *di Sanguinetto* prope *Clavarum* a *Turro*, ex collibus *Genuensibus* a *Vincen-*
tio, ex Liguria occidua ab *Eq. Riccasolo*, ex pascuis agri *Pedemontani* a *Prof. Balbiso* de herbario *Allioni*, *Albæ Pompejæ* in pascuis sterilibus, et in sabulosis ad *Tanarum* a *Bertero*, ex *Cenisio* a *Bonjean-*
nio, ex districtu *Comensi* in monte *Resegone* a *PPrr. Balsamo-Crivellio*, et *De Notaris*, in alpe *Coliasso*

supra *Leco*, et ex valle *Pulicella* districtus Veronensis a *RAINEIRO*, ex valle Frigida montis Baldi a *MANGANOTTO*, et ex eodem monte a Prof. *VISIANO*, ex Tyroli meridionali in districtu Tridentino a *FACCHINIO*, ex *Portole* Vicetinarum, et ex districtu Bassanensi in *Grappa*, et in sterilibus incultis a *MONTINIO*, et ab Eq. *PAROLINIO*, ex montibus Forojuliensibus a Prof. *BIGNOLIO*, ex *Vette di Feltre* a *MONTINIO*, ex siccis circa Tergestum a *TOMMASINIO*, et a *BIASOLETTO*, ex herbidis di *Vallesina* in ora Veneta a Prof. *NACCARIO*, ex alveo Vaterni a *TASSINARIO*, ex subapennino Ariminensi a *Sasso Feltrio*, et in monte S. Marini ab *AZZAROLIO*, Senogalliâ secus Senam a *SALVATORIO*, ex Petra pertusa (*Furlo*) in districtu Urbinati a Prof. *OCTAVIANO*, ex Nursinis ad *Castelluccio*, et ex Piceno in *Vettore*, et in monte *Regina* ab *ORSINO*, in monte *della Sibilla alla Corona*, *alla Madonna dell'Ambro*, et in monte *Priore* a *MARZIALETTO*, iterum ex *Vettore* a Prof. *OCTAVIANO*, ex Prætiis in monte Cornu, et *Costons* ab Eq. Prof. *TENORIO*, ab Eq. *GUSSONIO*, et a Prof. *MAURIO*, ex Etruria in monte Pisano ab Eq. Prof. *CAR. SAVIO*, in Apennino Pistoriensi ad *Teso* a Prof. *PETRO SAVIO*, in montibus *della Consuma*, in sylvis Mugellanis, in agro Florentino, et ad balnea S. Philippi a Prof. *ANT. TARCIONIO-TOZZETTO*, ex *Canino* in districtu Viterbiensi a Rev. Fratre *MAURITIO DE BRIXIA*, ex Ciminis, et Româ in villa Pamphilia a Prof. *MAURIO*, Ostiâ a *BARBIERIO*, ex collibus Latii a *Marino* ab Eq. *PAROLINIO*, Terracinâ a *FLORINIA-MAZZANTIA*, ex Corsica a *Rustino* a *SOLEIROLIO*. Floret Aprili, Majo, et iterum autumnô, in editis Junio, Julio.

Radix fusiformi-ramosa, fusce rubida, longa, modo tenuis, modo crassiuscula. Caulis a radice plures, capitosi, prostrati, vel decumbentes, raro erecti, teretes, potius graciles, inferne perennantes, rufescentes, et sæpe glabri, reliqua parte pilosi, rarissime hirsuti, pilis solitariis, vel fasciculatis, patulis, raro glabri, a palmo ad pedem, et etiam quidquam ultra longi. Folia opposita, breviter petiolata, inferiora minora, subrotunda, aut elliptica, reliqua elliptico-oblonga, oblongo-lanceolata, vel lanceolato-linearia, raro cuneata lanceolato-linearia, aut linearia; cæterum omnia obtusiuscula, vel superiora acuta, margine nunc plana, nunc plus minus revoluta, supra late, aut saturato

viridia, sub vitro minute granulata, adpersa pilis longiusculis, raris, solitariis, vel geminatis, subinde etiam tribus-quatuor fasciculatis, rarius hirsuta, aut glabra, subtus tecta tomento albo, brevissimo, stellulato, stipato, interjectis pilis longioribus geminatis, vel fasciculatis, præsertim in nervo, et venis. Petioli unam-duas lineas longi. Stipulæ lineares, vel lanceolato-lineares, ciliatæ, glabræ, aut pilosæ more foliorum, et subinde hirsutæ. Racemus terminalis, pedunculatus, secundiflorus, nubilis densiflorus, nutans, in anthesi laxatus, et magis inferne, erectus, albido-pubescent, vel hirsutus more caulis. Bractæ lineares, ciliatæ, glabræ, aut pubescentes, aut hirsutæ, nunc sitæ sub pedicello, nunc extra. Pedicelli tenues, ludunt calyci æquales, breviores, aut paulo longiores, fructiferi penduli. Flos grandisculus, tamen magnitudinis variæ. Calycis foliola duo exteriora lanceolata, obverse lanceolato-linearia, obverse lanceolata, vel obovato-lanceolata, obtusa, dimidio, aut triplo breviora, pubescentia, vel hirsuta; interiora tria late ovata, acuta, vel acuminata, magnitudinis variæ, quinquenervia, nervis viridibus, aut purpurantibus, hirsutis, pilis solitariis, vel fasciculatis, aut geminatis, inter nervos submembranacea, pallentia, interdum rubescentia, glabra, aut pilis exiguis, stellulatis adpersa, raris tomentosula, in flore núbili apice conniventi-contorta. Corolla luteo-anrea, vel pallide sulphurea cum macula saturate lutea in basi petalorum, plerumque calyce triplo longior, petalis obovatis, integris, aut subcrenatis. Stamina lutea. Stilus staminibus æqualis, aut paulo longior, inferne sygmoidens, superne declinans. Stigma depresso-capitatum, papillosum. Capsula chartacea, ovoideo-trigona, obtusa, calyce paulo brevior, vel æqualis, plus minus hirta, incomplete trilobularis, trivalvis, dehiscens valvis totis patentissimis. Semina grandiuscula, ovoidea, tenniter granulata, matra rufo-ferruginea.

In varietate β caulis plus minus hirsutus pilis solitariis, geminatis, vel fasciculatis. Folia utrinque viridia, sed subtus pallidius, aut subinde albescentia sine tomento, in utraque facie pilosa, vel hirsuta, pilis longiusculis, rigidulis, solitariis, aut geminatis, paucis fasciculatis, raro stellantibus; ludunt margine ciliata, et in nervo pilosa, reliqua superficie glabra. Calyces nunc undique hirsuti, et subinde hirsutissimi, pilis longis, solitariis, geminatis, aut fasciculatis, plus minus

interjectis pilis exignis stellatis, interdum vero inter nervos glabri, et nitentes. Flos subinde, et præsertim in montanis editis, grandis. Pili totius plantæ orti e tuberculo. Reliqua ut in specie.

Tam in specie, quam in varietate β magnitudo partium mirimode varia. Stirps vexata, quia parum examinata suomet in loco natali.

20. *Helianthemum croceum*: cano-tomentosum, pilis stellatis; caule decumbente; foliis oppositis, petiolatis, inferioribus subrotundis, ellipticisve, superioribus oblongis; stipulis abbreviatis; calycibus acutiusculis; fructibus pendulis.

H. croceum Pers. Syn. pl. 2. p. 79. n. 73. Ten. Syll. app. p. 632. n. 23. Guss. Fl. Sic. prodr. 2. p. 26., et Sup. 2. p. 177. a. b.,* et Fl. Sic. Syll. tom. 2. p. 19. a. b.* Presl. Sic. 1. p. 128. Moris. Sard. 1. p. 204.* De Cand. Prodr. 1. p. 279. n. 78. a. β . γ . Reich. Exc. 3. p. 715. n. 455a., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 8. Cist. t. 32. f. 455a.*

H. vulgare ϵ Bert. Rar. Ital. pl. dec. 3. p. 25., et Amæn. Ital. p. 32., et 373. Guss. Fl. Sic. prodr. 2. p. 19. a.* b.,* et Sup. 2. p. 178.,* et Fl. Sic. Syll. 2. p. 21.*

H. hirtum Coll. Herb. Ped. 1. p. 252. n. 37. non Cavanill. Reich. Exc. 3. p. 715. n. 4551., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 7. Cist. t. 23. f. 4551. pl. macrior.*

H. glaucum Presl. Sic. 1. p. 127. Guss. Sup. 2. p. 177. a. b. c., et Fl. Sic. Syll. 2. p. 20. a. b. c.**

H. tomentosum Guss. Sup. 2. p. 177., et Fl. Sic. Syll. 2. p. 20.**

H. stellatum Guss. Sup. 2. p. 178., et Fl. Sic. Syll. 2. p. 20.**

Cistus pilosus flore luteo All. Ped. 2. p. 104. n. 1672. tab. 45. fig. 1. juxta exemplar meum Floræ Pedem. figuris coloratis præditum.

*C. Helianthemum $\frac{1}{2}$ canescens Jan. El. p. 8. n. 20.**

C. croceus Desf. Atl. 1. p. 422. t. 110. fide exemplaris autoptici, quod vidi apud Gussonium.

Helianthemum alpinum, erectum, incanum, lutenum, Helianthemis vulgaris facie, sed majus Mich. in Till. Cat. hort. Pis. p. 78.

Ital. Helianthemo felpato.

Suffr. Valde copiosum in alpibus Apuanis ab imo ad summum, ibique legi in Lunensium lapidicinis, in rupibus supra scaturigines Frigidæ, et in Tambura. Filius attulit ex eisdem alpibus in via, quæ ex il Cavallo ducit al Pisanino, et Prof. ANT. TANCIONIS-TOZZETTIUS Flor. Ital. T. V.

- misit lectum in montibus proximis di *Serravezza*. Habui ex rupestribus Nicænsibus ab Eq. Prof. MORISIO, et a COLLA, ex Petra pertusa (*Furlo*) in Apennine Urbinati ab Eq. NARDUCCIO, ex Sicilia in Nebrodibus, in montibus di *Busambra*, et alla *Pizzuta* ab Eq. GUSONIO, a Prof. JANIO, a Prof. PARLATORE, et a TOPARO, ex Sardinia tam in rupestribus montanis, quam in maritimis ab Eq. Prof. MORISIO. Floret a Majo in Julium.
- Caules inferne quam in præcedente lignosiores, cæspitosi, decumbentes, ascendentes, albo-tomentosi. Folia simili modo ludentia forma, et magnitudine, et interdum etiam minora, exigua, utrinque albo-tomentosa, vel in facie superiore tomento minus denso, quam in inferiore, tecta, et subinde pilis rariusculis, stellulatis tantum adspersa, ideo ibidem viridia, potius quam incana. Stipulæ anguste lineares, rarius lanceolato-lineares, acutæ, tomentosæ, dense ciliatæ, folio triplo, vel quadruplo breviores. Racemus pauciflorus. Dantur quoque flores in caule solitarii, terminales. Calyx inter nervos tomentosus, aut glaber, in nervis, rarius in tota superficie, villosus, villis longiusculis, fasciculatis, vel geminatis, vix solitariis, albus, albo-lutescens, aut rubellus præsertim in nervis. Ejus foliola interna quadrinervia, breviter acuta, margine altero late membranacea. Corolla luteo-aurea, senio crocea. Tomentum totius plantæ breve, molle, incanum, stellatum, plus minus stipatum, cui hic illic interjiciuntur villi longiores, molles, geminati, aut plures fasciculati, vix solitarii. Reliqua ut in *Helianthemum vulgari*. Distinctio præcipua stat in tomento stellato, molli, incano, quo *Helianthemum croceum* induitur, in racemo ejus paucifloro, et in calycibus breviter acutis. Etiam cum facies superior foliorum nudiior, et virens est, tamen pili stellulati, quibus hæc plus minus adspergitur, speciem facile demonstrant.
21. *HELIANTHEMUM roseum*: pulveraceum, pilisque exiguis, stellulatis adpersum; caule decumbente; foliis oppositis, petiolatis, inferioribus ovatis, superioribus oblongis, subtus cinereo-tomentosis; racemo simplici; pedicellis calyce longioribus, fructiferis recurvatis.
- H. roseum *Bad. in Morett. Bot. Ital. p. 14. n. 86.* De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 822. a., et Prodr. 1. p. 283. n. 108. Reich. Exc. 3. p. 715. n. 4557., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 8. Cist. t. 34. f. 4557.*
- Cistus roseus All. Ped. 2. p. 105. n. 1675. t. 45. f. 4.*

Ital. *Eliantemo roseo*.

Suffr. Habui ex collibus siccis Liguriam occidentem a BADA-
NOO. Floret Majo, Junio.

Simile *Helianthemum vulgare* α, sed certissime diversum
hisce notis. Caulis cinereo-pulveraceus, et insuper,
præsertim in parte superiore, pilis exiguis, stellulatis,
cinereis adpersus. Folia supra viridia, plus minus pi-
loso-stellulata, subtus pulveracea, et eisdem pilis stel-
lulatis cinereo-tomentosula. Stipulae lineares, acutæ,
plerumque apice piliferæ, aut barbatae. Pedicelli pas-
sim calyce longiores. Calyces pilis stellulatis undique
tecti, vel inter nervos glabrati. Corolla saturate rosea.
Reliqua similia.

22. *HELIANTHEMUM Berterianum*: caule decumbente, pu-
bescente, pilis fasciculatis; foliis oppositis, breviter
petiolatis, oblongo-lanceolatis, linearibusque, utrinque
concoloribus, pilosisque, pilis raris, stellantibus; ra-
cemo simplici; pedicellis calyci subæqualibus, fructi-
feris recurvatis.

H. rhodanthum Coll. Herb. Ped. 1. p. 254. sub. n. 42.*
quoad plantam a Bertero, non Dunal.

Ital. *Eliantemo rossigno*.

Suffr. Habui Albâ Pompejâ in ripis Tanari a BERTERO.
Floret Majo, Junio.

Magnitudine, et forma partium simillimum *Heliantemo
vulgare* β nostro. Caulis ejus pubescit pilis longiuscu-
lis, mollibus, fasciculato-stellantibus, sæpe divaricatis.
Folia utrinque viridia, adpersa eisdem pilis raris, et
inter se distinctis. Racemus longus, multiflorus. Pe-
dicelli calyci subæquales. Calyces tomentosuli, pilis
exiguis stellatis, in nervis villosi, villis longiusculis,
fasciculatis. Corolla rosea. Villositas totius plantæ al-
bida. Reliqua ut in illo.

Helianthemum rhodanthum Dun. in De Cand. Prodr. 1.
p. 282. n. 104. habet caulem tomentosiusculum, et folia
supra viridi-glauescentia, subtus tomentoso-incana,
quibus notis evidenter differt a planta nostra.

23. *HELIANTHEMUM polifolium*: incano-tomentosum, to-
mento stellato; caule decumbente, erectove; foliis op-
positis, petiolatis, lanceolatis, linearibusque, margine
revolutis; pedicellis fructiferis recurvatis; foliolis ca-
lycinis internis oblongis, obtusis.

H. polifolium Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 259.* Ten. Nap. 4.
p. 321. A. B. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 823., et
Prodr. 1. p. 283. n. 105. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4.

- p. 53. Koch. Syn. p. 82. α . β . Reich. Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 8. Cist. t. 35. f. 4556. c.
- H. pilosum Bad. in Morett. Bot. Ital. p. 14. n. 84.* Coll. Herb. Ped. 1. p. 253. n. 40. Bert. Amœn. Ital. p. 242. n. 5a. excl. Linn. syn. Reich. Exc. 3. p. 715. n. 4553., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 8. Cist. t. 33. f. 4553.
- H. apenninum Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 178.* Ten. Nap. 4. p. 319., et Syll. p. 260. n. 21. Presl. Sic. 1. p. 129. De Cand. Franc. 4. part. 2. p. 824., et Prodr. 1. p. 282. n. 101. α . β . Reich. Exc. 3. p. 715. n. 4554., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 8. Cist. t. 33. f. 4554. Gaud. Helv. 3. p. 450.
- H. pulverulentum Coll. Herb. Ped. 2. p. 254. n. 43. Pollin. Ver. 2. p. 187. Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 178.* Presl. Sic. 1. p. 23. De Cand. Franc. 4. part. 2. p. 823., et Prodr. 1. p. 282. n. 103. Lois. Desl. Gall. ed. 2. tom. 1. p. 384.* Reich. Exc. 3. p. 715. n. 4555., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 8. Cist. t. 34. f. 4555.
- Cistus polifolius Sp. pl: p. 745. Smith. Engl. Fl. 3. p. 27., et Engl. bot. v. 19. t. 132a. Balb. Misc. bot. 1. p. 25.,* et in Acad. de Tur. an. X-XI. p. 341.*
- C. pilosus All. Ped. 2. p. 104. n. 1672. tab. 45. fig. 2. planta flore albo; excl. fig. 1. Re Seg. p. 45.*
- C. pulverulentus Balb. Misc. alt. p. 18., et in Acad. de Tur. ann. 1805-1808. p. 216. Lois. Desl. Gall. 1. p. 317.*
- C. n. 1036. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 4.
- Helianthemum n. 7. Ginann. Pin. Ravenn. p. 240.
- H. saxatile, caulibus et foliis incanis, oblong., fl al-bissimis, Appenninum Mentz. Pug. ex loco al Sasso.
- H. saxatile, fol. et caulibus incanis, oblongis, flor. albis Apennini montis Mentz. l. c. tab. 8. Mich. in Till. Cat. hort. Pis. p. 78.
- H. saxatile perenne, foliis et caule incanis, oblongis, floribus albis Apennini montis Targ. in Mich. Cat. hort. Flor. app. p. 141. n. 7.
- H. maritimum procumbens, Rorismarini folio superne glauco, inferne simul cum caulibus incano, floribus albis Mich. Cat. hort. Flor. p. 48. n. 3., et ibid. app. p. 141. n. 3.
- H. flore albo, folio angusto hirsuto Segui. Ver. 1. p. 442. n. 2.
- Cistus humilis Alpinus durior, Polij nostratis folio candicante Pluk. Phyt. t. 23. f. 6.
- Helianthemum montanum Polii folio incano, flore candido Dill. Elth. 1. p. 175. t. 145. f. 172.

β floribus roseis, et albis vel in eodem individuo.

Helianthemum polifolium γ Koch. *Syn.* p. 82.

H. pulverulentum Bad. in *Morett. Bot. Ital.* p. 14. n. 85.*

H. mutabile Coll. *Herb. Ped.* 1. p. 254. n. 44.

Cistus pilosus All. *Ped.* 2. p. 124. n. 1672. pl. fl. roseo e maritimis Nicmensibus.

C. mutabilis Birol. *Acon.* 1. p. 181.

Ital. *Eliantemo Canutola*.

Suffr. Legi in districtu Bononiensi in monte *Mariano*, et al *Sasso* ipsissimo loco, ubi olim legerat Mentzelius, et ubi copiosissimum, in districtu Ravennati in litore. Habui ex subapennino Bononiensi prope *Pianoro* in monte *del Castellaccio* a GIOVANNINIO custode horti Botanici nostri, ex Liguria occidua al *Capo di Noli* in monte *del Telegrafo* a RAINERO, a Prof. SASSIO, a BADAROO, in eodem loco, et in *Col di Tenda* a Prof. GHERARDIO, in pascuis supra *Eza*, et *Finale* a Prof. BALBISIO, ex Pedemontio in rupibus prope Segusium a Prof. RE, ex oris Larii in montibus *della Trammezzina* a RAINERO, ex districtu Veronensi in colle *Montidon* prope vicum *Ospedaletto* vallis *Pulicella*, ubi legerat Pollinius, a MANGAROTTO, ex Tyroli meridionali in collibus calcariis anpra *Magrè*, et *Roveredo*, circa Tridentum, et in finibus Brixienisibus ad Benacum a FACCHINIO, ex districtu Bassauensi in saxosis *di Fastro* supra *Primolano* a MONTINIO, Ravennâ in muro oppidi, ubi ego quoque observavi, a DALLAGATA, ex Pineto Cerviensi ab Eq. PAROLINIO, ex districtu Faventino in monte *Mauro* a TASSINARIO, ex Piceno in monte *Regnolo* a Prof. OCTAVIANIO, in monte *Priore*, et *alla Madonna dell'Ambro di Montefortino* a MARZIALETTO, in monte *De' fiori* ab ORSINO, ex Etruria in monte S. Juliani a Prof. PUCCINELLIO, ex viciniis *di Campiglia a Rocca S. Dalmazio* a Prof. PETRO SAVIO, in monte *Calvi alla Sassetta* a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, ex litore Romano prope *Corneto* a Prof. MAURIO, et inter *Corneto*, et *la Tofa* a Prof. SERATTIANO, ex Calabria a *Bova*, ex Apulia inter *Cerignole*, et *S. Cassano*, in radicibus meridionalibus Gargui, et in Gargano a *Pagliccio* ab Eq. GUSSONIO, in arenosis maritimis prope *Lesina* a GASFARRINIO, ex Salentinis circa Hydruntum ab Eq. PAROLINIO. Varietatem β accepi ex Liguria occidua in pratis montanis *del Capo di Noli* a RAINERO, et in collibus *di Laigueglia* a BADAROO. Floret ab Aprili in Julium.

Radix fusiformis, aut fusiformi-ramosa, crassa, flexuosa, lignosa, rubido-fusca, longa, et in arenis longissima. Caules caespitosi, decumbentes, adscendentes, vel erecti, teretes, inferne valde ramosi, crassi, lignosi, rubidi, in parte annotina tenuiores, sed firmuli, plus minus tomentosi, quandoque rubescentes, cæterum a palmo ad pedem longi. Folia opposita, breviter petiolata, inferiora multo minora, elliptica, superiora oblongo-lanceolata; in individuis natis loco sicco omnia linearia; cuncta obtusiuscula, margine revoluta, crasso nervo dirempta, tomentosa, subinde in facie superiore tomento rariore adpersa, vel denudata, et ideo viridiora; eorum tomento interdum interjiciuntur pili longiores, fasciculati. Stipulae lineares, angustae, acutiusculae, apice barbatæ, dorso pilosæ, margine ciliatæ, inferiores exiguae, superiores folio triplo, vel quadruplo breviores. Subinde in axillis foliorum præsertim inferiorum ramulus foliosus abortivus. Racemus terminalis, simplex, pedunculatus, incano-tomentosus, nubilus nutans, densiflorus, in anthesi erectus, laxiflorus, et magis inferne. Flores alterni, secundi. Bractea lineares, pedicello breviores, extra; vel sub pedicello sitæ. Pedicelli ludunt calyce breviores, æquales, aut paulo longiores, tomentosi, et subinde pilis longioribus, fasciculatis adpersi, sæpe rubelli, in fructu penduli. Calyx obductus tomento nunc denso, nunc raro, interdum etiam fere denudatus, præsertim inter nervos, ubi tunc pallet, et nitet, subinde basi, et in nervis acatens pilis longioribus, geminatis, aut fasciculatis, foliolis duobus externis linearibus, vel anguste oblongis, obtusis, ciliatis, dorsoque medio pilosis, circiter triplo brevioribus, internis late ovatis, obtusis, margine altero late albo-membranaceis, quadrinerviis, nervis crassiusculis, sæpe rubellis. Corolla alba, plerumque calyce triplo longior, petalis obovatis, crenatis, vel integris, basi brevi tractu luteo-maculatis. Stamina lutea. Stilus longitudine staminum, aut sublongior, inferne sygmoideus, superne declinans, apice incrassatus. Stigma depresso-capitatum, papillosum. Capsula chartacea, ovoideo-trigona, plus minus tomentosa, calyci subæqualis, incomplete trilocularis, trivalvis, deli-scens valvis totis patentissimis. Semina ovoideo-angulata, sub vitro minute granulata, matura fusco-ferruginea. Tomentum totius plantæ incanum, breve, stellatum. Calyces in sicco subinde lutescunt.

Varietas β vix distinctione-digna, cum tota differentia ejus stet in floribus albis, et roseis vel in eodem individo.

Exemplaria *Helianthemum polifolium*, quæ obtinui ex Anglia ab Hookero, et ab Woodsio, omnino conveniunt cum nostris, cum hæc gaudent foliis superne viridioribus, et magis denudatis, quæ res confirmat ea, quæ jam dixi in Amœn. Ital. p. 243. de identitate hujus speciei cum *Cisto piloso* All. Linnæus videtur tribuisse alii speciei, quæ huic nostræ proxima est, nomen *Cisti apennini* desumens a synonymo Mentzelii, quod reapse pertinet ad *Helianthemum polifolium*, qui quidem *Cistus apenninus* L. juxta Smithium Engl. Fl. 3. p. 28. differt pubescentia sua simplici, calycibus sine pilis in nervis, neque hactenus in Apennino repertus est. Hæc sunt *Helianthemata*, quæ obtinui ex Italia. Non me latet, Botanicos Italos alia indicasse, quorum exemplaria nondum obtinere potui. Si accepero, et sistant bonas species, addam in Appendicibus. Interim Botanici nostri effati Linnæani recordentur: *Cistorum historia maxime omnium obscura ob varietatum copiam* Sp. pl. p. 745.

ORDO II. OLIGOGYNIA.

PÆONIA.

Lin. Gen. p. 273. Tourn. Inst. 2. t. 146. Juss. Gen. p. 234. Lamck. Ill. 5. t. 481. Vent. Tabl. 3. p. 64. Gartn. De fruct. 1. p. 304. t. 65. Smith. Engl. Fl. 3. p. 28. De Cand. Regn. veg. syst. nat. 1. p. 386., et Prodr. 1. p. 65. Endl. Gen. p. 851. n. 4804.

Calyx perianthium liberum, persistens, tetra-penta-hexaphyllum, foliolis tribus internis, ovatis, concavis, obtusis, margine membranaceis, reliquis externis, cuspidatis, sæpe uno, alterove abeunte in folium simplex, integrum, aut fissum, vel ternatum. Corolla grandis, penta-polyptala, concava, patens, calyce multo longior, petalis obovatis, brevissime unguiculatis, integris, vel crenatis. Stamina plurima, corolla multo

breviora, nutantia, filamentis filiformibus, antheris terminalibus, elongatis, tetragonis, bilocularibus, a superioribus ad inferiora dehiscentibus. Discus carnosus, sustinens ovaria, in nonnullis speciebus elongatus, pleurogynus, sive obducens ovaria urcei instar, demum laceratus. Ovaria duo-sex, erecta. Stigmata sessilia, bilamellata, seu conduplicata, modo brevia, cristata, modo elongata, et apice recurva. Folliculi duo-sex, coriacei, tomentosi, aut glabri, maturitate plus minus divergentes, latere interno dehiscentes. Semina plura, suturæ affixa, grandiuscula, subrotunda, glabra, colorata.

Habitus. Radix tuberosa, vel nodoso-filipendula, fasciculata. Caulis herbaceus, inferne simplex, squamatus, superne foliosus, in paucis fruticosus, alterne ramosus. Folia composita, petiolata, alterna, petiolo primario tripartito, partibus trifoliolatis, vel pinnatis, foliolis partitis, integris, aut incisis, ovatis, lanceolatis, aut linearibus. Flores speciosi, Kermesini, rosei, palentes, albi.

Ord. nat. Multisiliquæ *Lin. Ord. nat. n. XXVI., et Præl. p. 376.* Ranunculacæ *Juss. Gen. p. 251. Smith. Gram. p. 136. Vent. Tabl. 3. p. 52. De Cand. Regn. veg. Syst. nat. 1. p. 129. Rich. Famill. nat. in Él. éd. 5. p. 155. Schultz. Nat. syst. p. 504. Pæoniacæ Bartl. Ord. nat. p. 251.*

1. *Pæonia officinalis*: petiolis tripartitis, pinna terminali trisecta, lateralibus pinnatis, foliolis subtrifidis, simplicibusque, lanceolatis, acuminatis, subtus glaucis; folliculis maturis divergentibus.

P. officinalis Sp. pl. p. 747. α. Anders. Mon. in Trans. Lin. Soc. v. 12. par. 1. p. 264. All. Ped. 2. p. 107. n. 1680. Re Seg. p. 45. Coll. Herb. Ped. 1. p. 74. n. 5. Comoll. Prodr. p. 104. Pollin. Ver. 2. p. 192. Suffr. Foroj. p. 149. Ors. in Cap. Opusc. p. 285. Sav. Bot. Etr. 1. p. 118. Ten. Nap. 1. p. 300. De Cand. Franç. 4. part. 2. p. 919., et Regn. veg. syst. nat. 1. p. 389., et Prodr. 1. p. 65. n. 3. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 56. α. Koch. Syn. p. 26. Reich. Exc. 3. p. 752. n. 4743., et Ic. Fl. Germ.

- et *Helv.* 3. p. 28. *Pæoniar.* t. 127. f. 4747. *Host. Austr.* 2. p. 63. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 2. p. 378. *Gaud. Helv.* 3. p. 453.
- P. peregrina* *Re Tor.* 1. p. 281., et *App. alt. in Mém. de l'Acad. de Tur. an.* 1827. tom. 31. p. 199. *De Cand. Regn. veg. syst. nat.* 1. p. 390. a. *Koch. Syn.* p. 26. *Gaud. Helv.* 3. p. 454. *Anders. Mon. in Trans. Lin. Soc.* v. 12. par. 1. p. 277.
- P. corallina* *Bert. Mant. pl. Fl. alp. Apuan.* p. 34. n. 54. excl. syn.
- P. paradoxa* *Ten. Syll.* p. 261. n. 3. *De Cand. Prodr.* 1. p. 66. n. 15. a. *Anders. Mon. in Trans. Lin. Soc.* v. 12. par. 1. p. 280.
- P. pubens* *Reich. Exc.* 3. p. 751. n. 4741., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 28. *Pæoniar.* t. 124. f. 4741. fol. angustior.
- P. bannatica* *Reich. Exc.* 3. p. 751. n. 4741., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 28. *Pæoniar.* t. 128. f. 4741. c.
- P. promiscua* *Reich. Exc.* 3. p. 751. n. 4742., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 28. *Pæoniar.* t. 126. f. 4742. fol. latior.
- P. rosea* *Host. Austr.* 2. p. 64.
- P. n.* 1187. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 81.
- Peonia femina* *Matth. Valgr.* 1585. tom. 2. p. 965. fig. *Dur. Herb. ed. Rom.* p. 341. fig. *Ang. Sempl.* p. 239. *Pon. Mont. Bald.* p. 190., et 211.
- Pæonia femina* *Casalp. De pl. lib.* 15. cap. 36. p. 588. *Lob. Ic.* p. 682.
- Peonia Calz. Viag. di mont. Bald.* p. 14.
- Pæonia communis* vel *femina* *Segui. Ver.* 2. p. 482. n. 2.
- P. foemina* *Fuchs. Hist. pl.* p. 202. fig.
- P. promiscua* seu *neutra* *Lob. Ic.* p. 683.
- Ital. *Peonia femina* *Matth.* l. c. *Peonia salvatica* *Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 160.
- Off. *Paonia flores* *Lin. Mat. med.* p. 94. n. 267. β .
- Perenn.* *Legi in alpibus Apuanis in alpe il Giovo l. d. il Pizzaccio.* Habui ex *Tambura* earundem alpium a *GUIDONIO.* Filius attulit ex monte *Vignola de' Conti* in districtu *Bononiensi*, et herborarius noster ex montibus di *Prunarolo*, et *Lisenna* supra *il Vergato.* Accepi ex monte *Generoso* ad *Larium* a *Prof. COMOLLIO*, et ex *i Corni di Canzo* a *RAINERO*, ex districtu *Bergomensi* in sylvis *d' Albino*, et *Nembro* a *BERGAMASCHIO*, *Veronâ* in collibus *d' Avesa* a *RAINERO*, ex *Baldo* a *BARBIERIO*, ex *Tyroli meridionali* in montibus *Roboretanis*, in districtibus *di Arco*, et *Riva*, nec non

in finibus Veronensibus, et Brixiensibus a FACCHINIO; ex agro Vicetino in collibus Bericis a RAINERO, ex districtu Bassanensi in sylvis d' Angarano a MONTINIO, ex ditione Tergestina in sylvis montis *Spaccato* a TOMMASINIO, et a BIASOLETTO, ex Apennino Maceratensi in monte di S. Vicino, et in Apennino di Sernano ab Eq. NARDUCCIO, ex Piceno al *Capo di Tenna* in prato S. Antonii, et in monte *Priore* a MARZIALETTO, in monte li *Catini* a *Vacchereccia*, et ex Præutiis in monte Cornu alla *Schiera* ab ONSINO, denuo ex Præutiis alla *Costa*, et in monte *Grande nella Valle dell'inferno* a CECCHETTO, ex Ducatu Lucensi al *Prato fiorito* a Prof. PUCCINELLIO. Floret ab Aprili in Junium.

Radix nodoso-filipendula, longa, fusca, tuberibus, seu nodis, oblongis, carnosius, per fibram concatenatis. Caulis simplex, crassus, erectus, e tereti obtuse angulatus, flexuosus, pallide virens, glaber, aut superno pilosus, uni-bipedalis, inferne loco foliorum gerens unam, alteramve squamam foliaceam, sessilem, oblongam, obtusam, vel acutiusculam, concavo-canaliculatam, striatam, pallide virentem, margine involutam; ubi hæ squamæ sunt duæ, vel tres, tunc alternæ, et inter se remotæ. Folia alterna, petiolata, sita ad flexuras caulis superioris, grandia, composita, petiolo primario trifido, petiolulo medio terminato foliolo tripartito, subdecurrente, lusu bi-quadripartito, et subinde etiam quinquepartito, segmentis duobus inferius sitis formâ folii pinnati, insuper segmenta hujus folioli variant integerrima, et bi-trifida. Petioluli laterales ferunt foliola quinato-pinnata, pinna media tripartita, subdecurrente, lateralibus simplicibus, vel bipartitis, rarius tripartitis, quæ segmenta, vel foliola pariter ludunt integerrima, et bi-trifida. Caterum folia plana, supra saturate viridia, subtus glauca, nunc utrinque glabra, nunc subtus pilosa, aut pubescentia; foliola, vel segmenta foliolorum lanceolata, acuminata, latitudinis mire variantis, idest anguste lanceolata, late lanceolata, et etiam oblongo-vel-ovato-lanceolata. Petioli crassi, teretes, vix supra subcanaliculati, glabri, vel pilosi, aut pubescentes, superiores breviores. Flos solitarius, terminalis, grandis, pedunculatus, statim sub calyce involneratus bracteis duabus, aut tribus, inæqualibus, foliaceis, lanceolatis, acutis, acuminatis, et etiam acuminato-caudatis, basi angustatis, quarum una subinde est folium ternatum.

Calyx corolla multo brevior, foliolis late ovatis, vel ovato-oblongis, concavis, obtusis, sæpe inæqualibus, viridibus, margine membranaceo, subinde rubescente, glabris, aut pubescentibus. Petala quinque-octo, ampla, obovata, obtusa, subcrenulata, rosea, vel Kermesina. Stamina numerosissima, nutantia, in anthesi gratum odorem fundentia, filamentis inferne roseis, apice albidis, antheris luteis, elongatis. Ovaria duo-quatuor. Stigmata brevia, cristata, rubro-kermesina. Folliculi duo-quatuor, dense tomentosi, ovoidei, vel oblongi, tumentes, fructificatione incipiente erecti, eadem progrediente gradatim apice divergentes, fructificatione demum perfecta sæpe divaricati. Semina grandia, immatura corallina, matura nigra, nitida, sæpe immixtis ovulis abortivis, rubellis.

Stirps suomet in loco natali valde ludibunda foliolis, foliolorumque segmentis latioribus, vel angustioribus, integris, aut incis, subtus glabris, pilosis, vel pubescentibus. Folliculi a conceptione ad maturitatem perfectam directionem diversam assumunt. Ad quæ omnia diligenter attendendum, ne dicipiamur, et in erroneas, vel falsas species ducamur, ut mihi, aliiæque contigit.

Usus. Vide infra ad speciem sequentem.

a. *Pæonia corallina*: foliis subternatis, superioribus subternatis, foliolis ovatis, breviter acutatis, glabris; stigmatibus abbreviatis, cristatis; folliculis maturis recurvato-retrorsis.

P. corallina Retz. *Obs. fasc. 3. p. 34. Willd. Sp. pl. 2. par. 2. p. 1221. Smith. Engl. Fl. 3. p. 29., et Engl. bot. v. 22. t. 1513. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 260. Anders. in Trans. Lin. Soc. v. 12. par. 1. p. 269. Sang. Cent. p. 77. Ten. Nap. 1. p. 301., et Syll. p. 261. n. 1. De Cand. Franç. 5. p. 643., et Regn. veg. syst. nat. 1. p. 389., et Prodr. 1. p. 65. n. 2. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 59. a. Koch. Syn. p. 26. Reich. Exc. 3. p. 752. n. 4745., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 28. Pæoniar. t. 128. f. 4745. *P. officinalis* β *Sp. pl. p. 747.**

P. officinalis Plenck. *Ic. pl. med. 5. p. 45. t. 43a.*

Peonia maschio Matth. *Valgr. 1585. tom. 2. p. 964. fig. Ang. Sempl. p. 239. Dur. Herb. ed. Rom. p. 340. fig.*

Pæonia mas Cæsalp. *De pl. lib. 15. cap. 36. p. 588. Lob. Ic. p. 684. pl. florens, et p. 685. pl. fructif.*

Ital. *Peonia maschio* Matth. l. c.

Offic. *Pæoniæ radix, semina* Lin. *Mat. med. p. 94. n. 267. a.*

Perenn. Habui ex sylvis Bassanensibus in montibus *di Pove* a MONTINIO, ex Hetruria in sylva Carthusiæ prope Florentiam a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, Volaterris in muro Etrusco oppidi ad septentrionem ab AMIDEO. Floret Majo.

Caulis sæpe rubro-purpurascens. Folia inferiora biternata, raro in pinnis lateralibus pinnato-quinata, superiora ternata, vix quaternata, aut pinnato-quinata. Omnium foliola grandia, late ovata, aut late ovato-oblonga, integerrima, breviter acutata, vel obtusa, utrinque glabra, supra atroviridia, nitida, subtus pallidiora, glaucescentia. Flores saturate Kermesini. Stigmata breviter cristata. Folliculi in plena maturitate infra lineam horizontalem recurvato-retrorsi. Reliqua omnino ut in præcedente.

Usus. Ob vim anodynam, adstringentem olim adhibebantur fæculæ, conservæ, syrupi e radice, et floribus utriusque *Pæoniæ* in morbis convulsivis, præsertim in spasmo, eclampsia, et epilepsia; sed nunc exoleverunt.

3. *Pæonia Russi*: foliis biternatis, superioribus ternatis, foliolis late ovatis, subtus pubescentibus; stigmatibus elongatis, linearibus, apice recurvis.

P. Russi *Biv. Man.* 4. p. 12. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 29,*
et *Syn. tom.* 2. p. 26.* *Presl. Sic.* 1. p. 26. *Spr. Syst. veg.* 2. p. 615. n. 8. *De Cand. Prodr.* 1. p. 66. n. 10.

P. officinalis *Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 225.

P. flavescens *Presl. Del. Prag.* p. 5., et *Sic.* 1. p. 27.

P. corallina *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 28. a. b., et *Syn. tom.* 2. p. 26. a. b. *Moris. Sard.* 1. p. 64. a. β. tab. 4.*

P. hyemalis, pumila, Rosæ rubræ monoflore *Cup. Hort. Cath.* p. 169.

P. folio subtus incano, flore albo, vel pallido *Cup. l. c.* p. 169.

Ital. Pæonia rostrata.

Perenn. Habui ex montibus Panormitanis ab Eq. GUSSONIO, et ex sylvis *della Pizzuta* a Prof. PARLATORE, ex montanis Sardinie ab Eq. Prof. MORISIO. Floret Majo.

Præcedenti valde affinis, tamen notis sequentibus probo distincta. Napuli radicales fusiformes. Caulis a palmo ad pedem, et ultra longus, purpurascens, basi squamatus, squamis foliaceis, pluribus, approximatis, imis brevioribus. Folia inferiora biternata, superiora ternata, foliolis quam in præcedente brevioribus, sed æquo latis, et subinde latioribus, ovatis, vel ellipticis, planis,

aut undulatis, breviter acutatis, et quandoque obtusis, integerrimis, aut prope apicem dente grossiusculo notatis, supra atroviridibus, nitidis, glabris, subtus pallentibus, pubescentibus, vel saltem pilosis in nervo, et venis, rarius omnino glabris, impari subinde latissimo, cordato-ovato, lateralibus obliquatis. Petioli crassi, purpurascens, pubescentes, aut pilosi, vel glabri, supra latiuscule canaliculati. Corolla Kermesina, et quandoque alba cum, vel sine maculis Kermesinis. Ovaria terminata stigmate longo, circiter quadrilineari, conduplicato, angusto, lineari, erecto, apice recurvo. Folliculi fulvo-tomentosi, in plena maturitate a basi recurvati. Reliqua ut in *Paeonia coralina* Retz.

DELPHINIUM.

Lin. Gen. p. 274. Tourn. Inst. 2. t. 241. Juss. Gen. p. 234. Lamck. Ill. 5. p. 482. Vent. Tabl. 3. p. 62. Gærtn. De fruct. 1. p. 310. t. 65. Trevir. De Delph. et Aquil. p. 5. Smith. Engl. Fl. 3. p. 29. De Cand. Regn. veg. syst. nat. 1. p. 340., et Prodr. 1. p. 51. Endl. Gen. p. 849. n. 4796.

Perigonium quinquesepalum, vel heptasepalum, liberum, coloratum, deciduum, sepalo superiore basi producto in cornu conico-subulatum, cavum; in perigonio heptasepalo, sepala duo interna, nectario accessoria, unguiculata. Nectarium sepaloideum, monophyllum, unicalcaratum, vel diphyllum bicalcaratum, calcaribus intra cornu descendentibus. Stamina plura, perigonio breviora, filamentis inferne dilatatis, antheris ovatis, erectis, bilocularibus. Ovaria unum, tria, quinque. Stili totidem, staminibus breviores, persistentes. Stigmata simplicia, reflexa. Folliculi tot, quot ovaria, oblongi, tumiduli, latere interno dehiscentes. Semina biseriata, suturæ affixa, subrotunda, aut angulata, rugosa, vel squamata, vel plicis membranaceis obvallata.

Habitus. Plantæ annuæ, biennues, aut perennes. Caulis erectus, simplex, vel ramosus. Folia ternata, multipartita, laciniis angustis, aut palmata,

segmentis incis. Flores racemosi, vel paniculati, bracteati, pedicellis sæpe bracteolatis. Corolla cærulea, rosea, alba.

Ord. nat. Multisiliquæ Lin. Ord. nat. n. XXVI., et Præl. p. 376. Ranunculaceæ Juss. Gen. p. 251. Smith. Gram. p. 136. Vent. Tabl. 3. p. 52. De Cand. Syst. nat. 1. p. 129. Rich. Fam. in El. éd. 5. p. 155. Bartl. Ord. nat. p. 252. Schultz. Nat. syst. p. 504.

* *Nectario monophyllo; ovario unico. Consolida.*

1. *DELPHINIUM Consolida*: caule dichotomo, divaricato; foliorum laciniis multifido-linearibus; racemis paniculatis, laxis; seminibus rugosis, obsolete squamulosis. *D. Consolida Sp. pl. p. 748. Smith. Engl. Fl. 3. p. 30., et Engl. bot. v. 26. t. 1839. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 370., et Fl. Græc. 6. p. 3. t. 504. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 260. Fl. Dan. t. 683. Sv. bot. v. 1. t. 58. Plenck. Ic. pl. med. 5. p. 46. t. 433. Alb. Fl. med. 5. p. 81. t. 261. Trevir. De Delph. et Aquil. p. 7. Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 179.* Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 63. Koch. Syn. p. 22. Reich. Exc. 3. p. 735. n. 4669., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 20. Ranunc. Helleb. t. 66. f. 4669. Host. Austr. 2. p. 65. Gaud. Helv. 3. p. 455. D. pubescens De Cand. Franç. 5. p. 641., et Regn. veg. syst. nat. 1. p. 344., et Prodr. 1. p. 51. n. 5. Ten. Nap. 4. p. 323.*

Consolida regale Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 803. fig. Floris cujusdam vulgo in Etruria Fior capuccio alterum genus frequens in segetibus brevius Casalp. De pl. lib. 6. cap. 69. p. 267.

*Fior Capucci n. 739. Casalp. Erb. fogl. 260.**

Flos regius Dod. Pempt. p. 272. fig.

Consolida regia, sive Calcaris flos recentiorum Lob. Ic. p. 739.

Delphinium elatius simplici flore Clus. Hist. pl. lib. 6. p. cccv. fig.

D. Riv. Pent. irr. tab. 124. fig. 1.

β *floribus terminalibus, subsolitariis; seminibus imbricate squamulosis.*

Delphinium Consolida b divaricatum Reich. Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 20. Ranunc. Helleb. t. 66. f. 4469. b.

D. Consolida *De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 913., et Regn. veg. syst. nat. 1. p. 343. excl. syn. ad typum speciei pertinent., et Prodr. 1. p. 51. n. 4. Nacc. Ven. 3. p. 85.* Ten. Nap. 1. p. 302., et Syll. p. 262. n. 3.*

D. paniculatum *Host: Austr. 2. p. 65.*

Flos regius sylvestris *Dod. Pempt. p. 252. fig.*

Segetum consolida regia strigosior tota *Lob. Ic. p. 739. Ital. Cappucci. Consolida regale. Erba cornetta* *Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 89.*

Offio. Consolida regalis flores *Lin. Mat. med. p. 94. n. 268. Ann. Frequens inter segetes Italiae. Legi prope Sarzanam in vinctis di Bolano, Bononiæ in collibus di Montedonato, et Zolla predosa, Cumis prope Acherusiam. Habui ex collibus Bononiensibus di Ronzano a GENMARIO, Tergesto ad S. Mariam Magdalenam a TOMMASINO, ex Piceno a Montefortino a MARZIALETTO, ex agro Fesulano, et Florentino a Prof. ANT. TARCIONIO-TOZZETTIO, Tibure a Prof. MAURIO, et a FIORINIA-MAZZANTIA. Varietatem β legi una cum specie in collibus Bononiensibus di Montedonato, et Zolla predosa, in Apennino Florentino inter il Covigliaio, et la Futa. Filius attulit ex campis di Vidicciatico in Apennino Bononiensi. Habui ex Tyroli meridionali prope Arco, et circa Tridentum a FACCHINIO, ex arvis Bassanensibus a MORTINIO, Fossâ Clodiâ a S. Anna a Prof. NACCARIO, ex Apennino Ariminensi a Sasso Feltrio, et ex districtu Urbinati a Mongrimano ab AZZAROLIO, Senogalliâ a SALVATORIO, ex Piceno ad S. Elpidium a Rev. Fratre MAURITIO DE BRIXIA, ex Apennino Umbro a Col fiorito a MASQUILLIERIO, ex cultis Prætoriorum ab Eq. GUSSONIO, ex Etruria in campis Aretinis, et Florentinis a Prof. PETRO SAVIO, in agro Mugellano, et a Chianciano a Prof. ANT. TARCIONIO-TOZZETTIO, a Montalcino a Prof. GIULIO. Floret ab Junio in Augustum.*

Radix fusiformis, aut fusiformi-ramosa, flexuosa, longa, sæpe crassa, lateraliter ramulosa. Caulis teres, erectus, plerumque jam ab imo ramosus, dichotomus, divaricatus, nunc pubescens, nunc adpresse pilosulus, nunc glaber, a spithama ad duos pedes longus. Folia ternata, glabra, vel pilosula, aut pubescentia, foliolis multipartito-laciniatis, radicalia, et caulina inferiora minora, petiolata, laciniis latiuscule linearibus prædita, caulina reliqua sessilia, laciniis lineari-filiformibus, acutis, aut acuminatis, suprema minus decomposita.

Racemi terminales cauli, ramisque, solitarii, simplices, pauciflori, laxiflori. Bractea sub quovis pedicello, lineari-filiformis, indivisa, vel sub pedicellis inferioribus tripartita, et subinde etiam magis decomposita. Pedicelli sparsi, remoti, patentes, fructiferi saepe patenti-ascendentes, bractea sua multo longiores, pollicares, et quandoque ultra, plus minus pubescentes, iterum per longitudinem bracteolati, bracteolis duabus, tribus, filiformibus. Flos magnitudinis variae, sed passim grandiusculus. Perigonium antice pulchre, et saturate caeruleum, vel e carne purpurascens, glabrum, postice pallidius caeruleum. Sepala ovato-lanceolata, obtusiuscula, aequalia, patentia, lateralina in linea dorsali media, reliqua in tota superficie externa pubescentia. Sepalum superius basi productum in cornu subulatum, adscendens, puberulum, ipso longius. Nectarium fere longitudine perigonii, trifidum, lacinia media longiore, albida, erecta, obtuse bifida, concavo-canaliculata, lateralibus rotundatis, perigonio concoloribus, conniventibus, genitalia occultantibus. Filamenta caeruleo-albida, vel alba. Antherae luteae. Folliculus solitarius, oblongus, erectus, pubescens, apice hinc breviter rostratus. Semina grandiuscula, turbinate-tetragona, apice umbilicata, instructa plicis circularibus, flexuosis, quae ferunt squamulas exiguas, semicirculares, concaviusculas, sub vitro tenuissime striolatas, et margine minutissime crenulatas, subinde hic illic, vel omnino deficientes. Arillus initio albus, maturo fructu fuscus.

Varietas β differt tantum ob flores solitarios, aut subsolitarios in apice caulis, et ramorum, et ob semina constantius tecta squamulis semicircularibus, imbricatis. Huic valde proximum est caule, et foliis *Delphinium tenuissimum* Sibth. et Smith. Fl. Græc. 6. p. 4. t. 505., sed recedit floribus multo minoribus, et squamis seminum oblongis.

Usus. Flores hujus speciei olim adhibiti pro succedaneo florum *Viola odorata* L., nunc exoleti.

a. *DELPHINIUM Ajacis*: foliorum lacinias linearibus, numerosissimis; caule erecto, subramoso; racemo elongato, spiciformi; bracteis inferioribus decompositis; pedicellis abbreviatis, fructiferis strictis; seminibus circulariter rugosis.

D. *Ajacis* Sp. pl. p. 748. De Cand. Regn. veg. syst. nat. 1. p. 341. α ., et Prodr. 1. p. 51. n. 3., et Franç. 4. par. 2.

- p. 913. *Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 252. Pollin. Ver. 2. p. 913. Nacc. Ven. 3. p. 86. Sang. Cent. p. 77.* Ten. Nap. 1. p. 302., et Syll. p. 262. n. 4. Reich. Exc. 3. p. 735. n. 4670., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 20. Ranunc. Helleb. 1. 67. f. 4670. optim. Gaud. Helv. 3. p. 456.*
- D. n. 1202. *a. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 95.*
- Flos quidam vulgo in Etruria Fior. Capuccio *Casalp. De pl. lib. 6. cap. 69. p. 267.*
- Fior Capucci n. 738. *Casalp. Erb. fogl. 260.**
- Delphinium sativum *Riv. pent. irr. tab. 125.*
- Consolida regalis flore rubro *Lob. Ic. p. 740.*
- Ital. *Calcatrippa. Cappucci. Delfinio. Fior Cappuccio. Rigaglio. Spazzacampane. Sprone di cavaliere Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 89.*
- Ann.* Legi in arvis circa dirutam Lunam, et observavi in agro Pisano inter *Ripafratta*, et viam balnearum. Habui ex Liguria occidua a *Carneo* a Prof. SASSIO, ex monte Albano, prope *Palazzuola* a Prof. MAURIO, ex Corsica a *Calenzana* a SOLEIROLIO. Floret ab Junio in Augustum.
- Differt a præcedente notis sequentibus. Caulis tri-quadripedalis, glaber, aut superne puberulus, pilis incurvis, simplex, vel parce ramosus, ramis brevibus, alternis, erectis. Folia in lacinias multo numerosiores decomposita. Racemus terminalis, multiflorus, longus, et subinde longissimus, spicaformis, floribus approximatis, vel inferioribus remotis. Bractee inferiores multido-laciniatae more foliorum caulinarum, pedicello longiores, supremæ simplices, lineari-filiformes, pedicello breviores. Pedicelli omnes breves, ad summum semipollicares, adscendenti-stricti præsertim in fructu. Flos duplo grandior, cæruleus, e cæruleo purpurascens, aut albus. Sepala latissime ovata, vix acuta, carina dorsali præcipue ad apicem virescente. Nectarium quoque latius, lacinia media profunde emarginata. Cornu longitudine perigonii, sæpe horizontale. Folliculus oblongus, pubescens, quinque-septem lineas longus. Semina numerosa, duplo grandiora, tota obvallata rugis circularibus, membranceis, flexuosis.
- Hæc species passim colitur ornamenti causa, tuncque facile ludit floribus plenis, diversimode coloratis. Sunt, qui habeant pro Hyacintho Theocriti, et Ovidii, sed minus recte. Confer ea, quæ dixi ad *Gladiolum communem* in Fl. Ital. 1. p. 228.

**** Nectario diphylo; sepalis internis accessoriis glabris; ovariis ternis. Delphinellum.**

3. *DELPHINIUM peregrinum*: caule erecto, ramoso; foliis tripartitis segmentis multifido-linearibus; peduncularibus, bracteisque simplicissimis; racemo spicæformi, laxifloro; sepalis accessoriis oblongis, inferne cuneatis, unguiculatis.

D. peregrinum *Sp. pl.* p. 749. *Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr.* 1. p. 271.; et *Fl. Græc.* 6. p. 4. t. 506. *Allion. Misc. bot. Taur.* 5. p. 89., et *Ped.* 2. p. 63. n. 1503. tab. 25. fig. 3. *Pollin. Ver.* 3. p. 799. excl. nonnull. syn. *Bert. Lucubr.* p. 11. n. 44. quoad plantam ex alveo torrentis *Varenna*, excl. syn. *Bonann.*, et *Bivon. De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 914. β .

D. elatum *All. in Misc. bot. Taur.* 2. p. 71.

D. junceum *De Cand. Franç.* 5. p. 641. sub. n. 4676.; et *Regn. veg. syst. nat.* 1. p. 348., et *Prodr.* 1. p. 52. n. 15. *Reich. Exc.* 3. p. 736. n. 4672., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 20. *Ranunc. Helleb.* t. 68. f. 4672. *Host. Austr.* 2. p. 66.

D. All. Stirp. Nicæn. p. 200. exem. autopt. in herb. Bonon. Ital. *Speronella sottile*.

Ann. Habui ex Liguria occidua in alveo torrentis *Varenna* prope *Pegli* a *VINCENTIO*, ex Euganeis a *Calcignana*, et prope *Arquà* secus vias a *MAJERO*, ab *Eq. PAROLINIO*, a *MONTINIO*, et a *ZANARDINIO*. Floret Maio, Junio.

Radix gracilis, fusiformis, aut fusiformi-ramosa, flexuosa, alba. *Caulis* teres, striatus, erectus, alterne ramosus, ramis patulis, glaber, aut tenuiter pubescens, pilis recurvis, uni-bipedalis. *Folia* caulina tripartita, segmentis multifido-laciniosis, sparsa, nunc inter se approximata, nunc quidquam remota, inferiora petiolata, prædita laciniosis latiuscule linearibus, acutiusculis, superiora brevissime petiolata, aut sessilia, laciniosis angustius linearibus, paulo longioribus, acuminatis; peduncularia simplicissima, linearia, vel lanceolato-linearia, acuminata, integerrima, sessilia, alterna, numerosa. Omnia folia ludunt glabra, ciliolata, aut pubescentia. Racemus terminalis cauli, ramisque, spicæformis, suffultus pedunculo foliato, simplex, vel, qui caulem terminat, inferne ramulosus, puberulus, laxiuscule florifer, nunc pauciflorus brevis, nunc multiflorus elongatus. Sub quovis pedicello bractea linearis, acuminata. Pedicelli breves, strictiusculi, sæpe bractea

breviores, supra medium instructi bracteolis duabus, linearibus, plerumque oppositis. Perigonium parvum, modo pallide, modo saturatius cæruleum, vel e cæruleo violaceum. Sepala externa quinque, oblonga, obtusa, dorso pilosa, inferiora sursum conniventia. Cornu ut plurimum adscendens; obtusum, perigonio longius, pilosum. Nectarium diphyllum, phyllis emarginatis. Petala nectario accessoria duo, interna, oblonga, vel obovata, obtusa, integra, aut emarginata, basi angustata, et longe cuneata, unguiculata, ungue latiusculo, longitudine laminæ, vel paulo longiore. Folliculi tres, parvi, duas-tres lineas longi, glabri, stilo persistente, longiusculo rostrati. Semina subrotunda, exigua, membranulis circularibus, imbricatis, albis, tenuissime striolatis obvallata.

4. *DELPHINIUM halteratum*: pubescens; caule erecto, ramis patulis; foliis tripartitis segmentis multifido-linearibus, peduncularibus imis plurisectis, superioribus indivisis; racemo apiciformi, stricto, pedicellis abbreviatis; sepalis accessoriis cordato-orbiculatis, ungue multo brevioribus

D. halteratum Sibth. et Smith. *Fl. Græc. prodr.* 1. p. 371., et *Fl. Græc.* 6. p. 5. t. 507. *De Cand. Regn. veg. syst. nat.* 1. p. 349., et *Prodr.* 1. p. 53. n. 17. *Ten. Nap.* 4. p. 324. *A. B. Guss. Sup.* 2. p. 181.* *Presl. Sic.* 1. p. 25.

D. peregrinum Bert. *Lucubr.* p. 11. n. 44. quoad plantam Siculam, excl. syn. Linn., et *De Cand. Orsin. in Cap. Opusc.* p. 281.* *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 179.* *Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 226. *Biv. Bern. Cent.* 1. p. 33. n. 28.* *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 30.* *Ten. Nap.* 1. p. 303.* *Trev. De Delph. et Aquil.* p. 9. tab. 2. fig. e. f. g. ab omnibus excl. syn. Linn.

D. confertum Guss. *Fl. Sic. prodr.* 2. p. 30*

D. longipes Guss. *Fl. Sic. Syll. tom.* 2. p. 27.* non Morisii.

D. gracile Ten. *Nap.* 4. p. 323., et *Syll.* p. 261. n. 1. non De Cand.

D. junceum Ten. *Nap.* 4. p. 323., et *Syll.* p. 261. n. 2. *Guss. Sup.* 2. p. 181.* non De Cand.

Consolida regalis montana flore dilute cæruleo Cupani *Bonann. Panph. tab.* 25.

C. regalis latifolia parvo flore *C. B. Prodr.* p. 74. fig. (pl. ex Imper.).

C. regalis peregrina parvo flore *J. Bauh. Hist. pl.* 3. lib. 26. p. 212. fig.

Ital. *Speronella frastagliata*.

Ann. Legi in rudibus amphitheatri Capuani, et prope Cumas, et observavi in pluribus locis circa Neapolim, ubi hæc tantum species occurrit. Habui ex Piceno ad S. Elpidium a Rev. Fratre MAURITIO DE BRIKIA, et ab ONSINO, ex montibus Præstutiorum, et ex viciniis Romæ, ubi nihil copiosius, a Prof. MAURO, ex rudibus amphitheatri Flavii a Prof. SEBASTIANO, alla *Macchia de' Mattei* a MASQUILLIERIO, secus viam inter Romam, et Albanum a BARRIERIO, ex arvis circa Neapolim ab Eq. Prof. TENORIO, ex via inter Neapolim, et Puteolos, ubi logerat Michelius, a Prof. OCTAVIO TARGIONIO-TOZZETTIO de herbario Micheliano, Panormo, ubi frequentissimum inter segetes, ab Eq. BIVONA-BERNARDIO, ab Eq. GUSSONIO, et a TODARO, ex collibus Ibleis ab Eq. PAROLINIO, Messanâ ad pharum a BRUNNERO, iterum Messanâ, et ex insula Dalitio ab Eq. GUSSONIO. Floret ab Aprili in æstatem.

Simile precedenti. Planta nunc pilosula, nunc albedo-pubescent. Caulis erectus, flexuosus, alterne ramosus, ramis distantibus, patulis. Folia caulina crebra, inferiora dissecta in lacinias numerosiores, latiuscule lineares, vel lanceolato-lineares, in foliis imis obtusas; in reliquis acutas, vel acuminatas. Folia peduncularia pariter crebra, ima plerumque tri-quinquepartita, cætera simplicissima, lanceolato-linearibus, aut linearibus, acuminatis. Racemi spicæformes, nunc conferti, nunc laxiflori præsertim inferne. Bractæ, et bracteolæ lineares. Pedicelli breves, inter duas-quinque lineas, passim stricti, sed etiam erecto-patuli, inferiores bractea breviores. Sepala tria inferiora dependenti-patula. Sepala duo accessoria cordato-orbiculata, obtusissima, suffulta ungue tenui, ipsis duplo, et etiam fere triplo longiore. Folliculi tres-quatuor lineas longi, adpersi pilis incurvis. Semina triplo grandiora. Reliqua omnia ut in *Delphinio peregrino* L.

5. *DELPHINIUM longipes*: glabrum; caule confertim ramoso; foliis tripartitis segmentis multifido-linearibus, peduncularibus imis subtrisectis, superioribus indivisis; racemo laxifloro, pedicellis elongatis, strictis; sepalis accessoriis subrotundo-ovatis, obtusissimis, subcordatis, ungue multo brevioribus.

D. longipes Moris. Sard. 1. p. 59.* excl. syn. Guss.

Ital. *Speronella gambûta*.

Ann. Habui ex Sardinia in arenis maritimis di Pula ab Eq. Prof. MORISIO. Floret ab Aprili in Junium.

Radix fusiformi-ramosa. Caulis teres, striatus, glaber, erectus, pedalis-sesquipedalis, superne paniculato-ramosus, ramis confertis, sparsis, numerosis, ascendenti-strictis, longis. Folia alterna, petiolata, crebra, tripartita, segmentis cuneato-flabellatis, multifido-laciniosis, inferiora laciniis latiuscule linearibus, acutiusculis, superiora laciniis anguste linearibus, acutis, omnia glabra, substantia firmula. Petioli plani, superiores breviores. Racemi solitarii, terminales cauli, ramisque, longi, laxiflori, lateralibus proximis terminali medio longioribus, et altioribus. Folia peduncularia infra flores vel omnia indivisa, vel ima bi-trifida, sessilia, aut subsessilia, lanceolato-linearibus, acuta, sparsa. Pedicelli elongati, stricti, inferiores pollicem, et etiam paulo ultra longi, successivi gradatim breviores, semper tamen longi. Bractea sub quovis pedicello, linearis; superiores passim pedicello multo breviores, inferiores subinde pedicello aequales. Bracteolæ duæ, anguste lineares, oppositæ, sitæ paulo supra medium pedicelli. Perigonium extus leviter, tenuiterque puberulum, nunc saturate, nunc dilutius caruleum. Cornu sepalo suo longius, in anthesi adscendens. Nectarium perigonio subæquale, phyllis inæqualiter bilobis, lobo superiore longiore, erecto, emarginato, lobo inferiore anteriore, rotundato. Sepala accessoria longe unguiculata, ungue tenui, laminam duplo, et ultra superante, lamina subrotundo-ovata, obtusissima, aut emarginata, basi subcordato-cuneata. Sepala tria inferiora dependenti-patula. Carpella non vidi.

Delphinium halteratum Sibth. differt quam certissime ab hoc herba pubescente, vel pilosa, caule minus ramoso, ramis patentibus, pedicellis multo brevioribus, perigonio fere dimidio minore, extus magis pubescente, sepalis accessoriis omnino orbiculatis, evidentius subcordatis, unguibus lamina fere triplo longioribus.

6. *DELPHINIUM gracile*: glabrum; caule parce ramoso, patulo; foliis tripartitis segmentis multifido-linearibus, peduncularibus imis subtrisectis, superioribus indivisis; racemo laxiusculo, pedicellis abbreviatis; sepalis accessoriis ovatis, ungue multo brevioribus.

D. gracile De Cand. *Syst. nat.* 1. p. 52. a., et *Prodr.* 1. p. 347. n. 14. a. *Moris. Sard.* 1. p. 60.*

D. junceum *Moris. Stirp. Sard. cl. fasc.* 1. p. 1.* excl. syn. Ten.

D. peregrinum *Desf. Atl.* 1. p. 426. excl. syn.

D. halteratum Reich. Exc. 3. p. 736. n. 467a., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 20. Ranunc. Helleb. t. 68. f. 467a. f. 1. ubi male consociatum cum *Delphinio peregrino* L. Ital. *Speronella gentile*.

Ann. Habui ex arenosis maritimis Sardinia ab Eq. Prof. MORISRO. Floret Aprili, Majo.

Proximum precedenti; tamen sat distinctum notis sequentibus. Caulis subpedalis; simplex, vel alterne ramosus, ramis paucis, patulis. Folia inferiora tripartita, segmentis trifidis, laciniis linearibus, acutis, media tridentata, lateralibus bidentatis, ima membranacea, fugacia, reliqua duriora, subcoriacea, superiora tripartita, laciniis angustioribus, integerrimis, acuminatis, peduncularia inferiora bi-tripartita, vel indivisa, reliqua simplicissima. Racemus laxiflorus. Flores inter quatuor, et sedecim. Bractea, et bracteola lineares. Pedicelli quinque-sex lineas longi, bracteis aequales, aut superiores paulo longiores. Perigonium caeruleum, vel e caeruleo purpurascens, sepalis externis acutiusculis, dorso tenuiter pilosis. Cornu perigonio parum longius. Phylla nectarii leviter emarginata. Sepala duo accessoria ovata, basi cuneata; apice integra, vel emarginata, anguste unguiculata, ungue ipsis duplo longiore, et etiam quidquam ultra. Folliculi parvi, vix pilosi. Semina exigua, triplo, et quadruplo minora, quam in *Delphinio halterato*. Tota herba glabra.

Delphinium cardiopetalum De Cand. Syst. nat. 1. p. 347. juxta exemplar ex Gallia a Dubyo, et ex Pyrenaeis a Bonjeannio differt ab hoc foliis minoribus, omnibus substantiae tenuioris membranaceae, floribus item minoribus, saturatius coloratis, sepalis obtusis, duobus accessoriis cordato-orbiculatis, ungue tenui, omnino ut in *Delphinio halterato* Sibth.

*** *Nectario diphylllo; sepalis internis accessoriis disco barbatis; ovariis tribus-quinque.* Delphinastrum.

7. *DELPHINIUM velutinum*: molliter villosum; caule erecto; foliis palmato-partitis, segmentis multifido-linearibus; petiolis basi longe dilatato-vaginantibus; racemo spiciformi, bracteis inferioribus elongatis; sepalis accessoriis subexsertis, obtusis; folliculis tomentosis.

D. velutinum Bert. Exc. de re herb. p. 12. n. 10. Spreng. Syst. veg. 4. part. 2. p. 211. De Cand. Prodr. 1. p. 54.

- n. 4: *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 57. n. 10. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 281. * *Ten. Nap.* 4. p. 325., et *Syll.* p. 262. n. 5. *Reich. Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 20. *Ranunc. Helleb.* t. 71. f. 4675. b.
- D. hirsutum* *Sao. Bot. Etr.* 2. p. 124. * herb.
- D. fissum* *Ten. Nap.* 1. p. 304.
- D. hybridum* *De Cand. Syst. nat.* 1. p. 354. *Koch. Syn.* p. 23. ex loco. *Flsch. Ind. non. hort. Petrop.* p. 70.
- D. perenne montanum Italicum subhirsutum*, foliis tenuiter dissectis *Mich. Cat. MS.* n. 345. * herb. *Mich.*
- D. perenne montanum Italicum subhirsutum napelli folio minore*, calcari pene incurvo, flore violaceo *Mich. Rar. MS.* n. 3.
- D. perenne montanum subhirsutum minus*, foliis Aconiti tenuissime dissectis, flore caruleo *Mich. Cat. hort. Flor.* p. 32. n. 1.
- Aconite 1111 *Matth. Valgr.* 1585. tom. 2. p. 1144. fig.
- Aconitum Lycopetionum flore Delphinii *Lob. Stirp. hist. obs.* p. 386. fig., et *Ic.* p. 678.
- A. Lycopet. flo. Delphinij II. *Clus. Hist. pl. lib. V. p. XCV.* fig. ex: *Lob.*
- Ital. *Napello bugiardo*.
- Perenn.* Legi Bononiæ in sylvis collinis di Montecastello, ubi copiosum. Habui ex districtu Tergestino alla Lipizza, circa Basovizza, et S. Canziano a TOMMASINO, ex Apennino di Sernano ab Eq. NARDUSCIO, ex montibus Camerinensibus, Nursinis, et Spoletinis a Prof. OCTAVIANO, ex Piceno in monte De' fiori alle Pianelle ab ORSINO, in monte Regnolo alle Spedaletto, et in monte Frondosa a MARRIALETTA, ex Præstutis in montibus Costane, Cornu, et in Valle Chjarina ab Eq. GUSONIO, in montibus Calvo, et Scala prope Pizzoli a CROCHETTO, et a Prof. MAURIO, ex Hetruria in montibus di Lucchio Apennini Pistoriensis a Prof. OCTAV. TARGONIO-TOZZETTIO de herbario Michelii, in Montemurello prope Florentiam a Prof. ANT. TARGONIO-TOZZETTIO, et ab JOSEPHO BARONIO, in Apennino Aretino al Sasso di Simone ab AMIDEO, et a CLEARCHO. Floret Majo decedente, et veniente Junio, serius in editis.
- Radix fasciculato-tuberosa, tuberibus brevibus, fusiformibus, turgidis, nigrescentibus, inferne fibrosis. Caulis teres, erectus, striatus, totus mollissime villosus, villo patenti-subdeflexo, simplex, vel superne ramosus, ramis alternis, sesqui-tripedalis: Folia alterna, longe petiolata, palmato-partita, segmentis flabellato-

-multifida, laciniis linearibus, acutis, planis, dorso nervoso-venosa; pallentia, supra viridia, contra nervos, et venas sulco lineari notata, utrinque plus minus molli-ter pubescentia, sed magis subtus, ima subinde fere glabra; superiora minora, minorique laciniarum numero pollentia. Petioli teretes, striati, more canlis villosi, inferne longo tractu dilatati, vaginantes, imi longissimi, interdum glabri. Racemus terminalis, spicæformis, simplex, floribus nunc inter se remotis, nunc approximatis, item modo paucis, modo numerosis, totus mollissime villosus. Bractea sub quovis pedicello solitaria, lineares, inferiores plerumque longissima, etiam bipollicares, florem multo superantes, subinde multifido-lacinatæ folii caulini supremi instar, superiores gradatim breviores, tamen ut plurimum pedicello longiores, rarius breviores. Pedicelli inter duas-quinque lineas longi, sed superiores semper breviores; omnes ad medium, vel paulo supra medium instructi bracteolis duabus, linearibus, oppositis, longiusculis. Perigonium cæruleo-violaceum, vel bicolor ex phyllis nectarii, et sepalis internis albis. Sepala externa ovato-oblonga, obtusa, linea dorsali præsertim prope apicem virescentia extus tota pubescentia. Cornu conico-subulatum, obtusum, perigonio longius, aut æquale, pubescens, horizontale, apice leniter recurvo, rarius recto, intus fovens calcar diphyllum a nectario profectum. Nectarium diphyllum, glabrum, perigonio subæquale, phyllis apice obtuse bidentatis, antice, et inferne lobe marginali, obtuso instructis. Sepala duo accessoria unguiculata, lamina deflexa, bifida, laciniis oblongis, obtusis, disco, et margine laciniarum barbatis, vix exerta, unguibus latiusculis, erectis, lamina sublongioribus, aut æqualibus, pallidius coloratis, vel albidis, basi viridibus. Stamina filamentis inferne dilatatis, apice attenuato-capillaribus, antheris viridibus. Stigmata simplicissima, obtusa, recurva. Folliculi tres, dense villosi-tomentosi, erecti. Semina turbinata, tecta squamulis albo-membranaceis, pellucidis, nitidis, tenuissime striatis, flexuosis, sublaceris.

Huc proximum est *Delphinium fissum* Waldst. et Kitzei. Pl. rar. Hung. r. p. 83. t. 81. Reich. Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 20. Ranunc. Helleb. t. 70. f. 4675. etiam juxta exemplar, quod olim obtinui a Romero f. r.; sed hæc species certissime differt foliis glabris, petiolis basi non, aut vix dilatatis, racemis longioribus, laxioribus, bracteis,

bracteolisque brevissimis, pedicellis longiusculis, bracteis superantibus, perigonio saturatus ceruleo, extus glabro, phyllis nectarii, sepalisque accessoriis exertis, bifidis, laciniis lanceolato-linearibus, acutis, folliculis glabris.

Herborarii nostri vendunt folia *Delphinii velutini* pro foliis *Aconiti Napelli* L., ad quod diligenter attendant pharmacopola, ne decipiantur, cum virtus utriusque speciei sit longe diversa.

8. *DELPHINIUM emarginatum*: foliis inferioribus palmatis, lobis apice acute incisus, superioribus anguste partito-multifidis; petiolis basi brevissime dilatatis; racemo laxifloro; sepalis accessoriis perigonio externo aequalibus, obtusis; folliculis ternis, glabris.

D. emarginatum Presl. *Del. Prag.* p. 6., et *Fl. Sic.* 1. p. 25. excl. syn. Cup. *Guss, Fl. Sic. prodr.* 2. p. 31., et *Sup.* 2. p. 182.* et *Syn.* 2. p. 28.*

D. pentagynum Brot. *Lus.* 2. p. 304. tab. 78. non Desf.

Aconitum Anemones stellata folio, lucido, *Consolidæ* regalis flore ceruleo, glabrum Cup. *Hort. Cat.* p. 3., et *Sup. alt.* p. 5.

A. flore ceruleo Lusit. *Grisl. Virid. Lusit. edit. Ulyssip.* p. 2. non num., et *edit. Veron.* p. 14. *Tourn. Herb. ex Guss.*

Delphinium Lusitanicum, glabrum, *Aconiti* folio *Tourn. Inst. rei. herb.* 1. p. 426.

Ital. *Speronella ventagliana*.

Perenn. *Hsbui* ex collibus Panormitanis ab Eq. Gussoneo, et a Prof. PARLATORE. Floret Majo, Junio.

Caulis angulatus, inferne pilosus, pilis raris, patenti-flexis, superne glaber, simplex, vel uno, alterove ramo, alterno instructus, circiter bipedalis. Folia alterna, glabra, aut supra contra nervos, subtus in nervis, vix ultra, item et margine pilosa, inferiora longe petiolata, reniformi-cordata, etiam duos pollices lata, palmata, quinque-septemloba, lobis latiusculis, apice acute inciso-dentatis, superiora successive brevius petiolata, tripartito-multifida, laciniis angustis, linearibus. Petioli striati, pilosi, basi brevissimo tractu dilatati. Racemus terminalis, simplex, vel uno, alterove ramo inferne instructus, laxiflorus, plus minus elongatus, glaber, aut apice subpilosus, pilis patentibus, basi paniculum turgescentibus. Bractea lineares, pedicello aequales, aut quidquam longiores, imæ subinde trifida, lacinia media elongata. Pedicelli quatuor-quinque lineas longi, in anthesi cernui, in fructu erecti, paulo supra

medium, aut ad medium instructi bracteolis duabus, linearibus, oppositis. Interdum sub pedicellis superioribus deest bractea, et hæc nascitur in ipso pedicello infra bracteolas. Perigonium potius parvum, cæruleo-violaceum, glabrum. Sepala externa ovato-oblonga, obtusa, basi quidquam angustata. Cornu rectum, horizontale, vel ascendens, conico-subulatum, obtusum, longitudine perigonii, aut paulo longius. Nectarium diphyllum, perigonio brevius, glabrum, phyllis breviter bifidis, obtusis, antice lobo laterali, obtuso. Sepala duo accessoria unguiculata, perigonio subæqualia, aut paululum breviora, bifida, laciniis oblongis, obtusis, subrepando-undulatis, disco, et margine superiore barbatis. Folliculi tres, glabri.

Delphinium pentagynum Desf. Fl. Atl. 1. p. 427. tab. 111. huic speciei valde proximum, sed differt caule ramosiore, in parte superiore dense velutino, foliis superioribus angustius dissectis, flore grandiore, sepalis acutis, late ovatis, accessoriis duobus perigonio insigniter brevioribus, phyllis neectarii levissime emarginatis, folliculis villosis. *Delphinium pentagynum* De Cand. Syst. nat. 1. p. 354. est omnino idem cum Desfontainesiano, sed male auctor eidem tribuit synonymon Grisei, et Tournefortii, quod pertinet ad nostrum.

9. *DELPHINIUM elatum*: caule inferne subhirsuto; foliis palmatis, segmentis basi latis, apice acute inciso-serratis; sepalis ovatis, accessoriis bifidis, barbatis; folliculis ternis, glabris.

D. elatum Sp. pl. p. 749. All. Ped. 2. p. 63. n. 1504.* Birol. Acon. 1. p. 182. Koch. Syn. p. 22. a. n. 1.

D. intermedium Ait. Kew. ed. 2. tom. 3. p. 320. De Cand. Syst. nat. 1. p. 358. a., et Prodr. 1. p. 55. n. 41. a. Coll. Herb. Ped. 1. p. 58. n. 14. Reich. Exc. 3. p. 736. n. 4676., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 20. Ranunc. Helleb. t. 72. f. 4676. Gaud. Helv. 3. p. 457. n. I. a.

D. alpinum Wadst. et Kit. Pl. rar. Hung. 3. p. 273. t. 246.

D. Clusianum Host. Austr. 2. p. 67.

β foliorum segmentis profundius inciso-serratis.

Delphinium elatum Koch. Syn. p. 23. a. n. 2.

D. intermedium β *alpinum* De Cand. Syst. nat. 1. p. 359., et Prodr. 1. p. 55. n. 41. β. Gaud. Helv. 3. p. 259. n. II. alpestre.

D. alpinum Reich. Exc. 3. p. 736. n. 4677., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 20. Ranunc. Helleb. t. 74. f. 4677.

D. n. 1201. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 94.

Aconitum lycoct. flo. Delphinii I. Silesiac. *Clus. Hist. pl. lib. V. p. XCV. fig.*

Ital. Speronella palmata.

Perenn. Habui ex alpinis Pedemontanis a MOLINERIO. Varietatem β obtinui iterum ex Pedemontio in montibus della *Madonna delle Finestre* ab Eq. Prof. MORISIO. Floret Junio, Julio.

Radix tuberosa, subrotunda, deorsum crasse fibrosa. Caulis teres, fistulosus, erectus, inferne subhirsutus, pilis reflexis, superne pilosus, aut glaber, bi-quinquepedalis, saepe purpurascens, simplex, vel apice parce ramosus. Folia alterna, petiolata, palmata, tri-quinque-septemfida, segmentis inferne latis, integris, apice acute, et inaequaliter inciso-dentatis, dente impari longiore, sinu baseos divergente, et quandoque divaricato, recta abscisso, supra saturate viridia, glabra, subtus pallentia, palmate nervosa, laxaque venosa, plus minus pilosa praesertim in nervis, venis, et margine. Petioli inferiores subhirsuti, superiores glabri, supra leviter canaliculati, basi vix dilatati. Racemus terminalis, multiflorus, demum laxiflorus, simplex, aut inferne auctus racemis brevioribus, axillaribus. Bracteam glabrâ, inferiores saepe tripartitâ, laciniis lanceolatis, reliquam simplices, lineares, interdum deficientes. Pedicelli bractea longiores, glabri, aut pubescentes, instructi prope florem bracteolis duabus, oppositis, vel alteruis, linearibus, et interdum bracteola tertia, inferiore, cum deest bractea sub pedicello. Perigonium mediocris magnitudinis, pulchre caeruleum, aut e caeruleo violaceum, extus glabrum, vel pilis raris adpersum, nitidulum. Sepala ovata, obtusa, aut vix acuta. Cornu conicum, obtusum, vel emarginatum, perigonio subaequale, aut paulo longius, nunc rectum, nunc curvulum, oblique ascendens, vel horizontale. Nectarium diphyllum, phyllis erectis, conniventibus, subemarginatis, nigrescentibus, glabris, subinde apice barbulis. Sepala accessoria ungue horizontali, canaliculato, pallido, lamina dependente, bifida, nigrescente, disco luteo-barbata, laciniis obtusiusculis, albo-ciliatis. Folliculi tres, nitidi, reticulati, glabri, vel pilosuli. Semina grandiuscula, trigona, apice convexo, tecta arillo ruguloso, in angulis seminis laxiore, et alam sistente.

Varietas β differt foliis utrinque pubescentibus, paulo angustius palmatifidis, segmentis apice angustius, et profundiùs laciniatis, racemo, et perigonio extus

pubescentibus, nectarii phyllis suberenatis, acutis, cornu uncatu.

Observ. Linnæus in Sp. pl. l. c. tribuit *Delphinio elato* suo labella bifida, nec emarginata; quare de planta hac nostra intellexit, non de Sibirica, ut maluit Aitonius fil. in Hort. Kew. ed. 2. tom. 3. p. 320.

10. *DELPHINIUM montanum*: foliis palmato-partitis, segmentis inferne cuneatis, superne anguste pinnatifido-laciniatis; sepalis lanceolatis, acuminatis; cornu uncatu. D. *montanum* De Cand. Syst. nat. 1. p. 360. excl. nonnull. syn., et Prodr. 1. p. 55. n. 46. a., et Franç. 5. p. 641. Pollin. Ver. 2. p. 194. Lois. Desl. Gall. ed. 2. tom. 1. p. 387. Reich. Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 20. Ranunc. Helleb. t. 73. f. 4676. b.

D. *elatum* a. n. 3. Koch. Syn. p. 23.

D. *intermedium* III. amethystinum Gaud. Helv. 3. p. 400.

D. *montanum*, perenne, villosum, Aconiti folio Zannich.

Opusc. posth. p. 59. ex loco.

Aconitum cœruleum hirsutum flore Consolidæ regalis Tit.

It. in calo. Hort. Maur. p. 11. non num., ex loco.

Ital. *Speronella sbrandellata*.

Perenn. Habui ex *Vette di Feltre* a MONTINIO, et ex eisdem alpiibus *alla Malga Pietena*, et *alla Malga Agnerola* a FACCHINIO. Floret Julio.

A præcedente reredit hisce notis. Caulis pubescens. Folia quoque pubescentia, dissecta in segmenta profundiora, angustiora, basi enneata, apice flabellata, et anguste pinnatifido-laciniata, laciniis acuminatis, impari insigniter elongata. Petioli pubescentes. Racemus pubescens. Flores grandiores, luride, et squallide cœrulei. Sepala lanceolata, acuminata. Cornu uncatum, plerumque perigonio brevius, rarius æquale. Nectarii phylla acute bidentata, subrenata. Sepala accessoria laciniis acuminatis, crenulatis.

**** *Nectario diphylo; sepalis accessoriis imberbibus; folliculis ternis.* Staphisagria.

11. *DELPHINIUM Staphisagria*: caule molliter villoso; foliis palmatis, pubescentibus, segmentis oblongo-lanceolatis, subtrifidis, integrisve; racemo laxo; pedicellis basi bracteolatis; cornu brevissimo.

D. *Staphysagria* Sp. pl. p. 750. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 371., et Fl. Græc. 6. p. 6. t. 508. Plenck. Ic. pl. med. 5. p. 46. t. 434. De Cand. Syst. nat. 1. p. 363., et

Prodr. 1. p. 56. n. 53., et *Franç.* 4. par. 2. p. 905. *Sav. Bot. Etr.* 2. p. 125. *Sang. Cent.* p. 78.* *Ten. Nap.* 4. p. 304. *A., et Syll.* p. 262. n. 6. *Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 226. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 1. p. 32.,* et *Sup.* 2. p. 182.,* et *Syll.* 2. p. 29.* *Presl. Sic.* 1. p. 26. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 68. *Koch. Syn.* p. 23. *Reich. Exc.* 3. p. 736. n. 4674.

Staphisagria Ang. Sempl. p. 291.

Staphisagria Cæsalp. De pl. lib. 15. cap. 31. p. 584. *Cup. Hort. Cath.* p. 208. *Castell. Hort. Mess.* p. 22. *Riv. Pent. irr.* t. 127.

Ital. Erba da pidocchi. Stafisagria. Stafuagria. Stafusaria. Strafisagria. Strafizzata. Strafizzeca. Stafusaria. Tusano Tarq. Tozz. Diz. bot. 2. p. 89.

Offic. Staphisagria semina Lin. *Mat. med.* p. 94. n. 269. *Ann. Bienn. Habit. ex Hetruria in Maremma prope Suvereto* a Prof. PETRO SAVIO, ex *Latio a Castel Gandolfo* secus emissarium a SANGUINETTO, ex *ruferatis*, et *glareosis Siciliæ Panormi, Catanae, et Syracusis* ab Eq. GUSONIO. Floret Aprili, Majo.

Caulis teres, crassus, tenuiter striatus, erectus, pedalis, et ultra, molliter villosus, villis longis, patentibus, quibus pili alii breviores interjiciuntur. Folia alterna, longe petiolata, inferiora palmato-septemfida, superiora quinquefida, segmentis oblongo-lanceolatis, apice bi-trifidis, integrisve, subtus trinerviis, laciniis foliorum imorum obtusiusculis, reliquorum acutis, aut acuminaatis, plus minus pubescentia, subtus pallidiora, modo grandia, modo parva. Petioli striati, more caulis villosi, supra canaliculati, basi paululum dilatati. Racemus terminalis, laxiflorus, velutino-villosus, simplex, vel auctus racemis lateralibus proximis, axillaribus, multo brevioribus. Bractea lanceolata, aut linearis, obtusiuscula sub quovis pedicello, illoque brevior. Pedicelli inferiores a lineis sex ad duos pollices longi, superiores gradatim breviores. Bracteolæ duæ, oppositæ, lineares, vel lanceolato-lineares, sitæ in basi pedicellorum. Perigonium nunc pallide, nunc saturate cæruleum, vel cæruleo-violaceum, extus pubescens, sepalis ovatis, obtusis, aut vix acutis, multinerviis. Cornu brevissimum, a linea dimidia ad lineas duas tantum pertingens, obtusum, et subinde emarginatum, adscendens, incurvum. Nectarium diphyllum, perigonio brevius, albidum, phyllis oblongis, angustis, obtusis, recurvis, inferne in nervis, et in margine interno puberulis. Sepala accessoria unguiculata, obovata, obtusa, integra, aut

breviter bifida, imberbia, albida, vel cærulescentia, margine undulata, perigonio subæqualia, aut paulo longiora. Filamenta inferne ciliata. Ovaria, et stilorum basis villosa. Stigmata simplicia, paululum dilatata, canaliculata, recurva. Folliculi tres, dense villosi. Herba unctuosæ, odoris ingrati.

Usus. Semina contrita præstant ad pediculos enecandos.

12. *DELPHINIUM pictum*: caule brevissimo pubescenti-velutino; foliis palmatis, glabris, segmentis oblongo-lanceolatis, subtrifidis, integrisve, acutis; pedicellis inferne bracteolatis; cornu sepalis paulo brevioribus.

D. pictum Willd. *En. hort. Berol.* 1. p. 574. *De Cand. Syst. nat.* 1. p. 363., et *Prodr.* 1. p. 56. n. 52. *Moris. Sard.* 1. p. 61.*

D. Staphisagria Wood. *Med. bot. t.* 154. *Moris. Stirp. Sard. el. fasc.* 1. p. 1.*

Staphis agria Dod. *Pempt.* p. 366. fig.

Staphisagria, sive *Vitifolia Pedicularis* Lob. *Ic.* p. 689.

Ital. Stafisagria minore.

Ann. Habui ex pascuis collinis Sardinie ab Eq. Prof. MORISIO. Floret ab Aprili in Junium.

Præcedenti proximum; differt notis sequentibus. Totus caulis brevissime pubescenti-velutinus, vix in parte suprema pilis longioribus, rariusculis, patentibus interjectis, sæpe rubescens. Folia minora, pari modo secta, glabra, margine tantum, et subinde etiam in nervis pilosa. Pubescentia petiolorum ut in caule superiore. Eadem et racemi. Pedicelli a duabus lineis ad sesquipollicem longi, infra medium, vel in basi instructi bracteolis duabus, oppositis, aut alternis. Bractee, et bracteolæ villosæ. Cornu recurvum, perigonio parum brevius.

ACONITUM.

Lin. Gen. p. 274. *Tourn. Inst.* 2. t. 239. 240. *Juss. Gen.* p. 234. *Lamck. Ill.* 5. t. 482. *Vent. Tabl.* 3. p. 63. *Gærtn. De fruct.* 1. p. 311. t. 65. *De Cand. Syst. nat.* 1. p. 364., et *Prodr.* 1. p. 56. *Smith. Engl. Fl.* 3. p. 31. *Reich. Mon.* p. 16., et *Ill.* p. 5. non. numer. *Endl. Gen.* p. 849. n. 4797.

Perigonium coloratum, liberum, quinqueseptalum, sepale superiore majore, cassidæforme, antice deorsum

rostratum, lateralibus duobus oppositis, suborbiculatis, conniventibus, inferioribus duobus minoribus, dependentibus. Nectaria duo, sub casside recondita, stipitata, stipite tenui, ascendente, vel erecto, labello supra stipitem obliquo, superne desinente in calcar tubulosum, recurvum, inferne in laminam planam, emarginatam, plerumque incurvam. Stamina plura, sita inter sepala lateralialia, perigonio multo breviora, filamentis inferne dilatatis, seu alatis, apice subulatis, antheris subrotundis, vel oblongis, bilocularibus, incumbentibus. Subinde stamina nonnulla externa abortiva, squama tantum remanente. Ovaria tria-quinque. Stili filiformes. Stigmata simplicia. Folliculi tres-quinque, chartacei, stilo persistente terminati, latere interno dehiscentes. Semina plura, angulato-turbinata, arillata, arillo celluloso, squamato, plicato, et subinde longitudinaliter alato, suturae utrinque affixa.

Habitus. Herbae perennes. Radix tuberosa, saepe fasciculata, rarius bulbifera. Caulis erectus. Folia petiolata, palmata, segmentis flabellatis, multifido-incisis. Flores racemosi, vel paniculati, bracteati. Pedicelli bracteolati. Corolla flava, caerulea, violacea, alba, vel e caeruleo, et albo varia, saepius decidua.

Ord. nat. Ut in *Delphinio* p. 398.

* *Floribus flavis.*

1. *Aconitum Anthora*: foliis palmato-multifidis, laciniis anguste linearibus; galea convexa, brevi, rostro horizontali; nectarii labello inferne obcordato.

A. Anthora *Sp. pl.* p. 751. *De Cand. Syst. nat.* 1. p. 365. *a.*, et *Prodr.* 1. p. 56. n. 1. *a.*,* et *Franç.* 4. par. 2. p. 917.* *Ser. in Mus. Helv.* 1. p. 130. t. 15. f. 1. 3. 4. et 47. *Jacq. Austr.* 4. p. 43. t. 382. *Plenck. Ic. pl. med.* 5. p. 48. t. 436. *All. Ped.* 2. p. 62. n. 1501. *Re Seg.* p. 45. *Birol. Acqn.* 1. p. 183. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 62. n. 1. *Pollin. Ver.* 2. p. 196. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 70. *Koch. Syn.* p. 23. *Reich. Mon.* p. 62. tab. 1., et *Illustr.* n. 60. t. 69., et *Exc.* 3. p. 743. n. 4711., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 25. *Ranunc.*

Helleb. t. 100. f. 4711. a. β. γ. Host. Austr. 2. p. 77. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 381. Gaud. Helv. 3. p. 461.

A. Jacquini Reich. Mon. p. 65. tab. 2.

A. eulophum Reich. Mon. p. 69. t. 5.

A. n. 1199. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 93.

Antora Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 1152. fig. mala. Dur. Herb. ed. Rom. p. 34. fig. pess. Calz. Viag. di mont. Bald. p. 11.

Quædam in alpibus Liguriæ... appellant Antoram Casalp. De pl. lib. 15. cap. 35. p. 587.

Anthora Pon. Mont. Bald. p. 172.

Anthora vera flore luteo Barrel. Ic. 609.

Aconitum salutiferum, seu Anthora Tit. It. in calc. hort. Maur. p. 11. non numer.

A. salutiferum, sive Anthora, flore luteo Zannich. Opusc. posth. p. 58.

Anthora Riv. Pent. irr. t. 128. luxurians.

Ital. Aconito salutifero. Antitora. Antora Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 4.

Offic. Anthoræ radix Lin. Mat. med. p. 95. n. 270.

Perenn. Habui ex parvo Cenisio; et a Granier a BOKJEANNIO, ex districtu Bassanensi in vertice della Campaniana a MONTINIO. Floret Julio, Augusto.

Radix fasciculata, napulis fusiformibus, aut oblongis, fibrillosis, carnosis, duobus-quatuor, rarius tuber solitarium. Caulis e tereti angulatus, erectus, vel adscendens, inferne glaber, aut subpilosus, superne pubescens, pilis brevibus, recurvo-arcuatis, simplex, vel parce ramosus, ramis alterais, brevibus, a spithama ad duos pedes longus. Folia numerosa, conferta, alterna, breviter petiolata, palmato-tripartita, segmentis inferne angustissimis, cuneatis, reliqua parte flabellato-multifidis, laciniis anguste linearibus, acutis, divergentibus, margine subrevolutis, glabra, aut vix pilosula, supra late viridia, subtus pallidiora, nervo per laciniis excurrento instructa. Petioli plani, supra canaliculati, amplexicaules, superiores brevissimi. Racemus terminalis, simplex, vel ramosus, pubescens, pilis recurvo-arcuatis, foliosus, modo laxè, modo dense florifer. Folia floralia inferiora caulinis supremis similia, reliqua minus decomposita, suprema sæpe simplicia, linearia. Bracteolæ in quovis pedicello duæ, vel tres, situ variæ. Flores suævolentes. Perigonium ochroleucum cum virare aliquo, undique pubescens, pubescentia nunc densa, nunc rariuscula. Gulea brevis, hemisphærica, obtusa, antice

plus minus inclinata, rostro longo, fere horizontali, inter rostrum, et verticem incavata. Sepala lateraliter grandia, orbiculata; sepala inferiora dependentia, oblongo-lanceolata; utraque obtusa. Nectaria stipite more galeæ arcuata, labello superne desinente in calcar contortuplicatum, inferne in laminam dilatatam, obcordatam, refracte incurvam. Stamina filamenta glabra. Antheræ subrotundæ, rubido-fusæ, polline albo. Folliculi quinque, erecti, pubescentes, rostrati.

Usus. Radix jam adhibita contra vermes, et in febribus exanthematicis, nunc desueta. Ejus qualitas acris, amara. Vis suspecta.

2. *Aconitum Lycoctonum*: foliis palmatis, segmentis latis, cuneatis, acute inciso-dentatis, galea elevata, tubulosa, subclavata, rostro inclinato; nectarium cornu circumvoluto, labello emarginato, recto; folliculis ternis.

A. Lycoctonum *Sp. pl.* p. 750. (mixtum cum *Aconito septentrionali* D. C.) *De Cand. Syst. nat.* 1. p. 369. α . β . γ ., et *Prodr.* 1. p. 57. n. 2. (excl. variet. κ . λ . μ ., quæ in Italia non occurrunt), et *Franc.* 4. par. 2. p. 916. *Jacq. Austr.* 4. p. 41. t. 380. *All. Ped.* 2. p. 61. n. 1498. *Balb. Taur.* p. 87.* *Re Seg.* p. 45.* et *Tor.* 1. p. 282.* *Biol. Acon.* 1. p. 182. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 62. n. 2. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 253., et 390. *Comoll. Prodr.* p. 104.* *Pollin. Fer.* 2. p. 196. *Suffr. Foros.* p. 149. *Bert. Mant. Fl. alp. Apuan.* p. 35. n. 55. *Sav. Bot. Etr.* 1. p. 155. *Mour. Cent.* 13. p. 27.* *Ten. Syll.* p. 262. *A. B. Lois. Desl. Gall.* 1. p. 319.* et ed. 2. tom. 1. p. 388.* *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 79. *Koch. Syn.* p. 25. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 380. *Gaud. Helv.* 3. p. 462. cum varietatib.

A. Vulparia *Ten. Nap.* 4. p. 327. *Reich. Ill.* n. 56. tab. 56. 57. 58. pl. flore flavo tantum, et *Exc.* 3. p. 737. n. 4681., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 21. β . *Ranunc. Helleb.* t. 80. f. 4681. excl. fig. varietat. α .

A. Neapolitanum *Ten. Nap.* 4. p. 327.

A. Theliphonum *Reich. Ill.* n. 54. tab. 54. casside recta, superne angustata, et *Exc.* 3. p. 737. n. 4680, et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 21. *Ranunc. Helleb.* t. 79. f. 4680.

A. pyrenaicum *Reich. Ill.* n. 48. tab. 48. non *Ic. Fl. Germ.*, et *Helv. Host. Austr.* 2. p. 69. excl. syn. Linn;

A. ranunculifolium *Reich. Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 22. n. 4681. b. *Ranunc. Helleb.* t. 81. f. 4681. b.

Flor. Ital. T. V.

A. Jacquinianum Host. *Austr.* 2. p. 68., excl. pl. Carp., et Transylv. flore purpureo.

A. n. 1200. Hall. *Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 94.

Aconito II. Matth. *Valgr.* 1585. tom. 2. p. 1142. fig.

Napelli alterum genus foliis Platani, floribus pallidis *Casalp. De pl. lib.* 15. cap. 32. p. 585.

Luparia Calz. Viag. di mont. Bald. p. 11.

Il II. *Aconito* del Matthioli Pon. *Mont. Bald.* p. 236. (err. 336.).

Aconitum reticulata radice flore sulfureo albicante latifolium, et angustifolium *Barrel. Ic.* 599. 600. ex loco.

A. folio Platani, flore luteo pallente *Zannich. Opusc. posth.* p. 59. *J. Bauh. Hist. pl.* 3. lib. 34. p. 652. fig.

A. Lycocotnum luteum *Segui. Fer.* 2. p. 114. n. 1.

A. lycocot. vulg. luteo flore *Clus. Hist. pl. lib. v. p. xciiii.* fig.

Ital. *Erba della volpe. Lupaia. Strozza lupo* Targ. Tozz. *Diz. bot.* 2. p. 4.

Perenn. Legi in alpinis Apuanis in valle *Frattetta* sub vertice *Sagro*. Habui ex eisdem alpinis *alla Pietra Pana* a BOTARIO, ex Apennino Bononiensi a *Castiglione de' Pepoli* a MATTEJO, ex Liguria orientali in montibus d' *Antola* ab hortulano Durattiano, ex Liguria occidua in radicibus montis *Apega* prope *le Vieussene* a Prof. SASSIO, ex Comitatu Nicmensi in monte *Agnon* supra *Brey* ab Eq. Prof. MONISIO, ex montibus Pedemontanis a Prof. BALBISIO, ex sylvaticis ad thermas *Valderias* a BERTHO, ex valle d' *Ala* a Prof. RE, ex nemoribus Ticini prope *Buffalora*, et ex montibus d' *Erba* a PPRI. BALSAMO-CRIVELLIO, et DE NOTARIA, ex monte *Generoso*, et ex montibus vallis *Intelvi* ad *Larium* a Prof. COMOLLIO, ex districtu Bergomensi in valle *Brembana* a BERGAMASCHIO, ex districtu Veronensi in sylvis montis *Pastello* a MARGAROTTO, ex Tyrolis Italico in alpinis di *Fiemme*, et *Fassa*, a *Duron*, nella *Seiser-alpe* a FACCHINIO, ex districtu Bassanensi in sylvis d' *Angarano*, nella *Grappa*, a *Montalon* in *Falsugana*, et ex *Vette di Feltre* a MONTINIO, Tergesto in sylvis septentrionalibus montis *Kokuschi* a TOMMASINIO, ex Apennino Urbinati a *Montenerone* a Prof. OCTAVIANO, ex summitate montis *S. Vicino* in Apennino Cingulano, ubi legerat *Barrelierius* quoque, ab Eq. NABBUCCIO, ex montibus Nursinis ab Eq. PATRUCCIO, ex Piceno in monte *S. Bernardo* ab ORSINO, in monte *Regnola alla Spedaletto*, et in monte *Fronzosa*

a MARZIALETTO, ex Pretutiis in monte Cornu ab On-
sino, in sylvis montium *Grande, Calvo, et Scala* a
CROCHETTO, ex Hetruria *alla Falterona* a Prof. PETRO
SAVIO, et ab Eq. NARDUCCIO, *alla Secchiotta di Val-*
lombrosa alla Cimensina a BARONIO, et ad Ereumum
Camaldulensium a BARONIO filio, in alpe *della Luna*
Apennini Aretini ab AMIDEO, ex *Foce Frabaria* prope
S. Sepolcre a CLERICO, ex *Serra di S. Antonio* in La-
tio a Prof. MAURIO. Floret ab Junio in Augustum.

Radix e napulis fasciculatis, fusiformibus, non valde
crassis, sed collo arete compactis. Caulis e tereti an-
gulus, fistulosus, erectus, etiam tripedalis, gla-
ber, aut superne pubescens, pilis recurvis, simplex,
vel parce ramosus, ramis brevibus, patulis, sitis in
axillis foliorum superiorum. Folia palmata, quinque-
septem-novempartita, segmentis plus minus latis, cu-
neatis, externis bifidis, reliquis trifidis, omnibus in-
ciso-dentatis, laciniis, dentibusque acutis, vel acumi-
natis, nunc paucis, et inter se remotis, nunc numero-
sis, et sibi invicem superimpositis cum illis segmenti
proximi, supra plus minus saturate viridia, et subinde
ad angulos intrantes albo-maculata, subtus pallentia,
palmate nervosa, et laxo reticulato-venosa, nervis,
venisque prominentibus, in margine, nervis, et venis
pilosa, reliqua superficie glabra, vel undique pilosa,
inferiora longissime petiolata, suprema brevissime. Pe-
tioli supra canaliculati, glabri, aut pilosi, basi pau-
lulum dilatati. Racemus terminalis, simplex, aut in-
ferne ramosus, ramis patulis, dense, vel laxo florifer.
Folia floralia sub ramis racemi, vel sub pedicellis in-
ferioribus sessilia, aut subsessilia, palmata, segmentis
paucis, parceque inciso-dentatis, reliqua simplicia,
linearia. Pedicelli stricti, apice recurvuli, glabri, aut
pubescentes, instructi bracteolis duabus, linearibus,
plerumque alternis, loco variis. Perigonium nunc ochro-
leuco-albens, nunc lutescens, extus glabrum, vel pi-
losulum, aut pubescens. Galea elevata, magnitudine,
et longitudine ludens, diametri ab una ad tres lineas,
tubulosa, obtusa, saepe apice turgidior, et subclavata,
rarius apice angustior, et conica, recta, vel antice
quidquam inclinata. Rostrum modo breve, modo lon-
gusculum, deorsum versum, aut fere horizontaliter
protensum, apice virens. Sepala lateralia margine, et
intus pilosa; sepala duo inferiora oblonga, pilosa; utra-
que obtusa. Nectaria ungue erecto, calcare circumvoluto,

et subinde tantum uncato, labello dependente, recto, emarginato, erosulo. Filamenta glabra. Folliculi tres, erecti, glabri, vel pubescentes. Semina circumdata plicis sinuosis.

Conferantur observationes nostræ de hac specie in Mant. Fl. alp. Apuan. p. 36.

**** Floribus cæruleis, aut albo-cæruleis.**

3. *ACOWITUM Napellus*: foliis palmatis, segmentis cuneato-flabellatis, mutifide-linearibus; racemo stricto; galea hemisphærica; nectarii cornu brevi, subuncato, labello incurvo.

A. Napellus Sp. pl. p. 751. Smith. Engl. Fl. 3. p. 31., et Engl. bot. Sup. v. 2. t. 2730. luxur. Sp. bot. v. 1. tab. 46. Ser. in Mus. Helv. 1. p. 162. t. 15. f. 41. 42. 50. De Cand. Prodr. 1. p. 62. n. 20. α. β. γ. δ. All. Ped. 2. p. 62. n. 1499. Birol. Acon. 1. p. 183. Coll. Herb. Ped. 1. p. 67. n. 14. Comoll. Prodr. p. 104.* Pollin. Ver. 2. p. 197.* De Cand. Franc. 4. par. 2. p. 917., et 5. p. 642. β. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 72. Koch. Syn. p. 24. Reich. Exc. 3. p. 741. n. 4700., et Ill. n. 1. 2. 3. tab. 1. 2. 3., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 24. Ranunc. Helleb. 3. p. 92. t. 4700. Gaud. Helv. 3. p. 465.

A. vulgare De Cand. Syst. nat. 1. p. 371.

A. acutum Comoll. Prodr. p. 105.*

A. Hoppeanum Reich. Mon. p. 94. t. 15. f. 1., et Ill. n. 65. t. 65., et Exc. 3. p. 742. n. 4703., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 24. Ranunc. Helleb. t. 94. f. 4703.

A. Kœleanum Reich. Mon. p. 85. tab. 11. f. 1., tab. 12. fig. 1., et Ill. n. 62. tab. 62., et Exc. 3. p. 743. n. 4710., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 25. Ranunc. Helleb. t. 99. f. 4710.

A. taurericum Reich. Mon. p. 87. 88. n. 3. t. 12. f. 3.

A. tauricum Reich. Ill. n. 63. tab. 63., et Exc. 3. p. 743. n. 4709., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 25. Ranunc. Helleb. t. 99. f. 4709.

A. Funkianum Reich. Ill. n. 66. tab. 66.

A. laxum Reich. Exc. 3. p. 742. n. 4701., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 24. Ranunc. Helleb. t. 93. f. 4701.

A. angustifolium Bernh. Pl. sicca.* Nacc. Agg. p. 19.,* et Ven. 3. p. 87.* Reich. Exc. 3. p. 742. n. 4704., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 24. Ranunc. Helleb. t. 95. f. 4704.

A. n. 1200. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 283.

- Napello* *Matth. Venez. Ered. Valgr.* 1581. p. 697. fig., et *Venez. Cinam.* 1621. p. 612. fig., non *Valgr. Venez.* 1585., nec *Albert. Venez.* 1604.
- N. retiforme* *Calz. Viag. di mont. Bald.* p. 11.
- Il vero *Napello* azzuro del *Lobelio* *Pon. Mont. Bald.* p. 172.
- Napello* ceruleo del *Lobelio* *Pon. l. c.* p. 236.
- Napellus* major cœruleus, montanus, Anthora facie *Bocc. Mus. di piant.* p. 74. ex loco.
- Aconitum* *Napellus* dictus primus *Tit. It. in calc. Hort. Maur.* p. 10. non num.
- A. cœruleum*, seu *Napellus* *Zannich. Opusc. posth.* p. 41.
- A. cœruleum* seu *Napellus* primus *Segui. Ver. 2.* p. 117. n. 5.
- Napellus* *Dod. Pempt.* p. 442. fig.
- N. verus* cœruleus *Lob. Ic.* p. 679.
- β foliorum segmentis, laciniisque lato-linearibus.
- Aconitum* *Napellus* *Lin. herb.* ex *Smithio*, et *De Cand. Schwed. Acad. Hamburg.* 1749. tom. 1. p. 50. tab. 2. *Jacq. Austr.* 4. p. 42. t. 381. *Plenck. Ic. pl. med.* 5. p. 47. t. 435. *De Cand. Prodr.* 1. p. 62. n. 20. §.
- A. Napellus* *Bauhini Reich. Ill.* n. 4. tab. 4.
- A. Neubergense* *De Cand. Syst. nat.* 1. p. 373. *Reich. Ill.* n. 69. tab. 69., et *Exc.* 3. p. 740. n. 4694., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 23. *Ranunc. Helleb.* 1. 88. f. 4694.
- A. neomontanum* *Comoll. Prodr.* p. 105.* *Bernh. Pl. sicc.**
- A. callibotryon* *Reich. Mon.* p. 98. n. 1. t. 16. fig. 1., non fig. 2.
- A. tauricum* *Wulf. in Jacq. Collect.* 2. p. 112. *Jacq. Ic. rar.* 3. p. 6. t. 492.
- A. taurericum* *Reich. Mon.* p. 88. var. 2. tab. 12. fig. 2.
- A. autumnale* *Reich. Mon.* tab. 17. fig. 2., non *Ic. Fl. Germ. et Helv.*
- A. commutatum* *Reich. Mon.* tab. 18. f. 3.
- A. cœruleum*, sive *Napellus* primus foliis latioribus *Zannich. Opusc. posth.* p. 58.
- A. Lycot.* V. *Neubergense* *Clus. Hist. pl. lib. r. p. xcvi.* fig.
- A. magnum* purpureo flore, vulgo *Napellus* *J. Bauh. Hist. pl.* 3. lib. 34. p. 655. fig.
- Ital. Aconito. Aconito. Malapelle. Napello* *Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 4.
- Offic. Napelli herba recens* *Appar. med. nosoc. Ticin.* ann. 1790. p. 3.
- Perenn.* Habui ex alpinis *Pedemontanis alla Madonna della Finestre* ab *Eq. Prof. Moaisio*, ex *Cenisio a*

Prof. BALBISIO, et a BONJEANNIO, ex montibus di *Val-sassina*, et *Cavargna* ad Larinum a Prof. COMOLLIO, ex Baldo a POLLINIO, et a BARBERIO, ex Tyroli Italico in alpibus di *Fiemme*, et *Fassa* a FACCHINIO, in viciniis di *Primier* ab Eq. PAROLINIO, ex *Portole* Vicentinorum, et ex *Vette di Feltre* a MONTINIO, ex alpibus Belunensibus al *Comelico* a FACCHINIO, et a Prof. VISIANIO, Fossâ Clodiâ in sylva dei *Nordi* a Prof. NACCARIO, ex Corsica in monte *Coscione*, ubi jam repperat Bocconius, a SOLEIROLIO. Varietatem β obtinui ex alpibus Pedemontanis alla *Madonna delle Finestre* a BERTERO, ex montibus vallis *Intelvi*, *Sassina*, *Cavargna*, et *Biandino* ad Larinum a Prof. COMOLLIO, ex montibus Bergomensibus prope *Vilminore* a BERGAMASCHIO. Floret ab Junio in Augustum.

Radix e napulis crassis, carnosis, fusiformibus, plus minus longis, solitariis, vel pluribus fasciculatis, extus nigris, lateraliter fibrosis. Caulis tereti angulatus, fistulosus, erectus, sæpe leniter flexuosus, glaber, aut pubescens, simplex, vel superne ramosus, ramis paucis, alternis, strictis, ab uno ad quatuor, et quinque pedes longus. Folia alterna, crebra, petiolata, palmato-quinquepartita, segmentis duobus utrinque externis basi connatis, medio libero, plerumque longe cuneato, et veluti petiolulato, omnibus flabel-latis, pinnatifido-laciniatis, inferne nunc angustis, nunc latis, laciniis semper anguste linearibus, acutis, vel acuminatis, margine subrevolntis, glabra, interdum subciliata, supra saturate viridia, sulco lineari per medium segmentorum, et laciniarum notata, subtus pallentia, palmate nervosa, et laxe venosa. Petioli supra canaliculati, basi paululum dilatati, superiores successive breviores. Racemus terminalis, simplex, aut inferne ramosus, nunc elongatus, multiflorus, nunc brevis, pauciflorus, floribus condensatis, aut inter se plus minus remotis, pubescens, rarius glaber. Bractæ inferiores longiores, sæpe palmatifide, laciniis linearibus, reliquæ indivisæ, lineares. Pedicelli longitudine varii, stricti, aut erecto-patuli, ad medium, aut paulo supra medium instructi bracteolis duabus, linearibus, brevibus, plerumque oppositis. Perigonium atro-ceruleum, sed indit pallide ceruleum, e carneis purpurascens, album, vel albo, et ceruleo pictum, item extus pubescens, aut tantum pilosulum, vel etiam glabrum, magnitudinis mediocris, aut potius grande.

Galea hemisphærica, parum elevata; antice breviter rostrata. Sepala lateralia ciliata, et facie interna pilosa. Sepala inferiora oblongo-lanceolata, pilosa. Nectaria stipite gracili, glabro, vel antice piloso, labello sygmoidæo, inferne emarginate, superne desinente in calcar breve, obtusum, vix uncatum. Filamenta inferne anguste alata, glabra, superne subulata, nunc glabra, nunc pilosa, nunc hirsuta. Folliculi tres, rarius quatuor, erecto-patuli, reticulato-venosi, plerumque glabri. Semina angulis alatis, lateribus rugulosis.

Varietas β . est planta luxurians foliorum segmentis, laciniisque lato-linearibus. Si cui lubeat abolere, et comprehendere cum specie, non obstabo.

Hæc stirps a segmentis, laciniisque foliorum angustissimis (*Aconitum Napellus Schleicheri* Reich. Illustr. tab. 1. fig. 1.) transit ad segmenta inferne late cuneata, superne anguste laciniata (*Aconitum Hoppeanum* Reich. Illustr. tab. 65.), et denique ad segmenta, et lacinias latas (*Aconitum Neubergense* De Cand., Reich. Illustr. tab. 69.); sed inter hæc formas præcipuas habentur tot, tantæque formæ intermediæ, quarum altera in alteram gradatim transit, imo omnes promiscue crescunt, ut eas esse unius, ejusdemque typi lusns quisque facile intelligat. Nos vero rei veritati studentes neque varietates, neque species incomprehensibiles ex his faciemus, ne doctrinam Aconitorum in caos inextricabile conjiciamus, ut hactenus contigit.

Usus. Extractum *Aconiti Napelli* L. pari modo ac extractum *Aconiti Stoerkiani* Reich. laudatum fuit in scirrhus, aliisque morbis desperatis, quæ res inter commentitias habendæ, sed utile videtur in rheumate chronico, et in debilitate bronchiorum, si caute adhibeatur.

4. *Aconitum variegatum*: glabrum; radice bulbifera; caule superne refracte flexuoso; foliis palmato-ternatis, foliolis rhombeis, grosse inciso-dentatis, acutis; panicula patente, pauciflora; casside parum elevata, convexa, subinclinata; calcare uncatum; folliculis glabris.

A. variegatum Sp. pl. p. 750. Reich. Illustr. n. 34. tab. 34. opt. (non Ic. Fl. Germ. et Helv.) De Cand. Syst. nat. 1. p. 376., et Prodr. 1. p. 59. n. 5. a. Pollin. Ver. 2. p. 200.

Lycotomum cæruleum parvum Dod. Pempt. p. 441. fig. L. cæruleum parvum facie Napelli Lob. Ic. p. 678.

Aconit. Lycet. X. Thora Italica Clus. Hist. pl. lib. 5. p. XCIII. fig.

Lycotconum cæruleum parvum Dod. *Lugd. hist. n. p. 1743.*
fig. 1067.

Aconitum lycotconum flore cæruleo, galea elatiori, radice bulbosa *Segui. Sup. p. 302.* herb. Bonon.

Ital. Tora piccola. Tora Italiana.

Perenn. Habui ex districtu Bassanensi in sylvis di *Nosellari* supra *Solagna* a *Montino*, *alle Grotte d'Oliero*, et *Collalti* ab *Eq. PAROLINIO*. Floret Augusto deoedente, et Septembri.

Radix ramosissima, fusca, prope collum ferens bulbos ovoideos, fuscus, ipsos quoque basi radicanter, et successive caulem daturus. Caulis tereti angulatus, gracilis, erectus, superne refracte flexuosus (*a zig zag*), sæpe rubescens, a palmo ad duos pedes, vix ultra longus. Folia potius parva, alterna, breviter petiolata, subcoriacea, palmato-ternata, foliolis rhombeis, seu basi cuneatis, integris, superne latis, lateralibus bifidis, medio trifido, utrisque grosse inciso-dentatis, dentibus acutis, margine curvulo, supra late, aut saturate viridia, nitida, subtus glaucescentia. Panicula terminalis, laxa, patens, simplex, vel ramosa, pauciflora. Folia floralia inferiora, præsertim in panicula ramosa, foliis caulinis supremis similia, reliqua exigua, ramentacea, ovata, vel bi-trifida, laciniis ovatis, aut lanceolatis. Rami paniculae uni-triflori. Pedicelli supra medium, et sæpe prope apicem instructi bracteolis duabus-tribus, linearibus. Perigonium plus minus grande, cæruleum, vel e cæruleo albens. Sepala omnia subciliata. Galea parum elevata, apice convexa, recta, vel antice subinclinata, sinu levi supra rostrum incavata, rostro incisio adunco, postea patente, vel sursum recurvo. Sepala lateralibus pilosa, extra galeam sita, inferiora duo oblongo-lanceolata, dependentia. Nectaria stipite inferne fere erecto, apice incurvo, labello sygmoideo, calcare uncat. Filamenta glabra. Folliculi tres, erecto-patuli, glabri. Tota herba glaberrima.

Hæc est planta Dodonæi, et antiquorum botanicorum, quorum figuras superius attuli. Non me latet, Friesium in *Novit. Fl. Suec. ed. alt. p. 171.* tribuisse has figuras *Aconito Cammaro* L., quod sane diversum.

5. *Aconitum Cammarum*: glabrum; caule erecto; foliis palmato-ternatis, foliolis basi cuneatis, superne dilatato-flabellatis, pinnatifido-incisis, laciniis acutis; panicula strictiuscula; galea elevata, ample conica, subinclinata; calcare uncat; folliculis linea superiore pubescentibus.

A. Cammarum *Sp. pl.* p. 751. *Jacq. Austr.* 5. p. 11. t. 424. *All. Ped.* 2. p. 62. n. 1500.* herb. *Reich. Exc.* 3. p. 738. n. 4684. β ., et *Illustr. n.* 8. tab. 8. fig. 1. 2., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 22. β . *Ranunc. Helleb.* t. 83. f. 4684. γ . *Host. Austr.* 2. p. 73.

A. Lycot. IX. *Judenbergense* *Clus. Hist. pl. lib. 5. p. xcvi.* fig. bona.

β galea elevata, gracili, tubuloso-conica.

Aconitum Cammarum *Nocc. et Balb. Ticin.* 1. p. 255. ex loco.

A. nasutum *Reich. Ill. n.* 9. tab. 9. fig. 1. 2., et tab. 10.

Thora Italica seu *Napellus minor* flore cæruleo *Barrel. Ic.* 6ro.

Ital. Cammaro.

Perenn. Habui ex sylvis Pedemontanis de herbario AL-
LIONI; varietatem β obtinui ex monte *Lesime* Apennini Placentini, ubi *Nocca*, et *Balbisius* indicant, a GABILLIO, ex Apennino Parmensi prope *Fugazzolo* a BERTHO. Floret ab Junio in Augustum.

Caulis e tereti angulatus, fistulosus, erectus, superne leniter flexuosus, bi-tripedalis, ramosus; ramis alternis, strictiusculis. Folia palmato-ternata, foliolis basi cuneatis, superne dilatato-labellatis, pinnatifido-lacinatis, acutis, externis bipartitis, medio tripartito, glabra, supra late viridia, contra nervos sulco-lineariter notata, subtus pallentia, palmate nervosa, laxaque reticulato-venosa, inferiora longius petiolata. Petioli supra canaliculati, basi vix dilatati. Panicula terminalis, strictiuscula. Folia floralia sub ramis inferioribus paniculam similia foliis caulinis supremis, reliqua vel trifida, laciniis lanceolatis, vel indivisa, lanceolata, aut linearia.

Bracteolæ pedicellorum lineares, duæ-tres, oppositæ, vel alternæ. Perigonium potius grande, cæruleum, glabrum, galea insigniter elevata, ample conica, obtusa, sub-inclinata, rostro adunco, breviusculo. Nectaria stipite suberecto, labello sygmoideo, valde inclinato, et fere verticali, calcare longiusculo, obtuso, uncat. Filamenta glabra, basi anguste alata. Folliculi tres-quinque, in latere superiore linea longitudinali pubescentes. Semina circulariter rugosa, rugis flexuosis, et inanper ala dorsali, flexuosa longitudinaliter instructa. Tota planta glabra.

Varietas β differt foliorum laciniis magis acutatis, galea insigniter quidem elevata, sed multo graciliore, conico-tubulosa. Huic proximum quoque est *Aconitum Cammarum gracile* *Reich. Illustr. n.* 7. tab. 7., et *Ic. Fl. Germ.*,

et Helv. 3. p. 22. α . Ranunc. Helleb. tab. 83. β . gracile; tamen differt foliorum laciniis acutiusculis, nec acuminatis, galem tubo crassiore, fere recto. Videtur forma intermedia conjungens typum speciei cum varietate nostra β . Plantam meam valde similem lectam in valle Szalatin Comitatus Liptoviensis in Hungaria olim obtinui a Römero f. r. sub nomine *Aconiti italici* Trattin.

6. *ACONITUM cernuum*: caule superne pubescente; foliis palmato-ternatis, foliolis connatis, dilatato-flabellatis, pinnatifido-incisis, acuminatis; panicula patula; galea subhemisphærica; calcare longo, uncato; folliculis glabris; divergentibus.

A. cernuum Wulf. apud Kælle. Spic. p. 17. Bernh. Pl. sicc.* Reich. Illustr. n. 33. tab. 33., et Exc. 3. p. 739. n. 4687., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 22. α . β . Ranunc. Helleb. t. 85. f. 4687. optim.

A. callibotryon Comoll. Prodr. p. 105.* non Reich.

A. paniculatum α . β . Pollin. Ver. 2. p. 199.*

A. paniculatum α penninum Ser. in De Cand. Prodr. 1. p. 60. n. 9. Gaud. Helv. 3. p. 470. α .

Aconito VIII. Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 1148. fig.

Aconitum coma inflexa, floribus rarioribus, et foliis eleganter dissectis Segui. Ver. 2. p. 117. n. 4.

Ital. *Aconito pannocchiuto* Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 5.

Perenn. Habui ex Podemontio in sylvis ad thermas Valderias a BERTERO, in Cenisio a BONJEANBIO, et a Prof. BALBISIO, in Pizzo d'Anzasco vallis Veggezzo, et in radicibus montis Rosa prope Peccetto a Prof. DE NOTARIS, ex montibus ad Larium prope pascua montis Biandino a Prof. COMOLLIO, ex districtu Bergomensi in valle Taeggio, et Cammonica a BERGAMASCHIO, ex districtu Brixienti in sylvis di. Collio a ZANTEDESCHIO, ex Baldo in valle Artillona a POLLINIO, et in valle Frigida a MANGANOTTO, ex eodem monte a BARBIARIO, ex Tyroli Italico in sylvis alpinis di Fiemme, et Fassa a FACCHINIO, iterum in Fiemme a MENEGRINIO, a Predazzo, et ex districtu Bassanensi a Oliero ab Eq. PANOLINIO, et in sylvis della Campesana, et Vallerana a MONTINIO, ex Apennino Mutinensi prope S. Pelegrino a Prof. POCCINELLIO. Floret ab Junio in Augustum.

Valde proximum præcedentibus duobus. Gaudet caule bi-tripedali, sæpe nutante, superne pubescente, et ramoso, ramis patulis, foliis ad angulos intrantes subinde albo-maculatis, panicula plerumque multiflora, patente, nunc corymbosa; nunc pyramidata, pubescente,

pilis brevibus, patulis, rarina glabra, perigonio caruleo, vel caruleo-violaceo, aut albo, et caruleo picto, extus pilosulo, rarius glabro, galea convexa, subhemisphaerica, aut parum elevata, subinclinata, semper magis lata, quam longa, rostro plus minus inclinato, plus minus longo, sepalis lateralibus, et duobus inferioribus ciliatis, in utraque facie pilosis, sepalis inferioribus pariter ciliatis, et utrinque pilosis, nectariis stipite ascendente, calcare longo, uncato, folliculis tribus-quinque, glabris, divergentibus.

Observ. Aconita sunt venenata, aut saltem suspecta. Pro plantis summopere venenatis veteres habuerunt:

Lurida terribiles miscent aconita novercae

Ovid. Met. lib. 1. v. 147.

sed intelligebant de Aconitis in Scythia nascentibus:

Hujus in exitium miscet Medæa, quod olim

Attulerat secum Scythicis aconiton ab oris

Ovid. Met. lib. 7. v. 406. 407.

quo veneno Italiam carnisse gloriabatur Virgilius, licet non desint Italiam Aconita sua:

At rabidæ tigres absunt, et sava leonum

Semina, nec miseros fallunt aconita legentes.

Virg. Georg. lib. 2. v. 151. 152.

Ut vero Aconitorum Scythicorum vim adeo lethalem explicarent, finxerunt, eadem orta fuisse e spuma oris Cerberi inferni, qui

sparsit virides spumis albescentibus agros,

Has concesse putant, nactasque alimenta feracis,

Fecundique soli vires cepissis nocendi

Ovid. Met. lib. 7. v. 415-417.

AQUILEGIA.

Lin. Gen. p. 275. Tourn. Inst. 2. t. 242. Juss. Gen.

p. 234. Lamck. Ill. 5. tab. 488. Vent. Tabl. 3. p. 62.

Trevir. De Delph. et Aquil. p. 20 Gærtn. De fruct. 2.

p. 175. t. 118. Smith. Engl. Fl. 3. p. 32. De Cand.

428 POLYANDRIA—OLIGOGYNIA:

Syst. nat. 1. p. 833., et *Prodr.* 1. p. 50. *Endl. Gen.* p. 849. n. 4795.

Perigonium quinquesepalum, liberum, coloratum, deciduum. Nectarothecæ quinque, alternæ cum sepalis, deorsum corniculatæ, corniculis apice callosis, plerumque incurvis, sursum dilatatæ, hiantes, bilabiata, labio exteriori magno, plano, erecto, labio interiore brevissimo, oræ receptaculi affixo. Stamina plura, per phalanges disposita, perigonio breviora, interna longiora, castrata, dilatata, laminæformia, ovariis imposita, externa breviora, filamentis subulatis, antheris cordatis, bilocularibus, erectis. Ovaria quinque. Stili subulati, erecti. Stigmata simplicia. Folliculi quinque, erecti, cylindracei, stilo persistente rostrati. Semina plura, ovata, carinata, glabra, suturæ folliculorum utrinque affixa.

Habitus. Plantæ perennes. Radix fibrosa. Caulis erectus. Folia radicalia bi-triternata, foliolis ovatis, aut subrotundis, lobatis, vel incis. Flores nuntantes, corymbosi, aut solitarii. Corolla cærulea, violaceæ, atro-purpurea, rubra cum flavedine, virens, alba, sæpe abortiva.

Ord. nat. Ut in *Delphinio* p. 398.

1. *AQUILEXIA vulgaris*: foliis radicalibus biternatis, foliolis subtrifidis, laciniis latis, obtuse lobatis; corniculis longitudine sepalorum, incurvis.

A. vulgaris *Sp. pl.* p. 752. *De Cand. Franç.* 4. part. 2. p. 911., et *Syst. nat.* 1. p. 334., et *Prodr.* 1. p. 50. n. 1. *Smith. Engl. Fl.* 3. p. 33., et *Engl. bot.* v. 5. t. 297. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 261. *Fl. Dan.* t. 695. *Sv. bot.* v. 2. t. 118. *Plenck. Ic. pl. med.* 5. p. 48. t. 437. *All. Ped.* 2. p. 64. n. 1507. *Re Seg.* p. 45., et *Tor.* 1. p. 283. *Birol. Acon.* 1. p. 183. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 63. n. 1. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 255., et 390. *Comoll. Prodr.* p. 105. *Pollin. Ver.* 2. p. 201. *Nacc. Ven.* 3. p. 87.* *Suffr. Foroj.* p. 149. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 279.* *Bert. Aman. Ital.* p. 374. n. 164. *Bert. fil. It. in Apenn. Bonon.* p. 20.* *Sav. Pis.* 1. p. 16., et *Bot. Etr.* 4. p. 117. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 179. *Ten. Nap.* 1. p. 306., et *Syll.* p. 263. n. 1. *Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 228. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 33.,

- et Syll. 2. p. 29. Presl. Sic. 1. p. 24. Moris. Sard. 1. p. 58. Trevir. De Delph. et Aquil. p. 21. a. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 89. Koch. Syn. p. 21. Reich. Exc. 3. p. 747. n. 4729., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 27. Ranunc. Helleb. t. 114. f. 4729., Host. Austr. 2. p. 82. Gaud. Helv. 3. p. 474. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 381.
- A. viscosa* Gouan. Ill. p. 12. tab. 19.
- A. atrata* Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 91. Koch. Syn. p. 22.
- A. nigricans* Reich. Exc. 3. p. 748. n. 4731., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 27. Ranunc. Helleb. t. 115. f. 4731.
- A. n.* 1195. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 381.
- Aquilina* Matth. Vulgr. 1585. tom. 1. p. 665. fig. Dur. Herb. ed. Rom. fig. agg. tab. 1.
- Aquilegia Casalp.* De pl. lib. 15. cap. 38. p. 589.
- Isopyrum Dioscoridis* Column. Phytob. ed. Neap. p. 1. tab. 1.
- Aquilegia hortensis*, simplex Zannich. Opusc. posth. p. 73.
- A. sylvestris* Segui. Ver. 2. p. 119.
- Ital. *Amor nascosto. Amor perfetto. Aquilegia. Aquilina. Calze a braca. Fior capuccio. Perfetto amore* Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 23.
- Offic. *Aquilegiæ herba, flores, semina* Lin. Mat. med. p. 95. n. 272.
- Perenn.* Legi ad radices alpium Apuanarum prope *For-nole*, Genu in monte *Fasce*, in Liguria occidua in albis della *Scaggia*. Filius attulit ex Apennino Bononiensi in sylvis di *Castiglione de' Pepoli*, et in saxosis circum prata dell' *Acero*, tum ex Apennino Mutinensi a *Iola di Fanano*. Habui ex thermis Porrectanis a *PIRAZZOLIO*, ex Pedemontio in saxosis herbidiis ad thermas *Valderias* a *BERTERO*, ex *Corni di Canzo* ad *Larium* ab *Eq. DE WELDENIO*, ex saxosis prope lacum d' *Idro* a *BARRIERO*, ex districtu Veronensi in summitate montis *Pastello* a *MANGANO*, ex Tyroli Italico in *Val di Fassa* a *RAINERO*, in eadem valle, et in *Val di Fiemme* a *FACCHINIO*, ex *Summano* Vicetinarum, et ex sylvis di *Vallerana*, et *Valstagna* Bassanensium a *MONTINIO*, *Fossà Clodià alla Ca-bianca* a *Prof. NACCARIO*, ex monte Cornu Prætutiorum a *S. Nicola* ab *ORSINO*, ex *Hetruria* in Apennino Pistoriensi al *Teso* a *Prof. PETRO SAVIO*, all' *Ancisa* ab herborario nostro, in monte *Perfetto* Apennini *Mugellani*, in *Falterona*, et a *Camaldoli* a *Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTO*, in monte *Sinario* a *BARONIO*, in

Apenuiuo Aretino *al Fumaiolo* ab AMIDEO. Floret Majo, Junio, et in editis Julio, Augusto.

Radix fusiformis, aut fusiformi-ramosa, extus nigra, collo stipata fibris petiolorum sphacelatorum. Caulis teres, erectus, uni-tripedalis, parce, et remote foliosus, superne ramosus, dum macrior tantum simplex, pubescens, nunc sine viscositate, nunc insigniter viscosus, alias totus, aut inferne glaber. Rami alterni, patuli. Folia radicalia longe petiolata, biternata, foliolis subrotundis, vel cuneato-labellatis, basi integris, superne plus minus profunde sectis, media trifida, lateralibus bifidis, laciniis late, et obtuse lobatis, aut dentatis, rarius integerrimis, quandoque angustioribus, et profundioribus; cæterum foliola sunt supra late viridia, glabra, subtus glauca, glabra, vel pilosa, aut pubescentia. Folia caulina pauca, remota, brevius petiolata, supremaque minora, sessilia, segmentis integris, aut bi-tridentatis. Petioli supra canaliculati, basi panlulum dilatati. Flores paniculato-subcorymbosi, magnitudine varii, tamen grandiusculi, nutantes. Folia floralia bi-tripartita, laciniis integerrimis, acuminatis, vel indivisa. Pedunculi pubescentes, et interdum viscosi. Perigonium variat, cæruleum, cæruleo-violaceum, purpureum, atropurpureum, album, extus glabrum, aut pilosulum. Sepala ovata, aut ovato-lanceolata, acuta, vel acuminata. Nectarotheca labio externo obtusissimo, et subinde læviter emarginato, corniculis longitudine sepalorum, obtusis, incurvis. Stamina interiora nectarothecas plus minus superantia. Lamina interna castrata ovaria obvallantes, lanceolata, obtusa, et interdum retusa cum, vel sine acuminulo in medio, margine nunc magis, nunc minus undulata, ovaria sine stilo superantes. Ovaria pubescentia. Stili glabri, aut inferne pilosi, apice recurvi. Folliculi longi, erecti, approximati, pubescentes, rostrati, transverse venosi, venis anastomosantibus. Semina oblonga, carinata, glabra, rufescentia.

Characteres, quibus Botanici Germani distinxerunt *Aquilegiam atratam*, ex observationibus meis non sunt constantes; hinc tota differentia ejus stat in colore floris, qui nunquam facit speciem. Etiam *Aquilegia Sternbergii* Reich. Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. Ranunc. Helleb. t. 118. fig. 4733. est mihi suspecta, et forte pertinet ad *Aquilegiam vulgarem* luxuriantem magnitudine floris. Ita mihi videtur ab exemplari ejus ex monte *Nanas*, quod obtinui a Tommasinio.

Usus. Planta adhibita in exanthematibus, et in ictero; nunc desneta. Præstat in viridariis ornamenti causa ob flores coloris diversi, et sæpe monstrosos.

2. *AQUILEGIA alpina*: foliis biternatis, foliolis tripartitis, segmentis angustis, angustequè laciniatis; corniculis perigonio amplissimo brevioribus.

A. alpina *Sp. pl.* p. 752. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 912. *æ.*, et *Syst. nat.* 1. p. 336. *æ.*, et *Prodr.* 1. p. 50. n. 5. *æ. Deless. Ic. select.* 1. p. 13. t. 48. *All. Ped.* 2. p. 64. n. 1508. t. 66. *Re Seg.* p. 45. *Birol. Acon.* 1. p. 184. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 54. n. 3. *Bert. fl. It. in Apenn. Bonon.* p. 44.* *Trev. De Delph. et Aquil.* p. 24. *Koch. Syn.* p. 22. *Reich. Exc.* 3. p. 749. n. 4734., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 27. *Ranunc. Helleb.* t. 119. f. 4734. *Gaud. Helv.* 3. p. 476. *A. n.* 1196. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 89.

A. montana magno flore *C. B. Prodr.* p. 75. n. 1.

Ital. Aquilegia maggiore.

Perenn. Filius attulit ex crista Cornu scalarum, et ex Cimone di Caldaia in Apennino Bononiensi, ubi copiosa. Habui ex alpibus Valderiis in Pedemontio a BERTERO, et ex Cenisio a BONJEANNIO, ex Apennino Lucensi prope Tereglio, ex Apennino Pistoriensi a Pian silvano, et a Mandromini, et ex Apennino Bononiensi in Cornu scalarum al Cavone a Prof. PETRO SAVIO. Floret Julio, Augusto.

Differt a præcedente caule simpliciore, a palmo ad sesquipedem longo, foliis radicalibus primis ternatis, reliquis biternatis, omnium foliolis minoribus, cuneato-flabellatis, tripartitis, segmentis angustioribus, anguste trifidis, vel bifidis, laciniis lato-linearibus, apice e rotundo acutiusculis, caulinis numerosioribus, licet paucis, anguste laciniatis, laciniis lanceolato-linearibus, floribus solitariis, vel duobus-tribus, perigonio amplo, pulchre cæruleo, vix pilosulo, sepalis late ovatis, acutis, corniculis perigonio multo brevioribus, apice plerumque exquisite incurvatis, nectarothecis labio externo grandi, ovato, apice rotundato, vel fere truncato, obtusissimo, et etiam emarginato, laminis ovaria obvallantibus acuminatis, subinde tamen obtusis cum mucronulo in medio, margine laxè undulatis, antheris oblongis, mucronulatis, stilib inferne, et folliculis dense pubescenti-velutinis.

3. *AQUILEGIA pyrenaica*: foliis radicalibus biternatis, foliolis subtrifidis, segmentis obtusè lobatis; caule subnudo, paucifloro; corniculis perigonio brevioribus.

A. pyrenaica *De Cand. Syst. nat.* 1. p. 337., et *Prodr.* 1. p. 50. n. 6., et *Franç.* 5. p. 640. *Morett. Dec.* 4. p. 12. *Comoll. Prodr.* p. 105. * *Pollin. Ver.* 2. p. 202. *Bert. Aman. Ital.* p. 374. n. 165. *Reich. Exc.* 3. p. 749. n. 473a., et *Id. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 27. *Ranunc. Helleb.* t. 117. f. 473a. *Gaud. Helv.* 3. p. 477.

A. alpina *Vitm. Sagg.* p. 46., et 49.

A. viscosa *Ten. Nap.* 1. p. 305., et *Syll.* p. 263. n. 2. non *Gouan. Trevir. De Delph. et Aquil.* p. 23. tab. 2. *Host. Austr.* 2. p. 83. *Suffr. Foroj.* p. 149.

β *sepalis lanceolatis, acuminatis; corniculis brevissimis. Aquilegia viscosa* *Reich. Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 27. *Ranunc. Helleb.* t. 116. fig. 4731. b. non *Gouan. Ill.*

Ital. Aquilegia mezzana.

Perenn. Legi in alpinis Apuanis *Sagro, Tambura*, ubi frequens. Filius attulit ex *Cavallo*, et *Pisanino* earundem alpinum. Habui ex alpe *Tambura*, et *Procinto* a Prof. PETRO SAVIO, et ex alpinis di *Serravezza* a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, ex *Pedemontio al Col di Tenda* ab Eq. Prof. MORISIO, in monte S. Bernardi ab Eq. DE WELDENIO, ex montibus ad *Larium in Valassina, Corni di Canzo, Codeno* a Prof. COMOLLIO, in monte *Bar* prope *Leco* a RAIMERO, in *Valmeria* supra *Mondello* ab Eq. CESATE, ex *Baldo* a Prof. JANIO, ex *Portole* Vicetinarum a MAJERO, ex eodem loco, et ex *Vette di Feltre* a MONTINIO, ex *Vettore a Buco d'Uro* ab ONSINO. Varietatem β accepi ex Tyroli Italico in vallocula inter alpem di *Soial*, et *Schleren* a FACCHINIO, et ab Eq. PAROLINIO, ex districtu Bassanensi in *Valstagna* a MONTINIO, et a *Oliero* ab Eq. PAROLINIO, ex Præfatiis alla *Maiella* ab Eq. GUSSONIO. Floret Julio, Augusto.

Proxima præcedenti. Caulis a palmo ad pedem longus, nunc simplex, uniflorus, nunc superne parce ramosus, ramis remotis, tunc bi-quadriflorus, pubescens, vel inferne glaber, subnudus, subinde viscidus. Folia radicalia quam in præcedente minora, foliolis apice latilobis, obtusis; caulina pauca, unum-duo, et interdum ramentacea, integra, lanceolata, aut linearia, vel trifida, segmentis lanceolatis, integerrimis; peduncularia linearia. Flos pulchre cæruleus, magnitudinis variæ, et subinde potius grandis, nunquam tamen ut in *Aquilegia alpina* L. Perigonium pilosulum. Sepala ovato-lanceolata, acuta, aut acuminata. Cornicula sepalis breviora, modo rectiuscula, modo incurvata. Nectarothecæ

labium exterius rotundatum, obtusum, vel acutiusculum, corniculo suo subæquale, staminibus longius. Laminae obvallantes ovaria vix undulatae. Antheræ oblongæ. Stili inferne hirsuti. Folliculi toti hirsuti.

Varietas β vix adnotari digna. Distinguitur sepalis angustioribus, lanceolatis, et corniculis brevissimis, interdum fere nullis. Habeo præ oculis individua sepalis gradatim latioribus, et corniculis longioribus, quæ ostendunt transitum ab hac varietate in speciem.

NIGELLA.

Lin. Gen. p. 276. Tourn. Inst. 2. tab. 134. Juss. Gen. p. 233. Lamck. Ill. 5. t. 488. Vent. Tabl. 3. p. 61. Gærtn. De fruct. et sem. 2. p. 173. t. 118. De Cand. Syst. nat. 1. p. 326., et Prodr. 1. p. 48. Endl. Gen. p. 849. n. 4794.

Perigonium quinquesepalum, liberum, patens, coloratum, deciduum. Nectarothecæ plures, sitæ circa stamina, perigonio, staminibusque breviores, bilabiatae, labio superiore indiviso, inferiore bifido, ungue foveolato, foveola nectarifera. Stamina plura, filamentis subulatis, ordinis simplici, vel multiplici, tuncque per phalanges basi connatis, antheris oblongis, bilocularibus, erectis, sæpe a connectivo ultra apicem loculorum producto mucronatis. Stili tres-quinque-decem, crassiusculi, plus minus elongati, angulati. Stigmata longitudinaliter adnata. Capsula quinque-decemlocularis, apice introrsum tri-quinque-decemvalvis, vel globosa loculis totis connatis, vel turbinata loculis superne liberis, polyspermia, a stilibus persistentibus rostrata. Semina suturæ internæ loculorum adnata, plana, aut angulata, glabra, aut scabra, vel rugosa.

Habitus. Plantæ herbacæ. Caulis erectus, vel ascendens, alterne ramosus. Folia pinnata, vel bipinnata, pinnulis multifido-capillaceis, vel multifido-linearibus. Flores solitarii, terminales, involucrati, aut nudi. Sepala pallide cærulea, alba, vel ochroleuca. Capsula sæpe punctis callosis

Flor. Ital. T. V.

scabra, in paucis speciebus gaudet loculis totis connatis, in sola *Nigella damascena* loculis intus in duas concamerationes divisus, quarum exterior vacua, interior seminifera. Semina saporis acris, sæpe aromatica. Plantæ ludunt floribus plenis, sive sepalis multiplicatis, multiplicique serie dispositis.

Ord. nat. Multisiliquæ γ *Lin. Ord. nat. n. XXVI., et Præl. p. 376.* Ranunculaceæ *Juss. Gen. p. 231. Smith. Gramm. p. 136. Vent. Tabl. 3. p. 52. De Cand. Syst. nat. 1. p. 127. Rich. Famill. in Él. éd. 5. p. 155. Bartl. Ord. nat. p. 252. Schultz. Nat. syst. p. 504.*

* *Floribus involucreatis.*

1. *NIGELLA damascena*: involucri foliolis subbipinnato-capillaceis; capsula inflata.

N. damascena *Sp. pl. p. 753. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 373.; et Fl. Græc. 6. p. 7. t. 509. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 910., et Syst. nat. 1. p. 331., et Prodr. 1. p. 49. n. 10. All. Ped. 2. p. 65. n. 1510. Coll. Herb. Ped. 1. p. 51. n. 1. Pollin. Ver. 2. p. 204. Sav. Pis. 2. p. 18., et Mat. med. p. 28. t. 16., et Bot. Etr. 4. p. 117. Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 179. Ten. Nap. 4. p. 328., et Syll. p. 263. n. 1. Ab Ucr. Hort. Pan. p. 228. Guss. Fl. Sic. prodr. 2. p. 34., et Sup. 2. p. 182., et Syn. 2. p. 30. Præsl. Sic. 1. p. 23. Zeraph. Fl. Melit. thes. 2. p. 56. Moris. Sord. 1. p. 56. Desf. Atl. 1. p. 428. Lamck. Ill. 5. t. 488. f. 2. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 96. Koch. Syn. p. 21. Reich. Exc. 3. p. 750. n. 4737., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 28. Ranunc. Helleb. t. 120. f. 4737. Host. Austr. 2. p. 84.*

Melanthio selvatico *Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 84t. fig.*

Nigella Casalp. De pl. lib. 15. cap. 11. p. 572.

N. angustifolia, flore maiore, simplici cæruleo *Cup. Hort. Cath. p. 152,*

N. cærulea *Segui. Ver. Sup. p. 300.*

N. hortensis altera *Fuchs. Hist. pl. p. 504. fig.*

Ital. Anigella. Damigella. Erba bozzolina. Fanciullacce. Geppi. Isopiro. Melanzio. Melanzio salvatico. Nigella. Scapigliate. Scarmigliate. Scompigli. Streghe Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 153.

Ann. Legi Sarzanæ in arvis, et collibus, Bononiæ a Roncorio. Habui ex Liguria occidua in collibus di Pegli a

VINCENTIO, ex districtu Tergestino inter *Barcola*, et *Contovello* a TOMMASINIO, ex Enganeis ad sepes prope *Arquà* a MAJERO, ex districtu Urbinati *al Furlò* a Prof. OCTAVIANO, Macerata extra portam *del Mercato* a Prof. UTILI, et in ripis *di Sanginesio* ad sepes ab Eq. NARDUCCIO, ex Piceno *al Campo di Marte* prope *Montefortino* a MAZZIALETTI, et in *Monte de' fiori* ab ONSINO, ex Hetruria in *Mugello*, et in agro Florentino a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTI, iterum circa Florentiam ab Eq. RICCASOLO, ex *Canino* in agro Viterbiensi a Rev. Fratre MAURITIO DE BRIKIA, Ostia ad sepes a BAUNERO, Terracinà a FIORINIA-MAZZANTIA, ex arvis Panormitanis a Prof. PARLATORE, Capreis a Prof. GIRALDIO, ex Ilva a Prof. GIULIO. Floret ab Junio in æstatem. Radix fusiformis, potius gracilis, flexuosa, lateraliter ramulosa. Caulis angulatus, striatus, erectus, jam ab imo alterne ramosus, spithamalis-pedalis, virens. Folia radicalia cæspitosa, caulina alterna, utraque pinnata, foliolis multifido-linearibus, ima laciniis latiusculis, brevioribus, acutis, reliqua laciniis lineari-capillaceis, acuminatis, supra canaliculatis. Petioli supra canaliculati, basi quidquam dilatati, ibique margine anguste membranacei. Flores solitarii, terminales cauli, ramisque. Involucrum pentaphyllum, sub flore immediate situm, eoque multo longius, foliolis subbipinnato-capillaceis, costa communi inferiore supra albente. Sepala quinque, ovato-lanceolata, acuminata, basi angustata, longiuscule unguiculata, pallide cærulea, et subinde cæruleo-albentia. Nectárothecæ plures, saturate cæruleæ. Stamina virentia, patentia, filamentis capillaribus, antheris oblongis, erectis, muticis. Ovarium turgens, ovoidæum. Stili tres-quinque, crassiusculi, recurvato-intortiti, virides, post nuptias elongati, extensi, patentés, subflexuosi. Capsula ovoidea, grandis, inflata, obtusa, chartacea, e viridi purpurascens, tri-quinquelocularis, loculis totis connatis, intus in duas concamerationes divisis, exteriore vacua, interiori occupata a sacculo seminifero membranaceo, prætenui, apice interiora versus dehiscens valvis tribus-quinque. Semina in quovis sacculo longitudinaliter biseriata, inter se alterna, contigua, placenta axili ad suturam internam loculorum affixa, subturbinata, primo viridia, matura nigerrima, transverse rugosa. Tota herba glabra. Quandoque etiam in arvis vidi ludentem sepalis multiplicatis, pluriseriatis.

** *Floribus nudis.*

2. *NIGELLA arvensis*: ramis caulinis erecto-patulis; sepalis subcordato-ovatis, mucronatis, longe unguiculato-stipitatis; stilibus subquinis; capsulis turbinatis, loculis superne liberis, rostris intortis, patentibus, recurvisque.
- N. arvensis* Sp. pl. p. 753. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 374., et Fl. Græc. 6. p. 9. t. 512. Bull. Pl. ven. p. 132. t. 126. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 910., et Syst. nat. 1. p. 329., et Prodr. 1. p. 49. n. 7. All. Ped. 2. p. 65. n. 1510. Birol. Acon. 1. p. 184. Coll. Herb. Ped. 1. p. 52. n. 4. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 256., et 390. Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec. 2. tom. 10. p. 290.* Pollin. Ver. 2. p. 203. Nacc. Ven. 3. p. 88. Suffr. Foroj. p. 149. Fior. in Giorn. de' Lett. Pisa ann. 1823. tom. 17. p. 122.* Ten. Nap. 4. p. 328. A. B., et Syll. p. 263. n. 2. A. B. Moris. Stirp. Sard. el. fasc. 1. pag. 1.* Desf. Atl. 1. p. 429. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 97. Koch. Syn. p. 21. Reich. Exc. 3. p. 750. n. 4735., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 27. Ranunc. Helleb. t. 120. fig. 4735. Host. Austr. 2. p. 84. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 382. Gaud. Helv. 3. p. 478.
- N. arvensis* β glaucescens Guss. Pl. rar. p. 216.* non Fl. Sic. prodr.
- N. Catenæ* Guss. et Ten. in Ten. App. 5. p. 14.*
- N. divaricata* Moris. Sard. 1. p. 54.* excl. syn. De Cand., Deless., et Guss.
- N. n. 1194. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 88.
- Un altro *Melanthio salvatico* Matt. Valgr. 1585. tom. 2. p. 842. fig.
- Melanthium sylvestre* Fuchs. Hist. pl. p. 505. fig. Dod. Pempt. p. 303. fig.
- Ital. *Nigella nuda*. *Nigella salvatica*.
- Ann. Habui ex agro Ticinensi a Prof. SASSIO, Mantuâ a MIGLIARETTO a BARBIERIO, ex litore Terracinensi a FIORINIA-MAZZANTI, ex Vulture Apulo, ex Calabria ad Rhegium Julium, et a Mantu ad mare Jonium ab Eq. GUSSONIO, ex arenosis maritimis Sardinie ab Eq. Prof. MORISIO. Floret a Majo in æstatem.
- Radix gracilis, fusiformis, flexuosa, subinde lateraliter parce ramulosa. Caulis erectus, angulatus, striatus, alterne ramosus, ramis erecto-patulis, seu divergentibus, nunc saber, et magis inferne, nunc inferne scaber, superne glaber, nunc totus glaber, palmaris-pedalis.

Folia alterna, pinnata, vel bipinnata, pinnulis multifido-capillaceis, aut laciniis paulo latioribus, linearibus, vel lanceolato-linearibus, item modo tenuibus, modo crassiusculis, et carnosulis, margine, et carina scabris, inferiora longius petiolata, acutiuscula, superiora breviora, minusque decomposita, acutiora. Flores solitarii, terminales cauli, ramisque, nudi, pedunculati, pedunculo crassiusculo, angulato, scabrido, vel glabro, a duabus-tribus lineis ad sesquipollicem longo. Perigonium pallide carulescens, et fere albidum, ex-
tus venis viridibus, ramoso-reticulatis. Sepala quinque, subcordato-ovata, breviter mucronata, mucronae viridi, ungue angusto longe stipitata, margine minutissime plus minus denticulata. Nectarothecæ labio inferiore piloso, aut glabro, laciniis apiculatis prolongatione angusta, apice callo globoso terminata. Antheræ virides, oblongæ, mucronatæ. Stili tres-quinque-septem, scabri, vel glabri, contorti, aut distorti, in fructu recurvati, vel patuli. Capsula turbinata, tri-quinque-septemlocularis, loculis superne liberis, patulis, rostratis, dorso tricarinata, glabra, vel in lateribus loculorum, et interdum etiam in carinis punctis callosis scabra. Semina triquetra, nigra, scabra. Tota herba e viridi glaucescens, in maritimis magis glauca. Ludit hæc quoque sepalis multiplicatis.

Cave, ne decipiaris a glabritie, vel scabritie caulis, capsularum, et stilorum, quæ certe ludibunda est, ut vidi tam in plantis longe a mari ortis, quam in illis ad mare, de quo lusu jam monuerunt Hostius in Fl. Austr. l. c., et Gaudinius in Fl. Helv. l. c.; at non cognovit De Candolleas, qui in Syst. nat. l. c. glabritiem harum partium tantum admisit, et ita deduxit alios in errorem. Color herbæ glaucus nunc levior, nunc intensior, et laciniæ foliorum tenuiores, vel crassiores sunt res tam parvi momenti, ut nullimode ex iis species hæc in duas dirimi possit.

3. *NIGELLA divaricata*: ramis caulinis patentissimis; sepalis ovato-oblongis, obtusiusculis, subsessilibus; stilibus subquinis, erectiusculis; capsulis turbinatis, loculis superne liberis.

N. divaricata De Cand. Syst. nat. 1. p. 329., et Prodr. 1. p. 49. n. 6. Deless. Ic. select. 1. p. 12. t. 46. opt. Guss. Fl. Sic. Syn. 2. p. 30*

N. arvensis Ab Uer. Hort. Pan. p. 228. Presl. Sic. 1. p. 23.

N. arvensis b glaucescens Guss. Fl. Sic. prodr. 2. p. 34.* et Sup. 2. p. 182.* non Pl. rar.

N. arvensis cornuta *Cup. Hort. Cath. p. 152.*

N. alba simplici flore *Alp. Exot. p. 261. fig. p. 260.*

Ital. Nigella cornuta.

Ann. Habui ex Sicilia in argillosis Agrigentinis ai Macalebbi, et in arenosis maritimis di Sciacca ab Eq. Gussoneo. Floret ab Aprili in Junium.

Radix fusiformi-ramosa, gracilis. Canlis adscendens, angulatus, scaber, vel glaber, palmaris-spathamalis, jam a basi alterne ramosus, ramis patentissimis fere ad angulum rectum. Folia supra magis viridia, subtus glauca, radicalia, et caulina ima longe petiolata, instructa pinnis primariis duabus-tribus cum impari, petiolulatis, superiora sessilia, aut subsessilia, subternata; omnium pinnularum laciniae breves, carnosulae, anguste lanceolato-lineares, acute, margine scabridae. Flores solitarii, terminales canli, ramisque, nudi, suffulti pedunculo-longitudinis variae. Sepala quinque, late ovato-oblonga, obtusiuscula, aut vix acuta, sessilia, aut subsessilia, licet basi paululum angustata, margine minutissime denticulato-erosula, et subundulata, albido-caerulescentia, venis dorsalibus virentibus, ramoso-reticulatis. Nectarothecae albae, labio inferiore hirsuto, aut piloso, laciniiis apiculatis prolongatione angusta, apice callo globoso terminata, labio superiore tenui, subulato. Antherae elongatae, mucronatae. Capsula turbinata, quinque-oculocularis, loculis superne liberis, dorso tricarinatis, glabris, lateribus saepe scabris, apice rostratis, rostris erectis, vel subdivergentibus, contortis, scabris. Semina triquetra, nigra, scabra, confricata vix odora.

Nullum dubium est, hanc a praecedente differre, licet De Candolleus l. c. dubitet. Sepala grandiora, formae diversae, obtusiuscula, subsessilia jam e longinquo id demonstrant praeter reliqua.

REAUMURIA.

Lin. Gen. p. 276. Juss. Gen. p. 316. Lamck. Ill. 5. t. 489. Vent. Tabl. 3. p. 267. De Cand. Prodr. 3. p. 456. Ehrenb. in Linnæa 2. p. 273. Endlich. Gen. p. 1038. n. 5480. Guss. Fl. Sic. Syn. 2. p. 25.

Calyx perianthium liberum, persistens, quinquepartitum, laciniiis oblongis. Corollae petala quinque,

ovata, sessilia, alternantia cum laciniis calycinis, basi squamis duabus marginalibus fimbriato-ciliatis appendiculata, persistentia. Stamina plura; per phalanges irregulares connata, filamentis filiformibus, antheris oblongis, bilocularibus, incumbentibus, longitudinaliter dehiscentibus. Ovarium sessile. Stili quinque, filiformes, elongati, erecti. Stigmata simplicia. Capsula ex ovoideo pentagona, quinquelocularis, quinquevalvis, valvis usque ad basim dehiscentibus, dissepimentis tenuissimis, facile diffiuis. Semina in quovis loculo duo, altero subinde abortiente, erecta, oblonga, compresso-triquetra, undique sursum barbata setis erectis.

Habitus. Suffrutices cespitosi. Caulis alterne ramosus, et ramulosus. Folia carnosula, alterna, parva, glauca, undique pertusa poris rorifluis, in ramulis creberrima, minora. Flores solitarii in apice ramulorum, caulisque, involucrati foliis dense subimbricatis, squarrosis. Corolla alba, vel rosea.

Ord. nat. Succulentæ *Lin. Ord. nat. n. XIII., et Præl. p. 315.* Ficoideæ *Juss. Gen. p. 315., Smith. Gramm. p. 165. Vent. Tabl. 3. p. 266. Rich. Famill. in Él. de bot. éd. 5. p. 199.* Ficoideæ spurie *De Cand. Prodr. 3. p. 456.* Tamariscineæ *Bartl. Ord. nat. p. 286. Schültz Nat. syst. p. 447.* Reaumuriaceæ *Lindl. Introd. ed. 2. p. 91. Endl. Gen. p. 1037.*

I. REAUMURIA vermiculata: foliis semiterotibus; barba seminum setosa.

R. vermiculata *Sp. pl. p. 754. De Cand. Prodr. 3. p. 456. n. 1. Bert. Lucubr. p. 25. n. 144. Guss. Fl. Sic. prodr. 2. p. 35., et Syn. 2. p. 25. Desf. Atl. 1. p. 431. Lamçk. Ill. 5. t. 489. f. 1.*

Sedum Siculum, maritimum, vermiculatum, flore saxifragæ albæ semine villosa *Bocc. Sic. p. 6.*

S. mariti. villosa semine *Bocc. Sic. p. 7. t. 4. f. C. G. Bonan. Panph. t. 119.*

S. maritimum (adde fruticans) vermiculatum, flore saxifragæ albæ, semine villosa *Cup. Hort. Cath. p. 200.*

Kali vermiculatum albo et amplo Sedi Rosci flo. *Barrel. Ic. 838.*

Sedum minimum arborescens vermiculatum *Lob. Ic.* 380.

Vermicularis frutex minor *Ger. em. p.* 523. fig.

Ital. *Vermicolare rugiadosa.*

Suffr. Lecta in Sicilia ad Agrigentum ab Eq. Gussoneo.

Floret Julio, Augusto.

Caulis cæspitosus, adscendens, superne ramosus, et valde ramulosus, ramulis brevibus, dense foliosis, pluribus abortivis, glaber, aut apice vix puberulus, albens. Folia carnosula, linearia, semiteretia, obtusa, alterna, sessilia, undique pertusa poris rorifluis, glauca, in ramulis confertissima, breviora. Flores solitarii, terminales cauli, ramulisque, grandiusculi, involuerati foliis subimbricatis, acutis, squarrosis, vel patulis. Laciniae calycinæ oblongo-lanceolatae, acutæ, aut acuminatæ, glaucæ, poris rorifluis pertusæ. Corolla alba, calyce quidquam longior, petalis ellipticis. Capsula calyce longior. Barba seminum longitudine capsulæ, facta setis rufescentibus. Reliqua generis.

STRATIOTES.

Lin. Gen. p. 277. *Juss. Gen. p.* 67. *Lamck. Ill.* 5.

t. 489. *Vent. Tabl.* 2. *p.* 213. *Cærtn. De fruct.* 1.

p. 48. *t.* 14. *Smith. Engl. Fl.* 3. *p.* 33. *Endl. Gen.*

p. 162. *n.* 1211.

Spatha di-triphylla, phyllis conduplicatis, carinatis. Calyx perianthium inferne tubulosum, tubo adhærente, longo, limbo tripartito, laciniis ovatis, deciduis. Corollæ petala tria, alternantia cum laciniis calycinis, queis longiora, obovata, vel linearia, patentiuscula. Stamina etiam viginti-quatuor, orta ex fauce tubi perigonialis, corolla breviora, sæpe vel omnia, vel plura degenerantia (neotaria apud nonnullos), filamentis brevissimis, antheris subulatis, vel linearibus, erectis, filamento longioribus. Ovarium adhærens, obtusangulum. Stylus brevis, cylindraceus, connatus cum tubo perigonii. Stigmata sex, bifida, longitudine staminum. Bacca adhærens, oblongo-hexagona, utrinque angustata, sexocularis, demum cernua. Semina in quovis loculo pauca, obovata, biseriata, prope angulos externos loculorum affixa, nidulantia intra pulpam pellucidam, sæpe abortiva.

Habitus. Plantæ aquaticæ, in inflorescentia nantes, peractis nuptiis immersæ. Rhizoma e collo stolonifer, stolonibus apice proliferis. Folia omnia radicalia, rosulata, lanceolata, vel linearia, striata, ciliato-spinulosa, aut inermia. Scapus uniflorus, e centro rosulæ foliorum. Corolla alba, vel albo-rubens. Plantæ ex abortu omnium staminum nonnullis botanicis dioicæ visæ sunt, vel paucistamineæ ex abortu partiali eorundem staminum; sed quæ plantæ facile multiplicantur per gemmas, ludunt in genitalibus, neque hisce lusibus credenda classis.

Ord. nat. Palmæ β Linn. *Ord. nat. n. I. et Præl.* p. 32. *Hydrocharides* Juss. *Gen.* p. 67. *Smith. Gramm.* p. 74. *Hydrocharideæ* Vent. *Tabl. 2.* p. 212. *Rich. Famill. in Él. éd. 5.* p. 107. *Bartl. Ord. nat.* p. 74. *Stratiotæ* Schultz. *Nat. syst.* p. 274.

1. *STRATIOTES aloides*: foliis lanceolatis, ciliato-spinulosis; spatha apice nuda.

S. aloides *Sp. pl.* p. 754. *Smith. Engl. Fl.* 3. p. 34., et *Engl. bot. v. 6. t. 379.* *Hook. Brit. Fl. ed. 2.* p. 261. *Fl. Dan. t. 337.* *Morett. Bot. Ital. p. 34.* *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec. 2. tom. 10. p. 428.** *De Cand. Franç. 3. p. 266.* *Koch. Syn. p. 668.* *Reich. Exc. 1. p. 13. n. 53., et in Add. et corrig. Host. Austr. 2. p. 91.*

Pianta con foglie simili all' Aloe, ma molto minori, e più sottili ec. *Ang. Sempl. p. 280.*

Sedum aquatile sive stratiotes potamos *Dod. Pempt. p. 588. fig.*

Militaris Aizoides *Lob. Ic. p. 375. Ger. em. p. 825. fig.*

Stratiotes aquaticus *Lugd. hist. 1. p. 1061. fig.*

Aloe sive Aizoon palustre *J. Bauh. Hist. pl. 3. lib. 38. p. 787. fig.*

Ital. Erba coltella. Scargia. Stiletti d'acqua *Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 222.*

Perenn. Habui ex lacu superiore Mantus a Pradella, et a Porta Mulina a BARBIERIO, ex paludibus Ferrariensibus a Prof. CAMPANA. In utroque loco copiosissima. Floret Julio.

Radix fibrosa, longa, affixa rhizomati brevissimo, crasso, stolonifero, stolonibus apice proliferis. Folia omnia radicalia, rosulata, lanceolata, acuminata, canaliculata,

442 POLYANDRIA—OLIGOGYNIA:

striata, basi se se amplexantia, margine, et subinde etiam in carina inferiore ciliato-spinulosa, late, aut saturate viridia, intus ample cellulosa, spithamalia-resquipedalia. Scapus radicalis, e centro rosulæ foliorum, anceps, erectus, uniflorus, basi angustior, et albens, reliqua parte virens, sæpe apice utrinque in margine ciliato-spinulosus. Flos terminalis, grandiusculus. Spatha plerumque bivalvis, rarius trivalvis, valvis nunc æqualibus, nunc inæqualibus, acutis, vel acuminatis, apice nudis, margine, et sæpe etiam carina inferiore ciliato-spinulosis. Calyx laciniis ovatis. Petala alba, obovata. Reliqua generia.

Planta fructifera demergitur, et e rhizomate emittit stolonem simplices, longos, apice gemmam novæ plantæ ferentes, quæ, dum evolvitur, similiter radicat in limbo, deinde æstate ad superficiem aquæ attollitur, enatat, floret, et post inflorescentiam submergitur, ut fructum perficiat, et ut stolonem novum apice soboliferum ipsa quoque ferat. Sic renovatur, et perennat species, pereunte quotannis planta, quæ fructificavit. Sæpe vero fructus abortit, et gemmæ stolonum tantum sebolem instaurant.

ORDO III. POLYGYNIA.

ANEMONE.

Lin. Gen. p. 279. Tourn. Inst. 2. t. 147. Juss. Gen. p. 232. Lamck. Ill. 5. t. 496. Vent. Tabl. 3. p. 56. Gærtn. De fruct. 1. p. 357. t. 74. De Cand. Syst. nat. 1. p. 188., et Prodr. 1. p. 16. Smith. Engl. Fl. 3. p. 35. Endl. Gen. p. 845. n. 4773.

Pulsatilla Tourn. Inst. 2. t. 148.

Anemonoides Dillen. App. in Nov. pl. gen. p. 107. tab. 4.

Hepatica Dillen. l. c. p. 108. tab. 5. fig. 1. A. B. C. De Cand. Syst. nat. 1. p. 215., et Prodr. 1. p. 22. Endl. Gen. p. 846. n. 4774.

Flores involucrati, involucri triphylo, approximato, vel remoto, persistente. Perigonium coloratum, deciduum, hexasepalum, vel polysepalum,

et plurisepalum. Stamina multa, perigonio breviora, filamentis filiformibus; antheris subrotundis, vel oblongis, bilocularibus, apici filamentorum affixis. Receptaculum convexum, nudum, vel villosum, aut lanatum. Ovaria plura, sessilia, uniovulata, ovulo pendulo. Stili persistentes, in aliis perpetuo brevissimi, in aliis post nuptias elongati, et plumosi. Stigmata simplicia, obtusiuscula. Nuculæ parvæ, monospermæ, in capitulum collectæ, villosæ, aut glabræ, aliæ ecaudatæ, aliæ a stilo elongato plumoso caudatæ, caudis divergentibus.

Habitus. Plantæ perennes. Rhizoma carnosum, fibrosum. Scapi radicales, plerumque uniflori, pauci umbelliferi, præditi involucrio e foliolis integris, vel serratis, aut decompositis. Folia omnia radicalia, simplicia, composita, aut decomposita, synanthia, vel hysteranthia. Perigonium cæruleum, violaceum, rubrum, album, flavum, patens, aut campaniforme, sepalis in æstivatione imbricatis.

Ord. nat. Multisiliquæ *ð* *Lin. Ord. nat. n. XXVI.*, et *Prel. p. 376.* Ranunculaceæ *Juss. Gen. p. 231. Smith. Gramm. p. 136. Vent. Tabl. 3. p. 52. De Cand. Syst. nat. 1. p. 127., et Prodr. 1. p. 2. Rich. Famill. in Él. éd. 5. p. 155. Bartl. Ord. nat. p. 252. Schultz. Nat. syst. p. 504.*

* *Involucrio approximato; nuculis ecaudatis.*
Hepaticæ.

1. *ANEMONE Hepatica*: foliis cordatis, trigono-trilobis, lobis obtusis, integerrimis; involucrio triphylo, simplici.
- A. Hepatica Sp. pl. p. 758. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 374., et Fl. Græc. 6. p. 10. t. 513. Fl. Dan. t. 612. Sv. bot. v. 2. t. 141. Plenck. Ic. pl. med. 5. p. 57. t. 45a. All. Ped. 2. p. 170. n. 1920. Balb. Taur. p. 87. Re Seg. p. 45. Birol. Acon. 1. p. 184. Coll. Herb. Ped. 1. p. 23. Comoll. Prodr. p. 106. Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec. 2. tom. 10. p. 290.* Pollin. Ver. 2. p. 217. Suffr. Foroj. p. 150. Bert. Mant. Fl. alp. Apuan. p. 27. n. 56. Sav. Bot. Etr. 1. p. 156. Ten. Nap. 4. p. 331., et Syll. p. 264. n. 7. Pritz. Anem. revis. p. 130. & Sturm. Deuts. Fl. 1.*

abth. 7. heft. Röhl. cum Koch. *Deuts. Fl.* 4. p. 99. Koch. *Syn.* p. 6. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 382. *Gaud. Helv.* 3. p. 480.

Hepatica triloba De Cand. *Franç.* 4. par. 2. p. 885., et *Syst. nat.* 1. p. 216., et *Prodr.* 1. p. 22. n. 1. *Re Tor.* 1. p. 283. *Nocc. et Balb. Ticin.* 1. p. 256., et 390. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 283. *Sang. Cent.* p. 78. *Presl. Sic.* 1. p. 7. excl. *Engl. bot.*

H. nobilis Reich. *Exe.* 3. p. 730. n. 464a., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 17. *Ranunc. Anem.* t. 47. f. 464a. *Host. Austr.* 2. p. 92.

Anemone n. 1156. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 65.

Trinitas Matth. *Valgr.* 1585. tom. 2. p. 886. fig. *Casalp. De pl. lib.* 14. cap. 8. p. 547.

T. herba Dur. *Herb. ed. Rom.* p. 465. fig.

Trinità Ang. *Sempl.* p. 242. *Calz. Viag. di Mont. Bald.* p. 10.

Hepatica nobile del Dodoneo *Pon. Mont. Bald.* p. 211.

Trifoglio aureo del Dodoneo con fior porporeo *Pon. l. c.* p. 240.

Trifolium aureum Ambr. *Phytol.* 1. p. 543. *Dod. Pempt.* p. 579. fig.

Ranunculus tridentatus, vernus, flore simplici, cæruleo, et albo *Zannich. Opusc. posth.* p. 51.

Hepatica trifolia cæruleo, albo, rubro flore *Segui. Ver.* 1. p. 511. n. 1. 2. 3.

Ital. Erba Trinità. Erba Trinitas. Ranuncolo tridentato.

Trifoglio epatico. Trifoglione di fiore pavonazzo. Trinitas Targ. Tozz. *Diz. bot.* 2. p. 19.

Offic. Hepatica nobilis herba, flores Linn. *Mat. med.* p. 97. n. 277.

Perenn. Copiosa in sylvis omnium montium Italiae. Legi Sarzanæ in Montedarme, in alpibus Apuanis ad scaturigines Frigidæ, Bononiæ in collibus di Castiglione, et supra la Bastia di S. Rufillo, in subapennino Bononiensi in montibus inter Loiano, et Pianoro. Habui ex Tambura alpium Apuanarum a GUIDONIO, Mantuâ al Bosco Fontana a BARBIERIO, ex Baldo a RAINERO, ex Tyroli Italico in Fiemme, et Fassa a FACCHINIO, ex sylvis Bassanensibus a MONTINIO, et alle Grotte di Oliero ab Eq. PAROLINIO, Tergesto in Lippizza a TOMMASINIO, ex subapennino Ariminensi a Campo lungo ab AZZAROLIO, Maceratâ in sylvis di Fiastra ab Eq. NARDUCCIO, ex Piceno a Montefortino, et alla Corona a MARZIALETTO, ex Hetruria in Apennino Pistoriensi

prope *S. Marcello* a Prof. PETRO SAVIO, in montibus Mugellanis, et in sylvis di *Pratolino* a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTO, a *S. Felice a Ema* ab Eq. RICCA-SOLO, in monte dell' *Alvernia*, et in Apennino Plebis *S. Stephani* a CLERICO, ex Corsica a *Calenzana* a SOLEIROLIO. Floret Martio, Aprili, serius in editis.

Radix rhizoma fusiforme, præmorsum, breve, fuscum, lateraliter emittens fibras numerosas, ramulosas. Scapi radicales, plerumque prodeuntes ante folia, teretes, aut compressiusculi, crassiusculi, uniflori, erecti, vel nutantes, fructigeri cernui, circiter tres-quatuor pollices longi, basi aucti squamis membranaceis, ovatis, aut oblongis, obtusiusculis, vel acutis, concavis, albidis, aut ex albedo rubentibus. Involucrum flori valde approximatum, triphyllum, patens, virens, perigonio brevius, foliolis ovatis, obtusis, integerrimis, sessilibus. Pedunculus brevissimus, vix tertiam lineæ partem, aut lineam semis attingens. Perigonium hexasepalum, ludens plurisepalum, supra plerumque cæruleum, alias rubellum, extus pallidius coloratum, subinde totum album. Sepala oblonga, obtusa, concava. Stamina perigenio multo breviora, alba, rarius colorata, filamentis inæqualibus, capillaribus, apice crassiusculis, antheris didymis. Ovaria plura, ovata, pubescentia, viridia, sæpe calyculata alveolis margine lacero-pilosis. Stili brevissimi, crassiusculi, persistentes. Stigmata obtusa, recurvula. Nuculæ ovatæ, in capitulum collectæ, pubescentes, recurvo-rostellatæ, ecaudatæ. Folia omnia radicalia, plerumque hysteroanthia, rarius synanthia, longe petiolata, scapis nunc paulo breviora, nunc longiora, nunc æqualia, coriacea, cordata, triangulo-triloba, lobis æqualibus, subrotundis, obtusis, vel acutiusculis, integerrimis, supra viridia, nitida, et sæpe glabra, subtus pallidiora, plerumque purpurantia, et villosa. Petioli supra canaliculati. Tota herba initio sericeo-villosa, postea vel tota, vel partim glabrata. Folia, et flores variant magnitudine.

Usus. Ob vim adstringentem, tonicam præstans ad viscera roboranda, sed, nescio quo fato, nunc exoleta.

**** Involucro remoto; nuculis ecaudatis.**

Anemonoideæ.

a. *ANEMONE trifolia*: foliis, involucrisque ternatis, foliolis oblongo-lanceolatis, ovatisque, acutis, serratis; sepalis obtusis, subsenis.

A. trifolia *Sp. pl.* p. 762. *De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 884.*, et *Syst. nat.* 1. p. 205., et *Prodr.* 1. p. 20. n. 31. *Balb. Misc. bot.* 1. p. 25. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 20. n. 15. excl. pl. *Amer. Nooc. et Balb. Ticin.* 1. p. 257., et 391. *Pollin. Ver.* 2. p. 224. *Suffr. Foroj.* p. 150. *Bert. Pl. Gen.* p. 69. n. 150., et *Amæn. Ital.* p. 156. n. 149., et *Mant. Fl. alp. Apuan.* p. 37. n. 57. *Sav. Bot. Etr.* 2. p. 122. *Pritz. Anem. revis.* p. 86. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 14. *heft. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 114. *Koch. Syn.* p. 9. *Reich. Exo.* 3. p. 731. n. 4646., et *1c. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 17. *Ranunc. Anem. t.* 48. f. 4646. *Host. Austr.* 2. p. 95. *Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 283.*

Emaphillon Ang. Sempl. p. 192.

Anemone trifolia *Dodonæi* *Pon. Descr. mont. Bald. in Clus. Hist. pl.* p. cccxlvj. *Ludg. Hist.* 2. p. 847. fig.

Ranunculus nemorosus trifolius *Segui. Sup.* p. 211. n. 2.

Anemone trifolia *Dod. Pempt.* p. 436. fig.

Alabastrites sive Dentaria alba *D. Brancionis* *Lob. Ic.* p. 281.

Anemone trifolia flore albo *J. Bauh. Hist. pl.* 3. lib. 30. p. 412. fig.

Ital. Anemone trifogliata.

Perenn. Legi Sarzanum in collibus di Sarzanello, et *Montedarme*, ubi copiosa, Genum in collibus del *Boschetto* ad *Porciferam*. Habui ex monte *Bruciana* prope *Codena* in subalpinis Apuania a *GUIDONIO*, Genuâ in sylvis extra portam di *Granarolo* a *Prof. DE NOTARIS*, Veronâ in sylva del *Mantico* a *MANGANOTTO*, ex Tyroli meridionali in sylvis prope *Brixinam* ab *Eq. DE HEUFLERO*, et ex Tyroli Italico in *Fiemme* prope *Predazzo* a *FACCHINIO*, ex sylvis, et sepibus *Bassanensis* ab *Eq. PAROLINIO*, et a *MONTINIO*, ex collibus prope *Utinum* a *RAINERO*, ex monte *Soffio* districtus *Urbinate*, et ex *Apennino* proximo della *Cattria* a *FEDERICIO*, ex collibus d' *Acqualagna* prope *Cagli* ab *Eq. NAARDUCCIO*, ex *Hetruria* in montanis *Plebis S. Stephani* provincie *Aretine* ab *AMIDEO*, et a *CLARICO*. Floret Martio, Aprili, in editis Majo, Junio.

Radix rhizoma horizontale, cylindraceum, subinde ramosum, fere crassitie calami scriptorii, album, vel extus rubens, extremitate inferiore obtusum, apice squama deslexa terminatum, lateraliter parce fibrillosum, nunc folium radicale, nunc scapum floriferum apice ferens. Folium ternatum, longe petiolatum, foliolis sessilibus, oblongo-lanceolatis, vel ovatis, acutis,

aut acuminatis, subtus nitidulis, inferne integris, reliquo margine serratis, plerumque conduplicato-canaliculatis, lateralibus basi obliquatis, medio cuneato. Petiolus communis semiteres, erectus, tri-quadripollicaris, supra leviter canaliculatus. Scapus teres, tenuis, erectus, palmaris-spithamalis, et etiam quidquam ultra, superne ferens involucrium, cæterum nudus. Involucrium sesquipollicem, vel duos pollices a flore remotum, subinde tamen vix pollicem, triphyl- lum, foliis ternatis, verticillatis, breviter petiolatis, petiolis supra canaliculatis, basi paululum dilatatis; eorum foliola radicalibus similia, sed paulo angustio- ra. Flos solitarius, terminalis, erectus, vel nutans. Perigonium hexasepalum, vel plurisepalum, etiam de- casepalum, album, interdum subtus roseum, raro to- tum roseum. Sepala elliptico-oblonga, obtusa, inte- gra, sub sole patentia, in umbra in campauam con- niventia. Stamina alba, inæqualia, filamentis capil- laceis, apice crassiusculis. Ovaria sessilia, ovata, acu- ta, viridia, pubescentia. Stilus brevissimus. Stigma simplex, crassiusculum, obtusum, recurvum. Nu- culæ ejusdem formæ ac ovaria, in capitulum collectæ, compressiusculæ, leviter pubescentes, breviter rostra- tæ, ecaudatæ. Herba plus minus pubescens. Folia plu- rimum variant magnitudine, vix flores. Planta gregaria.

3. *Анемоне nemorosa*: rhizomate cylindraceo, elongato; foliis radicalibus, involucrique ternatis, quinatisve, foliolis oblongis, inciso-serratis; sepalis subsenis.

A. nemorosa *Sp. pl.* p. 76a. *Smith. Engl. Fl.* 3. p. 36., et *Engl. bot.* v. 5. t. 355. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 262. *Curt. Lond. ed. Grav.* v. 1. t. 68. *Fl. Dan.* t. 549. *Sv. bot.* v. 1. t. 3. *Plenck. Ic. pl. med.* 5. p. 57. t. 453. *Bull. Pl. ven.* p. 80. t. 3. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 884. α. β., et *Syst. nat.* 1. p. 203. α., et *Prodr.* 1. p. 20. n. 27. α. *All. Ped.* 2. p. 172. n. 1929. *Balb. Taur.* p. 87. *Re Seg.* p. 46., et *Tor.* 1. p. 285. *Birol. Acon.* 1. p. 185. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 19. n. 13. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 258., et 391. *Comoll. Prodr.* p. 106. *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec.* 2. tom. 10. p. 290.* *Pollin. Ver.* 2. p. 224. *Nacc. Ven.* 3. p. 94.* *Suffr. Foroj.* p. 149. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 279. *Bert. Pl. Gen.* p. 69., et *Amæn. Ital.* p. 157. n. 150. *Sav. Bot. Etr.* 1. p. 157. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 181.* *Ten. Nap.* 4. p. 330., et *Syll.* p. 263. n. 4. *Pritz. Anem. revis.* p. 90. α. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 14. heft. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4.

p. 112. Koch. Syn. p. 9. Reich. Exc. 3. p. 731. n. 4644., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 17. Ranunc. Anem. t. 47. f. 4644. Host. Austr. 2. p. 95. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 383. Gaud. Helv. 3. p. 492.

A. n. 1154. Hall. Hist. stirp. indig. Helv. 2. p. 64.

Anemonoides flore majore Segui. Sup. p. 211.

Ranunculi quarta species lactea Fuchs. Hist. pl. p. 162. fig.

Anemone V. Dod. Pempt. p. 435. fig.

Nemorosus Ranunculus Lob. Ic. p. 673.

Ital. Anemolo bianco. Anemone de' boschi. Ranunculo bianco Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 20.

Offic. Ranunculi albi flores Lin. Mat. med. p. 96. n. 275.

Perenn. Copiosa in sylvis, et sepibus umbrosis totius Italiae. Legi Sarzanæ in collibus di Sarzanello, et Montedarme, Genus secus aqueductum del Zerbino, Bononiæ alle Grotte, et in sylvaticis inter Roncorio, et montem Paderno. Habui ex sylvis Taurinensibus a BERTERO, ex agro Ticinensi a FACCHINIO, Mantuâ al Bosco Fontana a BARBIERIO, ex sylvis, et sepibus Bessanensibus ab Eq. PAROLINIO, et a MONTINIO, ex agro Forojuliensi a Prof. BRIGNOLIO, Tergesto in Lippizza, et ex monte Majori Istriæ a TOMMASINIO, Fossâ Clodiâ a CAZZOLO a Prof. NAOCARIO, ex agro Faventino in sylva de' Rumturi a TASSINARIO, ex Piceno in monte Corona a Costa ricciatora, et in monte Priore a MARZIALETTO, ex Ducatu Lucensi a S. Maria del Giudice, ex Casseroniana supra Fabbriche, ex Etruria in umbrosis montis Pisani, et in Apennino Pistoriensi al Teso a Prof. PETRO SAVIO, iterum ex Etruria in montibus Pistorii, in sylvis di Pratolino, et alla Falterona a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, in monte Sinario a BARONIO fil., a S. Felice a Ema prope pontem ab Eq. RICCASOLO, in vallibus Volaterranis a Pensano ab AMIDEO, in collibus della Piaggia prope S. Sepolcro a CLERICO, ex Latio in collibus Albanis a Prof. MAURIO. Floret Martio, Aprili.

Species præcedenti proxima. Rhizoma ejusdem formæ, et directionis, sed plerumque paulo crassius, extus rubens, vel nigrescens. Folium radicale, et folia involucri ternata, vel quinata, foliolis ovatis, aut oblongo-lanceolatis, obtusis, acutis, vel acuminatis, incis, inæqualiter grosse serratis, medio trifido, lateralibus bifidis, omnibus brevissime petiolulatis. Perigonium plerumque hexasepalum, ludit plurisepalum, et pluriseriatum, sepalis etiam duodecim, tuncque angustioribus.

Sepala elliptico-oblonga, obtusa, alba, vel extus rosea, raro utrinque rosea. Stamina numerosiora, filamentis albis, antheris oblongis, luteis. Ovaria villosa. Stili breves. Nuculæ laxius villosæ, longiuscule rostratæ, tamen ecaudatæ. Habitus firmior, et plerumque paulo grandior. Herba plus minus hirsuta, at interdum fere glabra. Folia, et flores variant magnitudine. Cætera ut in *Anemone trifolia* L.

Usus. Olim laudabatur in cephalalgia, nunc exoleta.

4. *ANEMONE apennina*; rhizomate crasso, carnoso, irregulari; foliis radicalibus biternatis, involucrantibus ternatis, omnium foliolis pinnatifido-serratis; sepalis oblongo-linearibus, numerosis.

A. *Apennina* Sp. pl. p. 762. Smith. Engl. Fl. 3. p. 37., et Engl. bot. v. 15. t. 1062. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 263. Curt. Lond. ed. Grav. v. 1. t. 69. De Cand. Syst. nat. 1. p. 202. a., et Prodr. 1. p. 19. n. 23. a. β. Sav. Bot. Etr. 2. p. 123. Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 181.* Ten. Nap. 4. p. 330., et Syll. p. 263. n. 5. Guss. Fl. Sic. prodr. 2. p. 37.,* et Syn. 2. p. 34.* Presl. Sic. 1. p. 7. Pritz. Anem. revis. p. 79. a. Reich. Exc. 3. p. 731. n. 4645., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 17. Ranunc. Anem. t. 47. f. 4645. Ranunculus nemorosus, flore maiore Cup. Hort. Cath. p. 185.

Anemone nemorosa flore albo et cæruleo Castell. Hort. Mess. p. 3.

Ranunculus nemorosus fl. cæruleo duplex Apennini montis Mentz. Pugill. tab. 8.

Anemone II. Dod. Pempt. p. 434. fig.

A. *geranifolia* Ger. em. p. 377. fig. J. Bauh. Hist. pl. 3. lib. 30. p. 405. fig.

A. *tuberosa* Geranifolia Lob. Ic. p. 280.

A. *hortens.* tenuif. simpl. flore l. Clas. Hist. pl. lib. 2. p. 254. fig.

Ital. *Anemone de' boschi* Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 19.

Perenn. Habui ex districtu Camerinensi a Montigno a Prof. OCTAVIANO, ex Hetruria in sylvis Volaterranis ab AMIDEO, a S. Felice a Ema in aggere fluminis ab Eq. RICCASOLO, in Maremma Grossettana ab eodem, a Prof. PARLATORE, et a Prof. PETRO SAVIO, in monte Argentario a Prof. GIULIO, et denuo ab Eq. RICCASOLO, ex agro Viterbiensi a CAMILLIO, ex villis circa Romam, ubi vulgatissima, a Prof. SEBASTIANO, a Prof. MAURIO, et a BARBIERIO, ex Civitacastellana, et ad Albanum denuo a BARBIERIO, ex sylvis prope Neapolim ab
Flor. Ital. T. V.

Eq. GUSSEONIO, ex montosis Ilvæ prope Rio a Prof. PETRO SAVIO. Floret Martio, Aprili.

Rhizoma tuberosum, carnosum, breve, crassum, irregulare, plerumque tortuosum, raro cylindraceum, parce fibrosum, extus fuscum, ferens gemmas foliorum radicalium nunc seorsim, nunc cum gemma scapifera. Folia radicalia pauca, unum-tria, synanthia, biternata, foliolis ovatis, aut oblongis, obtusiusculis, acutis, vel acuminatis, pinnatifidis, laciniis inæqualiter inciso-serratis, pilosis. Eorum petioli teretes, supra anguste canaliculati, glabri, basi valde attenuati, et valde flexuosi, ideo debiles, jacentes. Scapus foliis longior, teres, striatus, basi tenuior, et flexuosus, decumbens, adscendens, palmaris-dodrantalis, folia involucri tantum ferens, infra involucrium glaber, aut pilis raris adpersus. Involucrium a flore insigniter remotum, triphyllum, verticillatum, foliis longiuscule petiolatis, ternatis, foliolis ut in foliis radicalibus. Eorum petioli supra canaliculati, basi paulum dilatati. Pedunculus terminalis, unilorus, a sesquipollice ad tres pollices longus, villosus, villis adpressis, vel patulis. Perigonium grandiusculum, polysepalum, in umbra campaniforme, in sole stellatim patens, pulchre, et saturate cæruleum, vel pallide cæruleum, aut album. Sepala decem-sedecim, angusta, oblongo-lanceolata, vel oblongo-linearia, obtusa. Stamina perigonio triplo, vel quadruplo breviora, alba, filamentis capillaceis, antheris oblongis. Receptaculum albo-villosum. Ovaria inferne dense albo-villosa, nec lanata, terminata stilo brevi, crassiusculo. Nucula parvæ, in capitulum collectæ, paucæ, villosæ, aut pubescentes, breviter rostellatæ, rostello recurvo.

Cave, ne confundas cum hac *Anemonem nemorosam* L. sepalis latioribus, paucioribus pollentem; insuper folia ejus radicalia ternata, aut quinata facile distinguunt. Hinc dolendum, folia radicalia ommissa fuisse in figura *Anemones apenninæ* Engl. bot. tab. 1062.

5. *ANEMONE ranunculoides*: rhizomate tenui, cylindraceo, horizontali; foliis omnibus ternatis, quinatisque, foliolis pinnatifidis, inciso-serratis, involucriantibus angustioribus, brevissime petiolatis; scapo subbifloro; perigonio subpentasepalo.

A. ranunculoides Sp. pl. p. 762. Smith. Engl. Fl. 3. p. 38., et Engl. bot. v. 21. t. 1484. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 263. Fl. Dan. t. 140. Sv. bot. v. 6. t. 405. De Cand. Franç. 4.

- par. 2. p. 885., et *Syst. nat.* 1. p. 206., et *Prodr.* 1. p. 20. n. 33. *All. Ped.* 2. p. 173. n. 1930. *Balb. Taur.* p. 87. *Re Seg.* p. 46.; et *Tor.* 1. p. 285. *Biol. Acon.* 1. p. 185. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 20. n. 16. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 258., et 391. *Comoll. Prodr.* p. 106. *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec.* 2. tom. 10. p. 290. *Pollin. Ver.* 2. p. 22. *Suffr. Foroj.* p. 150. *Orsin. in Cap. Opusc.* p. 279. *Sav. Bot. Etr.* 2. p. 123. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 181.* *Ten. Nap.* 4. p. 331., et *Syll.* p. 263. n. 3. *Pritz. Anem. revis.* p. 98. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 7. heft. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 113. *Koch. Syn.* p. 9. *Reich. Exc.* 3. p. 731. n. 4643., et *Io. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 17. *Ranunc. Anem.* 1. 47. f. 4643. *Host. Austr.* 2. p. 96. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 384. *Gaud. Helv.* 3. p. 493. A. n. 1153. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 64.
- Anemone montana* Ranunculo similior, colore luteo *Cesalp. De pl. lib.* 14. cap. 10. p. 549.
- Il IV. Ranuncolo di fior giallo appresso il Fuchsio &c. *Pon. Mont. Bald.* p. 188.
- Anemone-ranunculus* flore luteo *Segui. Ver.* 1. p. 483.
- Ranunculi quarta species lutea *Fuchs. Hist. pl.* p. 162. fig.
- Anemone nemorum lutea* *Ger. em.* p. 383. fig.
- Nemorosus Ranunculus luteus* *Lob. Ic.* p. 674.
- Ital. *Anemolo de' boschi* *Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 20.
- Perenn.* Copiosa in Italia septentrionali, et media. Legi Bononiæ in arvis, et in monte *Paderno*. Habui ex Liguria orientali ad S. Stephanum *d'Aveto al Prato della Cipolla* a TURIO, ex sylvis Taurinensibus a BERTRON, ex agro Mediolanensi in sylvis di *Lainate* ab EQ. RICCASOLO, et in oris dell'*Ambro* a RAINERO, ex valle *Calepio* Bergomensium a BERGAMASCHIO, Mantuâ al *Bosco Fontana* a BARBIERIO, Bassano in sylvis S. Michaelis *d'Angarano* a MONTINIO, Tergesto in valle *Draga* prope *Orlich* a TOMMASINIO, ex districtu Urbinati ad Petram pertusam ab EQ. NARDUCCIO, et in sylvis Catrinæ a FEDERICIO, ex agro Camerinensi a Montigno a Prof. OCTAVIANIO, ex Piceno in monte *Priore*, *Volubrio*, *Capo di Tenna*, et S. *Leonardo* a MARZIALETTE, ex Præstutiis a *Campo aprico*, et *Valle Chiarina* ab EQ. GUSSONIO, ex Ducatu Lucensi al *Prato fiorito* prope balnea a GIANNINIO, et a Prof. PETRO SAVIO, ex Hetruria alla *Falterona* a Prof. ANT. TARGONIO-TOZZETTIO, in monte *Sinario* a BARONIO fil., in monte *Alto alla Verna* ab AMIDEO, ex collibus Albanis in Latio a Prof. SEBASTIANO, a BARBIERIO, et a

Prof. MAURIO, Ariciâ ab eodem Prof. MAURIO. Floret Martio, Aprili, in editis Majo, Junio.

Rhizoma cylindraceum, crassitie fere calami scriptorii, subinde ramosum, horizontale, extus fuscum, latera-liter parce fibrillosum, apice terminatum squama, intra quam fert aut folium radicale, aut scapum floriferum. Folium radicale solitarium, longe petiolatum, ternatum, aut quinatum, subpilosum, supra saturate viride, subtus pallidius, et nitens, foliolis latiusculis, brevissime petiolulatis, basi cuneatis, profunde partitis, laciniis inciso-serratis, nunc obtusiusculis, nunc acutis, et interdum etiam acuminatis. Scapus folio radicali longior, teres, infra involucrium crassiusculus, et glaber, erectus, palmaris-spithamalis, superne ferens involucrium triphyllum, verticillatum, foliis brevissime petiolatis, petiolo latiusculo, supra canaliculato, foliolis angustioribus, et longioribus, quam in folio radicali, cæterum similibus. Pedunculi unus-duo e centro involucri, eoque sæpe breviores, rarius æquales, aut longiores, tenues, pilosi, uniflori. Perigonium pentasepalum, raro hexasepalum, luteo-aureum, extus pilosum, supra nitens. Stamina lutea, filamentis inferne paululum dilatatis, antheris ovatis. Receptaculum subpilosum. Ovaria dense, et adpresse villosa. Stili longiusculi, recurvati. Nuculæ paucæ, in capitulum collectæ, ovariis paulo grandiores, villo rariore vestitæ, et subinde glabræ, longiuscule rostellatæ, ecaudatæ.

6. *ANEMONE narcissiflora*: foliis radicalibus ternatis, foliolis subsessilibus, cuneato-flabellatis, multifidis, laciniis linearibus; floribus umbellatis, solitariisque; nuculis orbiculatis.

A. narcissiflora *Sp. pl.* p. 763. *Jacq. Austr.* 2. p. 38. t. 159. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 885., et *Syst. nat.* 1. p. 212. *α. γ.*, et partim *β.*, et *Prodr.* 1. p. 21. n. 45. *α. γ.* et partim *β.* *All. Ped.* 2. p. 173. n. 1931. *Re Seg.* p. 46. *Birol. Acon.* 1. p. 185. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 22. n. 22. *Comoll. Prodr.* p. 106.* *Pollin. Ver.* 2. p. 226. *Bert. fl. It. in Apennin. Bonon.* p. 14.* *Orsin. in Cap. Opusc.* p. 279.* *Sav. Bot. Etr.* 2. p. 124. *Ten. Nap.* 4. p. 331.,* et *Syll.* p. 263. n. 2.* *Pritz. Anem. revis.* p. 124. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 107. *Koch. Syn.* p. 8. *Reich. Exc.* 3. p. 731. n. 4647., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 17. *Ranunc. Anem.* t. 48. f. 4647. *Host. Austr.* 2. p. 96. *Gaud. Helv.* 3. p. 494.

A. dubia Bell. *Append. in Acad. de Tur. ann.* 1790-1791. vol. 5. p. 232. tab. 7. pl. uniflora.

A. baldensis β Pollin. *Ver.* 2. p. 223.

A. n. 1155. Hall. *Hist. stirp. indig. Helv.* 2. p. 65.

Pulsatilla trianthos sulfur. semine non papposo Barrel. *Ic.* 494.

Ranunculus saxatilis *aeoniti folio laciniatissimo nigrescente, albo flore* Tit. *It. in calc. Hort. Maur.* p. 19. non numer.

Ranunc. montan. II. species altera Clus. *Hist. pl. lib.* 2. p. 235. fig.

Ital. *Anemone narcissino.*

Perenn. Filius attulit ex Apennino Bononiensi *al Corno alla scala*, ubi copiosa, et unde obtinui etiam a Prof. PETRO SAVIO, et a CLENICO. Habui ex Pedemonte in alpinis *della Madonna delle Finestre* ab Eq. Prof. MORISIO, et a Prof. BALBISIO, ex monte *Generoso* ad Larium a Prof. COMOLLIO, et a Prof. MORETTIO, ex *Grappa Bassanensis* a MONTINIO, ex montibus *Forojuliensibus* a Prof. BRIGNOLIO scapo unilloro, ex *Vette di Feltre* tam scapo uniflora, quam floribus paucis, subsessilibus ab Eq. PAROLINIO, et a MONTINIO, ex Piceno in monte *De' fiori alle Pianelle* ab ORSINO, ex Prætutiis in montibus *Costone*, et Cornu ab Eq. GUSONIO, ex monte *Orsaio* in Apennino Pontremulensi a Prof. PETRO SAVIO, ex Apennino Lucensi a *S. Pellegrino* a Prof. PUCCINELLIO, et *al Rondinaio* in rupibus a GIANNINIO, ex *Mandromini* in Apennino Pistoriensi ab herborario nostro. Floret ab Junio in Augustum.

Rhizoma fusiforme, breve, crassum, nigrescens, perpendiculare, vel transversum, basi solutum in fibras numerosas, fasciculatas, crassiusculas, collo tectum reliquiis petiolorum sphacelatorum. Folia radicealia plura, caespitosa, synanthia, longe petiolata, saturate viridia, ternata, foliolis subsessilibus, fere in orbem dispositis, palmato-multifidis, flabelliformibus; laciniis inaequalibus, linearibus, acutis, vel acutiusculis, lateralibus saepe superimpositis laciniis folioli proximi. Petioli crassi, supra canaliculati, basi dilatati, vaginantes. Scapus teres, plerumque crassus, erectus, vel adscendens, foliis longior, palmaris-pedalis, apice ferens involuerum di-triphyllum, et etiam monophyllum, sessile, foliolis palmato-multifidis, ceterum laciniatis more foliorum radicalium, sed numero minori

laciniarum pollentibus. Pedunculi e. centro involucri, uniflori, ab uno ad sex, cum plures umbellati, nunc involucri insigniter longiores, nunc æquales, interdum vero brevissimi, ut flores subsessiles evadant. Perigonium plerumque hexasepalum, mediocris magnitudinis, album, subinde extus roseum. Sepala ovalia, acuta, vel obtusa, concava, dorso glabra, aut pilosula. Stamina plurima, perigonio multo breviora, filamentis crassiusculis, antheris oblongis, erectis, luteis. Ovaria staminibus breviora, parva. Nuculæ grandiusculæ, sæpe paucæ, subfastigiatae, aut plures, in capitulum collectæ, suborbiculatae, compressæ, marginatae, glabræ, stilo brevissimo, uncato rostellatae. Tota herba hirsuta, villis longis, patentibus.

7. *ANEMONE baldensis*: foliis radicalibus biternatis, foliolis tripartito-flabellatis, segmentis subtrifidis, involucri remotissimo; perigonio suboctosepalo; nuculis dense capitatis, lanatis.

A. baldensis Mant. 1. p. 78. Willd. *Sp. pl.* 2. par. 2. p. 1278. De Cand. *Franç.* 4. par. 2. p. 882., et *Syst. nat.* 1. p. 203., et *Prodr.* 1. p. 19. n. 26. Turr. *Fl. Ital. prodr.* p. 37. All. *Ped.* 2. p. 172. n. 1928. tab. 44. f. 3., et tab. 67. f. 2., et *Auct. p.* 35. Coll. *Herb. Ped.* 1. p. 19. n. 12. Moret. in *Mem.* 1. p. 274. Pollin. *Viag. al lag. di Gard.* p. 102., et *Ver.* 2. p. 223. excl. var. β . Pritz. *Anem. revis.* p. 74. Sturm. *Deuts. Fl.* 1. abth. 14. heft. Röhl. cum Koch. *Deuts. Fl.* 4. p. 110. Koch. *Syn.* p. 9. Host. *Austr.* 2. p. 95. Reich. *Exc.* 3. p. 732. n. 4652., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 17. *Ranunc. Anem.* t. 50. f. 4652. Gaud. *Helv.* 3. p. 490.

A. alpina γ . Turr. in *Giorn. d' Ital. Venez.* 1765. tom. 1. p. 136.

A. alpina Scop. *Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 384. tab. 26. ex evid. descript.

A. fragifera Wulf. in Jacq. *Misc.* 2. p. 55. Jacq. *Ic. rar.* 2. p. 11. tab. 103. Murr. *Syst. veg. ed.* 14. p. 510. n. 16. *Re Seg.* p. 46.*

A. n. 1151. Hall. *Hist. stirp. indig. Helv.* 2. p. 63.

Ital. Anemolo fragolino.

Perenn. Habui ex Cenisio, ubi copiosa, a PPir. BALRISIO, et RE, et a BONJEANNIO, ex alpinis Brixianis prope lacum di Zondenino a ZANTEDESCHIO, ex alpinis di Fiemme, et Fassa in Tyroli Italico a FACCHINIO, ex Portole Vicetinarum prope la Forcella a MONTINIO, et ab Eq. PAROLINIO. Floret Julio, Augusto.

Radix gracilis, fusiformis, obliqua, nigrescens, vix lateraliter fibrillosa, hic illic, et præcipue prope collum gemmifera, collo basibus petiolorum sphacelatis vestito. Folia radicalia pauca, cæspitosa, synanthia, modo breviter, modo longe petiolata, biternata, foliolis glabris, vel margine, et nervis pilosis, parvis, sessilibus, approximatis, palmato-flabellatis, seu tripartitis, segmentis breviter bi-tri-quadrifidis, laciniis lanceolatis, acutis. Petioli tenues, pilosi, supra canaliculati, basi paululum dilatati, amplexantes. Scapus teres, erectus, vel adscendens, a pollice ad spithamam longus, totus villosus, fereus involucrium a flore remotissimum, et subinde fere in basi. Involucrium subtriphyllum, foliolis instar radicalium dissectis, brevissime petiolatis, petiolis latis, membranaceis, amplexantibus, villosis. Pedunculus e centro involucri, uniflorus, plus minus elongatus. Perigonium mediocris magnitudinis, album, subtus adpresse villosum, et subinde roseum, heptan-neseepalum, sed plerumque octosepalum. Stamina perigonio multo breviora, antheris ovato-oblongis, luteis. Stili glabri, breves. Nuculæ valde numerosæ, in capitulum globosum, grandiusculum dense collectæ, lanatæ, lana alba, apiculatæ stilo persistente, brevi, glabro, erectiusculo.

8. *ANEMONE coronaria*: rhizomate tuberoso, crasso, irregulari; foliis radicalibus biternatis, foliolis pinnatifidis, laciniis inciso-serratis; involucrio triphylo, sessili, palmatifido; sepalis late obovatis, obtusis.

A. coronaria *Sp. pl.* p. 760. *Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr.* 1. p. 375., et *Fl. Græc.* 6. p. 11. tab. 514. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 882., et *Syst. nat.* 1. p. 196., et *Prodr.* 1. p. 18. n. 13. *Bad. in Morett. Bot. Ital.* p. 8.* *Bell. App. in Acad. de Tur. ann.* 1790-1791. vol. 5. p. 232. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 17. n. 8. *Pollin. Ver.* 2. p. 122. *Sav. Bot. Etr.* 2. p. 121. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 180.* *Ten. Nap.* 4. p. 330., et *Syll.* p. 263. n. 6. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 36., et *Syn.* 2. p. 33. *Presl. Sic.* 1. p. 6. *Zeraph. Fl. Melit. thes.* 2. p. 42. *Moris. Sard.* 1. p. 18.* *Pritz. Anem. revis.* p. 55. *Reich. Exc.* 3. p. 731. n. 4648., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 17. *Ranunc. Anem.* t. 49. f. 4648.

A. pratensis *Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 229. non Lin.

A. Oenanthe *Ab Ucr. in Opusc. di Aut. Sic. tom.* 6. p. 252. n. 13.

Anemone I. et II. *Matth. Valgr.* 1585. tom. 1. p. 650. 651. fig.

- Anemone* Dur. *Herb. ed. Rom. p. 28. fig. mala.*
Anemone alterum genus peregrinum apud nos *Cæsalp. De pl. lib. 14. cap. 9. p. 548.*
Anemone Italica, purpurea, foliis floribus orbiculatis *Cup. Hort. Cath. p. 16.*
A. Oenanthes foliis, flore violaceo, hexaphyllo *Cup. Sup. alt. p. 7.*
A. sylvestris, simplex, tenuifolia, cærulea *Cast. Hort. Mess. p. 3.*
A. III. Dod. Pempt. p. 434. fig.
A. hort. tenuifol. simplici flore II. Clus. Hist. pl. lib. 2. p. 255. fig.
Ital. Anemolo. Anemolo de' campi. Anemolo salvatico. Anemolo scempio. Anemone. Fagottino. Lindadoro Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 19.
Perenn. Copiosa in collibus Bononiensibus flore coccineo, violaceo, aut albo, ubi legi in collibus di Gaibolla, et Paderno. Habui ex Liguria occidua in valle d' Andora a Badaroo, et a Diano, et Oneglia a Prof. GHERARDIO, Nicæ a VOGELIO de herbario Mauri, ex campis Cæsenatensibus a BARBIERIO, Urbino in cultis a FEDERICIO, et a Prof. OCTAVIANO, Senogallia in arvis inter oppidum, et S. Angelo a SALVATORIO, ex subalpinis Apuanis a GUIDONIO, Florentia a Marignolle ab Eq. RICCASOLO, et extra portam Pinti a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTO, Volaterris prope Capuccinos ab AMIDEO, Romæ in villis suburbanis a PPR. SEBASTIANO, et MAURIO, et a FIORINIA-MAZZANTIA, ex agro Fundano ab Eq. PAROLINIO, ex Sicilia in regione Ætnæa ad Catanam a Prof. COSENTINIO, Panormo ab Eq. BIVONA-BERNARDIO, et a TODARO, ex Sardinia in arvis Calaritanis ab Eq. Prof. MORISIO, et in pascuis dell' Isolotto prope Calarim a Prof. DE NOTARIS. Floret Febuario, Martio, Aprili.
Rhizoma tuberosum, carnosum, crassum, breve, irregulare, nunc in formam subrotundam, nunc in oblongam efformatum, extus fuscum, fibris simplicibus, ramulosisque instructum. Folia omnia radicalia, cæspitosa, synanthia, longe petiolata, biternata, foliolis pinnatifidis, laciniis argute inciso-serratis, latioribus in foliis primis, margine ciliolatis, supra late viridibus, glabris, subtus pallentibus, et pilosulis, sæpe crispo-recurvatis. Petioli semiteretes, inferne attenuati, flexuosi, debiles, pilis incurvis adpersi, supra leviter canaliculati. Scapi unus, vel plures ex eodem rhizomate,

uniflori, nobiles cernni, incano-villosi, a pollice ad pedem longi, et plerumque foliis longiores, erecti, vel ascendentes, superne ferentes involucrium triphyllum, sessile, verticillatum, foliolis palmatifidis, laciniis incis-serratis, acuminatis, nunc flori valde approximatum, nunc recedens a flore distantia unius, vel duorum pollicum. Pedunculus adpresse villosus, incanus. Perigonium grande, sed magnitudinis variz, subhexasepalum, extus pallidius, et adpresse pubescens, ludit saturate coccineum cum macula pallide cœrulea in basi sepalorum, vel late violaceum, aut albo-roseum, sub sole patens, in umbra connivens, et campaniforme. Sepala late obovata, obtusa, vel acuta, integra, tria interiora paulo angustiora. Stamina valde numerosa, perigonio multo breviora, filamentis filiformibus, basi rubidis, aut purpureo-rubidis, antheris oblongis, erectis, atro-cœruleis, polline viridulo, odoris spermatici. Ovaria numerosa, villosa, stilo subulato, incurvulo, atro-cœruleo, vel atro-purpureo, scabro. Nuculæ in globum dense stipatz, villosæ, stilo persistente terminatz, ecaudatz, plerumque abortivæ.

Usus. Planta ob florum pluchritudinem præstantissima, ideo late excolta in hortis, ubi ludit floribus plenis, et coloris mirimode varii. Ego vero decipio plantam sylvestrem, qualis occurrat in collibus Bononiensibus.

9. *ANEMONE hortensis*: rhizomate tuberoso, crasso, irregulari; foliis radicalibus tripartitis, primordialium segmentis latis, apice inciso-serratis, reliquorum anguste laciniatis; involucrio sessili, remoto; sepalis numerosis, lanceolatis.

A. hortensis *Sp. pl.* p. 761. *Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr.* 1. p. 375., et *Fl. Græc.* 6. p. 12. t. 515. *All. Ped.* 2. p. 172. n. 1926. *Pollin. Ver.* 2. p. 223. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 279. *Bert. Pl. Gen.* p. 68., et *Amæn. Ital.* p. 156. n. 148. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 181.* *Ten. Nap.* 4. p. 330., et *Syll.* p. 264. n. 8. *Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 230. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 37.,* et *Sup.* 2. p. 183.,* et *Syll.* 2. p. 33.* *Moris. Sard.* 1. p. 19. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 882. *Pritz. Anem. revis.* p. 59. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 106. *Koch. Syn.* p. 8. *Reich. Exc.* 3. p. 732. n. 4649., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 17. *Ranunc. Anem.* t. 50. f. 4649. *Host. Austr.* 2. p. 94. *Gaud. Helv.* 3. p. 488.

A. stellata *Lamck. Enc. mét. bot. éd. de Pad.* 1. p. 165. n. 12. *De Cand. Syst. nat.* 1. p. 198., et *Prodr.* 1. p. 18.

- n. 16. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 16. n. 7. *Sav. Pis.* 1. p. 19.,
et *Bot. Etr.* 2. p. 122. *Presl. Sic.* 1. p. 6. *Sturm. Deuts.*
Fl. 1. abth. 46. heft.
- A. n. 1152. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 64.
- A. in tractu maritimo, et copiosa in monte S. Juliani
prope Pisas *Casalp. De pl. lib.* 14. cap. 9. p. 548.
- A. Geranii rotundo folio, purpurascens, dilute purpu-
rascens, et dilute rubens *Cup. Hort. Cath.* p. 15.
- A. latifolia, Saniculæ folio *Hort. Rom.* 5. tab. 35.
- A. l. *Dod. Pempt.* p. 434. fig.
- A. hortens. latif. simpl. flore III. *Clus. Hist. pl. lib.* 2.
p. 249. fig.
- β perigonio coccineo, subinde monstroso e coccineo vi-
renti, sepalis acutis, vel acuminatis.
- Anemone pavonina Lamck. Enc. méth. bot. éd. de Pad.* 1.
p. 164. n. 11. *De Cand. Franç.* 5. p. 634., et *Syst. nat.* 1.
p. 197., et *Prodr.* 1. p. 18. α. β. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 17.
n. 9. *Lois. Desl. Not.* p. 87.,* et *Fl. Gall. ed.* 2. tom. 1.
p. 400.* *Reich. Exc.* 3. p. 782. n. 4650., et *Ic. Fl. Germ.*
et *Helv.* 3. p. 17. *Ranunc. Anem.* t. 49. f. 4650.
- A. fulgens *Pritz. Anem. revis.* p. 58. *Reich. Cent.* 3. p. 1.
t. 201. fig. 343.
- Anem. hort. latif. pleno flo. versic. Clus. Hist. pl. lib.* 2.
p. 261. fig. radic. cum fol., p. 262. fig. flor.
- A. maxima polyanthos Chalcædonica *Lob. Ic.* p. 278.
- Ital. *Argemone. Fiore stella Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 20.
Var. β. *Occhio di pavone.*
- Perenn.* Copiosissima in herbidis collinis totius Italiæ tem-
peratioris, et calidioris. Legi Sarzanæ, Genus, Bonon-
niæ. Habui ex Istria inter Dignano, et Pirano a TOM-
MASINIO, et a BRASOLETTO, ex monte Mauro in distri-
ctu Faventino a TASSINARIO, ex agro Urbinati a Prof.
OCTAVIANO, Senogalliâ ad sepes a SALVATORIO, ex Pi-
ceno in pascuis di Montefortino a MARZIALETTO, ex
monte Pisano a Prof. PETRO SAVIO, ex agro Volaterra-
no ab AMIDEO, Româ in villis suburbanis a Prof. SE-
BASTIANJO, et a BARBIERIO, Terracinâ a FIORINIA-MAZ-
ZANTIA, ex Sicilia ad Catanam a Prof. COSENTINIO, et
in collibus Panormitanis ab Eq. GUSONIO, ex Inarime
ab Eq. PAROLINIO, ex insula Caprearum a Prof. GI-
RALDIO, ex Sardinia in collibus Calaritanis a Prof. DE
NOTARIS, ex Corsica a Calvi a SOLEIROLIO. Varieta-
tem β obtinui ex collibus Bononiensibus a GENNARIO,
ex agro Florentino a FOX-STRAWWEJO, ex Villafranca
prope Nicam a VOGELIO, et ab WOODSIO de herbario
Mauri. Floret a Februario in Aprilem.

Rhizoma ut in præcedente specie. Folia radicalia subcoriacea, longe petiolata, tripartita, vel ternata, prima segmentis, aut foliolis latis, et sæpe insigniter, medio trifido, lateralibus bifidis, apice nunc parce, et grosse inciso-dentatis, dentibus acutis, nunc multidentatis, dentibus parvis, argutis, supra viridia, lineata, subtus pallidiora, et nervis, venisque prominentibus, anastomosantibus insignita, successiva segmentis, vel foliolis pari modo partitis, laciniis angustis, lanceolato-linearibus, acuminato-mucronatis, omnia vel adpresso pilosa, vel glabra. Petioli, supra canaliculati, flexuosi præsertim inferne, debiles. Scapus teres, erectus, aut adscendens, sæpe foliis longior, etiam dodrantalis, pilosus. Involucrum ut plurimum a flore remotissimum, sessile, triphyllum, aut tripartitum, foliolis, aut segmentis nunc integerrimis, nunc apice bi-trifidis, acuminatis. Pedunculus a pollice ad sesquipedem longus, apice densius, adpressequè villosus, villo incano. Perigonium polysepalum, grandiusculum, aut saltem mediocre, supra late violaceum, vel roseum, extus pallens, et adpresse pilosum præsertim in basi, alias totum album, in sole stellatim patens, in umbra campaniforme. Sepala lanceolato-linearia, obtusa, aut vix acuta, supra lineata, dorso multinervia. Stamina perigonio multo breviora, tota cærulea. Antheræ ovatæ. Ovaria villosa. Stili longiusculi, cærulei, glabri. Stigmata simplicia, acuta. Nuculæ in capitulum globosum, aut oblongum dense glomeratæ; villosæ, et fero lanatæ, terminatæ stilo longiusculo, recto, nudo, nec cauda plumosa.

In varietate *β* herba speciei, sed folia radicalia sæpe paulo grandiora, segmentis argute multidentatis. Involucrum flori propinquius, quia pedunculus uni-bipollinaris tantum. Perigonium vel duplo grandius, vel æquale, constans sepalis fere ordine simplici, oblongo-lanceolatis, acutiusculis, vel acutis, aut angustioribus, lanceolatis, valde acuminatis, supra vivide coccineis, subinde etiam apice profunde multidentatis, dentibus acutissimis. Ita se habent exemplaria nostra ex *Heletruria*, et ex *Villafranca* Nicææ, promiscue lecta in eisdem locis. At flos quandoque ludit plenus ex staminibus evanescentibus, tuncque sepala sunt anguste lanceolata, valde acuminata, e coccineo viridia, interiora minorâ. Hujusmodi est exemplar nostrum ex collibus Bononiensibus.

10. *ANEMONE palmata*: foliis cordato-subrotundis, obtuse lobatis, denticulatis; involucri remoto, foliolis apice inciso-dentatis; sepalis numerosis, elliptico-oblongis.

A. palmata Sp. pl. p. 758. De Cand. Franç. 5. p. 635., et Syst. nat. 1. p. 199., et Prodr. 1. p. 19. n. 17. Coll. Herb. Ped. 1. p. 16. n. 6. Guss. Fl. Sic. prodr. 2. p. 38., et Syll. 2. p. 34. Moris. Stirp. Sard. el. fasc. 1. p. 1.,* et Sard. 1. p. 20.* Desf. Atl. 1. p. 432. Lois. Desl. Not. p. 87., et Gall. ed. 2. tom. 1. p. 400. Pritz. Anem. revis. p. 62.

A. latifolia flava L. Clus. Barrel. Ic. 792.

A. hortens. latif. simplo flavo flo. Clus. Hist. pl. lib. 2. p. 248. fig.

Ital. *Anemolo Farferugio*.

Perenn. Habui ex montanis Sardiniae australis ab Eq. Prof. MONTEIO, et a Prof. DE NOTARIS. Floret ab Januario ad Martium.

Rhizoma fusiforme, præmorsum, breve, crassum, transversum, extus fuscum, lateraliter fibrillosum, et subinde gemmiferum. Folia radicalia cæspitosa, synanthia, breviter petiolata, coriacea, cordato-reniformia, vel cordato-orbiculata, tri-quinqueloba, lobis crenato-dentatis, dentibus acutisculis, glabra, ciliata, subtus sæpe purpurantia. Petioli longitudine folii, aut paulo longiores, glabri, vel subpilosi, flexuosi præsertim inferne, supra canaliculati. Scapus teres, decumbens, adscendens, vel erectus, uni-quinquepollicaris, basi glaber, prope involucri pilosulus, uniflorus, et subinde biflorus. Involucrium triphyllum, sessile, a flore remotum, pilosum, foliolis apice palmato-trifidis, lacinia integris, aut dentatis, e centro ferens unum, vel duos pedunculos, quorum alter brevior, et alio involucri præditus. Peduncululus a semipollice ad duos pollices longus, adpresse villosus, et densius in apice, villo flavescente. Perigonium polysepalum, mediocris magnitudinis, sub sole stellatim patens. Sepala elliptico-oblonga, vel oblongo-linearia, obtusa, aut vix acuta, flava, antra lineata, extus multinervia, externa paulo latiora, dorso subinde rubeascentia, et adpressè villosa, villo flavescente, interiora angustiora, utrinque glabra, vel extus parcius pilosa. Stamina flava, perigonio multo breviora, filamentis basi paululum dilatatis, superne filiformibus, apice crassiusculis, antheris oblongis, erectis. Ovaria villosa. Stili longiusculi, erecti. Nucula villosa, et fere lanata, stilo glabro, persistente terminata, ecaudata.

Possideo ex Sardinia tam scapa uniflora, quam biflora, tam rhizomate sola gemma terminali prædito, quam etiam gemma laterali.

*** *Involucro remoto; nuculis cauda plumosa terminatis. Pulsatillæ.*

11. *ANEMONE vernalis*: foliis pinnatis, ternatisque, foliolis cuneatis, subtrifidis; involucri laciniis lineari-angustissimis, villosissimis; sepalis oblongis.

A. vernalis Sp. pl. p. 759. *α. Fl. Dan. tab. 29. Sv. bot. v. 9. t. 637. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 879.,* et Syst. nat. 1. p. 189. α.,* et Prodr. 1. p. 16. n. 1. α.* All. Auct. p. 35. n. 1921. Re Seg. p. 45. Birol. Acon. 1. p. 184. Coll. Herb. Ped. 1. p. 15. n. 1. Comoll. Prodr. p. 106. Pritz. Anem. revis. p. 5. Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 24. heft. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 100. Koch. Syn. p. 7. Host. Austr. 2. p. 92. Gaud. Helv. 3. p. 481.*

A. sulphurea All. Ped. 2. p. 170. n. 1921. non Linn. ex ipso All.

Pulsatilla vernalis Reich. Exc. 3. p. 733. n. 4660., et Ic.

Fl. Germ. et Helv. 3. p. 18. Ranunc. Anem. t. 59. f. 4660.

Anemone n. 1147. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 61.

Pulsatilla lutea apii hortensis folio Hall. l. c. tab. 21.

P. II. Alpina, Dalechampij Lugd. hist. 1. p. 851. fig.

Ital. *Anemolo primaticcio*.

Perenn. Habui ex Cenisio a Prof. BALBISIO, et a BONJEAN-
NIO, ex Sempronio Italico versus Frassinone a Prof. DE
NOTARIS, ex Valtellina a LAFROSSIO, ex monte Legnone
ad Larium a Prof. MORETTIO, ex Tyroli meridionali in
alpibus vallis Pustria ab Eq. DE HEUFLERO, in alpinis
di Fiemme, et Fassa a FACCHINIO, et denuo in Fassa
a RAINERO, ex districtu Bassanensi in Valsugana in
summis montibus Casa Pinello, Ciola, et Frabort a
SANTORELLIO, et a MONTINIO. Floret Julio, Augusto.

Rhizoma fusiforme, crassum, descendens, vel transversum, nunc breve, nunc longius, et subinde ramosum, ramis gemmiferis, extus nigrescens, lateraliter fibrillosum. Folia radicalia caespitosa, synanthia, breviter petiolata, impari-pinnata, pinnis duabus, vel ternata, foliolis parvis, coriaceis, cuneato-ovatis, subtrifidis, laciniis latiusculis, acutis, vel acutiusculis, integris, aut bi-tridentatis, glabra, aut pilosa præsertim subtus. Petioli glabri, vel pilosi, supra canaliculati, basi dilatati, membranacei, amplexantes. Scapus tores, adscendens,

aut erectus, potius crassus, valde villosus, a semipollice ad palmum longus, raro spithamalis-dodrantalis. Involucrum sessile, triphyllum, villosissimum, plus minus a flore remotum, foliolis verticillatis, fere usque ad basim partitis, laciniis linearibus angustissimis. Pedunculus crassus, valde villosus, a paucis lineis ad duos pollices longus. Perigonium præ plantula grande, tamen magnitudinis variæ, nutans, vel erectum, subhexasepalum, supra album, dorso cærulescens, vel violaceum, et villosum, rarius utrinque coloratum, sepalis ovato-oblongis, obtusis, aut acutiusculis, sub fortiore sole patens, reliquis horis connivens, campaniforme. Stamina perigonio multo breviora, filamentis filiformibus, glabris, antheris oblongis, luteis. Ovaria valde numerosa, lanata. Stili staminibus longiores, plumosi, apice excepto. Stigmata simplicia. Nucula in capitulum collectæ, lanatæ, terminatæ cauda longissima, plumosa, perigonium quidquam superante. Villi plantæ molles, sericei, ex albo lutescentes.

12. *ANEMONE Halleri*: foliis pinnatis, ternatisque, foliolis profunde pinnatifidis, laciniis lanceolatis, acuminatis; sepalis oblongo-lanceolatis.

A. *Halleri* Willd. *Sp. pl.* 2. par. 2. p. 1273. *All. Ped.* 2. p. 170. n. 1922. t. 80. f. 1. mala. *Re Seg.* p. 46.* *Biorol. Acon.* 1. p. 185. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 15. n. 2. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 879., et *Syst. nat.* 1. p. 190., et *Prodr.* 1. p. 16. n. 2. *Pritz. Anem. rev.* p. 10. α. β. tab. 1. 2. *Gaud. Helv.* 3. p. 483.

A. *Hackelii* Koch. *Syn.* p. 8. excl. syn. *Sturm. Reich. Exc.* 3. p. 733. n. 4658. excl. syn. *Sturm., et Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 18. *Ranunc. Anem.* 1. 57. f. 4658.

A. n. 1148. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 62.

Ital. Anemone frastagliato.

Perenn. Habui ex Cenisio a Prof. Ræ. Floret Julio, Augusto.

Rhizoma ut in præcedente. Folia radicalia plus minus longe petiolata, synanthia, impari-pinnata, pinnis duabus, vel tantum ternata, foliolis multo grandioribus, quam in illa, profunde pinnatifidis, aut bi-tripartitis, laciniis lanceolatis, aut lanceolato-linearibus, elongatis, acuminatis, aut acutis, integris, subinde uno alterove dente, vel incisione insculptis, subtus trinerviis. Petioli supra canaliculati, basi brevi tractu valde dilatati. Scapus teres, potius crassus, erectus, vel adscendens, etiam ad dodrantem longus. Involucrum triphyllum,

sessile, verticillatum, foliolis inferne seapum vaginantibus modo petioli lati, reliqua parte profunde partitis, laciis longis, lanceolato-linearibus, acuminatis, integris, vel breviter bi-trifidis. Pedunculus crassus, etiam duos pollices longus. Perigonium magnitudinis ut in præcedente, subhexasepalum, sepalis oblongo-lanceolatis, acutis, vel acutiusculis, purpureo-violaceum. Reliqua ut in illo. Tota plantâ valde villosa, villo mollissimo, sericeo, albo.

13. *ANEMONE Pulsatilla*: foliis bipinnatis, profunde partitis, laciis linearibus; perigonio recta patulo.

A. *Pulsatilla* *Sp. pl.* p. 759. *Smith. Engl. Fl.* 3. p. 35., et *Engl. bot.* v. 1. t. 51. *Hook. Brit. Fl. ed. 2.* p. 262., et in *Fl. Lond. ed. Grav.* v. 4. t. 67. *Fl. Dan.* t. 153. *So. bot.* v. 5. t. 292. *Bull. Pl. ven.* p. 78. t. 49. *Plenck. Ic. pl. med.* 5. p. 58. t. 455. *All. Ped.* 2. p. 171. n. 1923. *Balb. Taur.* p. 87. *Re Seg.* p. 46., et *Tor.* 1. p. 284. *Birol. Acon.* 1. p. 185. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 15. n. 3. *Pollin. Ver.* 2. p. 219. *Nacc. Ven.* 3. p. 44.* *Suffr. Foroj.* p. 150. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 880., et *Syst. nat.* 1. p. 191., et *Prodr.* 1. p. 17. n. 5. *Lois. Desl. Gall.* 1. p. 321.,* *Pritz. Anem. rev.* p. 26. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 46. heft. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 102. *Koch. Syn.* p. 7. *Host. Austr.* 2. p. 93. *Scop. Carn. ed. 2. tom. 1.* p. 386. *Gaud. Helv.* 3. p. 484. n. I., et p. 485. n. II.

A. *pratensis* *Pollin. Ver.* 2. p. 219.

A. *montana* *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 46. heft. *Pritz. Anem. revis.* p. 33. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 103. *Koch. Syn.* p. 7.

A. *Bogenhardiana* *Pritz. Anem. revis.* p. 31.

Pulsatilla pratensis *Nocc. et Balb. Ticin.* 1. p. 257. ex loco, excl. syn.

P. *vulgaris* *Reich. Exc.* 3. p. 733. n. 4657., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 18. *Ranunc. Anem.* t. 54. f. 4657. a. β.

P. *montana* *Reich. Exc.* 3. p. 733. n. 4656., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 18. *Ranunc. Anem.* t. 52. f. 4656.

P. *Bogenhardiana* *Reich. Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 18. *Ranunc. Anem.* t. 53. f. 1657. b.

Anemone n. 1146. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 67.

Pulsatilla *Matth. Valgr.* 1585. tom. 1. p. 655. fig. *Dur. Herb. ed. Rom.* p. 382. fig.

Pulsatilla *Casalp. De pl. lib. 14. cap. 11.* p. 550.

Pulsatile *Calz. Viag. di mont. Bald.* p. 8.

Pulsatilla vulgare, o *Anemone* selvatico del Fuchsio *Pon. Mont. Bald.* p. 10.

Pulsatilla folio crassiore, et majore flore *Zannich. Opusc. posth. p. 51. Segui. Ver. 1. p. 508. n. 1.*

P. purpurea, flore dilutior *Segui. Sup. p. 217.*

P. vulgaris dilutior flore *Clus. Hist. pl. lib. 2. p. 246. fig.*

Ital. Pulsatilla Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 20.

Offic. Pulsatillæ herba Lin. Mat. med. p. 97. u. 276.

Perenn. Habui ex collibus di *Serravalle* prope *Novi* a Prof. DE NOTARIS, Ticino in colliculo *alla Cava*, ubi ego quoque olim observaveram, a PPR. BALSANO-CRIVELLIO, et DE NOTARIS, ex monte *Legnone* ad *Larium* a Prof. COMOLLIO, ex montibus di *Zogno* in districtu Bergomensi a BERGAMASCHIO, Mantuâ al *Bosco Fontana* a BARBIERIO, ex Tyrolî meridionali a *Bolzano* a Currio ab Eq. DE HEUFLERO, ex eodem loco, et a *Roveredo* a FACCHINIO, ex districtu Bassanensi in pratis di *Crespan*, al *Castellaro di Mussolente*, et in collibus d' *Angarano* a MONTINIO, a *Montalon* in *Falsugana* ab Eq. PAROLINIO, ex districtu Forojuliensi a Prof. BRIGNOLIO, Tergesto in pratis *del Carso*, et in *Lippizza* a TOMMASINIO, a BIASOLETTO, a Prof. VISIANIO, et a BERINIO, Fossâ Clodiâ a S. Anna a Prof. NACCARIO. Floret Martio; Aprili, serius in editis.

Rhizoma crassum, fusiforme, vel sursum ramosum, ramis apice gemmiferis, extus nigrescens. Folia radicalia cespitosa, in plantis præcocius, vel locis editis frigidis ortis vix incipientia, cum scapus jam florifer est, postea evolvenda, in plantis serioribus, et locorum calidiorum omnino synanthia, petiolata, bipinnata, foliolis profunde pinnatifidis, lacinii linearibus, integris, vel bi-trifidis, acutis, aut acuminatis, pilisque coadunatis sæpe apiculatis, brevibus, nunc angustissimis, et fore filiformibus, nunc duplo-triplo-quadruplo latioribus; ludunt nudiuscula, vel valde villosa. Petioli longitudinis varii, et subinde longissimi, plus minus villosi, supra canaliculati, basi valde dilatati, membranacei, amplexantes. Scapus teres, erectus, crassus, palmaris-pedalis, et ultra, plerumque villosissimus. Involucrum triphyllum, verticillatum, foliolis profunde partitis, lacinii anguste linearibus, insigniter villosum, plus minus a flore remotum, et semper magis in fructu. Pedunculus crassus, villosus, a semipollice ad quinque pollices longus, erectus, vel subnutans. Perigonium hexasepalum, grande, tamen longitudinis varii, quandoque etiam ultra pollicem longum, variat colore saturate purpureo, violaceo, aut violaceo-cærulescente, sepalis oblongis,

acutiusculis, aut obtusis, rectis, nec apice recurvis, dorso villosis, sub sole meridiano patentibus, horis meridiei proximis erecto-patulis, reliquo tempore conniventibus. Stamina perigonio insigniter breviora, filamentis filiformibus, glabris, externis brevioribus, antheris oblongis, luteis. Ovaria, stili, nuculae ut in tribus novissimis. Herba villo copioso, albo, vel albo-lutescente, molli, sericeo tecta, subinde hic illic, praesertim in foliis, plus minus denudata.

Jam Caspar Bauhinus monuerat in Pin. p. 177. de ludibundo colore floris in hac specie. Addo, florem variare quoque magnitudine, sicuti folia passim ludunt laciniiis numerosioribus, vel paucioribus, tenuibus, vel latoribus, nudioribus, vel villosioribus, a quibus lusi-bus natae sunt nonnullae falsae species, quae fatigant, non docent studiosos. *Anemone pratensis* L. nondum reperta est in Italia; eam possideo ex Holsatia ab Ill. Frölichio; optime autem exhibetur a Reichenbachio in Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. Ranunc. Anem. t. 52. fig. 4655., et t. 53. f. 4655. β minor. Quam plantam sub nomine *Anemone pratensis* saepe accepi ex Italia, semper erat *Anemone Pulsatilla* L.

Usus. Qualitas herbae acris, corrosiva. Laudabatur in morbis oculorum, sed nunc oboleta.

14. *ANEMONE alpina*: foliis radicalibus, involucrique tripinnatis, foliolis oblongis, acute pinnatifido-serratis, basi cuneatis, terminali majore, sepalis senis, oblongis, patentibus.

A. alpina Sp. pl. p. 760. Jacq. Austr. 1. p. 53. tab. 85. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 881. α . β ., et Syst. nat. 1. p. 193. α . β ., et Prodr. 1. p. 17. n. 10. α . γ . All. Ped. 2. p. 171. n. 1925. *A. Re Seg.* p. 46. Birol. Acon. 1. p. 185. pl. fl. albo. Coll. Herb. Ped. 1. p. 16. n. 5. pl. fl. albo. Pollin. Ver. 2. p. 220. α . β . Pritz. Anem. rev. p. 47. α . Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 51. heft. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 108. Koch. Syn. p. 8. Host. Austr. 2. p. 93. pl. fl. albo. Gaud. Helv. 3. p. 486. α .

A. burseriana Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 385.

Pulsatilla alba Reich. Exc. 3. p. 732. n. 4653., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 17. Ranunc. Anem. t. 51. f. 4653. pl. minor.

P. Burseriana Reich. Exc. 3. p. 732. n. 4654., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 17. Ranunc. Anem. t. 51. f. 4654. pl. major.

Anemone n. 149. α . Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 62. Flor. Ital. T. V.

- Pulsatilla* di fior bianco del Lobelio &c. *Pon. Mont. Bald. p.* 188.
- Pulsatilla* flore albo *Zannich. Opusc. posth. p.* 51. *Segui. Ver. 1. p.* 509. *n.* 2.
- P.* flore albo, intus lacteo, exterius nonnihil purpurascens *Zannich. l. c. p.* 59.
- Anemone sylvestris* *Il. Clus. Hist. pl. lib. 2. p.* 245. fig.
- Pulsatilla alba* *Lob. Ic.* 282.
- β foliis radicalibus, involucrique tripinnatis, foliolis numerosissimis, parvis, ovatis, conformibus, supra glabris, pinnatifido-incisis, laciniis lanceolatis.
- Anemone alpina* β *De Cand. Prodr. 1. p.* 17. *All. Ped. 2. p.* 171. *n.* 1925. *B. Ors. in Cap. Opusc. p.* 279. β.* *Ten. Nap. 4. p.* 329. *A. B., et Syll. p.* 263. *n.* 1. *A. B. A. millefoliata Bert. Aman. Ital. p.* 374. *n.* 166. *Bert. fil. It. in Apenn. Bonon. p.* 14.*
- δ perigonio luteo; foliis villosissimis.
- Anemone alpina* γ. ε. ξ. *De Cand. Syst. nat. 1. p.* 194., et *Prodr. 1. p.* 17. *n.* 10. δ. ε. η., et *Fl. Franç. 4. par. 2. p.* 881. γ. *Pollin. Ver. 2. p.* 221. γ. *Pritz. Anem. revis. p.* 48. β. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p.* 109. β. *Koch. Syn. p.* 8. β. *Host. Austr. 2. p.* 93. pl. il. luteo. *Gaud. Helv. 3. p.* 487. β.
- A. sulphurea* *Mant. 1. p.* 78. excl. syn. *Hall.*
- A. apifolia* *Willd. Sp. pl. 2. part. 2. p.* 1270. *Wulf. in Jacq. Misc. 2. p.* 47. t. 4. *Comoll. Prodr. p.* 106.* *Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p.* 385.
- Potentilla Burseriana* *Reich. Exc. 3. p.* 733. *n.* 4654. β., et *l. c. Fl. Germ. et Helv. 3. p.* 17. β. *Ranunc. Anem. t.* 51. f. 4654. β.
- Anemone* *n.* 1149. β. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p.* 63.
- Pulsatilla lutea*, hispidior, alpina *Zannich. Opusc. posth. p.* 59.
- P.* III. alpina *Dalechampij Ludg. hist. 1. p.* 851. fig.
- P. lutea* *J. Bauh. Hist. pl. 3. lib. 30. p.* 411. sine fig.
- Ital. Anemolo d' alpe.*
- Perenn.* Habui ex alpihus Valderiis in *Fallasco* a *BERTERO*, ex *Cenisio* a *BONJEANNIO*, et a *Prof. BALBISIO*, ex *Valtellina* a *Morbegno* a *BARBIERIO*, ex *Corni di Canzo* ad *Larium* a *Prof. COMOLLIO*, et a *RAINERO*, ex vertice *Muffetto* in ditioe *Brixien*si a *ZANTEDESCHIO*, ex districtu *Bergomensi* in valle *Taeggio*, et in sylvis di *Nembrio* a *BERGAMASCHIO*, ex *Baldo* a *Prof. VISIANIO*, ex *Tyroli meridionali* in *Bondone* prope *Tridentum* ab *Eq. DE HAUFLERO*, ex *Tyroli Italico* in adscensu

di Camerloi ab Eq. PETRUCCIO, ex *Portole Vicetinarum*, et ex *Grappa Bassanensium* a MONTINIO, ex montibus Forojuliensibus a Prof. BRIGNOLIO. Varietatem β legi in alpinis Apuanis *Sagro, Tambura*. Filius attulit ex eisdem alpinis inter *il Cavallo*, et *il Pisanino*, et ex Apennino Bononiensi in *Corno alla scala*, et in *Cimone di Caldaia*. Habui ex Apennino Liguriæ orientalis in vertice *di Montenero* a TURIO, ex Umbria *al Sasso borghese* a Prof. OCTAVIANO, ex eodem loco, ex monte *dei tre Vescovi*, ex Piceno in *Vettore*, in *Sibilla alla Corona*, et in monte *Priore* a MARZIALETO, denuo ex *Vettore* a Prof. MAURIO, ex *Vettore, Pizzo di Sivo*, et ex monte Cornu Prætoriorum *alla Grotta delle Rondini* ab ORSINO, ex eodem monte Cornu, et ex monte *Costone* ab Eq. GUSSONIO, ex monte *Orsaio* in Apennino Pontremulensi a Prof. PETRO SAVIO, ex Apennino Lucensi in monte *Fegatesi* a Prof. PUCCINELLIO, et *al Rondinaio* a GIANNINIO, ex Apennino Pistoriensi denuo a Prof. PETRO SAVIO, ex Corsica in monte *Rotondo* a SOLEIROLIO. Varietatem δ accepi ex Pedemontio *alla Madonna delle finestre* ab Eq. Prof. MORISIO, ex Rhætis in valle *di Reno* a RAINERO, ex *Braulio* in *Valtellina*, et ex montibus *di Valsassina* ad Larinum a Prof. COMOLLIO, et ab Eq. DE WELDENIO, ex valle *Taeggio* districtus Bergomensis a BERGAMASCHIO, ex Tyroli Italico in *Fiemme*, et *Fassa* a FACCHINIO, denuo ex *Fassa* a RAINERO, ex districtu Bassanensi a *Montalon* in *Valsugana* a MONTINIO, et ab Eq. PAROLINIO. Floret ab Junio in Augustum.

Rhizoma crassum, longum, fusiforme, vel sursum ramosum, ramis apice gemmiferis, sæpe alte descendens, extus nigrescens. Squamæ latæ, ovato-oblongæ, striatæ, extus valde villosæ, scapum, et folium radicale amplexantes. Folium radicale solitarium, vel duo, modo vix incipiens, dum scapus floret, modo omnino evolutum, et perfecte synanthium, plus minus longe petiolatum, amplum, ambitu triangulari, tripinnatum, petiolo communi superne bis ternato, foliolis oblongo-lanceolatis, pinnatifidis, laciniis acute inciso-serratis, basi angustatis, et cuneatis, impari grandiore, supra saturate virens, et plerumque magis denudatum, subtus pallidius, et magis villosum. Scapus teres, crassus, erectus, vel ascendens, a palmo ad sesquipedem longus. Involucrum triphyllum, verticillatum, statim a basi lata, vaginante solutum in petiolos partiales,

biternatos, foliolis radicalia referentibus, a flore plus minus remotum, et subinde remotissimum. Pedunculus crassus, pollicaris-dodrantalis. Perigonium hexasepalum, lusu polysepalum, pluriseriatum, grande, sub sole patens, album, dorso adpresse villosum, et magis basi, et subinde purpurascens, vel cærulescens. Sepala oblonga, obtusa. Stamina perigonio multo breviora. Nucularum caudæ sæpe longissimæ, divergentes. Reliqua ut in præcedente. Tota herba plus minus villosa, villo albo, molli, sericeo; senio plus minus denudata.

Varietas β differt, quia habet folia radicalia plerumque perfecte synanthia, sæpe plura. Tum ea, tum folia involucri sunt prædita foliolis multo minoribus, circumscriptiōne ovatis, passim numerosioribus, fere semper supra glabris, impari conformi, omnibus pinnatifidis, laciniis parvis, exacte lanceolatis, acutis, vel acuminatis. Herba senior ut plurimum glabrata. Facies certe diversa ab *Anemone alpina* L., et tantum accedens ad exemplaria ejus macriora. Varietas hæc nostra occurrit tantum in Apennino, et in alpihus Apuanis, ubi typus speciei nullimode habetur.

Varietas δ omnino similis typo speciei foliis, et scapo, diversa tantum habitu plerumque villosiore, et perigonio flavo, extus pallidiore.

ATRAGENE.

Lin. Gen. p. 280. Juss. Gen. p. 232. Vent. Tabl. 3. p. 55. Gærtn. De fruct. 1. p. 356. t. 74. Endl. Gen. p. 844. n. 4769.

Clematis species *De Cand. Syst. nat. 1. p. 165., et Prodr. 1. p. 9.*

Perigonium duplex, coloratum, liberum, deciduum, sepalis externis quatuor, grandibus, oblongis, vel oblongo-lanceolatis, internis decem-pluribus, plusquam dimidio brevioribus, spathulatis, obtusis, aut emarginatis, vel linearibus, acutis. Stamina numerosa, perigonio interno breviora, aut æqualia, filamentis linearibus, apice subulatis, antheris bilocularibus, oblongis, erectis, loculis longitudinaliter connectivo adnatis. Ovaria plura, villosa. Stili longitudine staminum,

plumosi. Stigmata simplicia. Nucula ovata, compressa, cauda longa, plumosa, recurva terminata. *Habitus*. Caulis sarmentosus. Folia petiolata, bi-quaternata, rarius simpliciter ternata, foliolis inciso-serratis, vel integris. Pedunculi uniflori, nudi. Perigonium exterius violaceum, album, aut albo-flavescens.

Ord. nat. Ut in *Anemone* p. 442.

1. *ATRAGENE alpina*: foliis biternatis, foliolis oblongo-lanceolatis, inciso-serratis; sepalis internis spathulatis, obtusis.

A. alpina *Sp. pl.* p. 764. *Jacq. Austr.* 3. p. 24. t. 241. *All. Ped.* 1. p. 297. n. 1082. *Re Seg.* p. 46., et *Tor.* 1. p. 285. *Birol. Acon.* 1. p. 186. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 3. n. 1. *Comoll. Prodr.* p. 106.* *Pollin. Ver.* 2. p. 205. *Suffr. Foroj.* p. 150. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 20. heft. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 114. *Koch. Syn.* p. 3. *Reich. Exc.* 3. p. 734. n. 4662., et *Jc. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 19. *Anem. Clem.* t. 60. f. 4662. *Host. Austr.* 2. p. 97. *Gaud. Helv.* 3. p. 496.

A. austriaca *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 387.

Clematis alpina *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 874., et *Syst. nat.* 1. p. 165., et *Prodr.* 1. p. 10. n. 82.

Atragene n. 1145. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 60.

Clematide cruciata alpina *Pon. Mont. Bald.* p. 175. fig.

Clematis alpina Geranifolia *C. B. Prodr.* p. 135. n. 2.

Zannich. Opusc. posth. p. 44. *Segui. Ver.* 1. p. 412. n. 13.

Pluk. Phyt. tab. 84. f. 7.

Ital. Vitalbino de' sassi. Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 30.

Frut. Habui ex Cenisio a BONJEANNIO, et a Prof. BALBISIO, ex Valsassina ad Larium in monte Camisolo a Prof. COMOLLIO, in monte Codeno prope Leco a RAINERO, in Valmeria ab Eq. CESATE, ex Tyroli Italico in sylvis di Fiemme, et Fassa a FACCHINIO, denuo in Fassa a RAINERO, in Cima d' Asta ab Eq. PETRUCCIO, ex Portole Vicetinarum, et ex districtu Bassanensi in sylvis di Vallerana, et Valstagna a MONTINIO, in Grappa ab Eq. PAROLINIO. Floret Junio, Julio.

Radix brevis, ramosa. Caulis angulatus, sarmentosus, lentus, prostratus, vel scandens, glaber, nodosus, in nodis ferens gemmam foliiferam, et floriferam, sæpe purpurascens, modo brevissimus, modo etiam bi-tricubitalis. Squamæ gemmarum ovatae, acutæ, glabrae,

concavæ, imbricatæ, exteriores breviores. Folia opposita, et insuper plerumque gemina in quavis gemina, longe petiolata, biternata, foliolis ovatis, ovato-lanceolatis, vel lanceolatis, acutis, aut acuminatis, grossæ, et inæqualiter inciso-serratis, glabris, vel subpilosiss, subtus pallidioribus, in apice petiolorum partialium sessilibus, deciduis. Petioli foliorum primariorum crassiusculi, dilapsis foliolis demum in cirros tortuosos conversi, ii foliorum gemmaceorum tenuiores. Pedunculi uniflori, nudi, circiter longitudine foliorum, striati, glabri, aut pubescentes, plerumque solitarii. Perigonium pilosum, exterius grande, e sepalis quatuor, oblongis, aut lanceolatis, obtusis cum apiculo, vel acutis, multinerviis, dense ciliatis, violaceis, aut cærulescentibus, raro albis, interius triplo, aut dimidio brevius, e sepalis subduodenis, spathulatis, obtusis, albis, aut ex albo roseis. Stamina filamentis linearibus, canaliculatis, pilosis, albis, antheris longis, pilosis. Ovaria dense villosa. Stili plumosuli, staminibus subæquales. Nuculæ ovatæ, compressæ, villosæ, in capitulum globosum coadunatæ, terminatæ cauda plumosa, longa, tenui, recurvato-flexuosa.

CLEMATIS.

Lin. Gen. p. 280. Juss. Gen. p. 232. Lamck. Ill. 5. t. 497. Vent. Tabl. 3. p. 55. Gærtn. De fruct. 1. p. 353. t. 74. Smith. Engl. Fl. 3. p. 38., et Gram. tab. 17. fig. 213. Endl. Gen. p. 844. n. 4768. De Cand. Syst. nat. 1. p. 131. partim., et Prodr. 1. p. 2. partim.

Clematitis Tourn. Inst. 2. tab. 150.

Perigonium simplex, tetra-octosepalum, coloratum, patens, deciduum. Stamina numerosa, filamentis medio latioribus, terminatis connectivo subulato, antheris bilocularibus, longis, erectis, tota longitudine connectivo adnatis. Ovaria plura. Stili subulati, staminibus æquales, vel longiores. Stigmata simplicia. Nuculæ in capitulum collectæ, ovatæ, compressæ, terminatæ cauda plumosa, vel nuda.

Habitus. Caulis in plerisque fruticosus, sarmentosus, in aliis herbaceus, erectus. Folia opposita,

composita, vel simplicia, in compositis petiolo sæpe cirroso. Flores solitarii, aut paniculati, subinde dioici. Perigonium purpureum, cærulescens, album, flavum, in nonnullis speciebus grate olens, sepalis in æstivatione induplicatis.
Ord. nat. Ut in Anemone p. 442.

* *Scandentes.*

1. *CLEMATIS Viticella*: foliis compositis, foliolis petiolulatis, simplicibus, ternatisque, integerrimis, unisectisve; pedunculis solitariis, unifloris; sepalis obovatis.
- C. *Viticella* *Sp. pl. p. 765. Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr. 1. p. 376., et Fl. Græc. 6. p. 13. t. 516. De Cand. Syst. nat. 1. p. 160. a., et Prodr. 1. p. 9. n. 73. a. Birol. Acon. 1. p. 186. Coll. Herb. Ped. 1. p. 6. n. 13. Lantf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec. 2. tom. 10. p. 291.* Pollin. Ver. 2. p. 207. Ruch. Ven. p. 132. Moric. Ven. 1. p. 235. Nacc. Ven. 3. p. 91. Suffr. Foroj. p. 150. Sav. Bot. Etr. 4. p. 119.* Ten. Nap. 1. p. 307., et Syll. p. 264. n. 4. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 116. Koch. Syn. p. 2. Reich. Exc. 3. p. 735. n. 4668., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 20. Ranunc. Clem. t. 65. f. 4668. Hest. Austr. 2. p. 97. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 388.*
- Clematide secunda *Matt. Valgr. 1585. tom. 2. p. 1007. fig. Calz. Viag. di mont. Bald. p. 11. Pon. Mont. Bald. p. 138.*
- Tertia Flammula *Cæsalp. De pl. lib. 14. cap. 1. p. 543.*
- Clematidis cærulea repens *Zannich. Ist. p. 69. tab. 80.*
- Clematis, sive Flammula, flore cæruleo, scandens *Zannich. Opusc. posth. p. 81.*
- C. altera *Clus. Hist. pl. lib. 1. p. 122. fig. Camer. Epit. p. 696. fig.*
- Ital. *Vitalba pavonazza. Vitalbino. Viticella. Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 74.*
- Frut. Legi Bononiæ in sepibus prope Corticella. Habui Mantuâ ad oras lacus inferioris a BARBIERIO, ex Monfalcone a BERINIO, ex agro Tergestino in sepibus circa Zaulle a TOMMASINIO, ex sepibus Patavinis præsertim prope Stra a MONTINIO, et ab Eq. PAROLINIO, ex agro Ravennati a DALLAGATA, Senogalliâ a SALVATORIO, ex agro Volaterrano ab Eq. Prof. CAJ. SAVIO, ex Apulia in fruticetis maritimis prope Lesina a GASPARRINIO. Floret ab Junio in Augustum.*
- Caulis angulatus, oppositè ramosus, sarmentosus, prostratus, vel scandens, et subinde altissime, sæpe

purpurascens. Folia opposita, petiolata, pinnata, et bipinnata, foliolis ovatis, acuminatis, aut acutis, et etiam obtusis cum seta apicillari, integerrimis, vel una tantum incisione inaculptis, aliis in petiolulo solitariis, aliis in apice petioluli geminis, vel ternatis, indivisis, aut bi-tripartitis. Petioli cirrosi. Pedunculi terminales cauli, ramisque, solitarii, tenues, longi, nudi, vel inferne instructi uno, aut duobus paribus foliorum parvorum, imo interdum exiguorum, quæ sunt opposita, ovata, acuta, integerrima. Perigonium grande, tamen magnitudinis variæ, tetrasepalum, purpureum, sepalis obovatis, obtusis cum apiculo, dorso medio glabris lateribus membranaceis, latis, extus dense pubescentibus. Ovaria villosa. Stili latere interno scabri. Nuculæ villosæ, caudis longiusculis, latere interno scabris, cæterum glabris. Reliqua generis. Flores subinde occurrunt pleni etiam in sepibus Bononiensibus.

2. *CLEMATIS cirrosa*: foliis coriaceis, simplicibus, subcordato-ovatis, grosse serratis, paucis ternatis; pedunculis unifloris, nutantibus; involuero abbreviato, urceolato, bifido, approximato.

C. cirrosa Sp. pl. p. 766. Sibth. et Smith. *Fl. Græc. Prodr.* 1. p. 40., et *Fl. Græc.* 6. p. 14. t. 517. De Cand. *Syst. nat.* 1. p. 162. *α. β.*, et *Prodr.* 1. p. 9. n. 77. *α. β.* Coll. Herb. Ped. 1. p. 6. n. 14. Ten. *Nap.* 1. p. 307.,* et *Syll.* p. 264. n. 5.* Guss. *Pl. rar.* p. 217.,* et *Fl. Sic. prodr.* 2. p. 40.,* et *Sup.* 2. p. 184.,* et *Syn.* 2. p. 36.* Moris. *Sard.* 1. p. 14. *α. Desf. Atl.* 1. p. 432.

Cheiropsis cirrhosa Presl. *Sic.* 1. p. 4.

Clematis altera Bætica Clus. *Hist. pl. lib.* 1. p. 123. fig.

β humilior, foliis tenuioribus, maxima parte ternatis, tripartitisve.

Clematis cirrosa β. γ. Moris. *Sard.* 1. p. 14.*

C. polymorpha Viv. *Fl. Cors. diagn.* p. 9. *α. β.** Ten. *Nap.* 4. p. 331. Guss. *Fl. Sic. prodr.* 2. p. 40. *b.*,* et *Sup.* 2. p. 183.,* et *Syn.* 2. p. 36.*

C. semitriloba De Cand. *Syst. nat.* 1. p. 163., et *Prodr.* 1. p. 9. n. 78. Ten. *Nap.* 4. p. 331., et *Syll.* p. 264. n. 6.

Ital. *Fiammola penzola*.

Frut. Habui ex Calabria ab Pizzo, et a Pazzano ab Eq. Prof. TENONIO, ex Calabria, et Sicilia ab Eq. GUSSONIO, et ex montosis Panormitanis ad sepes a TODARO, ex Corsica a GIROLATA a SOLEIROLIO. Varietatem β accepi ex COSYRA, et ÆGUSA ab Eq. GUSSONIO, ex Sardinia ad sepes ab Eq. Prof. MORISIO, ex Corsica α

Bonifacio a SERAFFINIO, a quo obtinuerat Vivianius, ex insulis Sanguinariis prope Corsicam a SOLZIROLIO. Floret a Septembri in Novembrem.

Caulis angulatus, ramosus, junior pilosulus, senior glaber, sarmentosus, prostratus, vel scandens, et subinde altissime, ætate purpurascens. Folia opposita, coriacea, petiolata, subcordato-ovata, obtusa, aut acuta, inæqualiter, grosse serrata, glabra, supra atro-viridia, nitida, subtus pallidiora, prima prodeuntia quandoque triloba, superiora in ramis junioribus ternata, foliolo medio petiolulato, vel sessili, et quandoque tantum tripartita. Petioli supra canaliculati, demum decidentibus foliis cirrosi, subinde pilosuli. Passim in caule seriore occurrunt gemmæ solitariæ, axillares, ferentes folia simplicia, fasciculata, et pedunculos tenues, unifloros, nutantes, solitarios, vel plures. Involucrum parvum, bifidum, aut bipartitum, urceolatum, segmentis ovatis, integerrimis, adpresse pubescens, nunc situm statim sub flore, nunc paulo infra florem, tuncque flos pedicellatus, pedicello crasso, adpresse villosus, coloris perigonii. Perigonium tetrasepalum, campaniformi-patens, pendulum, ex albo pallide lutescens cum virore aliquo. Sepala oblonga, obtusa cum apiculo, trinervia, supra contra nervos laterales canaliculata, margine late membranacea, extus adpresse pubescentia, et nervis lateralibus magis extantibus veluti bicarinata. Stanina plura, perigonio tertia parte breviora, filamentis ex albo virescentibus, supra canaliculatis, basi angustatis, apice attenuato-subulatis, antheris, pollineque pallentibus. Ovaria villosa. Stili longitudine staminum, adpresse barbati. Nuculæ villosæ, terminatæ cauda longa, valde plumosa, patenti-flexuosa. Villi stilorum, et caudarum albi, sericei.

Varietas β est tantum planta humilior, foliis majori parte ternatis, aut trifidis, modo tenuioribus, modo æque coriaceis ac in typo speciei, subinde profundius incisis. Nondum tamen vidi exemplaria ex Corsica, Sardinia, et Sicilia, quæ transirent in veram *Clematidem calycinam* Ait., quam colo in horto bot. Bononiensi, et quæ habet foliola profunde pinnatifida, luciniis angustis, profunde incisis, fertque involucrum immediate sub perigonio. Nihilo tamen secius non recedo a sententia Cl. Cambessedii, qui in Mém. du Mus. tom. 14. p. 201. recepit plantam Aitoni pro varietate *Clematidis cirrosæ* L., cum hujusmodi lusum contingat etiam in *Clematide Flammula* L.

3. *CLEMATIS Vitalba*: caule angulato; foliis pinnatis, foliolis ovato-acuminatis, subcordatis, integerrimis, grosse serratis; panicula brachiata, foliis subbrevisiore.
- C. Vitalba* *Sp. pl.* p. 766. *Smith. Engl. Fl.* 3. p. 39., et *Engl. bot.* v. 2. t. 612. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 262. *Curt. Lond. ed. Grav.* v. 1. tab. 70. *Jacq. Austr.* 4. p. 4. tab. 308. *Plenck. Ic. pl. med.* 5. p. 51. t. 442. *Bull. Pl. ven.* p. 99. tab. 89. *De Candl. Franç.* 4. par. 2. p. 872. *a. β.*, et *Syst. nat.* 1. p. 139. *a. β.*, et *Prodr.* 1. p. 3. *a. β.* *All. Ped.* 1. p. 297. n. 1079. *Balb. Taur.* p. 88. *Re Seg.* p. 46., et *Tor.* 1. p. 286. *Biol. Acon.* 1. p. 186. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 5. n. 6. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 258., et 391. *Comoll. Prodr.* p. 107. *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec.* 2. tom. 10. p. 291. *Pollin. Ver.* 2. p. 207. *Ruching. Ven.* p. 132. *Moric. Ven.* p. 235. *Nocc. Ven.* 3. p. 90.* *Suffr. Foroj.* p. 150. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 281. *Sav. Pis.* 2. p. 20., et *Bot. Etr.* 4. p. 118. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 181. *Ten. Nap.* 1. p. 309. *A. B.*, et *Syll.* p. 264. n. 3. *A. B. Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 230. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 39., et *Sup.* 2. p. 183., et *Syn.* 2. p. 35. *Presl. Sic.* 1. p. 4. *Moris. Sard.* 1. p. 13. *a. β.* *Moris.*, et *De Not. Capr.* p. 10. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 117. *Koch. Syn.* p. 2. *Reich. Exc.* 3. p. 735. n. 4667., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 19. *Ran. Clem.* t. 64. f. 4667. *Host. Austr.* 2. p. 98. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 388. *Gaud. Helv.* 3. p. 497. *a. β.*
- C. n.* 1142. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 59.
- Clematide terza Matth. Valgr.* 1585. tom. 2. p. 1008. fig. *Dur. Herb. ed. Rom.* p. 139. fig. mala.
- Vitalba Casalp. De pl. lib.* 14. cap. 1. p. 543. *Dod. Pempt.* p. 404. fig.
- Athragene Ang. Sempl.* p. 81.
- Clematide III. del Matthioli, ovvero Vito silvestro del Dalecampio Pon. Mont. Bald.* p. 152.
- Clematis sylvestris, latifolia Cup. Hort. Cath.* p. 52. *Zannich. Ist.* p. 69. *Segui. Ver.* 1. p. 411. n. 1.
- C. latifolia dentata Cup. l. c.* p. 52.
- Vitis alba Cast. Hort. Mess.* p. 47.
- V. nigra Fuchs. Hist. pl.* p. 97. fig.
- Clematis tertia Camer. Epit.* p. 697. fig.
- Ital. Clematide. Fior di minuè. Viorna. Vitalba Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 74.
- Frut. Frequens in sepibus, et in sylvis Italiz. Legi Sarzanæ, Bononiæ. Habui ex agro Nicmensi ab Eq. Prof. MORISIO, ex Tyroli Italico in Fiemme a FACCHINIO,*

Fossâ Clodiâ a Prof. NACCARIO, ex Hetruria a *Bagno*, et a *Colle in Val d'Elsa* a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTO. Floret Junio, Julio.

Caulis angulatus, oppositè ramosus, sarmentosus, prostratus, vel scandens, et subinde altissime, pubescens, in aprico purpurascens. Folia opposita, petiolata, impari-pinnata, pinnis duabus, distantibus, et interdum pinnâ unica, foliolis grandibus, ovatis, acuminatis, sæpe cordatis, vel subcordatis, petiolulatis, integerrimis, aut grosse, et plus minus serratis, vel una, alterave serratura tantum incisâ, tri-quinquenerviis, venosisque, glabris, aut subpilosis præsertim in nervis. Petioli pubescentes, supra canaliculati, demum cirrosi. Paniculæ solitariæ, terminales, et axillares, folio subbreviares, pedunculatæ, brachiatae, subcorymbosæ. Pedunculi, et pedicelli pubescentes. Folia floralia, sive bractæ sub ramificationibus oppositæ, ovatæ, acutæ, aut obtusæ, parvæ, pilosæ. Flores fragantes. Perigonium parvum, tetrasepalum, album, vel ex albo lutescens, extus pubescens, sepalis oblongis, obtusis. Stamina perigonio paulo breviora. Nuculæ terminatæ cauda longa, plumosa, flexuosa. Reliqua generis. Herbæ turiones edules.

4. *CLEMATIS Flammula*: caule tereti, striato; foliis compositis, pinnis ternatis, simplicibusque, foliolis ovatis, oblonge lanceolatis, integerrimis, incisisque; paniculis brachiatis.

C. *Flammula* Sp. pl. p. 766. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 873., et Syst. nat. 1. p. 134. α. β., et Prodr. 1. p. 2. n. 2. α. β. Coll. Herb. Ped. 1. p. 4. n. 2. Bert. Amæn. Ital. p. 236. n. 25. α. Sav. Pis. 2. p. 21., et Bot. Etr. 4. p. 118. Sebast. et Maur. Fl. Rom. Prodr. p. 182.* Ten. Syll. p. 264. n. 2. B.* Guss. Syn. 2. p. 35. c. Moris. Sard. 1. p. 11. α.* Moris., et De Not. Capr. p. 9. Desf. Atl. 1. p. 433. Reich. Exc. 3. p. 735. n. 4666. α. γ., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 19. Ran. Clem. t. 62. f. 4666. α. rotundifolia, et t. 63. f. 4666. β. vulgaris. Gaud. Helv. 3. p. 498.

C. *maritima* All. Ped. 1. p. 297. n. 1081., et Auct. p. 20.

C. *fragrans* Ten. Nap. 1. p. 308. t. 48.*

C. n. 2. All. Stirp. Nicæens. p. 122.

C. n. 1143. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 59.

Viticella Cæsalp. De pl. lib. 14. cap. 1. p. 543.

Clematis, sive Flammula repens Ambros. Phyt. 1. p. 165.

Clematis scandens virens, Asparagi radice, foliis rotundioribus, floribus albis umbellatis, semine brevi, et ferme rhomboideo *Mich. Cat. hort. Flor. p. 27. n. 2.*

Clematis altera urens, vulgi *Flammula* *Lob. Ic. 617.*

β foliolis parvis, ovatis, lanceolatisve, integerrimis, incisisque.

Clematis Flammula *Bert. Aman. Ital. p. 236. n. 25. β. Ten. Nap. 1. p. 309. A. B., et Syll. p. 264. n. 2. C. Reich. Exc. 3. p. 735. n. 4666. β., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 19. Ran. Clem. t. 63. f. 4666. γ. δ. De Cand. Syst. nat. 1. p. 134. γ., et Prodr. 1. p. 2. n. 2. γ.*

C. Flammula var. *maritima* *Moric. Ven. 1. p. 234.*

C. maritima *Sp. pl. p. 767. Ruch. Ven. p. 133.* Nacc. Ven. 3. p. 90.*

C. caespitosa *Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 389. Suffr. Foroj. p. 150.*

Clematide *Ang. Sempl. p. 301.*

Clematis maritima repens *C. B. Prodr. p. 135. n. 1. Donat. Tratt. de' sempl. p. 34.*

Clematitis maritima repens *Zannich. Ist. p. 68. t. 129. ostendens transitum in speciem.*

δ. foliolis, foliolorumve segmentis longis, lanceolatis, linearibusve, acuminatis, impari valde elongato.

Clematis angustifolia *Jacq. Enum. p. 310., nec alius loci, vel auctoris.*

Ital. Fiammola. Flammola. Fiammola. Vitalba piccola. Viticcio *Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 74.*

Frut. Frequens in sepibus Liguriæ, et Hetruriæ. Legi Sarzanæ, et in litore Lunensi alla *Marinella*, et in pineto Ravennati. Habui ex Liguria orientali in sepibus di *Rapallo*, et in monte *Portofino* ad macerias a *Turnio*, ex maritimis Nicænsibus ab *Eq. Prof. MORISIO*, ex *Civita di Penna* ab *ORSINO*, ex Hetruria in monte *Carli*, et in sylva Pisana a *Prof. PETRO SAVIO*, a *Livorno*, et a *S. Casciano* a *Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO*, ex sylvaticis litoris Romani, et Romæ in amphitheatro Flavio a *Prof. MAURIO*, ex agro Formiano a *FIORINIA-MAZZANTIA*, ex sepibus circa Neapolim ab *Eq. Prof. TENORIO*, ex insula *Montecristo* a *Prof. GIULIO*. Varietatem β legi in pineto Ravennati, et Venetiis al *Lido*. Habui ex litore marino prope *Monfalcone* a *TOMMASINIO*, ex eodem loco, et circa Duinum a *BERINIO*, et *BRUMATTIO*, ex arenosis Tergestinis a *BIASOLETTO*, ex viciniis Venetiarum al *Lido*, *Malamocco*, et *Cavallino* a *RUCHINGERO*, iterum ex ora Veneta, et *Fossà*

Clodiā a MONTINIO, ex agro Maceratensi secus flumen *Chienti* ab Eq. NARDUCCIO, ex Gargano in Apulia a GASPARRINIO. Varietatem δ accepi ex litore Ravennati, et Ariminensi, et ex Hetruria a *Campiglia in Maremma* a Prof. ANTONIO TARGIONIO-TOZZETTIO. Floret Junio, Julio.

Caulis teres, striatus, sulcatus, opposite ramosus, sarmentosus, prostratus, vel scandens, et subinde alte. Folia opposita, petiolata, composita, pinnis remotis, nunc petiolulis omnibus folio ternato instructis, nunc aliis folio ternato, vel geminato, aliis folio simplici terminatis, foliolis subcoriaceis, ovatis, obtusis, aut acutis, vel ovato-lanceolatis, acuminatis, magnitudine variis, integerrimis, vel bi-trifidis. Petioli teretes, striati, supra leviter canaliculati, exquisite cirrosi. Panicula sita in parte superiore caulis, et ramorum, terminales, et axillares, solitariae, vel basi auctae una, alterave panicula multo brevior, plus minus longe pedunculata, hinc modo folio longiores, modo breviores, brachiatae, subcorymbosae. Pedunculi striati. Sub ramificationibus inferioribus paniculae saepe folia floralia opposita, simplicia, petiolata, ovata, ovato-lanceolata, aut lanceolata, obtusa, vel retusa, aut acuta; sub ramificationibus superioribus bractea exigua, lineares, sessiles; subinde in tota panicula eadem bractea lineares, exigua. Flores fragrant. Perigonium parvum, tetrasepalum, album, extus pubescens, sepalis obverse lanceolatis, obtusis, trinerviis. Stamina perigonio breviora. Nucula perfecta subrotunda, tenuiter pubescentes, terminata cauda plumosa, longa, flexuosa. Planta glabra, subinde hic illic pilis raris adspersa.

Varietas β differt foliolis parvis, imo saepe exiguis, lanceolatis, rarius ovatis, plerumque bi-tripartitis, acutis, impari paulo longiore. Figura Zannichellii ad hanc varietatem superius allata ostendit foliola exigua, ovata, et sistit transitum in speciem.

Varietas δ habet foliola longa, lanceolata, vel linearia, acuminata, impari valde elongato, subinde plusquam pollicari. Diversissima a *Clematide angustifolia* De Cand., et Reich., quae est planta Sibirica, vel Caucasica, ne ullo pacto provenit in oris maris Adriatici; eam colo in horto bot. Bononiensi e seminibus missis ab horto bot. Berolinensi.

Herba hujus speciei acris, caustica, infensa. Curavi mulierem, quae turiones ejus pro turionibus *Clematidis Vitalbae* L. comedit, et correpta fuit febris cum exanthemate

forma variolarum, quo morbo tamen cito convaluit usu purgantium, et refrigerantium.

**** *Caule erecto.***

5. *CLEMATIS recta*: caule tereti striato; foliis inferioribus simplicibus, ovatis, superioribus pinnatis, foliolis ovato-lanceolatis, integerrimis omnibus; panicula terminali, corymbosa.
- C. recta* *Sp. pl.* p. 767. *Moric. Ven.* 1. p. 234. *Nacc. Ven.* 3. p. 89. *Suffr. Foroj.* p. 150. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 119. *Koch. Syn.* p. 2. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 387. *Gaud. Helv.* 3. p. 499. *α.*
- C. erecta* *Jaeg. Austr.* 3. p. 49. t. 291. *Plenck. Ic. pl. med.* 5. p. 51. t. 441. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 873., et *Syst. nat.* 1. p. 133. *α.*, et *Prodr.* 1. p. 2. n. 1. *α.* *All. Ped.* 1. p. 296. n. 1078. *Balb. Taur.* p. 88. *Re Seg.* p. 46., et *Tor.* 1. p. 286. *Birol. Acon.* 1. p. 186. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 3. n. 1. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 259., et 391. *Cornoll. Prodr.* p. 107. *Barb. Agg.* p. 36.* *Pollin. Ver.* 2. p. 206. *Ruch. Ven.* p. 133. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 281* *Ten. Nap.* 1. p. 310., et *Syll.* p. 264. n. 1. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 8. heft. *Reich. Exc.* 3. p. 734. n. 4664. *α.*, et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 19. *Ran. Clem.* t. 61. f. 4664. *Host. Austr.* 2. p. 99.
- C. Flammula* *All. Ped.* 1. p. 297. n. 1080. ex *Auct.* p. 20. *C. n.* 1144. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 60.
- Flammula* *Matth. Valgr.* 1585. tom. 2. p. 1009. fig.
- Flammula Jovis* *Calz. Viag. di mont. Bald.* p. 8.
- Flammula secunda* del Dodoneo, ovvero *Clematide retta* *Pon. Mont. Bald.* p. 12.
- Clematidis sive Flammula surrecta alba* *Zannich. Ist.* p. 68. t. 159. *Segui. Ver.* 1. p. 411. n. 2.
- Flammula altera* *Dod. Pempt.* p. 405. fig.
- F. Matthioli* *Clus. Hist. pl. lib.* 1. p. 124. fig.
- Ital. Fiammola.* *Vitalbino Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 74.
- Perenn.* Legi in Liguria orientali in montibus *del Bracco*. Habui ex Liguria occidua in valle d' *Uria* a Prof. DE NOTARIS, ex nemoribus ad Ticinum prope *Buffalora* a PPFR. BALSAMO-CRIVELLIO, et DE NOTARIS, ex montibus Bergomensibus a RAINERO, ex sepibus Mantuanis a BARNIERIO, ex viciniis Tridenti a FACCHINIO, ex agro Tergestino in adscensu montis *Spaccato* a TOMMASINIO, ex sepibus prope Patavium ab Eq. PAROLINIO, ex Petra pertusa secus fluvium a FEDERICIO, ex Piceno ad

Asculum ab *Onsino*, et in *Vettore* a *MARZIALETTO*. Floret Junio, Julio. Vidi quoque florentem Septembri. Caulis teres, fistulosus, erectus, striatus, simplex, vel superne ramosus, ab uno ad quatuor pedes longus. Folia opposita, breviter petiolata, inna simplicia, grandia, cordato-ovata, acuta, vel acuminata, reliqua impari-pinnata, pinnis duabus-tribus, foliolis petiolulatis, ovatis, aut ovato-lanceolatis, acuminatis, basi rotundatis, vel subcordatis. Tamen folia, quam foliola integerrima, supra læte, aut saturate viridia, glabra, subtus tri-quinquenervia, et reticulato-venosa, glaucescentia, subpilosa. Panicula terminalis, modo solitaria, modo cum axillaribus proximis, brachiata, corymbosa, pedunculata, pedunculo crasso, striato. Bractæ subramificationibus inferioribus parvæ, lanceolatæ, vel lineares; sub reliquis ramificationibus subnullæ. Perigonium tetrasepalum, ut plurimum paulo grandius quam in præcedente, album, vel dorso lutescens, sepalis obversæ lanceolatis, obtusis, trinerviis, subtus prope marginem pubescentibus. Nuculæ terminatæ caudâ longa, plumosa. Herba acris.

THALICTRUM.

Lin. Gen. p. 280. *Tourn. Inst. 2. t.* 143. *Juss. Gen. p.* 232. *Lamck. Ill. 5. t.* 497. *Vent. Tabl. 3. p.* 56. *Cært. De fruct. 1. p.* 355. *t.* 74. *Smith. Engl. Fl. 3. p.* 40. *De Cand. Syst. nat. 1. p.* 168., et *Prodr. 1. p.* 11. *Endlich. Gen. p.* 845. *n.* 4772.

Perigonium liberum, parvum, tetra-pentasepalum, concavum, coloratum, valde caducum. Stamina numerosa, patenti-effusa, vel erecta, filamentis plerumque superne dilatatis, antheris longis, bilocularibus, margine dehiscentibus. Ovaria paucaplura, raro stilosa. Stigmata plerumque sessilia, oblonga, tumida, erecta, vel obliqua, pubescentia. Nuculæ ecaudatæ aut triquetræ, angulis alatis, aut sulcatæ, aut inflatæ; in aliis speciebus sessiles, in aliis pedicellatæ.

Habitus. Plantæ perennes. Radix flavescens, rhizomate brevi, fibrosa, vel grumosa, rarissime late repens. Caulis erectus, ramosus, sæpe fistulosus.

Folia alterna, passim decomposita, et supradecomposita, foliolis vel obtuse lobatis, vel acute incisis, vel integris, in paucis simplicia. Flores paniculati, corymbosi, aut racemosi. Perigonium albidum, albo-virens, aureum, aut flavum. Sepala æstivantia imbricata. Nonnullæ species dioicæ, vel polygamæ.

Ord. nat. Ut in *Anemone* p. 442.

* *Nuculis sulcatis, apteris.*

1. *THALICTRUM alpinum*: glabrum; foliis pinnatis, bipinnatisque, foliolis cordato-subrotundis, obtuse lobato-dentatis; caule nudo; racemo terminali, simplici.

T. alpinum *Sp. pl.* p. 767. *Smith. Engl. Fl.* 3. p. 40., et *Engl. bot.* v. 4. t. 262. *Hook. Brit. Fl. ed. 2.* p. 261. * *Fl. Dan. tab.* 11. *Sv. bot.* v. 10. t. 655. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 874., * et *Syst. nat.* 1. p. 175., * et *Prodr.* 1. p. 12. n. 17. * *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 51. heft. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 123. *Koch. Syn.* p. 3. *Reich. Exc.* 3. p. 727. n. 4625., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 13. *Ran. Anem.* t. 26. f. 4625. *Host. Austr.* 2. p. 100.

T. minimum; montanum; atrorubens, foliis splendidibus *Boerh. In. alt. tom.* 1. p. 44. tab. cum figura incompleta, pessima.

T. minimum præcox foliis splendidibus *Moris. Oxon. sect. 9. tab.* 20. f. 14.

Ital. *Pigamo alpino.*

Perenn. Habui ex *Braulio* in *Valtellina alla seconda cantoniera* a *RAINERO*, ex *Tyrol* Italico in pratis paludosis della *Seiseralpe* a *FACCHINIO*. Floret Junio, Julio.

Radix gracilis, transversa, simplex, vel subramosa. Folia omnia radicalia, cæspitosa, petiolata, impari-pinnata, vel bipinnata, et subinde ternata, aut biternata, foliolis parvis, brevissime petiolulatis, subrotundis, obtuse lobato-dentatis, supra convexulis, viridibus, nitidis, subtus glaucis, et nervoso-venosis, basi nunc cordatis, nunc subcuneatis. Petioli tenues, basi dilatati, interstincti squamis late ovatis, striatis, amplexantibus. Caulis tenuis, simplex, erectus, vel adscendens, bisexpollicaris, nudus, raro inferne monophyllus. Racemus terminalis, simplex, laxiflorus, floribus cernuis. Pedunculi inferiores inter se remotiores, et subinde imus remotissimus, situs fere in basi caulis, cæteris

longior. Bractea oblonga sub quovis pedunculo, illoque brevior. Sepala quatuor, lanceolata, acuta, concavo-canaliculata; albida, vel ex albido purpurantia. Anthera aristata. Nucula plerumque tres, cernua, glabra, terminata stigmate persistente, conico, pubescente, immatura laeves, matura sulcata. Planta pusilla, glaberrima.

2. *THALICTRUM foetidum*: pubescenti-viscidum; caule flexuoso; foliis supradecompositis, foliolis exiguis, subrotundis, obtuse lobato-dentatis; panicula ramosa, patente; nuculis striatis.

T. foetidum Sp. pl. p. 768. Lamck. Ill. 5. t. 497. f. 3. Waldst. et Kit. Pl. rar. Hung. 2. p. 190. t. 174. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 875., et Syst. nat. 1. p. 176., et Prodr. 1. p. 13. n. 18. All. Ped. 1. p. 295. n. 1073. Re Seg. p. 46.* Birol. Acon. 1. p. 187. Coll. Herb. Ped. 1. p. 8. n. 7. Comoll. Prodr. p. 107.* Suffr. Foroj. p. 150. Guss. Pl. rar. p. 218.* Tsn. Nap. 4. p. 333., et Syll. p. 265. n. 4. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 124. Koch. Syn. p. 3. Reich. Exo. 3. p. 727. n. 4626., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 14. Ran. Anem. t. 26. f. 4626. Host. Austr. 2. p. 101. Gaud. Helv. 3. p. 501. T. n. 1140. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 58.

T. minimum foetidissimum C. B. Prodr. p. 147. n. 2.

T. minus foetidissimum Moris. Oxon. sect. 9. tab. 20. fig. 13. Ital. Pigamo puzzolente.

Perenn. Habui ex Pedemontio in valle Pisii a BERTERO, in viciniis Segusii a Prof. RZ, in parvo Cenisio a BONJEANNIO, ex Valtellina in rupibus prope Bormio a RAINERO, in Braulio alla Sponda lunga a Prof. COMOLLIO, ex Tyroli Italico in Fassa supra Campitello, in viciniis di Penia, et in Padon Italiano a FACCHINIO, ex Prätuttiis alla Maiella in valle dell' Inferno ab Eq. GUSONIO. Floret in demissis Majo, Junio, in editis serius.

Rhizoma transversum, crassum, densissime fibrosum, fibris crassiusculis. Caulis angulatus, flexuosus, inferne crebre foliosus, simplex, vel ramosus, spithamalis-pedalis, et etiam paulo ultra, statim ab radice, et infra folia tectus squamis aphyllis, acuminatis, vaginantis, striatis. Folia tri-quadripinnata, ambitu triangularia, petiolata, foliolis exiguis, obtusiusculis, carnosulis, subtus glaucis, et nervoso-venosis, aliis integerrimis, aliis bi-tridentatis, aliis trilobis, lobis integris, vel subdentatis. Petioli basi longo tractu dilatati, et vaginantes, in foliis superioribus successive breviores, in supremis subinde vix ulli. Panicula terminalis, ramosa, Flor. Ital. T. V.

laxa, fructifera patentior, pedicellis magis elongatis. Pedicelli longiusculi, tenues, uniflori, nudi. Sub ramis primariis inferioribus paniculæ folium florale parvum, sessile, pinnatum, foliolis tenuibus, laciniatis, sub ramis successivis folium bi-trifidum, sub supremis simplex, exiguum. Sepala quatuor, oblonga, obtusa, concava, purpurantia, vel luteola, dorso pubescentia. Antheræ longæ, latæ, mucronulatæ. Stigma crassum, oblongum, pubescens, supra canaliculatum. Nuculæ quinque-decem, sulcatæ, puberulæ, stigmatē diu persistente terminatæ. Tota planta cinereo-pubescent, pilis aliis glandula terminatis, aliis eglandulosis, viscida, fœtidissima.

Thalictrum pubescens Schleich. juxta emplar, quod habui ab ipso Schleichero, est planta gaudens caule altiore, et foliolis grandioribus, sed mihi videtur lusus *Thalictri fœtidi* L. in statu luxuriante.

3. *Thalictrum minus*: glabrum; caule erecto, angulato, striato; foliis supradecompositis, foliolis subrotundis, inferiorum obtuse, superiorum acute lobato-dentatis, auriculis petiolorum membranaceis, apice subfimbriatis; panicula patente, ramis alternis, floribus cornuis; nuculis sulcatis, utrinque angustatis, erectis.

T. minus Sp. pl. p. 769. Smith. Engl. Fl. 3. p. 41., et Engl. bot. v. 1. t. 11. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 261. Fl. Dan. t. 732. Jacq. Austr. 5. p. 9. t. 419. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 875., et Syst. nat. 1. p. 178., et Prodr. 1. p. 13. n. 23. All. Ped. 1. p. 295. n. 1074. Balb. Taur. p. 88. Re Seg. p. 46., et Tor. 1. p. 287. Birol. Acon. 1. p. 187. Coll. Herb. Ped. 1. p. 9. n. 10. Comoll. Prodr. p. 107. Barb. Agg. p. 36. Pollin. Ver. 2. p. 209. Bert. Pl. Gen. p. 70., et Aman. Ital. p. 157. n. 151., et p. 375. n. 167. Ten. Nap. 4. p. 332. A., et Syll. p. 265. n. 6., Moris. Sard. 1. p. 16. Koch. Syn. p. 4. β. Reich. Exc. 3. p. 728. n. 4627. α., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 14. Ran. Anem. t. 27. f. 4627. α. β. Host. Austr. 2. p. 100. Gaud. Helv. 3. p. 504. I.

T. collinum Koch. Syn. p. 4.

T. flexuosum Reich. Exc. 3. p. 728. n. 4628., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 14. Ranunc. Anem. t. 28. f. 4628. pl. viridior.

T. u. 1139. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 57.

Ruta sylvestris altera Casalp. De pl. lib. 9. cap. 2. p. 371.

Thalictrum minus Segui. Ver. 1. p. 476. n. 4. Dod. Pempt. p. 58. fig.

T. alpinum minus, saxatile, rutæ folio, staminibus luteis *Tit. It. in calc. hort. Mauroc. p. 19.* non numer. *Segui. Ver. 1. p. 476. n. 5. tab. 11. ex ipso Segui.* in *Sup. p. 307.*

Ital. Erba scopaja Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 225.

Perenn. Legi Genus al Lagazzo, et in monte Fasce, in Lunensium lapidicinis di Torano, et Misseia, unde habui quoque a CLÉNICO, et in alpihus Apnanis humilioribus ad scaturigines Frigidæ, ex quo loco misit quoque CELIUS. Accepi ex agro Nicœnsi, et ex saxosis ad thermas Valderias a BERTERO, ex parvo Cenisis a BONJEANNIO, ex pratis prope Domodossola a Prof. DE NOTARIS, ex districtu Comensi in colle supra Angera a PPrr. BALSAMO-CRIVELIO, et DE NOTARIS, ex Tyroli Italico in pratis di Fiemme, et Fassa a FAGGINIO, ex districtu Bassanensi in collibus di Roman a MONTINIO, ex agro Tergestino in rupestribus circa S. Croce, et Montebello a TOMMASINIO, ex Ducatu Lucensi prope il Rondinaio a GIANNINIO, ex montibus di Castellamare a FAITO ab Eq. GUSSONIO. Floret Junio, Julio.

*Rhizoma transversum, potius crassum, lateraliter fibrosum, sursum gemmiferum, gemmis caulem successive ferentibus. Caulis angulatus, erectus, præsertim inferne flexuosus, simplex, vel superne ramosus, basi squamatus, a spithama ad tres pedes longus, interdum purpurascens. Folia inferiora ambitu triangularia, potius grandia, tri-quadripinnata, foliolis subrotundis, obtuse lobato-dentatis, parvis, tamen multo grandioribus quam in *Thalictro fætido* L., superiora successive minora, brevius petiolata, supremaque sessilia, foliolis exiguis, acutis, et parvis dentatis, et subinde integerrimis. Ceterum omnium foliola subtus intensius glauca, et nervoso-venosa, alia cordata, alia basi rotundata, vel cuneata. Petioli supra canaliculati, dorso nervati, basi dilatati, amplexicaules, ancti utrinque auricula membranacea, sæpe apice lacero-fimbriata. In basi ramificationum petioli nunc adsunt stipellæ exiguæ, membranaceæ, albæ, nunc desunt, idque vel in eodem individuo. Panicula terminalis, laxa, ramosa, patens. Folia floralia, sive bractem sub ramis primariis inferioribus paniculæ referunt folium caulinum supremum, licet minus; reliquæ bractem sunt folium exiguum tenuiter laciniatum. Flores cernui, in anthesi approximati, in fructu, elongatis pedicellis, laxati. Sepala*

quatuor, ovato-lanceolata, acuta, concava, albida, vel ex albido purpurantia, glabra. Antherae luteae, apiculatae. Stigmata oblonga, subcordata, pubescentia. Nuculi erecto-patulae, sulcatae, glabrae, utrinque angustatae, sed magis apice. Tota planta glabra, et viridiglaucula, glaucescunt nunc intensiore, nunc minore, et subinde in facie superiore foliorum nulla, aut fere nulla.

4. *THALICTRUM majus*: caule angulato, fistuloso; foliis decompositis, foliolis subrotundis, oblongisve, subtrifidis, subtus glaucis; panicula patente, laxa, ramis pluribus fasciculatis, supremis umbellatis; nuculis utrinque angustatis.

T. majus Jacq. *Austr.* 5. p. 9. t. 420: *Murr. Syst. veg.* ed. 14. p. 513. n. 7. *Smith. Engl. Fl.* 3. p. 42., et *Engl. bot.* v. 9. t. 611. *Hook. Brit. Fl.* ed. 2. p. 261. *De Cand. Franc.* 4. par. 2. p. 876., et *Syst. nat.* 1. p. 179., et *Prodr.* 1. p. 13. n. 28. *Reich. Exc.* 3. p. 728. n. 4629., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 14. *Ran. Anem.* t. 30. f. 4629. *Host. Austr.* 2. p. 100. *Gaud. Helv.* 3. p. 508.

T. magnum *Dod. Pempt.* p. 58. fig.

T. sive T. majus *Ger. em.* p. 1251. fig. ex *Dod.*

Ruta pratensis herbariorum *Lob. Ic.* 2. p. 56. fig. ex *Dod. Ital. Pigamo ombrellato.*

Perenn. Habui ex Pedemontio ad Albam Pompejam secunda Tanarum a BERTERO, ex Tyroli Italico in *Fiemme* ad levam Avisii contra *Castello* a FACCHINIO, ex districtu Bassanensi supra *Telve* in *Valsugana*, et in pratis collinis d' *Angarano* a MONTINIO. Floret Junio, Julio.

Caulis precedente altior, etiam orgyalis, erectus, angulatus, fistulosus, viridis. Folia inferiore tripinnata, petiolata, foliolis potius grandibus, subrotundis, bi-trilobis, lobis cum apiculo in medio, nunc integerrimis, nunc paucidentatis; successiva bipinnata, brevius petiolata, supremaque sessilia, foliolis e subrotundo oblongis, vel omnino oblongis, simili modo lobatis, aut apice acute, et grosse dentatis, dentibus duobus, tribus, quinque, subinde aristatis. Caeterum foliola omnia supra viridia, subtus glauca, alia cordata, aut subcordata, alia cuneata. Petioli basi vix dilatati, expansione margine anguste membranacea, supra canaliculati. Panicula terminalis, ampla, laxa, effusa, ramis aliis alternis, pluribus ex inferioribus saepe fasciculatis, terminalibus plerumque umbellatis. Folia floralia ima foliis caulinis supremis similia, sed minora, successiva simplicia, laciniata, aut lanceolata, petiolata, integerrima,

acuminata, et etiam acuminato-aristata; reliqua exigua, ramentacea, vel nullâ. Flores cernui, longiuscule pedicellati, et magis adhuc in fructu. Sepala quatuor, ovata, acuta, concava, albida, vel dorso viridula. Antheræ longæ, luteæ, apiculatæ. Nuculæ ovato-oblongæ, utrinque angustatæ, sulcatæ, glabræ, erecto-patulæ. Totâ planta glabra.

Hæc species ludit nunc foliolis minoribus ut in allata figura Jacquinii, nunc grandioribus, ut in Engl. bot., et apud Reichenbachium, imo gaudet etiam foliis ut in figura Dodonæi. Quare omnes hæ figuræ sunt bonæ, si aptentur individuis propriis.

5. *THALICTRUM elatum*: caule teretiusculo, striato; foliis decompositis, foliolis subrotundis, lobato-pluridentatis; panicula laxa, floribus erectis; nuculis basi crassioribus. *T. elatum* Jacq. Hort. Vind. 3. p. 49. t. 95. Murr. Syst. veg. ed. 14. p. 513. n. 9. De Cand. Syst. nat. 1. p. 178. α., et Prodr. 1. p. 13. n. 27. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 133. Koch. Syn. p. 5. Reich. Exc. 3. p. 729. n. 4633., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 45. Ran. Anem. t. 35. f. 4633. Host. Austr. 2. p. 102.

Ital. Pigamo gigante.

Perenn. Habui ex agro Cuneensi in Pedemontio a BER-TERO, ex Tyroli meridionali inter Bolzano, et Merano, in viciniis Tridenti alla Vela, in Fiemme prope Tesero, et ex Vette di Feltre alla Malga Pietena a FAGGHIUSIO. Floret Junio, Julio.

Affine præcedenti, sed robustius, elatum. Caulis teretiusculus, striatus, sulcatus. Foliola grandiora, constantius subrotunda, lobato-pluridentata, viridia, subtus pallidiora. Flores erecti. Nuculæ basi crassiores, quam apice.

6. *THALICTRUM flavum*: caule tereti, sulcato; foliis decompositis, inferiorum foliolis subrotundis, ovatisve, superiorum angustis, omnibus subtrifidis, integrisque; panicula densillora, corymbosa, thyrsoides; floribus, staminibusque erectis; nuculis ovatis. *T. flavum* Sp. pl. p. 770. Smith. Engl. Fl. 3. p. 42. α. β., et Engl. bot. v. 6. t. 367. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 262. α. β. Fl. Dan. t. 939. Sv. bot. v. 5. t. 328. Plenck. Ic. pl. med. 5. p. 52. t. 443. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 877. α. β., et Syst. nat. 1. p. 182. α. β., et Prodr. 1. p. 14. n. 38. α. β. All. Ped. 1. p. 296. n. 1076.* Balb. Taur. p. 88. Re Seg. p. 46., et Tor. 1. p. 287. Birol. Acon. 1. p. 187. Coll. Herb. Ped. 1. p. 12. n. 22. Nooc. et Balb. Tic. 1. p. 259., et 391.

- Comoll. Prodr.* p. 108. *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec.* 2. tom. 10. p. 291. *Pollin. Ver.* 2. p. 211. *a. Ruch. Ven.* p. 134. *Moric. Ven.* 1. p. 236. *Nacc. Ven.* 3. p. 92. *Rom. in Da Rio Giorn. dell' Ital. lett. tom.* 24. p. 287. *Suffr. Foroj.* p. 150. *Sav. Pis.* 2. p. 22. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 182. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 140. *Koch. Syn.* p. 6. *Reich. Exc.* 3. p. 730. n. 4639., *et Ic. Fl. Germ., et Helv.* 3. p. 16. *Ran. Anem.* 1. 44. f. 4639. *luxur. Host. Austr.* 2. p. 102. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 390. *Gaud. Helv.* 3. p. 511.
- T. nigricans* *Jacq. Austr.* 3. p. 10. t. 421. *De Cand. Syst. nat.* 1. p. 182., *et Prodr.* 1. p. 14. n. 37. *Re Tor.* 1. p. 287. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 11. n. 20. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 259. *Comoll. Prodr.* p. 108. *Reich. Exc.* 3. p. 730. n. 4638., *et Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 16. *Ran. Anem.* 1. 43. f. 4638. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 391.
- T. n.* 1138. *a. β. Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 57.
- Thalictron* in Etruria vulgo *Verdemarum Casalp. De pl. lib.* 9. cap. 3. p. 372.
- Thalictrum majus*, siliqua angulosa aut striata *Zannich. Ist.* p. 257. t. 311. *Segui. Ver.* 1. p. 475. n. 1.
- T. nigrius* caule et semine striato *J. Bauh. Hist. pl.* 3. lib. 30. p. 486. fig.
- T. majus* foliis rugosis trifidis *Moris. Oxon. sect.* 9. tab. 20. fig. 3.
- β* foliolis angusto lanceolatis, lanceolato-linearibus, vel linearibus.
- Thalictrum angustifolium* *Jacq. Hort. Vind.* 3. p. 25. tab. 43. *De Cand. Franc.* 4. par. 2. p. 876. *a.*, *et Syst. nat.* 1. p. 181., *et Prodr.* 1. p. 14. n. 35. *All. Ped.* 1. p. 296. n. 1075.* *Comoll. Prodr.* p. 107. *Pollin. Ver.* 2. p. 210. *Ruch. Ven.* p. 133. *Moric. Ven.* 1. p. 236. *Nacc. Ven.* 3. p. 92. *Suffr. Foroj.* p. 150. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 139. *Koch. Syn.* p. 5. *a. β. γ. Reich. Exc.* 3. p. 729. n. 4637., *et Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 16. *Ran. Anem.* 1. 41. 42. n. 4637. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 391. *Gaud. Helv.* 3. p. 509. n. I. II.
- T. lucidum* *Sp. pl.* p. 770. *De Cand. Syst. nat.* 1. p. 181., *et Prodr.* 1. p. 14. n. 36. *Ten. Nap.* 4. p. 334., *et Syll.* p. 264. n. 1.
- T. nigricans* *Ten. Nap.* 4. p. 334. ex ipso *Auct. in Syll.*
- T. galioides* *h., b. β., c. Reich. Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 15. 16. t. 38. 39. 40. n. 4626.
- T. Bauhini* *Host. Austr.* 2. p. 103.
- T. pratense* angustissimo folio *Zannich. Ist.* p. 258. *Segui. Ver.* 1. p. 477. n. 6.

T. pratense majus Monspeliensium foliis rugosis *Pluk.*
Phyt. t. 65. f. 3.

Ital. *Erba Pina*. *Pigamo*. *Ruta di prato*. *Ruta salvatica*. *Talistro*. *Verde marco* Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 225.
Perenn. Legi Sarzanæ in fossis di *Marinella*, sed observavi pluribus aliis locis juxta canales, Bononiæ *al Sasso*, copiosissimum quoque olim videram in pratis nemerum juxta Ticinum. Habui ex Pedemontio a MOLINERIO, et in sylvis secus Tanarum a BERTERO, Ticino in nemoribus ad flumen. a PPFR. BALSAMO-CRIVELLIO, et DE NOTARIS, Bergamo a *Cervico* a BERGAMASCHIO, Mantuâ a *Melara* a FELISIO, ex Tyroli meridionali a *Brusac di Pinè*, et a *Primiero* in humentibus, et ad septentrionem di *Campitello* in *Fassa* a FACCHINIO, ex pratis di *Roman* prope Bassanum a MONTINIO, ex Piceno a *Montefortino* a MARZIALETTO, ex Hetruria in agro Pisano, a *Vecchiano*, et *al Teso*, in *Mugello* a *Panna*, et *alla Madonna dei tre fiumi* a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, Interamnâ, et Româ *alla valle dell'inferno* a MASQUILLIERIO, Terracinâ a FIORINIA-MAZZANTIA, ex Calabria ad *Aspramonte* ab Eq. GUSSONIO. Varietatem β observavi Sarzanæ ad Macram, legi Bononiæ in palustribus di *S. Gabriele*, et in Apennino Florentino *alla Futa*. Filius attulit ex eodem Apennino a *Montecarelli*. Habui ex Pedemontio a MOLINERIO, Mantuâ *al Bosco Fontana* a BARBIERIO, ex agro Veronensi ad oryzeta prope *Vigesio* a MANGANOTTO, et a RAINERO, ex Tyroli Italico a *Predazzo*, et *Pinè* a FACCHINIO, ex campis d' *Assiago* in Vicetinis, et Bassano in sylvis S. Michaelis d' *Angarano* a MONTINIO, ex Istria in valle S. Clementis circa *Muggia* a TOMMASINO, ex agro Maceratensi a Prof. UTILI, Petrasanctâ ad fossas *del Cinquale* a GUIDONIO, ex fossis agri Pisseni a Prof. PETRO SAVIO, ex *Canino* in pratis di *Riminio* ab Ill. PRINCIPE DE CANINO, Floret ab Aprili in Junium.

Rhizoma brevissimum, crassum, stipatum fibris numerosis, crassiusculis, subramulosis, descendantibus. Caulis erectus, angulatus, sulcatus, fistulosus, valde foliosus, simplex, vel ramosus, ramis strictis, bi-quadripedalis, dilute virens, subinde e viridi rubescens. Folia inferiora bi-tripinnata, petiolata, foliolis subrotundis, aut ovalibus, superiora pinnata, sessilia, foliolis angustioribus, oblongis, lanceolatis, aut linearibus. Omnium foliola bi-trifida, aut integerrima, basi

cordata, vel rotundata, licet angustata, supra saturate viridia, nitida, et quandoque nitidissima, ut vernice illinita videantur, subtus cinereo-glaucæ, nervosa, et reticulato-venosa, rarius utrinque glauca, plana, in locis siccis tantum margine revoluta, in foliis imis obtusiuscule, in reliquis argute incisa. Petioli basi dilatati, amplexicaules, vagina amplexante striata, margine anguste albo-membranacea, et eroso-lacera. Panicula terminalis, ramosa, stricta, multiflora, densiflora, modo corymbosa, modo thyrsoidæa. Folia floralia inferiora pinnata, foliolis angustis, acuminatis, subincisis, suprema ramentacea, exigua. Flores numerosi, erecti. Sepala quatuor, ovata, concava, alba. Antheræ flavæ, muticæ, aut vix apiculatæ. Nuculæ ovatæ, profunde sulcatæ, erectæ. Tota planta glabra. Magnitudo nucularum varia in variis individuis.

Varietas β differt tantum foliolis omnibus angustis, lanceolatis, lanceolato-linearibus, vel linearibus; sed dantur individua in eodem loco nata, quæ facile ostendunt transitum in speciem, quod luculentissime patet apud nos, de qua re jam suspicati sunt summi viri Linnæus, Willichius, Scopoli, alique, et recte.

7. *THALICTAUM calabricum*: caule subangulato, tenui; foliis decompositis, foliolis subrotundis, obtuse trilobis; panicula corymbosa, pauciflora; nuculis breviter pedicellatis, erectis, profunde sulcatis, stilo persistente, subulato terminatis.

T. calabricum Ten. Syll. p. 265. n. 8.* Guss. Fl. Sic.

prodr. 2. p. 42.,* et Sup. 2. p. 184.,* et Syn. 2. p. 37.*

Presl. Sic. 1. p. 5. Spreng. Pug. 1. p. 37. n. 67., et Syst.

veg. 2. p. 671. n. 21. De Cand. Prodr. 1. p. 13. n. 26.

T. calabrum Ten. Nap. 4. p. 333.*

T. aquilegifolium Ab Ucr. Hort. Pan. p. 230. non Linn.

T. aquilegifolium } *calabricum* Jan. El. p. 8.*

T. minus Cup. Hort. Cath. p. 210.

T. minus, staminibus e violaceo purpurascens Cup. Sup. alt. p. 85.

Ital. *Pigamo porporino*.

Perenn. Habui ex Calabria a Staiti ab Eq. Gussone, ex sylvaticis Panormitanis ab eodem, a Todaro, et a Prof.

Janio. Floret ab Aprili in Junium.

Radix fibrosa, nigrescens. Caulis tenuis, subangulatus, inferne foliosus, superne fere nudus, uni-tripedalis, simplex, vel parce ramosus. Folia tripinnata, foliolis parvis, subrotundis, obtuse trilobis, lobis subinde

obtusè bi-tridentatis, supra læte viridibus; subtus glaucis, inferiora longe petiolata. Petioli supra canaliculati, basi dilatati, auriculato-membranacei. Stipellæ nullæ in basi ramificationum petioli primarii. Panicula terminalis, ramosa, corymbosa, brevis, pauciflora, ramis inferioribus subinde fasciculatis, terminalibus umbellatis. Folia floralia ima parvâ, pinata, foliolis argute dentatis, reliqua exigua, ramentacea. Flores erecti. Sepala quatuor, oblonga, concava, rosea. Stamina filamentis longiusculis, læte purpureis, superne latioribus, antheris longiusculis, luteis, breviter mucronulatis. Ovaria terminata stilo subulato. Stigma oblongum, puberulum, post nuptias attenuatum. Nucula oblonga, brevissime pedicellatæ, erecto-patulæ, profunde sulcatæ, terminatæ stilo, et stigmate subulatis, persistentibus, longiusculis.

Nou video, quâ ratione vocabulum *calabrum* Horatianum translatum fuerit in *calabricum* Plinianum, quod certe sequioris notæ.

**** *Nuculis triquetris, alatis.***

8. *Thalictrum aquilegifolium*: caule tereti, fistuloso; foliis decompositis, ramificationibus petiolorum stipellatis, foliolis ovatis, inciso-dentatis; panicula corymbosa; nuculis pedicellatis, pendulis.

T. aquilegifolium *Sp. pl.* p. 770. *Jacq. Austr.* 4. p. 10, t. 318. *Bot. mag.* t. 1818. opt. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 878., et *Syst. nat.* 1. p. 169. a. β ., et *Prodr.* 1. p. 11. n. 1. a. β .: *All. Ped.* 2. p. 296. n. 1077. *Balb. Taur.* p. 88. *Re Seg.* p. 46., et *Tor.* 1. p. 288. *Birol. Acen.* 1. p. 187. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 7. n. 1. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 260., et 391. *Comell. Prodr.* p. 108. *Pollin. Ver.* 2. p. 208. a. β . *Suffr. Foroj.* p. 150. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 287. *Bert. Mant. Fl. Apuan.* p. 37. n. 58. *Bert. fil. It. in Apenn. Bonon.* p. 20.* *Sav. Bot. Etr.* 1. p. 155. a. β .* *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 182.* *Ten. Nap.* 4. p. 332., et *Syll.* p. 265. n. 7. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 44. heft. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 122. *Koch. Syn.* p. 3. a. β . *Reich. Exc.* 3. p. 729. n. 4635. a. β ., et *1c. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 15. *Ran. Anem.* t. 36. f. 4635. *Host. Austr.* 2. p. 101. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 389. *Gaud. Helv.* 3. p. 515. a. β .

T. majus *Ten. Syll.* p. 265. n. 5. ex ipso Auct.

T. atropurpureum *Jacq. Hort. Vind.* 3. p. 34. tab. 61.

490. POLYANDRIA—POLYGYNIA.

- T. n. 1141. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 58.
Ruta sylvestris Casalp. De pl. lib. 9. cap. 2. p. 371.
Thalictrum alpinum Aquilegiz foliis, florum staminibus purpurascens Segui. Ver. 1. p. 475. n. 2.
T. alpinum majus, Aquilegiz foliis, staminibus albis, caule viridi Segui. l. c. n. 3.
T. majus florum staminibus purpurascens Moris. Ox. sect. 9. tab. 20. fig. 16.
T. alpinum majus Aquilegiz foliis Hort. Rom. 5. tab. 24. Ital. Talistro Colombino Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 225.
Perenn. Legi in monte Gottro Liguriz orientalis, et in alibus della Scaggia al Prato ratado in Liguria occidentua. Filius attulit ex Pisanino septentrionali alium Apuanarum, et ex Apennino Bononiensi in monte Barba bianca prope Castiglione de' Pepoli, in via inter Vidiciatico, et l'Acero al Torlaino, et in sylva dell'Acero. Habui ex eodem Apennino a Castiglione de' Pepoli a MATTEJO; alla Caldaia, et all'Uccelliera in Apennino Pistoriensi contermino ab herbario nostro, ex Podemontio in sylvaticis ad thermas Valderias a BERTERO, in Cenisio a BONJEANNIO, ex sylvis prope Bergomum a BERGAMASCHIO, ex districtu Veronensi in vertice montis Pastello a MANGANOTTO, ex Tyroli Italico in montibus di Fassa a FACCHINIO, et a RAINERO, ex sylvis, et sepibus Bassani, et S. Michaelis d'Angarano a MONTINIO, ex Vette di Feltre in valle Morsopian ab Eq. CONTARENO, ex districtu Tergestino in frnticetis del Carso, et in Lippizza a TOMMASINIO, et a BIASOLETTO, Urbino in Apennino della Carpegna ab AZZAROLIO, Camerino in monte Gelagna a Prof. OCTAVIANIO, ex Piceno in monte Corona, in monte De' fiori, et al Salto del cuco ab ORSINO, a Montefortino, alla Sibilla, et ex Umbria in monte Regnola alla Macchia di Trocca a MARZIALETTO, ex Hetruria in monte Pisano ab Eq. Prof. CAJ. SAVIO, in Val di Nievole, et in Apennino Pistoriensi a Prof. PETRO SAVIO, in eodem Apennino a Praechia, in Apennino Mugellano alla Madonna dei tre fiumi, et a Montegiovi a Prof. ANT. TARCIONIO-TOZZETTO, in pratis di Monte Viechi prope S. Sepolcro a CLERICO, ex montibus Viterbiensibus a CAMILLIO, Româ, ubi frequens circa urbem, a Prof. MAURIO, ex collibus Albanis a MASQUILLIERO. Floret Maio, Junio.
Rhizoma brevissimum, crassum, stipatum fibris crassiusculis, fasciculatis, descendens, fuscis. Caulis teres,

leviter striatus, ample fistulosus, erectus, simplex, vel parce ramosus, foliosus, sesqui-tripedalis, virens, aut purpurascens. Folia petiolata, ima tripinnata, reliqua bipinnata. Foliola sæpe grandia, saltem inferiora, tenuia, supra late viridia, vix glaucescentia, subtus pallenti-glaucæ, vel omnia subrotunda, obtuse lobato-dentata, cordata, aut subcordata, vel superiora oblonga, basi rotundata, aut cuneata, sæpe acute, et angustius incisa, et subinde nonnulla integerrima. Petioli basi dilatati, vaginantes, vagina margine late membranacea. Stipellæ dum sub ramificationibus primariis petioli communis, oppositæ, grandiusculæ, membranacæ, albæ, subrotundæ, sæpe connato-perfoliatæ. Panicula terminalis, ramosa, potius brevis, multiflora, densiflora, exacte corymbosa, ramis inferioribus subinde fasciculatis, et supremis umbellatis. Folia floralia ima caulino supremo plerumque similia, sed minora, successivâ laciniata, reliqua ramentacea. Flores erecti, formosi. Sepala quatuor, grandiuscula, ovata, concava, albida, vel purpurantia. Stamina erecta, filamentis longissimis, superne latioribus, late purpurantibus, vel albis, antheris oblongis, præ filamentis brevibus, obtusis, muticis. Stigmata cito decidua. Nuculæ grandes, pedicellatæ, pendulæ, oblongæ, basi angustatæ, triquetra, angulis alatis, læves, glabræ. Tota planta glabra.

ADONIS.

Lin. Gen. p. 281. Dill. Gen. p. 109. tab. 4. fig. A. B. Juss. Gen. p. 232. Lamck. Ill. 5. t. 498. Vent. Tabl. 3. p. 57. Cartn. De fruct. 1. p. 355. t. 74. Smith. Engl. Fl. 3. p. 43. De Cand. Syst. nat. i. p. 220., et Prodr. 1. p. 23. Endl. Gen. p. 846. n. 4778.

Ranunculi species *Tourn. Inst. 2. tab. 149. fig. P. Q.* Calyx perianthium pentaphyllum, liberum, concavum, patens, subcoloratum, deciduum. Petala quinque-plura, poro, vel squamula nulla in basi, plerumque calyce longiora. Stamina corolla breviora, filamentis subulatis, antheris ovatis, aut oblongis, bilocularibus, incurvis. Receptaculum floris breve, convexum, in fructu elongatum, cylindraceum. Ovaria plura. Stilus brevissimus,

conicus. Stigma simplex. Nuculae ovoides, stigmatate persistente breviter mucronatae, reticulato-rugosae, in spicam oblongam, aut in cylindrum, vel in globum circa receptaculum stipatae.

Habitus. Plantae annuae, vel perennes. Caulis decumbens, aut erectus, valde foliosus, in nonnullis inferne squamatus, simplex, vel ramosus. Folia bipinnata, foliolis profunde pinnatifidis, laciniis linearibus, simplicibus, vel divisis, brevibus, inferiora petiolata, superiora sessilia. Flores solitarii, terminales. Corolla nitens, coccinea, rubro-sanguinea, flava, alba.

Ord. nat. Ut in *Anemone* p. 442.

1. *Adonis aestivalis*: canle sulcato; foliis bipinnatis, foliolis laciniato-linearibus; petalia obverse lanceolatis, integris, erosive; nuculis in cylindrum elongatum stipatis. *A. aestivalis* Sp. pl. p. 771. *De Cand. Syst. nat.* 1. p. 223., et *Prodr.* 1. p. 24. n. 9. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 24. n. 1. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 260., et 391. *Sav. Pis.* 2. p. 23. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 278. *Suffr. Foroj.* p. 150. *Ten. Nap.* 4. p. 336., et *Syll.* p. 265. n. 2. *A. B. Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 230. n. I. II. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 43. a. b.,* et *Sup.* 2. p. 184.* *Presl. Sic.* 1. p. 8. *Moris. Sard.* 1. p. 22. a. β.* *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 143. a. β. *Koch. Syn.* p. 10. a. β. *Reich. Exc.* 3. p. 726. n. 4619. a. β., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 13. *Ran. Anem.* 1. 24. f. 4619. cum varietatib. *Gaud. Helv.* 3. p. 517.
- A. miniata* Jacq. *Austr.* 4. p. 28. t. 354. *All. Ped.* 1. p. 169. n. 1917. *Re Seg.* p. 46. *Hort. Austr.* 2. p. 104.
- A. annua* Pollin. *Ver.* 2. p. 244. a. β. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 182.
- A. flammea* Jacq. *Austr.* 4. p. 29. t. 355. lusus florib. nonnull. grandior. *De Cand. Syst. nat.* 1. p. 223., et *Prodr.* 1. p. 24. n. 8. *All. Ped.* 2. p. 169. n. 1918. *Balb. Taur.* p. 89. *Re Tor.* 1. p. 289. *Birol. Acon.* 1. p. 188. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 24. n. 2. *Presl. Sic.* 1. p. 8. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 144. *Koch. Syn.* p. 10. a. β. *Reich. Exc.* 3. p. 726. n. 4620., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 13. *Ran. Anem.* 1. 24. f. 4620. cum var. anom. *Gaud. Helv.* 3. p. 13.
- A. autumnalis* Balb. *Taur.* p. 89. *Re Tor.* 1. p. 288. *Birol. Acon.* 1. p. 188. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 260., et 392. *Lanf. Mant. in Conf. et Brugn. dec.* 2. tom. 10. p. 291.* *Ors. in Cap. Opusc.* p. 278. *Suffr. Foroj.* p. 151. *Ten.*

- Nap.* 4. p. 337.; et *Syll.* p. 265. n. 1. Röhl. cum Koch.
Deuts. Fl. 4. p. 145. Koch. *Syn.* p. 9. Reich. *Exc.* 3.
 p. 726. n. 4621., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 13. *Ran.*
Anem. t. 24. f. 4621. *Scoop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 392.
A. dentata Ten. *Nap.* 4. p. 336.
A. Cupaniana Guss. *Fl. Sic. Syn.* 2. p. 37. a. b.*
A. ambigua Gaud. *Helv.* 3. p. 518. n. I. II.
A. n. 1158. a. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 66.
Adonide Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 956. fig.
 Quedam caule dodrantali, foliis anthemidis, floribus Ran-
 nunculi figura, paulo amplioribus rubicundis, et splen-
 dentibus &c. *Casalp. De pl. lib.* 14. cap. 6. p. 546.
 Rossa Adonis del Matthioli *Calz. Viag. di mont. Bald.* p. 8.
 Anemone di sottil foglia di Valerio Cordo &c. *Pon. Mont.*
Bald. p. 149.
Adonis sylvestris, flore phœniceo, ejusque foliis longio-
 ribus *Cup. Sup. alt.* p. 5. *Segui. Ver.* 1. p. 510. n. 1.
 Idem flore quatuor foliis luteis, tribus rubicundis, mi-
 noribus *Cup. l. c.*
Adonis hortensis, flore minore, atro-rubente *Segui. Ver.* 1.
 p. 510. n. 2.
A. sylvestris, flore luteo, foliis longioribus *Zannich.*
Opusc. posth. p. 74.
Ital. Adonide. Camomilla rossa. Capomilla di fior rosso.
Fior d' Adone. Occhio di cimice. Occhio di diavolo.
Piantamalanni. Ranuncolo dei grani. Stiantamalanni.
Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 5.
Ann. Legi Genus in satis collinis, Bononiæ agli Arienti,
et a Monsumatico in villa Galeria (Ducato di Galiera),
ubi copiosa. Habui ex Pedemontio in arvis ad Albam
Pompejam a BENTERO, ex agro Mantuano a BARBERIO,
ex Tyroli Italico in campis di Cavallese in Fiemme a
FACCHINIO, ex arvis sub monte Sumano, et ex S. Eu-
sebio d' Angarano in districtu Bassanensi a MONTINIO,
ex Monfalcone a BERINIO, et BRUMATTIO, Senogallia
a. SALVATORIO, Maceratâ extra portam della Pace a
Prof. UTILI, ex Piceno a Montefortino a MARZIALETTO,
ex Pratutius a Pizzoli a CECCHETTO, ex Ducatu Lu-
censi a Marlja a Prof. PUCCINELLIO, ex Hetruria inter
segetes agri Pisani a Prof. PETRO SAVIO, Fesulis, et a
Camerata a Prof. ART. TARGIORIO-TOZZETTIO, in agro
Florentino ab Eq. RICCAROLO, ex Canino in districtu
Viterbiensi a Rev. FRATRE MAURITIO DE BRIXIA, ex
Apulia a Tressanti ab Eq. GUSONIO, ex Sicilia ad Pa-
normum ab eodem, ab Eq. BIVONA-BERNARDIO, et a

TODARO, ex insula Caprearum a Prof. GIRALDIO, ex Sardinia ab Eq. Prof. MORISIO. Floret Majo, Junio.

Radix fusiformis, lateraliter fibroso-ramulosa, plerumque gracilis. Caulis erectus, angulatus, sulcatus, simplex, vel ramosus, et subinde jam ab imo, viridis, pedalis, sesquipedalis. Folia inferiora petiolata, reliqua sessilia, omnia bipinnata, foliolis profunde pinnatifidis, laciniiis anguste linearibus, mucronulatis, modo brevibus, modo longiusculis. Flores solitarii, terminales, plus minus longe pedunculati, forma, colore, et magnitudine valde ludibundi. Foliola calycina glabra, vel basi pilosa, modo longiora, ovato-lanceolata, concava, acuta, vel obtusa, modo insigniter breviora, et latiora, subrotunda, obtusa, erosa, et veluti abortiva. Petala quinque-octo, calyce vel parum, vel duplo, triplo, et etiam quadrupla longiora, obverse lanceolata, apice rotundata, integra, aut erosula, alias apice iterum angustata, fere lanceolata, et plerumque apice erosa, indunt cinabarrina, miniaea, miniaeco-lutescentia, lutea, basi ut plurimum notata macula atropurpurea, quæ tamen interdum deest. Stamina corolla breviora, antheris ovatis, atrocaeruleis, incurvatis. Nucula ovoideo-trigona, inferne turgescens, superne angustata, et breviter rostellata stilo persistente, nunc recto, nunc apice recurro, vel incurvo, sæpe intus infra mucronulum ferunt denticulos duos marginales, qui tamen interdum desunt, maturæ sunt reticulato-rugosæ. Hæ coagmentantur circa receptaculum diversimode elongatum forma spicæ oblongæ, vel cylindraceæ, crassioris, aut gracilioris, laxius, vel densius stipatæ. Earum magnitudo quoque varia. Herba glabra, aut in parte inferiore plantæ pubescens, vel pilosa.

Ita se habent plantæ spontaneæ hujus speciei a me pluries observatæ. Color florum ruber, vel luteus sæpe occurrit in eodem individuo, imo in eodem flore dantur petala rubra, et lutea. De ludibunda magnitudine, et forma florum satis superque monuit Jacquinus l. c. At *Adonis autumnalis* L., cujus exemplaria ex Kent ab Woodsio missa possideo, ostendunt lacinias foliorum paulo latiores, nuculas grossiores, in apicam brevem, oblongam, crassam, coagmentatas; insuper figura ejus in Engl. bot. v. 5. tab. 308. præ se fert corollam calyci æqualem, colore rubro-sanguineo saturatiore præditam, et petala breviora, latiora, exacte obcordata. Hujusmodi planta profecto nunquam mihi occurrit in Italia, neque ab ullo botanico nostro obtinui.

2. *Adonis distorta*: caule flexuoso; foliis radicalibus caespitosis, petiolatis, petiolis inferne longe dilatatis; petalis numerosis, obverse lanceolato-spathulatis; nucularum glomere capitato.

A. distorta Ten. Nap. 4. p. 337. tab. 149. fig. 1., et Syll. p. 265. n. 3. *A. B. Guss. Pl. rar. p. 218. a. b.*

A. pyrenaica? Brocc. Osserv. nat. in Bibl. Ital. tom. 29. p. 83. n. 66.

Helleborus ferulaceus flore Bupthalmi Mentz. Pugill. sine fig. Ex loco.

Ital. *Adonide apennina*.

Perenn. Habui ex Piceno prope summitatem montis Vettore a Prof. OCTAVIANO, ex Pratutius in monte Velino ab Onasio, a PPR. MAURIO, SCHODWIO, et SEBASTIANO, in monte Cornu, et Costone ab Eq. GUSSONIO. Floret Julio, Augusto.

Rhizoma crassum, fusiforme, breve, nigrescens, præditum fibris lateralibus, pluribus, crassiusculis, nigrescentibus, descendentibus. Caulis teres, striatus, decumbens, vel erectus, flexuoso-distortus, pollicaris-palmaris, simplex, rarius ramo instructus. Folia inferiora petiolata, radicalia caespitosa, petiolis distortis, supra canaliculatis, basi longo tractu dilatatis, amplexicaulibus, superiora sessilia; omnia bipinnata, foliolis pinnatifido-lacinatis, laciniiis brevibus, anguste lanceolato-linearibus, acutis. Flos solitarius, terminalis, grandis, brevissime pedunculatus, vel fere sessilis. Calycis foliola ovato-oblonga, obtusa, concava, corollæ subconcoloria, et paulo breviora. Petala octo-decemocto, obverse lanceolato-spathulata, obtusa, integra, vel erosula, multistriata, pallide flava, vel alba. Stamina corolla multo breviora, antheris oblongis, incurvis, flavis. Nucula grossiuscula, ovoideo-trigona, mucronatæ stilo apice revoluta, in capitulum sphericum conglobatæ, maturitate reticulato-rugosæ. Herba in parte superiore puberula, aut tantum pilosula.

Huic proxima est *Adonis pyrenaica* De Cand. Syst. nat. 1. p. 226., quam possideo e Pyrenæis missam ab ipso De Candoileo, et a Bonjeannio; sed in hac caulis crassior, et altior, spithamalis-pedalis, petioli basi brevissimo tractu dilatati, flos paulo minor, longius pedunculatus, petala obovata, nuculae numerosiores, minores, in capitulum ovoideum conglobatæ. *Adonis apennina* L., quæ videtur lusus *Adonidis vernalis* L., cito distinguitur a nostra defectu foliorum radicalium, et caulinozum

inferiorum, pro quibus caulis tegitur squamis. Apenninus fert solam *Adonidem distortam*, ideo de illa loquitur Mentzelius in Pugill. l. c.; sed nullam figuram ejus dedit. Contulit vero cum lusu *Adonidis vernalis* ex Marchia Brandeburgensi circa Francofurtum, de qua figuram exhibuit, eamque Linnæus in Sp. pl. p. 772. applicuit *Adonidi apennina* sum, quæ profecto non est planta Apennina.

RANUNCULUS.

Lin. Gen. p. 281. Juss. Gen. p. 233. Lamek. Ill. 5. t. 498. Vent. Tabl. 3. p. 58. Gærtn. De fruct. 1. p. 353. t. 74. Smith. in Rees's Cycl. v. 29., et Engl. Fl. 3. p. 44., et Gramm. tab. 17. fig. 214. De Cand. Syst. nat. 1. p. 231., et Prodr. 1. p. 26. Endl. Gen. p. 847. n. 4783.

Ranunculi species Tourn. Inst. 2. tab. 149. fig. A-L. Ficaria Dill. Nov. gen. p. 108. tab. 5. fig. A-D. Juss. Gen. p. 233. Vent. Tabl. 3. p. 58. Endl. Gen. p. 847. n. 4785.

Scotanum Adans. Famill. 2. p. 459.

Ceratocephalus De Cand. Syst. nat. 1. p. 230., et Prodr. 1. p. 26. Endl. Gen. p. 847. n. 4784.

Calyx perianthium liberum, pentaphyllum, rarius triphyllum, concavum, patens, vel retroflexum, sæpe subcoloratum, deciduum. Petala quinque-decem, obtusa, in ungue instructa poro nectarifero, subinde squamula aucto. Stamina numerosa, corolla breviora, raro pauca, filamentis subulatis, antheris bilocularibus, terminalibus. Receptaculum convexum, in fructu auctum, globosum, oblongum, vel cylindraceum. Ovaria plura, brevissime, vel longe stilosa. Stigma puberulum, laterale. Nuculae coadunatae in capitulum sphericum, aut oblongum, vel in spicam cylindraceam, plus minus compressæ, rarius angulatæ, aut stilo longo rostratæ; variant læves, granulatæ, echinatae, striatæ, reticulato-rugosæ.

Habitus. Plantæ annuæ, vel perennes. Radix fibrosa, fasciculata, grumosa, bulbosa. Caulis teres,

erectus, vel prostratus, subinde radicans, in aquatilibus fluitans. Folia simplicia, vel composita, integra, dentata, lobata, laciniata. Pedunculi uniflori. Calyx æstivatione imbricatus. Corolla supernitida, lutea, vel alba, albo-purpurascens; aut rubra. Plantæ acres, vesicatoriæ.

Ord. nat. Ut in *Anemone* p. 442.

* *Foliis simplicibus.*

1. *RANUNCULUS Flammula*: caule fistuloso, declinato; foliis inferioribus oblongis, petiolatis, mediis lanceolatis, superioribus linearibus, omnibus integris, serratisve; nuculis tumidulis, lævibus.

R. *Flammula* *Sp. pl.* p. 772. *Smith. in Rees's Cycl.* v. 29. n. 1., et *Engl. Fl.* 3. p. 45. α., et *Engl. bot.* v. 6. t. 387. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 264. α. *Curt. Lond. ed. Grav.* v. 2. tab. 70. *Lagasc. Hort. sicc. Lond. fasc.* 1. n. 23.* *Fl. Dan.* t. 575. *Sv. bot.* v. 2. t. 117. *Plenck. Ic. pl. med.* 5. p. 61. t. 459. *Bull. Pl. ven.* p. 144. t. 15. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 905. α. β., et *Syst. nat.* 1. p. 247. α. β., et *Prodr.* 1. p. 32. n. 52. α. β. *All. Ped.* 2. p. 48. n. 1443. *Balb. Taur.* p. 89.* *Re Seg.* p. 46., et *Tor.* 1. p. 289. *Birol. Acon.* 1. p. 188. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 31. n. 19. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 261., et 392. *Comoll. Prodr.* p. 108. *Pollin. Ver.* 2. p. 228. *Suffr. Foroj.* p. 151. *Sav. Pis.* 2. p. 24., et *Bot. Etr.* 4. p. 120. *Seb. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 183. *Ten. Nap.* 1. p. 311. *A. B.*, et *Syll.* p. 266. n. 9. *Moris. Sard.* 1. p. 29. *Desf. Atl.* 1. p. 435. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 166. α. *Koch. Syn.* n. 15. α. *Reich. Exc.* 3. p. 722. n. 4595., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 11. *Ran. Ran.* t. 10. f. 4595. *Host. Austr.* 2. p. 105. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 394. excl. pl. repente. *Gaud. Helv.* 3. p. 552. α. β.

R. n. 1182. α. β. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 78.

Flammula Ranunculus *Dod. Pempt.* p. 432. fig.

F. *Ranunculus folio serrato* *Dod. l. c.* fig.

Flammeus Ranunculus aquatilis angustifolius, Taracanis effigie, Flammula vulgi *Lob. Ic.* p. 670.

Ranunculus aquatilis angustifolius serratus *Lob. Ic. l. c.*

R. *longifolius, alijs Flammula* *J. Bauh. Hist. pl.* 3. app. p. 864. fig.

β caule reptante, foliis angustissimis.

Ranunculus Flammula *Smith. Engl. Fl.* 3. p. 45. δ. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 167. β. *Koch. Syn.* p. 15. β.

Flor. Ital. T. V.

Reich. Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. *Ran. Ran.* t. 10. f. 4595. β .
Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 394. pl. caule reptante.
R. reptans Sp. pl. p. 773. *Fl. Dan.* t. 108. *De Cand.*
Franc. 4. par. 2. p. 905., et *Syst. nat.* 1. p. 248., et
Prodr. 1. p. 32. n. 53. α . *All. Ped.* 2. p. 48. n. 1444. *Coll.*
Herb. Ped. 1. p. 32. n. 20. *Comoll. Prodr.* p. 106. α *Gaud.*
Helv. 3. p. 553.

R. n. 236. *Lin. Fl. Lap.* p. 190. tab. 3. fig. 5.

R. n. 1183. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 79.

R. repens, gramineis foliis, e singulis geniculis radices
 agens *Amm. Stirp. rar. in Imp. Ruth.* p. 80. tab. 13. fig. 1.
Ital. Ranuncolo delle passere Targ. Tozz. *Diz. bot.* 2.
 p. 198.

Ann. Perenn. Legi Sarzanæ in palustribus pratorum are-
 nosorum di *Marinella*. Habui ex Liguria occidua in
 paludosis del *Ceriale* a Prof. SASSIO, ex Pedemontio in
 humentibus della *Mandria* a Prof. BALBISIO, ex agro
 Mediolanensi prope *Bollate* a PPR. BALSAMO-CRIVEL-
 LIO, et DE NOTARIS, ex agro Tridentino a *Baselga* a
 FACCHINIO, Bassano in pratis uliginosis d' *Assiago* a
 MONTINIO, ex Piceno in monte d' *Accumoli* ai *Panta-*
nacci ab OMSINO, ex Ducatu Lucensi ad paludem
 Blentinæ, et in uliginosis di *Vorno* a *Fessa cieca* a
 Prof. PUCCINELLI, ex turfosis Blentinensibus, et ex
 sylva Pisana a *Palazzetto* a Prof. PETRO SAVIO, Flo-
 rentiâ alla *Ghiacciaia di Trespiano* a BARONIO fil. Va-
 rietatem β obtinui ex viciniis Comi al *Prà Pasquè* a
 RAINERO. Floret ab Junio in æstatem.

Radix articulata, repens, sive ad articulos fibris verti-
 cillatis instructa. Caulis decumbens, adscendens, vel
 erectus, superne declinans, teres, striatus, fistulosus,
 articulis tantum fæctis, sæpe flexuosus, a dodrante
 ad sesquipedem longus, alterne ramosus, ramis axil-
 laribus, subinde abortivis, et fasciculum foliorum men-
 tientibus. Folia ima longe petiolata, ovata, aut oblon-
 ga, obtusiuscula, successiva brevius petiolata, lanceo-
 lata, anprema sessilia, linearia, amplexicaulia, alias
 cuncta lanceolata, aut angustissime lanceolato-linea-
 ria, acuta; indunt quoque integerrima, vel plus minus
 serrata, brevia, vel elongata, longitudine varia. Peti-
 oli supra canaliculati, basi dilatati, margine mem-
 branacei, amplexicaules. Panicula terminalis, modo
 pauciflora, modo pluriflora, pedunculis inferioribus sæpe
 oppositifoliis. Folia floralia ad pedunculos linearia,
 supremæque exigua. Pedunculi teretes, tenues, longi,

nudi, uniflori. Flores parvi. Calycis foliola ovata, obtusa, exquisite concava, patentia, cito decidua, e viridi lutescentia, sæpe subpilosa. Corolla luteo-aurea, petalis obovatis, integris, ant leviter emarginatis, calyce duplo longioribus, in ungue poro nectarifero minimo pertusis. Nuculæ in capitulum globosum coacervatæ, parvæ, ovatæ, turgidulæ, læves, stilo brevi apiculatæ. Herba glabra, vel hic illic subpilosa.

Varietas β est planta minima, glabra. Caulis tenuis, bipollicaris-palmaris, prostratus, ad articulos radicans fibris fasciculatis, internodiis arcuatis. Folia ima lanceolato-lineararia, reliqua angustissime lineararia, vel omnia angustissime lineararia, cæterum brevissima, obtusiuscula, sursum secunda, plerumque duo-quatuor in quovis articulo fasciculata ex gemma rameali abortiva. Flores terminales, unus-duo, subinde cum pedunculis solitariis, unifloris, brevibus in axillis foliorum caulinarum.

a. *RANUNCULUS ophioglossifolius*: caule crasso, fistuloso, superne erecto; foliis inferioribus longe petiolatis, subcordato-ovatis, superioribus oblongis; nuculis ovatis, compressiusculis, acutis, utrinque granulato-scabris.

R. *ophioglossifolius* Will. Dauph. 3. p. 731. tab. 49. De Cand. Syst. nat. 2. p. 248., et Prodr. 1. p. 43. n. 146., et Franç. 5. p. 639. Coll. Herb. Ped. 1. p. 42. n. 53. Sav. Bot. Etr. 4. p. 119.* Fior. in Giorn. de' Lett. Pis. 1828. tom. 17. p. 123.* Ten. Nap. 4. p. 343. A. B., et Syll. p. 266. n. 10. Guss. Pl. rar. p. 221.,* et Fl. Sic. prodr. 2. p. 53.,* et Syn. 2. p. 42.* Moris. Sard. 1. p. 28.* Moris. et De Not. Capr. p. 11.* Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 167. Koch. Syn. p. 15. Reich. Exc. 3. p. 725. n. 4613., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 12. Ran. Ran. t. 21. f. 4613. Host. Austr. 2. p. 107.

R. *ophioglossoides* Willd. Sp. pl. 2. par. 2. p. 1310. Smith. in Rees' s Cycl. v. 29. n. 10. Balb. Misc. bot. alt. p. 18.

R. *fistulosus* Brign. Fasc. rar. pl. Foroj. p. 25.

R. *Flammula* Biv. Bern. Cent. 2. p. 47. n. 66. excl. syn. Ital. *Fiammola maggiore*.

Ann. Perenn. Legi Sarzanæ in fossis inter la Mano, di ferro, et dirutam Lunam. Habui ex agro Bononionensi a Minerbio a Pirazzolio, ex agro Ferrariensi transpadano al Finaldrello a Felisio, ex fossis Tarvisiis a Mogliano a Majero, ex palustribus ora Venetæ prope Concordia a Prof. Naccario, ex vicinis Anconæ ab Orsino, ex portu di Recanati alle Pantiere ab Eq.

NARDUCCIO, ex Ducatu Lucensi ad paludem Blentinnensem, a *S. Lorenzo a Vaccoli*, et a *Messaciuccoli* a Prof. PUCCINELLIO, ex fossis agri Pisani ab Eq. Prof. CAJ. SAVIO, ex humentibus sylvæ Pisane a Prof. PETRO SAVIO, Ostia a Prof. MAURIO, et a BARRIERIO, ex Pontinis a FIORINIA-MAZZANTIA, ex Sicilia in inundatis, et stammis a *Mondello, alla Piana de' Greci, al Gurgoglio di Dingoli, alla Ficuzza, al Piano della Stuppa* ab Eq. GUSSONIO, a Prof. PARLATORE, et a TODARO, ex Capraria a Prof. DE NOTARIS, ex palustribus Sardinis præsertim d' *Iglesias* ab Eq. Prof. MORISIO, et a Prof. DE NOTARIS, ex Corsica a *Calvi* a SOLERIOLO. Floret Maju, Junio.

Habitus præcedentis. Radix, et caulis inferne instruuntur in articulis fibris verticillatis, longis, tennibus. Caulis teres, striatus, ascendens, vel erectus, fistulosus, crassus, in individuis macris tantum tenuis, a pollice ad sesquipedem longus. Folia inferiora longe petiolata, cordato-ovata, aut ovata, obtusa, vel obtusiuscula, superiora oblonga, aut oblongo-lanceolata, brevius petiolata, supremæque sæpe tantum lanceolata, acutiuscula; cuncta variant integra, subdenticulata, vel subrenata. Petioli latiusculi, supra canaliculati, basi dilatati, amplexicaules, vagina margine hyalino-membranacea, quandoque apice subciliata. Panicula terminalis, subdichotoma, sæpe cum pedunculo alari, vel extrafoliaceo. Pedunculi tenues, longi, uniflori, inferiores interdum oppositifolii, aut suprafoliacei. Folia floralia lanceolata, vel lanceolato-linearia, superiora sæpe brevissima. Flores multo minores quam in præcedente. Calyx idem formâ, ut plurimum adpressè pilosus. Petala lutea, supra nitida, obovata, obtusa, integra, calyce longiora, ungue poro nectarifero, exiguo, cyathiformi insculpta. Antheræ ovato-subrotundæ. Nucula numerosæ, exiguæ, in capitulum globosum congestæ, ovatæ, a stilo brevissimo conico-compresso acutiusculæ, subcompressæ, marginatæ, lateribus granulato-scabræ. Herba glabra, vel in parte superiore subpilosa. Planta mire ludens magnitudine; in inundatis, quæ exsiccantur, fit vere pusilla, uni-bipollicaris, caule tenui; foliis exiguis.

3. *RAVUNCULUS fontanus*: caule fistuloso, longo decumbente, radicante; foliis radicalibus cordatis, successivis ovatis, oblongioribus, basi cuneatis, omnibus obtuse crenatis; pedunculis solitariis, oppositifoliis; nuculis lævibus.

- R. fontanus* *Spr. Syst. veg. 4. par. 2. p. 218. n. 153. Presl. Del. Prag. p. 6., et Fl. Sic. 1. p. 15. Guss. Fl. Sic. prodr. 2. p. 52.,* et Sup. 2. p. 186.,* et Syn. 2. p. 42.**
- R. uliginosus* *Ten. Nap. 4. p. 343., et Syll. p. 266. n. 11. A. B.*
- R. erinifolius* *Ten. Syll. p. 273. n. 38.*
- R. alpinus*, infirmus, *Verbenæ nodifloræ foliis* *Cup. Hort. Cath. p. 185.*
- R. alpinus*, palustris, *Verbenæ nodifloræ foliis* *Cup. Sup. alt. p. 75.*

Ital. *Ranuncolo de' fonti.*

Ann. Perenn. Habui ex Calabria ad *Aspramonte*, et ex Sicilia in *Nebrodis* ab *Eq. Gussone*, ex eisdem montibus a *Castelbuono* a *Prof. Parlato*. Floret Junio, Julio.

Radix præcedentium duorum, caulisque inferne ad articulos imos simili modo radicans. Caulis teres, striatus, fistulosus, debilis, multa parte procumbens, et sæpe ad articulos fibra simplici, longa radicans, apice adscendens, palmaris-pedalis. Folia inferiora longiuscule petiolata, radicalia cordato-ovata, successiva ovata, reliqua oblonga, utraque basi cuneata, brevius petiolata, suprema sæpe lanceolata, omnia tenuia, acutiuscula, plerumque obtuse crenata. Petioli latiusculi, supra canaliculati, basi dilatati, amplexicaules, vagina margine membranacea. Pedunculi solitarii, oppositifolii, uniflori, longi, nudi. Flores exigui. Calycis foliola subrotunda, obtusa, concava. Petala lutea, obovata, obtusa, integra, calyce paulo longiora. Nuculæ numerosæ, exiguæ, in capitulum globosum collectæ, ovatæ, stilo brevissimo, conico-compresso acutatæ, compresso-tumidulæ, læves. Tota planta glabra.

4. *RANUNCULUS lateriflorus*: caule fistuloso, erecto, dichotomo; foliis longe petiolatis, elliptico-oblongis; floribus sessilibus, oppositifoliis, alaribusque; capitulis fructus squarrosis, nuculis longe rostratis, granulato-scabris.

R. lateriflorus *De Cand. Syst. nat. 1. p. 251., et Prodr. 1. p. 43. n. 149. Deless. Ic. sel. 1. p. 8. tab. 30. Presl. Sic. 1. p. 19. α. β. Guss. Fl. Sic. prodr. 2. p. 54.,* et Syn. 2. p. 49.* Ten. Syll. p. 267. n. 12.**

R. nodiflorus *Ab Ucr. Hort. Pan. p. 231. non Lin. Ten. Nap. 1. p. 311.**

R. alpestris, palustris, lignosus, *Ocimi folio*, echinatus *Cup. Hort. Cath. p. 185., et Sup. alt. p. 76.*

R. alpinus, palustris lignosus *Ocimi folio* echinatus *H. Cath. Bonan. Panph. tab. 65.*

Ital. Fiammella d'acqua.

Ann. Habui ex Calabria in paludibus della Serra ab Eq. Prof. TENORIO, ex inundatis Siciliæ alla Piana de' Greci, al Gurgo di Dingoli ab Eq. GUSONIO, a Prof. PALATORE, et a TODARO. Floret Majo, Junio.

Radix e fibris ad articulos verticillatis, etiam ex articulis caulinis imis. Caulis teres, leviter striatus, fistulosus, sæpe crassus, erectus, dichotomus, patens, a pollice ad dodrantem longus. Folia parva, elliptico-oblonga, obtusiuscula, multinervia, integra, vel obiter crenata, inferiora longe, superiora brevius petiolata, suprema minora, et paulo angustiora. Petioli latiusculi, supra canaliculati, basi dilatati, amplexicaules, vagina margine membranacea. Flores exigui, alares, et oppositifolii, sessiles, solitarii, raro gemini, altero sessili, altero pedicellato. Calycis foliola ovata, obtusa, concava, patentia. Petala lutea, obovata, obtusa, integra, longiuscule unguiculata, calyce subbreviora. Nuculæ numerosæ, collectæ in capitulum ovoideum, vel globosum, squarrosam, ovatæ, compressæ, marginatæ, longe rostratæ a stilo triangulo-lanceolato, recurvulo, lateribus granulato-scabræ, raro læves. Tota planta glabra.

Ranunculus nodiflorus L. juxta exemplaria ex Fontebellovaco prope Parisios, quæ possideo, differt habita minore, foliis superioribus lanceolatis, nuculis paucis in capitulo globuloso, rostellatis stilo multo brevior, et angustiore, apice uncat.

5. *RANUNCULUS* *Lingua*: caule erecto, fistuloso; foliis lanceolatis, acuminatis, elongatis, serrulatis, integrisve; floribus amplis; nuculis minutissime punctulato-exasperatis.
- R. Lingua* *Sp. pl.* p. 773. *Smith. Engl. Fl.* 3. p. 46., et *Engl. bot.* v. 2. t. 100. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 263. et in *Fl. Lond. ed. Grav.* v. 5. t. 41. *Fl. Dan.* t. 755. *Sw. bot.* v. 9. t. 636. *Röm. Fl. Europ. fasc.* 8. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 904., et *Syst. nat.* 1. p. 246., et *Prodr.* 1. p. 32. n. 52. *α. β.* *All. Ped.* 2. p. 47. n. 1442.* *Re Seg.* p. 46., et *Tor.* i. p. 290. *Birol. Acon.* 1. p. 188. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 31. n. 18. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 262. *Comoll. Prodr.* p. 108. *Lanf. Mant. in Conf. a Brugn. Giorn. dec.* 2. tom. 10. p. 291.* *Pollin. Ver.* 2. p. 128. *Suffr. Foroj.* p. 151. *Sav. Bot. Etr.* 4. p. 121.* *Ten. Syll.* p. 266. n. 8. *Guss. Sup.* 2. p. 186., et *Syn.* 2. p. 42. b. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 168. *Koch. Syn.* p. 15. *Reich. Exc.* 3. p. 722. n. 4597., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 11. *Ran. Ran.* t. 10. f. 4595. (pro 4597.) *Hort. Austr.* 2. p. 106. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 395. *Gaud. Helv.* 3. p. 554.

R. n. 1181. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 78.*

R. canle cubitali: floribus luteis: exiguis seminibus: foliis Plantaginis angustioribus *Casalp. De pl. lib. 14. cap. 4. p. 546.*

R. longifolius palustris major *Ambr. Phyt. 1. p. 458.*

R. longifolius, Lingua Plinii dictus, foliis serratis *Ambr. l. c. p. 459. fig.*

R. flammeus major *Ger. em. p. 961. fig.*

R. lanceatus major *Tabernæm. Ic. p. 48. fig.*

R. longo folia maximus, Lingua Plinii *J. Bauh. Hist. pl. 3. app. p. 865. fig.*

Ital. *Ranuncolo delle canne* Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 198.

Perenn. Habui ex paludosis Pedemontanis a MOLINZUTO, ex nemoribus Ticini a PPT. BALSAMO-CRIVELLIO, et DE NOTARIS, Bergamo a Endine a BERGAMASCHIO, Mantuâ a S. Giorgio, et a Pietole a BARBIERIO, et a Melara a FELISTO, ex districtu di Bolzano ad Athesim a FACCHINIO, ex agro Tarvisino a Quinto in Sile a FRACCHIA, ex fossis Pisanis ab Eq. Prof. CAJ. SAVIO, ex Ducatu Lucensi ad paludem Blentinensem a Prof. PUCCELLIO, a Prof. PETRO SAVIO, et ab Eq. NARDUCCIO. Floret Junio, Julio.

Radix e fibris ad articulos verticillatis, etiam ex articulis inferioribus caulis. Caulis teres, crassus; striatus, fistulosus, erectus, superne ramosus, cubitalis, et ultra. Folia lanceolata, acuminata, longa, latitudinis variae, et subinde insignis, margine serrulata, vel integra, nervo dirempta, venosaeque, venis per longitudinem nervorum instar excurrentibus, inferiora breviter petiolata, superiora sessilia. Petioli lati, supra canaliculati, basi dilatati, semiamplexicaules, vagina margine membranacea. Folia floralia angusta, lanceolato-linear, acuminata, brevia. Flores grandes, terminales. Pedunculi plus minus longi. Foliola calycina lato ovata, obtusa, concava, patentia, dorso adpresse pilosa. Petala luteo-aurea, supra nitidissima, obovata, integra, vel obiter emarginata, ungue brevissimo, poroso-squamulifero, calyce plusquam duplo longiora. Anthera ovato-oblonga. Nucula in capitulum globosum coadunata, ovata, stilo brevissimo, compresso-triangulo, recurvo terminata, in lateribus punctulis minutis, prominulis exasperata. Herba adpresse pilosa praesertim in parte superiore.

6. *RANUNCULUS gramineus*: radice bulbosa, fibris sphacellatis tunicata; caule erecto, glabro, paucifloro, foliis

lanceolato-linearibus, integris, multinerviis; nuculis reticulato-rugosis.

R. gramineus *Sp. pl.* p. 773. *Smith. in Rees's Cycl.* v. 29. n. 7., et *Engl. Fl.* 3. p. 46., et *Engl. bot.* v. 33. t. 2306. *Hook. Brit. Fl. ed. 2.* p. 264. *Bull. Pl. ven.* p. 145. t. 123. *Balb. Misc. bot.* 1. p. 26. *Re Seg.* p. 46. *Birol. Acon.* 1. p. 188. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 31. n. 17. α . β . *Moris. Sard.* 1. p. 30.* *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 904.,* et *Syst. nat.* 1. p. 245. α . β .,* et *Prodr.* 1. p. 32. n. 49. α . β .* *Koch. Syn.* p. 14. *Reich. Exc.* 3. p. 722. n. 4594., et *lc. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 11. *Ran. Ran.* t. 10. f. 4594. *Gaud. Helv.* 3. p. 555.

R. leptomacrophyllon bulbosus *Column. Ecphr.* 1. p. 314. descr.

R. bulbosus gramineus *mont. Column. l. c.* p. 313. fig.

Pumilus Ranunculus gramineis foliis *Lob. Ic.* p. 671.

Ranunculus pumilus (error. *pumilis*) *gramineis foliis* *J. Bauh. Hist. pl.* 3. app. p. 866. fig.

Ital. Ranuncolo barbuto.

Perenn. Habui ex districtu di *Rovigo alla Polesella* a Prof. NACCARIO, ex radicibus Matesii a *Cusano* ab Eq. GUSSONIO, ex Sardinia in pascuis montanis di *Arcidano* ab Eq. Prof. MORISIO. Floret Majo, Junio.

Radix bulbus subrotundus, vel oblongus ex bulbo duplici superimposito, tectus retibus fibrosis e squamis sphaecelatis, deorsum radicans fibris fasciculatis, crassiusculis, lateraliter ramulosis. Caulis teres, tenuis, striatus, erectus, simplex, vel superne parce ramosus, et saepe tantum bifidus, subnudus, glaber, aut inferne pilosus, palmaris-dodrantalis. Folia angusta, lanceolato-linearia, acuminata, multinervia, integra, glabra, glaucescentia, radicalia caespitosa, petiolata, caulina panca, alterna, sessilia, multo breviora, sticta. Petioli latiusculi, supra canaliculati, basi dilatati, amplexantes. Flores solitarii, terminales, mediocres. Pedunculi glabri. Foliola calycina ovato-lanceolata, obtusa, concava, patentia, longiuscula, glabra. Corolla lutea, supra nitida, calyce paulo longior. Petala obovata, apice rotundata, obtusa, integra, ungue brevissimo, poroso-squamulifero. Antherae lineares, longiusculae. Nuculae in capitulum globosum coacervatae, ovatae, tumidae, reticulato-rugosae, rostello brevissimo, recurvo apiculatae.

7. *RANUNCULUS pyrenaeus*: radice fasciculata; caule erecto, simplici, parceve ramoso; foliis lanceolatis, linearibusve, integris; pedunculis lanuginosis; nectarii squamula petaloidea, semitubulosa; nuculis laevibus.

R. pyrenæus *Lin. Mant. alt. p. 248. Smith. in Rees's Cycl. v. 29. n. 8. Jacq. Misc. bot. 1. p. 154. tab. 18. fig. 1. Röm. Fl. Europ. fasc. 8. Deless. Ic. select. 1. p. 7. tab. 27. fig. B. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 889. α. β.,* et Syst. nat. 1. p. 243. α. β. γ.,* et Prodr. 1. p. 31. n. 45. α. β. γ.* Re Seg. p. 47.* Coll. Herb. Ped. 1. p. 30. n. 13. Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 19. heft. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 164. α. β. γ. Koch. Syn. p. 14. α. β. γ. Reich. Exc. 3. p. 719. n. 4578. α. β., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 9. Ran. Ran. t. 4. f. 4758., et f. 4758. β. Host. Austr. 2. p. 106. Gaud. Helv. 3. p. 633. α. β. γ.*

R. pyrenaicus *Birol. Acon. 1. p. 189.*

R. plantagineus *All. Ped. 2. p. 48. n. 1445. tab. 76. fig. 1.* luxur.*

R. n. 1180. α. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 77.

Ital. Ranuncolo lanciola.

Perenn. Habui ex alpinis Valderiis alla Stella a BER-
TERO, ex Cenisio a Prof. BALBISIO, a Prof. RE, et a
BONJEANNIO, ex Braulio in Valtellina alla quarta Can-
toniera a RAINERO, ex Tyroli Italico in alpinis di
Fiemme, et Fassà a FACCHINIO, ex Montalon in Val-
sugana a MONTINIO, et a BEGGIATO. Floret Junio, Julio.

Radix cello subbulbosa, tectā retibus fibrosis squamarum
sphacelatarum, deorsum fasciculata, fibris crassiuscu-
lis, sæpe lateraliter ramulosis. Squamæ communes,
membranacæ, oblongæ, obvallantes basim foliorum ra-
dicalium, et caulis. Caulis teres, erectus, subinde fle-
xuosus, simplex, vel superne parce ramosus, subnu-
dus, infra pedunculum glaber, rarius subvillosus, a
duobus pollicibus ad pedem longus. Folia lanceolata,
vel lanceolato-linearia, interdum etiam linearia, acu-
ta, aut acuminata, latitudinis mire variantis, et sub-
inde insignis, integra, multinervia, nervis extantibus,
glabra, radicalia numerosa, cæspitosa, breviter petio-
lata; petiolo supra canaliculato, basi valde dilatato,
amplexicauli; caulina pauca, et interdum solitaria,
multo angustiora, et breviora, sessilia, basi non dila-
tata, nec amplexicaulia. Flores terminales, grandiu-
sculi, solitarii, pedunculati, pedunculo præsertim apice
lanuginoso. Calycis foliola oblonga, obtusa, concava,
patentia, glabra, vel subpilosa, margine albertia. Co-
rolla calyce duplo, et triplo longior, alba. Petala ob-
ovata, superne dilatata, et rotundata, integra, aut le-
viter erosula, quandoque fere abscissa; ludunt a quin-
que ad octo. Squamæ unguis tegens porum petaloidea,

lanceolata, semitubulata. Antheræ lineares. Stili brevès, recurvi. Nuculæ in capitulum ovoideum, vel oblongum congestæ, ovatæ, turgidulæ, læves, glabræ, rostellatæ stilo recurvo-uncato.

8. *RANUNCULUS parnassifolius*: caule tereti, erecto; foliis radicalibus petiolatis, subcordato-ovatis, multinerviis, caulinis paucis, sessilibus, supremis lanceolatis; pedunculis subcorymbosis; nuculis ovatis, tumidulis, lævibus.

R. parnassifolius *Sp. pl.* p. 774. *Smith. in Rees' s Cycl.* v. 29. n. 9. *Wulf. in Jacq. Collect.* 1. p. 191. *tab. 9. fig. 3.* sine fol. radical. *De Cand. Franc.* 4. par. 2. p. 890.* et *Syst. nat.* 1. p. 244.* excl. syn. Röm., et *Prodr.* 1. p. 32. n. 48. *Balb. Elench. recent. stirp.* p. 7., et in *Accad. di Tor. ann.* 1818. tom. 23. p. 108. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 30. n. 16. *Vill. Dauph.* 3. p. 733. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 19. *heft. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 163. *Koch. Syn.* p. 14. *Reich. Exc.* 3. p. 719. n. 4579., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 10. *Ran. Ran. t. 4. f. 4579. grandifl., et parvifl.* *Host. Austr.* 2. p. 107. *Gaud. Helv.* 3. p. 536. *α. β.*

R. n. 1179. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 77. excl. syn. Ital. *Ranuncolo Petacciòlo.*

Perenn. Habui ex alpinis Pedemontanis a БОНЕАННИО. Floret Junio, Julio.

Radix subbulbosa, plerumque obducta retibus fibrosis a squamis sphacelatis, deorsum fasciculato-fibrosa, fibris tenuibus. Squamæ communes obvolventes basim petiolorum radicalium, et canlis, oblongæ, tenues, albidæ, nervosæ, interiores insigniter elongatæ. Caulis teres, crassiusculus, striatus, erectus, vel adscendens, subinde flexuosus, plerumque superne ramosus, raro simplex, infra ramos glaber, bipollicaris-palmaris. Folia inferiora cordato-ovata, aut ovata, crassa, firma, acutiuscula, integerrima, multinervia, margine, et subinde etiam basi, lanuginosa; radicalia plus minus longe petiolata; caulina pauca, minora, sessilia, amplexicaulia; ramea exigua, lanceolata. Petioli latiusculi, glabri, supra canaliculati, basi dilatati, amplexicaules. Pedunculi raro solitarii, vel duo, ut plurimum plures, corymbosi, approximati, foliolosi, lanuginosi. Flores præ plantula grandes, subinde tamen fere dimidio minores. Calycis foliola late ovata, obtusa, concava, patentia, glabra, vel pilosa, sæpe dorso purpureo-rosea, margine alba. Corolla alba, calyce longior. Petala late obovata, obtusa, integra, aut leviter crosula. Squama unguis

elliptica, parva, petalo adpressa, poro mellifero grandiusculo. Antheræ oblongæ, brevissime apiculatæ. Stili recurvati. Nuculæ in capitulum globosum collectæ, ovatæ, turgidulæ, læves, glabræ, stilo recurvato terminatæ.

9. *RANUNCULUS bullatus*: hirsutus; foliis omnibus radicalibus, obovatis, dentatis; scapis nudis, unifloris; nuculis tumidis, lævibus.

R. bullatus *Sp. pl.* p. 774. *Smith. in Rees's Cycl.* v. 29. n. 16. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 903., et *Syst. nat.* 1. p. 253. a., et *Prodr.* 1. p. 27. n. 4. a. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 27. n. 3. a. *Ten. Nap.* 1. p. 312. t. 49.,* et *Syll.* p. 267. n. 13. A.* *Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 231. *Biv. Bern. Cent.* 1. p. 68. n. 78. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 45.,* et *Sup.* 2. p. 184.,* et *Syn.* 2. p. 41.* *Presl. Sic.* 1. p. 12. *Zeraph. Fl. Melit. thes.* 2. p. 65. *Moris. Sard.* 1. p. 32.,* *Viv. Fl. Cors. diagn.* p. 9. *Desf. Atl.* 1. p. 435.

R. latifolius, *bullatus*, autumnalis, *Asphodeli radice* *Cup. Hort. Cath.* p. 186.

R. autumnalis *Cup. Sup. alt.* p. 76.

Ranuncul. grumosa radice I. species II. *Clus. Hist. pl. lib.* 2. p. 238. fig.

Ranunculus Lusitanicus *Dod. Pempt.* p. 429. fig. *Lugd. hist.* 1. p. 1033. fig.

R. lusitanicus I. *Tabern. Ic.* p. 50. fig.

R. autumnalis *Clusii* *Ger. em.* p. 954. fig.

R. autumnalis folio lato, rotundo, serrato *J. Bauh. Hist. pl.* 3. app. p. 866., fig. p. 867.

Ital. *Ranuncolo* *Piantaggine*.

Perenn. Habui ex Japygia ab Eq. Prof. TENORIO, Brundisio ab Eq. PAROLINIO, ex Sicilia; ubi copiosus ubique, præsertim in collibus Panormitanis, et in *Val di Mazzara* ab Eq. GUSSONIO, et a Prof. PARLATORE, ex Sardinia in pascuis, et viis circa Calarim ab Eq. Prof. MORISIO, et a Prof. DE NOTARIS, ex Corsica in incultis di Bonifacio a SERAFFINIO, in Aiaccio a SOLEIROLIO, ex eadem insula ab Eq. GUSSONIO. Floret ab Octobri in hyemem.

Radix e napulis fasciculatis, fusiformibus, gracilibus, in fibram longam desinentibus. Folia omnia radicalia, rosulata, breviter petiolata, obovata, et quandoque elliptica, obtusa, grosse, inæqualiter dentata, dente terminali, vel nonnullis ex dentibus terminalibus grandioribus, subinde margine laterali integra, triplinervia, vix bullata. Scapi unus-plures ex eadem radice, teretes,

tenuis, erecti, nudi, a pollice ad dodrantem longi. Flos terminalis, grandiusculus, subinde tamen parvus. Foliola calycina ovata, obtusa, concava, patentia. Corolla lutea, calyce duplo longior. Petala octo-duodecim, anguste obovata, vel potius obverse lanceolata, obtusa, integra, multinervia, ungue instructo squamula exigua, ovata. Antheræ oblongæ. Nucula parvæ, in capitulum ovoidem congestæ, ovatæ, tumidæ, carinatae, læves, sub fortiori tantum vitro punctulis prominulis adpersæ, stilo recurvulo apiculatæ. Tota planta hirsuta, villis scaporum patulis. Folia rarius glabra.

10. *RANUNCULUS Ficaria*: radice fasciculato-tuberosa; foliis cordato-ovatis, repando-angulatis, integrisque, longe petiolatis; calycibus subtriphyllis; petalis-numerosis, oblongis.

R. Ficaria Sp. pl. p. 774. Smith. Engl. Fl. 3. p. 47., et Engl. bot. v. 9. t. 584. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 264. Curt. Lond. ed. Grav. v. 2. t. 71. Fl. Dan. t. 499. Sv. bot. v. 1. t. 17. Plenck. Ic. pl. med. 5. p. 62. t. 460. Bull. Pl. ven. p. 146. t. 43. All. Ped. 2. p. 48. n. 1446. Balb. Taur. p. 89. Re Seg. p. 47., et Tor. 1. p. 290. Birol. Acon. 1. p. 189. Coll. Herb. Ped. 1. p. 28. n. 5. Nocc. et Balb. Tie. 1. p. 262., et 392. Comoll. Prodr. p. 108. Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. dec. 2. tom. 10. p. 291. Pollin. Ver. 2. p. 229. Nacc. Ven. 3. p. 95.* Suffr. Foroj. p. 151. Bert. Pl. Gen. p. 70., et Amæn. Ital. p. 157. n. 152. Sav. Pis. 2. p. 25., et Bot. Etr. 2. p. 120. Ten. Nap. 1. p. 313., et Syll. p. 273. n. 37. Ab Ucr. Hort. Pan. p. 231. Guss. Fl. Sic. prodr. 2. p. 45., et Sup. 2. p. 184., et Syn. 2. p. 41. b. Moris. Sard. 1. p. 31. Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 11. heft. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 169. Koch. Syn. p. 15. Host. Austr. 2. p. 107. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 395. *Ficaria ranunculoides* De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 886., et Syst. nat. 1. p. 304., et Prodr. 1. p. 44. n. 1. Moric. Ven. 1. p. 237. Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 182. Presl. Sic. 1. p. 20. Reich. Exc. 3. p. 718. n. 4572., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 9. Ran. Ran. 1. 1. f. 4572. *F. calthæfolia* Reich. Exc. 3. p. 718. n. 4571., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 9. Ran. Ran. 1. 1. f. 4571. *F. verna* Gaud. Helv. 3. p. 559. *F. n.* 1160. cum varietatib. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 67.

Chelidonia minore Matth. Valgr. 1585. tom. 1. p. 667. fig. Dur. Herb. Rom. p. 121. fig. Ang. SEMPL. p. 181.

Favagello Casalp. De pl. lib. 14. cap. 7. p. 546.

Celidonio minore Calz. Viag. di mont. Bald. p. 14.
Chelidonia rotundifolia, minor Cup. Hort. Cath. p. 48.
cum varietatib.

Ranunculus præcox rotundifolius, luteus, granulata radice, foliis maculis albis et atropurpureis Cup. Sup. alt. p. 77.

R. n. 6. 7. 8. Mich. Cat. hor. Flor. p. 78.

R. vernus rotundifolius minor Segui. Ver. 1. p. 484. n. 1.

R. vernus rotundifolius major Hort. Rom. 5. t. 37.

Chelidonium minus Fuchs. Hist. pl. p. 867. fig.

Ital. Celidonia minore. Cenerognola minore. Erba Fava. Favagello. Favagello. Favaiola. Favaselle. Favucello. Favegello. Ficaria Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 198.

Offic. Chelidonii minoris radix Lin. Mat. med. p. 96. n. 274.

Perenn. Copiosissimus in hortis, pratis, et ad sepes totius Italiae. Legi Sarzanæ, Genuæ, Bononiæ. Habui ex agro Mediolanensi a Cazzola a DE CASTORONIS, ex districtu di Bolzano ad Athesim prope Siegmundekron a FAGUINIO, ex agro Bassanensi, et ex pratis d' Angarano a MONTINIO, ex cultis circa Tergestum a TOMMASINIO, Fossâ Clodiâ a Prof. NACCARIO, ex Piceno a Castel Marnardo, a Montefortino, a S. Leonardo a MARZIALETTO, ex agro Florentino a Prof. ANT. TARCIONIO-TOZZETTI, Terracinâ a FIORINIA-MAZZANTIA, Panormo in pratis a TODARO, ex insula Caprearum a Prof. GIRALDIO, ex Corsica a Calvi, et a Bastia a SOLEROLIO. Floret ab Jannario in Majum.

Radix grumosa, tuberibus fasciculatis, carnosis, extus flavidis, intus albis, nunc brevibus, oblongis, nunc elongatis, cylindræis, in extremitate inferiore plerumque obtusis, nudis, et quandoque subclavatis, his interjiciuntur, aut superimponuntur fibræ tenues, ramulosæ. Caulis unus-plures ex eadem radice, decumbentes, ascendentes, teretes, striati, fistulosi, simplices, aut parce ramosi, a duobus, vel tribus pollicibus ad dodrantem longi. Subinde loco caulis adest tantum scapus radicalis, nudus. Folia cordato-ovata, obtusa, repanda, repando-angulata præsertim in margine inferiore, interdum vero tota integra, læte viridis, crassiuscula, sæpe disco inferiore picta macula atropurpurea, vel alba, subtus pallidiora; radicalia plura, rosulata, longe petiolata, caulina pauca, alterna, vel opposita, minora. Petioli basi dilatati, amplexicaules, vagina margine albo-membranacea, caulini sæpe ferentes bulbillos in axilla. Flores solitarius, terminalis, grandiusculus,

longe pedunculatus. Calycis foliola plerumque tria, rarius quatuor-quinque, ovata, aut oblonga, obtusa, concava, patentia, e viridi lutescentia. Corolla calyce duplo longior, et subinde etiam paulo ultra, supra luteo-aurea, nitidissima, subtus e luteo viridula, sub solo cito dealbata. Petala octo-duodecim, modo latiora elliptico-oblonga, modo angustiora oblongo-lanceolata, semper obtusa, ungue instructo squamula exigua, oblonga. Antheræ lineares, longæ, obtusæ, lutem, basi cordatæ. Stylus brevissimus, lato-triangularis, ut stigma fere sessile appareat. Nuculæ in capitulum parvum, globosum collectæ, ovatæ, turgidæ, inferne pilosulæ, sæpe abortivæ. Herba glabra, succosa, non acris, imo cocta edulis.

Usus. Remedium antiscorbuticum non spernendum, licet parum in usu.

11. *RANUNCULUS Thora*: rhizomate cylindraceo, napulis appropinquantibus, fusiformibus, in fibrâ longam desinentibus; folio radicali petiolato, sæpe deficiente, caulino sessili, cordato-orbiculato, utroque minute crenato, integro, retusove, dente terminali grandiore; caule paucifloro; nuculis semiglobosis, tumidis, obsolete reticulatis.

R. Thora *Sp. pl.* p. 775. *Cesat. Stirp. Ital. rar. fasc. 1. tab. fig. 1-7.* *Smith. in Rges' s Cycl. v. 29. n. 19.* *De Cand. Franc. 4. par. 2. p. 903., et Syst. nat. 1. p. 265., et Prodr. 1. p. 30. n. 29.* *All. Ped. 2. p. 48. n. 1447.* *Birol. Acon. 1. p. 189.* *Coll. Herb. Ped. 1. p. 27. n. 4.* *Comoll. Prodr. p. 109.* *Pollin. Ver. 2. p. 229. a. β.* *Ten. Nap. 4. p. 344., et Syll. p. 269. n. 18.* *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 170.* *Koch. Syn. p. 15.* *Reich. Exc. 3. p. 722. n. 4593., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 11.* *Ran. Ran. 1. 9. f. 4593.* *Host. Austr. 2. p. 108.* *Gaud. Helv. 3. p. 557.*

R. scutatus *Waldst. et Kitaib. Pl. rar. Hung. 2. p. 205. t. 187.* *De Cand. Syst. nat. 1. p. 265., et Prodr. 1. p. 30. n. 30.*

R. n. 1178. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 76.*

Aconito Pardalianche falso *Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 1141. fig.*

A. mostrato da Maestro Luca Ghini *Ang. Sempl. p. 272.*

A. Pardalianche d'alcuni *Calz. Viag. di mont. Bald. p. 10.*

Thora de' Valdesi *Pon. Mont. Bald. p. 209.*

Aconitum Pardalianches, seu *Thora major* *Zannich. Opusc. posth. p. 74.*

Ranunculus Cyclaminis folio *Asphodeli* radice minor *Zannich. l. c. p. 51.* *Segui. Sup. p. 212.*

R. Cyclaminis folio, Asphodeli radice, major *Segui. Ver. 1. p. 485. n. 2.*

Phthora Valdensium, montis Baldi *Clus. Hist. pl. lib. 2. p. 239. fig. pl. macrior.*

Thora montis Baldi *Tabernam. Ic. p. 585.*

Th. Sabaudica *Tabernam. l. c.*

Th. Valdensis mas, et femina *Tabernam. Ic. p. 586.*

Ital. *Erba Tora* Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 198.

Perenn. Habui ex monte *Calbega* pagi Ticinensis in Insubria Helvetica a LAGGERO, ex *Corni di Canzo* ad Larium ab Eq. DE WELDENIO, et a RAINERO, ex districtu Bergomensis in monte *Ocone* vallis S. Martini, et in vicinis *di Clusone* a BERGAMASCHIO, ex Baldo a Prof. MORETTO, ex Tyroli Italico in *Fuchiada di Fassa*, et in *Vicensa di Fiemme* a FACCHINIO, ex *Portole*, et *Summano* Vicetinarum a Prof. MORETTO, et a MONTINIO, ex *Grappa* Bassanensium ab Eq. PAROLINIO, et a MONTINIO, ex *Pratutiis* in monte *Cornu a Lama bianca* ab ORSINO. Floret ab Junio in Augustum.

Rhizoma modo brevissimum, modo longiuseculum, transversum; huic dense hærent napuli numerosi, fusiformes, desinentes in fibram longam, ramulosam, flexuosam; cum rhizoma est brevissimum napuli videntur fasciculati. Caulis teres, farctus, erectus, a duobus pollicibus ad pedem longus, uniflorus-pauciflorus, basi instructus squamis ovatis, aut oblongis, obtusis, inferne nudus, raro comitatus folio radicali. Folium radicale raro occurrens, nunc cum caule, nunc seorsim a caule, longe petiolatum, petiolo tereti. Folium caulinum unicum, situm in parte superiore caulis, sessile, vel subsessile, auriculis caulem amplexans. Utrumque cordato-orbiculatum, toto margine, basi excepta, minute, et crebre dentatum, summitate integrum, vel retusum vel dentibus terminalibus uno-tribus majoribus, integris, medio acuto, lateralibus acutis, aut obtusis, crassum, senio coriaceum, radiate nervosum, et reticulato-venosum. Flores terminales, nunc solitarii, nunc duo-sex paniculati, pedunculis inferne foliolosis. Folium florale inferius grandius, sæpe palmato-laciniatum, laciniis acuminatis, integris, vel lateralibus dentatis, reliqua, et subinde etiam omnia integra, ovato-lanceolata, aut lanceolata, acuta, vel acuminata. Pedunculi supra folia floralia longo tractu nudi. Flores parvi, aut medio-cres. Foliola calycina oblongo-lanceolata, obtusa, concava, patentia, e viridi lutescentia. Corolla luteo-aurea,

supra nitens, calyci æqualis, ant paulo longior. Petala obovata, obtusa, integra, in ungue instructa pòro tubuloso, squamula nulla. Nuculæ paucæ, grandiusculæ, in capitulum globosum collectæ, semiglobosæ, tumidæ, in plena maturitate obsolete reticulatæ, cæterum laeves, terminatæ stilo tenui, subulato, longiusculo, recurvo. Tota planta glabra.

12. *RAUNCULUS brevifolius*: rhizomate cylindraceo, fibris lateralibus crassis, elongatis; foliis reniformi-quadrangulis, brevibus, latissimis, margine superiore grosse incisæ, radicalibus synanthiis, longe petiolatis; nuculis semiovatis, obsolete reticulatis.

R. brevifolius Ten. *Nap.* 4. p. 345., et *Syll.* p. 269. n. 19. *Guss. Pl. rar.* p. 220.* *Sang. Cent.* p. 79.* *De Cand. Syst. nat.* 1. p. 266., et *Prodr.* 1. p. 30. n. 31.

R. brachyphyllus Ten. *Fl. Nap.* tab. 149. f. 2.

R. Phthora Cesat. *Stirp. Ital. rar. fasc.* 1. tab. fig. 7.

β caule tenuiore; nuculis dimidio minoribus.

R. Phthora Crantz. *Austr.* p. 119. *Cesat. Stirp. Ital. rar. fasc.* 1. tab. fig. 1-6. *Reich. Exc.* 3. p. 722. n. 459a., et *lc. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 10. *Ran. Ran.* 1. 9. f. 459a.

R. Thora Jacq. *Observ.* 1. p. 25. tab. 13., et *Austr.* 5. p. 21. t. 44a. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 19. heft.

R. Thora γ *Pollin. Ver.* 2. p. 230.

R. Pseudo-Thora Host. *Austr.* 2. p. 108.

R. hybridus *De Cand. Syst. nat.* 1. p. 266., et *Prodr.* 1. p. 30. n. 32. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 171. *Koch. Syn.* p. 15.

Ital. Falso Tora. Tora sbrandellata.

Perenn. Habui ex Piceno in *Vettore*, et in *Sibilla alla Corona* ab ORSINO, a MARZIALETTO, a Prof. OCTAVIANIO, et a Prof. MAURIO, ex Præstutiis in monte Cornu, et Costone ab Eq. GUSSONIO. Varietatem β obtinui ex *Braulio* in *Valtellina* in valle dei *Vitelli* a RAINERO, ex Baldo a Prof. JAMIO, ex Tyroli Italico in alpinis dolomiticiis di *Fiemme*, et *Fassa*, et in *Schleren* a FACCHINIO. Floret Julio, Augusto.

Habitus quam in præcedente minor. Rhizoma cylindraceum, transversum, varium longitudine, lateraliter instructum fibris crassis, longis, prope collum paulo crassioribus, longo tractu nudis, inferne tantum ramulosas. Caulis semper comitatus foliis radicalibus, paucis, teres, dum minor crassiusculus, decumbens, adscendens, sæpe tortuosus, uniflorus, a pollice ad palmum longus, inferne nudus, basi una cum petiolis tectus squamis multinerviis,

vix acutis, externis brevioribus, ovatis, internis oblongis. Folia valde coriacea, viridi-glauescentia, radiatim nervosa, et crebre reticulato-venosa, brevia, et multo magis lata quam longa, radicalia pauca, longe petiolata, subreniformia sinu levi, margine superiore grosse, et alte incisa; laciniis mediis, et præsertim terminali, grandioribus, omnibus acutis, vel obtusis, foliorum latere utroque integro, vel obiter crenato. Petioli crassi, sæpe distorti, supra canaliculati, basi vix dilatati. Folium caulinum solitarium, radicalibus minus, basi cuneatum, cæterum sessile, aut breviter petiolatum, ejusdem formæ, margine superiore profundius sectum, laciniis acutis, vel acuminatis, ludit tamen denticulatum, dentibus uno vel duobus mediis tantum grandibus. Pedunculus terminalis, uniflorus, plus minus longus, nudus, aut inferne instructus folio florali subtrisetto. Calycis foliola oblonga, obtusa, concava, patentia, viridi-lutescentia. Corolla calyce paulo longior, lutea, supra nitida. Petala obovata, venis multis, ramosis percursa, in ungue poro mellifero instructa, squamula nulla. Nuculæ paucæ, potius grandes, in capitulum depresso-globosum congestæ, semiovatæ, carinatæ, compresso-tumidæ, læves, in plena maturitate venis vix extantibus, præsertim in dorso superiore, obsolete reticulatæ, terminatæ stilo brevi, subulato, recurvo-uncato. Tota planta glabra.

Varietas β differt habitu paulo grandiore, fibris ad rhizoma sæpius collo crassioribus, et ad formam napuli magis accedentibus, caule tenniore, et quandoque paulo longiore, uni-trifloro, ascendente, vel erecto, foliis minus coriaceis, utrinque in lateribus frequentius obiter crenatis, pedunculis inferne instructis uno, alterove folio florali lanceolato, acuminato, integerrimo, vel imo bistrifido, nuculis dimidio minoribus, et in plena maturitate paulo evidentius reticulatis. Cætera similia.

Nomen specificum *Phthora* introductum a Crantzio est omnino barbarum, et ducens in ambiguitatem; hinc præferendum putavi nomen specificum *Tenoreanum*, cum vere aptum sit ad totam hanc speciem significandam.

13. *RANUNCULUS magellensis*: foliis radicalibus reniformi-semirotundatis, obtusæ dentatis, dentibus superioribus profundioribus, majoribus; scapo unifloro; petalis emarginatis; nuculis ovatis, lævibus, rostro subulato, recurvo-uncato.

Flor. Ital. T. V.

514 POLYANDRIA—POLYGYNIA.

R. magellensis Ten. *Viag. in Abruzz. p.* 71. n. 510. excl. syn. Clus., et *Nap.* 4. p. 342., et *Syll.* p. 266. n. 6.

R. nivalis Ten. *Nap. tab.* 237. f. 2.

R. alpestris β *De Cand. Syst. nat.* 1. p. 239., et *Prodr.* 1. p. 31. β . sub. n. 39.

Ital. *Ranuncolo Ciombolino*.

Perenn. Habui ex *Maiella Prætoriorum al Maiellone*, et a *Monte Focaleto* ab Eq. GussONIO, et a Prof. SCHOUWIO. Floret Julio.

Rhizoma fusiforme, gracile, lateraliter præditum fibris longis numerosis, ramulosis. Scapus radicalis, tenuis, adscendens, vel erectus, subinde apice inclinans in latus, nudus, superne tantum instructus uno, vel duobus foliis linearibus, sessilibus, basi paululum dilatatis, et amplexicaulibus, pollicaris-palmaris, foliis longior. Folia omnia radicalia, plus minus longe petiolata, potius parva, reniformi-semiorbiculata, obtuse dentata, dentibus superioribus profundioribus, et grandioribus, interdum uno, alterove denticulo insculptis, tenuia, trinervia, nervis in venas reticulatas ramescentibus. Petioli supra canaliculati, basi tractu longiusculo anguste dilatati, expansione amplexante, margine albo-membranacea. Flos solitarius, terminalis. Foliola calycina oblonga, obtusa, concava, patentia, e viridi albescentia. Corolla alba, calyce paulo longior. Petala obovata, leviter emarginata, quinque-octo. Stamina alba, antheris ovatis. Nuculæ in capitulum globosum, collectæ, ovatæ, læves, rostratæ stilo longiusculo, compresso, subulato, apice recurvo-uncato. Tota planta glabra. Pulchra species, non confundenda cum *Ranunculo alpestri* L.; magis appropinquat sequentem.

14. *RANUNCULUS crenatus*: foliis radicalibus orbiculatis, cordatis, crenatis, crenis superioribus latioribus, cauliniis subtrifidis, integrisque, linearibus, basi valde dilatatis; caule subbifloro; petalis emarginatis; nuculis subrotundis, lævibus, rostro ensiformi, recto, apice uncato.

R. crenatus Waldst. et Kit. *Pl. rar. Hung.* 1. p. 9. t. 10. *De Cand. Syst. nat.* 1. p. 340., et *Prodr.* 1. p. 31. n. 40. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 46. heft. Röhl. cum Koch. *Deuts. Fl.* 4. p. 161. Koch. *Syn. ed.* 2. tom. 1. p. 13. Reich. *Exc.* 3. p. 719. n. 4580., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 10. *Ran. Ran.* t. 5. f. 4580.

Ital. *Ranuncolo crenellato*.

Perenn. Habui ex alpinis Brixiensibus in fissuris rupium, et in pascuis della *Corna Blacca*, et di *Dos alto* a ZANTEDESCHIO. Floret Julio, Augusto.

Valde proximus *Ranunculo magellensi* Ten., a quo differt notis sequentibus. Squamæ collum radices obvalantes grandiores. Folia radicalia orbiculata, profundiusculo cordata, ambitu læviter crenata, crenis superioribus latoribus, subtus quinquenervia, nervis ramescentibus in venas crebre reticulatas. Eorum petioli basi insigniter dilatati. Folia caulina plerumque duo, sita ad pedunculos, suffulta loco petioli vagina albo-membranacea, brevi, valde dilatata, et amplexante; horum inferius bi-trifidum, laciniis linearibus, integerrimis, superius indivisum, lineare. Caulis plerumque biflorus. Nuculæ subrotundæ, tumidulæ, terminatæ rostro longiusculo, ensiformi, recto, apice tantum uncatto. Cætera ut in illo.

15. *RANUNCULUS alpestris*: rhizomate brevi, præmorso, dense fibroso; caule subunifloro, subnudo; foliis radicalibus cordato-subrotundis, trifidis, segmentis latis, obtuse lobulatis; petalis obcordatis; fructu capitato; nuculis semiovatis, glabris, rostro longo, subulato, subuncato.

R. alpestris *Sp. pl.* p. 779. *Smith. in Trans. Lin. Soc. v. 10. par. 2. p. 343.*, et in *Rees' s Cycl. v. 29. n. 42. Jacq. Austr. 2. p. 7. t. 110. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 892.*,* et *Syst. nat. 1. p. 239. a.*,* et *Prodr. 1. p. 31. n. 39. a.** *All. Ped. 2. p. 51. n. 1455. Re Seg. p. 47. Birol. Acon. 1. p. 190. Coll. Herb. Ped. 1. p. 34. n. 26. Pollin. Ver. 2. p. 235. Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 19. heft. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 159. Koch. Syn. ed. 2. tom. 1. p. 14. Reich. Exc. 3. p. 720. n. 4581.*, et *1c. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 10. Ran. Ran. t. 5. f. 4581. Host. Austr. 2. p. 110. excl. syn. Fl. Hung. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 393. Gaud. Helv. 3. p. 530.*

R. n. 1167. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 71.

Ranuncoli montani i primi della prima, et seconda specie di Carlo Clusio *Pon. Mont. Bald. p. 195.*

Ranunculus alpinus, humilis, rotundifolius, flore minori *Zannich. Opusc. posth. p. 62.*

R. alpinus humilis, albus, folio subrotundo *Segui. Ver. 1. p. 489. n. 10. tab. 12. fig. 1.*

Ranunculi montani I. species I. *Clus. Hist. pl. lib. 2. p. 234. fig.*

R. montani I. species altera *Clus. Hist. l. c. fig.*

Ital. *Ranuncolo alpestre.*

Perenn. Habui ex alpibus Pedemontanis a Prof. BALBISIO, ex *Braglio* in *Valtellina* in valle dei *Vitelli*, et ex

monte *Codeno* ad *Larium* a *RAINERO*, ex vertice *Baldi* dicto *l'Altissimo* a *BARBIERIO*, et ex *Baldi* valle *delle Ossa*, et in cacumine *Costabella* a *MANGANOTTO*, ex *Tyrol*i Italico in *Fiemme* in rupibus di *S. Martino* supra *Panereggi*, et in *Fassa* sub i *Ghiacciai di Marmolata* a *FACCHINIO*, ex *Vette di Feltre Morsupian*, et *Vallazza* ab *Eq. CONTARENO*, a *Prof. MORETTIO*, a *MONTINIO*, et ab *Eq. PAROLINIO*, ex *Piceno* in editorii vertice montis *Vettore* ad septentrionem ab *ORSINO*, et a *PPrr. OCTAVIANIO*, et *MAURIO. Floret Junio, Julio.*

Radix rhizoma breve, præmorsum, dense vestitum fibris descendentibus, crassis, longis, collo tecta squamis oblongis, acutis, membranaceis, albidis, demum spha-celatis. Caulis teres, solitarius, vel duo ex eadem radice, decumbens, adscendens, aut erectus, plerumque simplex, uniflorus, raro biflorus, subnudus, bipollicaris-palmaris. Folia radicalia cæspitosa, petiolata, cordato-subrotunda, vel reniformi-semirotundata, trifida, segmentis latis, medio cuneato, trilobulato, lobulis subinde una, alterave crena notatis, segmentis laterali-bus bilobis, aut bifidis, laciniis plurilobulato-crenatis, interdum iisdem segmentis integris, et solummodo plurilobulato-crenatis. Lobuli omnes obtusi. Petioli supra canaliculati, basi dilatati, amplexantes, vagina lateribus albo-membranacea. Folia caulina sita sub pedunculo, unum-duo, basi utrinque aucta auricula parva, rotundata, albo-membranacea, amplexicauli, modo indivisa, lanceolata, vel linearia, obtusa, integerrima, modo, et præsertim inferius, bi-tripartita, laciniis linearibus, integerrimis; interdum etiam loco foliorum est tantum squama parva, albo-membranacea. Pedunculus a paucis lineis ad pollicem, et etiam paulo ultra longus. Foliola calycina ovata, aut ovato-lanceolata, obtusa, vel emarginata, concava, patentia, e viridi albescentia. Corolla tota alba, mediocris magnitudinis, licet variæ, et subinde grandiuscula, plerumque calyce duplo longior; ludit polypetala. Petala obcordata, ungue porifero, nudo, concolore. Antheræ parvæ, ovatæ. Stili longi, erecti, stigmato recurvulo, scabro. Nuculæ in capitulum globosum collectæ, semiovatæ, sub vitro granulis punctiformibus minutissimis adspersæ, cæterum glabræ, mucronatæ stilo longo, erecto, subulato, apice subuncato. Receptaculum fructus conicum, acutum. Planta glabra, læte virens. Ludit petalis trilobis, habeoque hujusmodi exemplar

lectum in Pyrenæis, et missum ad me a Cl. De Candolleo f. r.

16. *RANUNCULUS aconitifolius*: caule erecto, superne ramoso; foliis tripartitis, segmentis ovato-oblongis, lanceolatisve, acuminatis, medio trifido, lateralibus bifidis, omnibus acute, inæqualiter serratis, laciniatisve; fructu globoso, nuculis lævibus, rostro recurvo.

R. aconitifolius *Sp. pl.* p. 776. *α. β. Fl. Dan. t. 111. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 890. α. β., et Syst. nat. 1. p. 240. α. δ., et Prodr. 1. p. 31. n. 41. α. δ. All. Ped. 2. p. 49. n. 1450. A. B. Re Seg. p. 47., et Tor. 1. p. 291. Birol. Acon. 1. p. 189. Coll. Herb. Ped. 1. p. 34. n. 27. cum variet. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 263., et 392. Comoll. Prodr. p. 109. Pollin. Ver. 2. p. 232. α. β. Suffr. Foroj. p. 451. Ors. in Cap. Opusc. p. 286.* Sav. Bot. Etr. 4. p. 122. Ten. Nap. 4. p. 342. variet. platanif., et Syll. p. 266. n. 7. B. Moris. Sard. 1. p. 39. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 161. α. β. Koch. Syn. ed. 2. tom. 1. p. 15. α. β. Reich. Exc. 3. p. 720. n. 4585., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 10. α. β. Ran. Ran. 1. 7. f. 4585. α., et f. 4585. β. Host. Austr. 2. p. 110. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 393. Gaud. Helv. 3. p. 531. α. β. γ. Schleich. Pl. sicc.*
R. platanifolius *Lin. Mant. 1. p. 79. Birol. Acon. 1. p. 189. R. n. 1164. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 69.**

Ranuncolo con fior bianco Calz. Viag. di mont. Bald. p. 9.

Ranuncolo IV. di Dioscoride, ovvero Aconito Batracoide del Lobelio Pon. Mont. Bald. p. 210.

R. montano bianco del Dalecampio Pon. Mont. Bald. p. 239.

R. albus Apenninus mai. fol. Barrel. Ic. 88.

R. montanus, Aconiti folio, flore albo majore Zannich. Opusc. posth. p. 75.

R. montanus, Aconiti folio, flore albo, minori Zannich. l. c. p. 33.

R. alpinus, Aconiti folio, flore albo, minore Zannich. l. c. p. 51.

R. montanus, Aconiti folio, flore albo, minor Zannich. l. c. p. 59.

R. montanus, Aconiti folio, albo flore minore Segui. Ver. 1. p. 490. n. 12.

R. montanus IIII. Clus. Hist. pl. lib. 2. p. 266. fig.

R. batrachoides Lob. Io. p. 668. pl. minor.

R. albus, flore simpl. Lob. l. c. pl. major.

R. quartus Camer. Epit. p. 383. fig. Pl. fl. simpl.

R. montanus albus *Lugd. hist.* 1. p. 1031. fig.

R. albus simpliciflore *J. Bauh. Hist. pl.* 3. app. p. 859. fig.

R. flore albo alpinus major *J. Bauh. l. c.* p. 860. fig.

Ital. Più di cornacchia *Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 197.

Perenn. Habui ex Apennino Bononiensi ai *Ghiaccioni dell' Acero* a PIRAZZOLIO, ex Apennino Liguriæ orientalis ad S. Stephanum d' *Aveto* a TURIO, ex Pedemontio in *Vallasco*, et in sylvis ad thermas Valderias a BERTERO, ex Gothardo Italico a Prof. MORETTIO, ex districtu Comensi in monte *Boletto* a RAINERO, in monte *Sasso di Valsassina* a PFR. BALSAMO-CRIVELLIO, et DE NOTARIS, in monte di *Pusiana* ab Eq. CESATE, ex districtu Bergomensi in valle *Taleggio*, et in monte *Barbelino* a BERGAMASCHIO, ex Baldi valle *Novesa* a MANCANOTTO, ex Tyroli Italico in sylvis di *Fiemme*, et *Fassa* a FACCHINIO, denuo in *Fassa* a RAINERO, ex *Portole*, et *Summano* Vicetinarum a MONTINIO, ex districtu Bassanensi in montibus della *Campesana* ab Eq. PAROLINIO, ex monte Majori Istriæ a TOMMASINO, ex Piceno in *Pizzo di Sivo* ab ORSINO, ex Apennino Lucensi prope il *Rondinaio* a GIANNINIO, ex eodem Apennino a Prof. PUCCINELLIO, ex Apennino Pistoriensi al' *Uccelliera* ab herborario nostro, al' *Teso* a Prof. PETRO SAVIO, a S. *Mammè*, et ex montibus Florentinis ai *Cumaldoli* a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO. Floret Junio, Julio.

Radix dense fibrosa, fibris crassis, longis, sæpe lateraliter fibrillosis, ut plurimum collo vestita basibus sphacelatis petiolorum. Caulis teres, fistulosus, leviter striatus, erectus, superne modo parce, modo valde ramosus, mire ludens longitudine a semipede ad duos pedes, vidi etiam sesquipollicarem, unillorum. Folia in genere grandia, subtus insigniter nervosa, et reticulato-venosa, tripartita, segmento medio trifido, raro indiviso, lateralibus bifidis, et quandoque tri-quinquefidis, omnium laciniis ovatis, aut lanceolatis, acuminatis, inequaliter acute serratis, subinde profunde, ut lacinulatæ videantur; radicalia majora, longe petiolata, interdum, sed rarissime, ternata, foliolis breviter petiolulatis; canlina successive brevius petiolata, supremaque sessilia. Petioli supra canaliculati, basi dilatati, amplexicaules. Panicula terminalis, patens, paucic-multiflora. Folia floralia ad ejus ramificationes sessilia, inferiora bi-tripartita, laciniis lanceolatis, acuminatis, serratis, vel integris, superiora plerumque

simplicia, lanceolata, aut linearia, integerrima. Pedunculi longi, nudi. Flores præ planta parvi. Calycis foliola ovata, obtusa, concava, dorso subpilosa, patentia, ex albo rosea, citissime decidua. Corolla alba, calyce duplo, et triplo longior, ungue instructo squama elongata, lanceolata, libera, insigni. Antheræ oblongæ, pallide lutæ. Nuculæ paucæ, grandiusculæ, in capitulum globoso-depressum collectæ, semirotundæ, compresso-tumidulæ, glabræ, venis extantibus, ramosis rugosæ, apice rostellatæ stilo subulato, tenui, longinsculo, apice recurvo-uncato. Tota planta glabra, vel hic illic præsertim in nervia, venisque foliorum pubescens.

Stirps caule, et foliis plurimum ludibunda, nec dilanianda in futiles, et inconstantes varietates, quæ nimis multæ essent, et obscurarent, non declararent speciem satis per se perspicuam.

17. *RANUNCULUS rutæfolius*: foliis radicalibus inferno bipinnatis, foliolis flabellatis, tripartitis, segmentis multifidis, laciniis linearibus, inciso-dentatis; caule paucifloro, decumbenti-ascendente; fructu capitato; nuculis ovatis, reticulato-rugosis, rostro brevi, uncato.

R. rutæfolius *Sp. pl.* p. 777. *Smith. in Rees's Cycl.* v. 29. n. 35. *Wulf. in Jacq. Collect.* 1. p. 186. *tab. 6. 7. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 893., et Syst. nat. 1. p. 237., et Prodr. 1. p. 30. n. 34. All. Ped. 2. p. 49. n. 1451. t. 67. f. 1.* Re Seg. p. 47. Birol. Acon. 1. p. 190. Coll. Herb. Ped. 1. p. 32. n. 22. Poll. Ver. 2. p. 233. Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 19. heft. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 154. Koch. Syn. ed. 2. tom. 1. p. 14. Host. Austr. 2. p. 111. Gaud. Helv. 3. p. 527. Schleich. Pl. sicc.**

R. anemonoides *Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 46. heft. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 156. Koch. Syn. ed. 2. tom. 1. p. 14. Host. Austr. 2. p. 111. Reich. Cent. 8. p. 31. t. 779. f. 1048.*

Callianthemum rutæfolium *Reich. Exc. 3. p. 727. n. 4624., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 13. Ran. Ran. t. 25. f. 4624.*

C. coriandrifolium *Reich. Exc. 3. p. 727. n. 4623., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 13. Ran. Ran. t. 25. f. 4623.*

Ranunculus n. 1165. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 70. Ranoncolo alpino con foglia di Coriandro* *Pon. Mont. Bald. p. 197. fig.*

Ranunc. Alp. Coriandri fol. fl. albo purpurascen. *Barrel. Ic. 456.*

R. præcox I. rutæ folio Clus. *Tit. It. in calc. Hort. Maur.* p. 19. non num. Zannich. *Opusc. posth.* p. 63.

R. rutaceo folio, flore suaverubente Segui. *Ver. 1.* p. 486. n. 3.

R. præcox I. rutæ folio Clus. *Hist. pl. lib. 2.* p. 23a. fig. Ital. *Ranuncolo coriandolino.*

Perenn. Habui ex Cenisio a MOLINERIO, et a BONJEAN-
NIO, ex Baldo a Costabella a MANGANOTTO, et a RAI-
NERO, ex alpibus dolomiticiis di Fiemme, et Fassa in
Tyroli Italico a FACCHINIO. Floret in editis Julio, in
demissis Aprili, Majo.

Radix collo crassiuscula, et tecta squamis oblongis, acu-
tis, albo-membranaceis, cæterum fasciculato-fibrosa,
fibris numerosis, crassiusculis, longis, simplicibus, aut
vix ramulosis. Caulis teres, striatus, decumbens, ad-
scendens, simplex, aut uno, alterove ramo instructus,
inferne nudus, a sesquipollice ad semipedem longus.
Folia radicalia pauca, petiolata, inferne bipinnata, su-
perne simpliciter pinnata, foliolis carnosulis, circum-
scriptione rotundatis, flabellatis, tripartitis, laciniis
inciso-dentatis, dentibus acutiusculis. Modo costæ se-
cundariæ pinnarum sunt breves, et approximatae, et
tunc foliola sunt invicem quidquam incumbentia, et
fere inter se imbricata; alias vero eadem costæ sunt
elongatae, et inter se remotæ, et tunc foliola sunt in-
ter se distincta, laciniisque divaricatis pollentia. Pe-
tioli teretes, basi brevi tractu dilatati, amplexantes,
vagina margine albo-membranacea. Folia caulina pau-
ca, sita sub ramis, vel infra pedunculum, vagina pe-
tiolari brevi loco petioli suffulta, aut sessilia, pinna-
ta, cæterum radicalibus similia; ludunt foliolis par-
cius incis, aut etiam simplicia, tripartita, laciniis
integris, aut subdentatis, vel indivisa. Pedunculi cras-
siusculi, apice attenuati, a semipollice ad duos pol-
lices longi. Flos mediocris, raro grandis. Calycis fo-
liola oblonga, obtusa, patentia, e viridi albertia. Co-
rolla calyce longior, etiam duplo, et triplo. Petala
sex-duodecim, nunc latiora obovata, nunc angustiora
obverse oblongo-lanceolata, semper obtusa, integra,
aut leviter emarginata, vel erosa, alba, subinde extus
rosea, venis ramosis percursa, ungue intense croceo,
instructo rima nectarifera, vix squamosa. Antheræ ova-
tæ. Stigmata recurva, scabra. Nuculæ plerumque paucae,
in capitulum depresso-globosum collectæ, ovatae, tumi-
dulæ, margine destitutæ, in plena maturitate reticulato-

-rugosæ, rostello brevi, recurvo mucronatæ. Tota herba glabra, et glauca.

Qui diremerunt hanc speciem in duas, satis non animadvertunt, a planta contractiore obtineri loco pinguiore, vel ope culturæ plantam laxiorem. Quare jure merito Welvitschius habuit alteram pro forma alterius. Nostra exemplaria ostendunt utrumque lusum.

18. *RANUNCULUS glacialis*: foliis ternatis, foliolis petiolulatis, flabellato-laciniatis, obtusiusculis; calyce denso villosa, corollaque persistentibus; fructu globoso; nuculis semiovatis, carinatis, lævibus, rostro recto.

R. glacialis *Sp. pl.* p. 777. *Smith. in Rees's Cycl.* v. 29. n. 36. *Fl. Dan.* t. 19. *Sv. bot.* v. 11. t. 747. *Wulf. in Jacq. Collect.* 1. p. 189. *tab. 8. et tab. 9. fig. 1. 2.* *Vill. Dauph.* 3. p. 739. *tab. 49. folium. De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 892.,* *et Syst. nat.* 1. p. 238.,* *et Prodr.* 1. p. 30. n. 36. a.* *All. Ped.* 2. p. 50. n. 1452. *Re Seg. p. 47.* Birol. Acon.* 1. p. 190. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 33. n. 24. *Comoll. Prodr.* p. 109.* *Suffr. Foroj.* p. 151. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 19. heft. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 157. *Koch. Syn. ed. 2. tom. 1. p. 14. Reich. Exc.* 3. p. 720. n. 4584., *et Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 10. *Ran. Ran.* t. 6. f. 4584. a. *β. γ. Host. Austr.* 2. p. 112. *Gaud. Helv.* 3. p. 258. a.

R. n. 1166. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 70.

R. n. 133. *Lin. Fl. Lap.* p. 188. *tab. 3. fig. 1.*

R. alp. Coriandri fol. fl. albo purpurascen. *Barrel. Ic.* 456.

R. montanus purpureus, caule villosa *Fœlicis Plateri J. Bauh. Hist. pl. 3. app. p. 862. fig. Scheuchz. It. alp. tom. 1. p. 139. tab. 20. fig. 1., et p. 339.*

Ital. Carlina. Caralina.

Perenn. Habni ex Pedemontio in summis alpidibus di *Ceresole* a Prof. RE, in Cenisio a Prof. BALEISIO, et a BONJEANNIO, in Pizzo d'Anzasco vallis *Vegezzo*, in Sempronio Italico, et ex valle d'Ozernone alla *Rocchetta d'Amder* in Insubria Helvetica a Prof. DE NOTARIS, ex summitate montis *Braulio* in Valtellina a RAINERO, ex montibus della *Cavargna* ad Larium a Prof. COMOLLIO, ex monte *Barbelino* in districtu Bergomensi a BERGAMASCHIO, ex Tyroli Italico in summis alpidibus di *Fiemme*, et *Fassa* a FACCHINIO, in *Botro di mezzo dei Monzoni* a Prof. MENEGHINIO, denuo in alpidibus di *Fassa* ab Eq. PAROLINIO, a *Montalon* in *Valsugana* a MONTINIO, ex *Portole* Vicetinarum a Prof. MORETIZIO. Floret Julio, Augusto.

Habitus præcedentis, sed paulo grandior. Radix ejusdem formæ, collo obducta squamis amplis, senio in fibras sphacelatis. Caulis simplex, aut superne parce ramosus, ascendens, vel erectus, non, aut vix tortuosus, ab uno ad sex pollices longus, crassus, inferne nudus. Folia radicalia cæspitosa, petiolata, crassa, succulenta, ternata, foliolis petiolulatis, flabellato-bi-tri-quinquepartitis, laciniis lanceolatis, ovato-lanceolatis, et quandoque ovatis, obtusis, vel acutiusculis. Eorum petioli plus minus crassi, supra canaliculati, inferne ample dilatati, amplexicaules. Folia caulina sita sub ramis, vel in parte inferiore pedunculorum, simplicia, palmata, tripartita, laciniis integris, aut bi-trifidis, lanceolatis, acutis, vel acuminatis, sessilia, aut inferiora breviter petiolata, vel vagina petiolari tantum suffulta, suprema plerumque indivisa, lanceolata, integerrima. Pedunculi ab uno ad quatuor, corymbosi, crassi, a dimidio pollice ad duos pollices longi. Flores grandes. Foliola calycina elliptica, aut oblonga, obtusa, concava, patentia, dorso virentia, et subinde purpurantia, dense pubescentia, aut villosa, villo fulvo. Corolla tota alba, vel ex albo sanguineo-purpurascens, calyce duplo, et triplo longior. Petala late obovato-cuneata, contigua, margine superiore vix curvo, integro, aut leviter emarginato, et interdum suberenato, venis ramosis percursa, ungue instructo squama bifida, et poro nectarifero, ut in sequente. Filamenta alba, interdum violacea. Antheræ oblongæ, luteæ. Stili falcati. Nuculæ parvæ, valde numerosæ, in capitulum globosum dense collectæ, semiovatæ, compresso-tumidæ, carinatæ, læves, glabræ, rostratæ stilo brevi, ensiformi, recto, vix apice curvulo, subinde purpurante. Calyx, corolla, stamina persistunt in fructu. Herba nunc glabra, nunc pilosa, aut villosa.

19. **RANUNCULUS Seguieri:** rhizomate præmorso, longe fibroso; caule decumbente, tortuoso; foliis ternatis, foliolis pinnatifidis, laciniis lanceolatis, acuminatis; fructu depauperato, capitato; nuculis semiovatis, rugosis, stilo recurvato, adpresso rostratis.

R. Seguieri Willd. Sp. pl. 2. par. 2. p. 1320. excl. syn. Column., et Barrel. Smith. in Rees' s Cycl. v. 29. n. 87. Vill. Dauph. 3. p. 737. tab. 49. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 892., et Syst. nat. 1. p. 238. excl. syn. Column., et Prodr. 1. p. 30. n. 38. Coll. Herb. Ped. 1. p. 33. n. 25. Pollin. Ver. 2. p. 234. Sang. Cent. p. 79.* Ten. Nap. 4.

p. 341., et Syll. p. 266. n. 5. Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 19. heft. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 158. Koch. Syn. ed. 2. tom. 1. p. 14. Reich. Exc. 3. p. 720. n. 4583., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 10. Ran. Ran. t. 6. f. 4583. Host. Austr. 2. p. 112.

R. Columnæ All. Ped. 2. p. 50. n. 1453. tab. 67. fig. 3. 4.* excl. syn. Column. Wulf. in Jacq. Collect. 4. p. 345.

R. alpinus, Apii folio, flore albo, magno Ponted. Comp. p. 117. Segui. Ver. 1. p. 490. tab. 12. fig. 2. 3., ubi folia tantum.

Ital. Ranuncolo serpentino.

Perenn. Habui ex Pedemontio in alpinis di Limone a MOLINERIO, et a Prof. BALBISIO, ex alpihus Brixiensibus in Gera alta a ZANTEDESCHIO, ex Tyroli Italico in Fiemme a Viesena ad septentrionem di Predazzo, et a S. Pellegrino, in Fassa a Duron, et in Schleren, ex Tyroli meridionali in monte Bordon al Dosso d'Abbramo, et in Rivinalongo a Col di lana a FACCHINIO, denuo ex Fassa ai Monzoni ab Eq. PAROLINIO, ex Grappa Bassanensium a MONTINIO, ex Vette di Feltre in Vallazza, Valle del ciel, et Morsopian ab Eq. CONTARENO, et a MONTINIO, ex Piceno in vertice montis Vettore ab ORSINO, a MARZIALETTO, et a Prof. MAURIO. Floret Julio, Augusto.

Radix ut in præcedente, sed in omnibus partibus crassior, ejusque fibræ sæpe valde ramulosæ, collo obvallata squamis longioribus, acuminatis. Caulis teres, striatus, vel sulcatus, plus minus crassus, decumbens, adscendens, et quandoque etiam erectus, tortuosus, inferne nudus, simplex, vel parce ramosus, ab uno ad quinque pollices longus. Folia ternata, foliolis in orbem positis, sessilibus, pinnatifidis, laciniis lanceolatis, acuminatis, modo angustis, et fere linearibus, modo duplo latioribus, crassa, late viridia; radicalia cæspitosa, longe petiolata, petiolis sulcatis, tortuosis, inferne longo tractu dilatatis, amplexantibus, vagina striata, margine albo-membranacea; caulina pauca, minora, multo brevius petiolata, plerumque minus decomposita, cæterum radicalibus similia, sita sub ramis, vel in parte inferiore pedunculorum, supremo plerumque simplici, subsessili, tri-quinquesido. Pedunculi ab uno ad sex, floriferi erecti, fructiferi cernui, aut recurvati, a semipollice ad duos pollices longi. Flos grandis. Foliola calycina ovata, aut oblonga, obtusa, concava, patentia, e viridi albertia, et interdum dorso

purpurantia. Corolla tota alba, calyce duplo, et triplo longior. Petala late obovato-cuneata, curvatura superiore leni, integra, vel leviter emarginata, aut erosula, venis ramosis percursa, ungue foveolato, et squamato, squamula sæpe bifida. Antheræ oblongæ. Ovaria pilosa. Stili recurvi. Nuculæ paucæ, potius grandes, in capitulum globosum, depauperatum collectæ, semiovatæ, compresso-tumidæ, maturitate insigniter rugosæ, pilosæ, vel glabræ, terminatæ rostro tenni, subulato, longiusculo, valde recurvato, et dorso nuculæ plerumque adpresso, ut nucula carere rostro videatur. Tota planta nunc sublanuginosa, nunc tantum pilis raris, longis, tamen lanugineis, adspersa, et sæpe a pilis deciduis hic illio, et præsertim in calyce, glabrata.

20. *RANUNCULUS Agerii*: radice grumosa, tuberibus subrotundis; caule erecto, hirsuto, paucifloro; foliis radicalibus primordialibus reniformibus, successivis trifidis, utrisque grosse crenatis, reliquis ternatis, foliolis pinnatifidis, laciniis brevibus, linearibus; fructibus ovoideis; nuculis compressis, lanceolato-subulatis, minute subgranulatis.

R. Agerii Bert. Mem. sopra due spec. nuov. p. 5. tab. 1., et in Opusc. scient. di Bologn. tom. 3. p. 182. tab. 6. Spreng. Syst. veg. 4. par. 2. p. 218. De Cand. Prodr. 1. p. 27. n. 6.

R. racemosa radice J. Bauh. Hist. pl. 3. app. p. 857. (pro 837.), et in alio exempl. ejusd. edit. app. p. 863. sine fig. C. Bauh. Phyt. p. 326. n. 26.

*R. grumosa radice folio Ranunculi bulbosi C. B. P. p. 181. n. 4., et Prodr. p. 95. n. 4. Raj. Hist. pl. 1. p. 592. Mont. Herb.**

R. grumosa radice Bononiensis Park. Theatr. bot. p. 332. n. 15. sine fig.

Ital. Ranuncolo pallotolato.

Perenn. Legi Bononiæ in campis collinis a Montedonato prope i Gessi, et a Gaibolla. Floret Aprili, Majo.

Radix grumosa, tuberibus parvis, subglobosis, aut ovoideis, glomeratis, raro in fibrillam desinentibus, queis interjiciuntur fibræ paucæ, tenues, longæ, ramulosæ. Caulis teres, erectus, simplex, vel superne parce ramosus, hirsutus, villo patulo, a spithama ad sesquipedem longus, inferne nudus. Folia radicalia petiolata, primordialia reniformia, triloba, successiva tripartita, utraque grosse crenata, reliqua ternata, foliolis pinnatifido-laciniatis, laciniis brevibus, lanceolato-

-linearibus, acutiusculis, vel obtusis, impari petiolulato; caulina pauca, in caule superiore tantum sita, vagina petiolari brevi loco petioli suffulta. Omnia folia glabra, crassiuscula, supra saturate viridia, subtus pallidiora. Petioli foliorum radicalium glabri, supra canaliculati, basi dilatati, amplexantes. Pedunculi unus-tres, crassiusculi, villosi. Sub his, et prope basim eorum folia floralia pauca, parcius laciniata, peduncularia sæpe tantum tripartita, laciniis linearibus, integris, vel bi-trifidis. Flos mediocris, solitarius in caule, pedunculisque. Foliola calycina ovata, obtusa, concava, e viridi lutescentia, demum retroflexa. Petala luteo-aurea, supra nitida, obovato-subrotunda, obtusa, integra, calyce paulo longiora. Antheræ lineares, longæ. Nuculæ numerosæ, congestæ in capitulum ovoideum, obtusum, semilanceolatæ, acuminatæ, acumine, sive rostro, recto, compresso-subulato, granulis minutissimis subadpersæ.

α. *Ranunculus chærophyllos*: napulis radicalibus fasciculatis, parvis, turgido-fusiformibus, collo crasso, fibris reticulatis stipato; caule paucifloro; foliis primordialibus semirobundatis, reliquis ternatis, foliolis bi-trifidis, basi cuneatis, laciniis latiusculis, acute bi-tridentatis; fructu oblongo; nuculis semiovatis, scabridis, subpilisque, rostro erecto, apice curvulo.

R. chærophyllos *Sp. pl.* p. 780. excl. syn. Column. *Smith. in Rees' s Cycl.* v. 29. n. 73. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 900., et *Syst. nat.* 1. p. 254. α. excl. syn. Column., et *Bocc., et Prodr.* 1. p. 27. n. 5. α. *Lois. Desl. Gall.* 1. p. 333.,* et *ed.* 2. tom. 1. p. 397.. α.* excl. syn. Column. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 29. n. 10. *Moris. Sard.* 1. p. 33. α.*

R. pedunculatus *Viv. Fl. Cors. diagn.* p. 8.*

R. insularis *Viv. App. ad Fl. Cors. prodr.* p. 2.*

R. tenuifol. luteus grumosa rad. *Soractensis* seu *Ital. Barrel. Ic.* 581.

β habitu grandiore; foliis primordialibus subrotundis, vel cuneato-ovatis, superne dentatis, reliquis ternatis, foliolis bi-trifidis, laciniis lanceolato-linearibus, acuminatis; nuculis scabro-hispidulis.

Ranunculus chærophyllos β *Moris. Sard.* 1. p. 34.*

R. chærophyllos γ *De Cand. Syst. nat.* 1. p. 254., et *Prodr.* 1. p. 27. n. 5. γ.

R. chærophyllos C *Ten. Nap.* 4. p. 344., et *Syll.* p. 267. n. 14. B. *Presl. Sic.* 1. p. 12. α.

R. flabellatus Desf. *Atl.* 1. p. 438. tab. 114. Sibth. et Smith. *Fl. Græc. prodr.* 1. p. 383. excl. syn. Column., et *Fl. Græc.* 6. p. 16. t. 520. *Sang. Cent.* p. 81.* *Biv. Bern. Cent.* 1. p. 68. n. 79.* *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 46.,* et *Sup.* 2. p. 184.,* et *Syn.* 2. p. 44.*

R. saxatilis, Apii folio minor, radice tuberosa, reticula obducta *Boec. Mus. di piant.* p. 162.

R. radice tuberosa reticulata *Bocc. l. c. t.* 124. radix cum foliis radical. tantum.

R. Prizensis latiori folio, ac numerosioribus florum petalis *Cup. Hort. Cath.* p. 186.

Ital. *Ranuncolo reticolato*.

Perenn. Habui ex monte Pisano prope *S. Maria del Giudice* a Prof. PETRO SAVIO, ex Igilio ab Eq. RICCASOLO, ex Sardinia in pascuis montis *Gennargentu*, et *Linas*, et in palustribus circa *Porto Giunco* ab Eq. Prof. MORISIO, in pascuis siccis *d'Orri* a Prof. DE NOTARIS, et in montibus *Tempio* Corsicam versus ab Eq. Prof. VIVIANNO, ex Corsica in pratis *alla Monaccia*, unde obtinuit Vivianus, a SERRAFFINIO sub nomine *Ranunculi pedunculati* Viv., et a Quenza a SOLEIROLIO. Varietatem β accepi ex sylvis Albanis a Prof. MAURIO, ex Calabria a *Potenza* ab Eq. Prof. TENORIO, ex Sicilia in pascuis fertilibus Panormitanis ab Eq. BIVONA-BERNARDIO, ab Eq. GUSSOKIO, a TODARO, et a Prof. PARLATORE. Floret ab Aprili in Junium.

Radix grumosa, tuberibus parvis, turgidis, fusiformibus, desinentibus in fibram longam, sæpe ramulosam, collo rhizomatosa, incrassata, et veluti bulbosa, stipata retibus fibrosis. Caulis teres, erectus, simplex, vel bifidus, aut saltem parce ramosus, inferne nudus, a duobus pollicibus ad apithamam longus. Folia radicalia cæspitosa, petiolata, primordialia semirotundata, grosse dentata, dentibus obtusis cum apiculo exiguo, subinde subtriloba, lobis pari modo dentatis, fugacia, reliqua ternata, foliolis cuneato-flabellatis, bi-trifidis, laciniis brevibus, latiusculis, acute bi-tridentatis, foliolo impari petiolulato. Petioli supra canaliculati, basi quidquam dilatati. Folia caulina pauca, sita sub ramis, vel in parte inferiore pedunculi, vagina petiolari tantum suffulta, vel suprema sessilia, tripartita, laciniis longiusculis, acutis, aut acuminatis, quarum media trifida, lateralibus raro divisis, vel omnibus integris, peduncularia subinde indivisa, lanceolata, aut linearia. Pedunculi plus minus longi, præsertim terminalis,

qui etiam bipollicaris, aut paulo ultra. Flos potius grandis. Foliola calycina ovato-lanceolata, acuta, vel obtusiuscula, concava, viridi-lutescentia, patentia, sero, nec semper, reflexa. Corolla calyce longior, etiam fere duplo, luteo-aurea, supra nitens. Petala obovata, obtusa, integra, venis ramosis, numerosis percursa. Antheræ oblongo-lineares. Nuculæ numerosæ in capitulum oblongum dense collectæ, compressæ, subsemi-ovato-acuminatæ, marginatæ, subinde granulis minutissimis adpersæ, et subpilosæ, mucronatæ rostro longiusculo, compresso, ensiformi, erecto, apice leniter recurvulo. Rachis capituli longa, pilosa. Tota planta adpresse villosa.

Varietas β plerumque gaudet habitu grandioro. Caulis a semipede ad sesquipedem longus, uni-septemflorus, alterne ramosus, vel dichotomus cum pedunculis alaribus. Folia radicalia grandiora, primordialia subrotunda, aut semirobundata, basi nunc subcordata, nunc truncata, nunc cuneata, alias leviter triloba, aut tripartita, segmentis cuneato-flabellatis, apice profunde, et acute dentatis, reliqua ternata, foliis pinnatifidis, laciniis longioribus, linearibus, vel lanceolato-linearibus, acuminatis. Pedunculi etiam tripollicares. Nuculæ plerumque hispidulæ, rostro recto, apice incurvulo, vel recurvulo. Reliqua ut in specie, etiam calyx patens, vel demum reflexus. Individua minora hujus varietatis ostendunt transitum in speciem, neque a calyce patente, vel reflexo quidquam certi hauriri potest, ut ex his fiant duæ distinctæ species, ut mavult Smithius in Fl. Græc. l. c.

22. *RANUNCULUS garganicus*: radice napulis fasciculatis, longis, collo nudo; foliis radicalibus longo petiolatis, ternatis, biternatisque, foliolis anguste pinnatifidis, laciniis linearibus, incisis, acutiusculis; calycibus patentibus; fructu oblongato; nuculis ovato-lanceolatis, minute granulosis, levibusque, rostro erecto, apice recurvulo.

R. garganicus Ten. Nap. 4. p. 344.,* et Syll. p. 268. n. 16. B.*

R. Thomasii Ten. Nap. tab. 146.* ex ipso Auct.

R. min. ruthæ fol. fl. simpl. grumosa rad. Ital. Barrel. Ic. 1153. fig. II.

Ital. *Ranuncolo navoncino*.

Perenn. Habui ex Gargano ab Eq. Prof. TENORIO. Floret Majo, Junio.

Radix collo nuda, fasciculata, elongata, intermixta fibris tenuioribus, ramulosis, et napulis quam in præcedente duplo, vel triplo longioribus, fusiformibus, deorsum in fibrâ longam attenuatis. Caulis teres, striatus, erectus, uni-bipedalis, inferne nudus, superne ramosus. Folia radicalia longe petiolata, primordialia pauca, simplicia, tripartita, segmentis trilobis, fugacia, successiva ternata, aut biternata, foliolis flabellato-partitis, laciniis linearibus, incis, acutiusculis, impari longius petiolulato. Eorum petioli supra canaliculati, basi dilatati, etiam duplo, et paulo ultra longiores folio. Folia sub ramis vagina petiolarum brevi tantum suffulta, inferiora ternata, foliolis pari modo dissectis ac radicalia, sed laciniis paucioribus, et plerumque longioribus, suprema bi-tripartita, laciniis integris, aut una, alterave incisione insculptis. Pedunculi teretes, adpresse villosuli. Flos grandis. Calycis foliola oblonga, obtusa, e viridi lutescentia, dorso adpresse villosa, patentia, et subinde reflexa. Corolla luteo-aurea, supra nitens, calyce etiam duplo longior. Nuculæ in capitulum oblongatum, quandoque fere pollicare collectæ, ovato-lanceolatæ, compressæ, marginatæ, læves, aut granulis minutis, punctiformibus adpersæ, rostratæ stilo longiusculo, ensiformi, erecto, apice recurvulo. Tota herba villosula, villis adpressis.

Hæc species appropinquat *Ranunculum olerophyllum* L., præsertim varietatem ejus β , sed diversa napulis radicalibus saltem duplo longioribus, collo radicis nudo, caule altiore, laciniis foliorum brevioribus, et angustioribus, acutiusculis, nec acuminatis, herba minus villosa. Magis adhuc recedit a *Ranunculo millefoliato* Vahl. magnitudine partium, forma nuclearum, et stilo non revoluto, aut exquisite recurvato. Quid sit *Ranunculus garganicus* A. Ten. Syll. p. 268. n. 16., dicere nequeo, cum exemplar autopticum non viderim. Bis accepi pro hoc ab aliis, nec a Cl. Tenorio, *Ranunculum millefoliatum* Vahl.

23. *RANUNCULUS millefoliatus*: napulis radicalibus parvis, fusiformibus, collo nudo; caule paucifloro; foliis bipinnatis, ternatisve, foliolis multifidis, laciniis anguste lanceolato-linearibus; calycibus patentibus; fructu oblongo; nuculis suborbiculatis, minute punctulosis, glabris, rostro brevi, revoluto.

R. millefoliatus Vahl. *Symb.* 2. p. 63. tab. 37. *Willd. Sp. pl.* 2. par. 2. p. 1328. *Desf. Atl.* 1. p. 441. tab. 116. *Sibth.*

- et *Smith. Fl. Græc. prodr.* 1. p. 383., et *Fl. Græc.* 6. p. 17. t. 521. *Smith. in Rees' s Cycl.* v. 29. n. 14. *De Cand. Syst. nat.* 1. p. 256., et *Prodr.* 1. p. 27. n. 9. *Bert. Lucubr.* p. 8. n. 24. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 29. n. 11. *Ten. Nap.* 4. p. 344., et *Syll.* p. 269. n. 17. *Guss. Pl. rar.* p. 222.,* et *Fl. Sic. prodr.* 2. p. 47.,* et *Syn.* 2. p. 43.* *Presl. Sic.* 1. p. 13. *Reich. Exc.* 3. p. 721. n. 4590., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 10. *Ran. Ran.* t. 9. f. 4590. *R. chærophyllus Sav. Bot. Étr.* 4. p. 124.* *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 184.*
*R. alter radice Chelidonij minoris Aldr. Plant. sicc.** in herb. Bonon.
Ranunculo trovato sopra a molini di Sebenico, che ha fiori doppi di foglie... le radici somigliano Chelidonia minore Ang. Sempl. p. 178.
Ranunculus mont. leptophyllon Asphodeli radice Column. Ecphr. 1. p. 312. fig. p. 311.
R. Cherophyllos, Asphodeli radice Cup. Hort. Cath. p. 186.
R. Cherophyllos, seu Carotes folio, Asphodeli radice, flore duplici Cup. Sup. alt. p. 75.
R. asphodeli radice Pastinacæ tenuifoliz folio, flore duplici Bonan. Panph. tab. 10.
R. min. ruthæ fol. fl. simpl. grmiosa rad. Ital. Barrel. Ic. 1153.

Ital. *Ranuncolo daucino.*

Perenn. Habui ex districtu Urbinati ad Petram pertusam a FEDERICO, ex Piceno in monte *De' fiori* ab OSASINO, in monte *Priore*, et a *Capo di Tenna* a MARZIALETO, ex Prætutiis a *Castel di Sangro* ab Eq. GUSSONIO, ex Etruria prope *Prata* ab Eq. Prof. CAJ. SAVIO, a *Roselle* in *Maremma* a Prof. PETRO SAVIO, ex Argentario ab Eq. RICCASOLO, ex collibus Albanis, et Tucculanis, ubi communis in pratis, et sylvis, a PPR. SEBASTIANIO, et MAURIO, et a BARBIERIO, ex montosis editoribus Lucaniz prope *Castelgrande* a GASPARRINIO, ex herbidiis Gargani a Prof. PARLATORE, ex Sicilia in collibus herbidiis præsertim prope Panormum ad Eq. GUSSONIO, a TODARO, et a Prof. PARLATORE, ex Ilva a Prof. PETRO SAVIO. Floret Aprili, Majo.

Radix fasciculato-napulosa, napulis parvis, ellipsoideis, vel paulo longioribus fusiformibus, deorsum acutis, aut in fibrillam desinentibus, sæpe paucis; iis interjiciuntur fibræ tennes, ramulosæ; collo radicis tenui, reticulis fibrosis nullis, ant fere nullis. Caulis teres, erectus, pilosus, aut pubescens, simplex, vel uno-tribus

Flor. Ital. T. V. 34

ramis instructus, a palmo ad pedem longus, inferno nudus, modo solitarius, modo plures ex eadem radice, lateralibus brevioribus. Folia radicalia cæspitosa, longo petiolata, bipinnata, aut ternata, foliolis glabris, raro ciliolatis, multifidis, laciniis brevibus, angustis, linearibus, vel lanceolato-linearibus, acutis, aut obtusis, integris, vel apice bi-trifidis. Petioli pilosi, aut pubescentes, supra canaliculati, inferno longo tractu paulo dilatati, amplexantes. Folia caulina paucæ, sita sub ramis, aut infra pedunculum, vagina petiolari tantum suffulta, radicalibus minus decomposita, cæterum similia. Pedunculi modo breves, modo longi, et subinde longissimi, etiam quadripollicares, villosi, et magis apice. Raro datur pedunculus radicalis, sive scapus nudus, uniflorus. Flos grandis, aut saltem mediocris. Foliola calycina oblongo-lanceolata, vel lanceolata, acuta, concava, patentia, glabra, rarius pilosa, et viridi lutescentia, subinde extus purpurantia. Corolla luteo-aurea, supra nitens, calyce duplo, et triplo longior. Petala obovata, aut oblongo-obovata, quinque-decem, obtusa, integra, venis numerosis, ramosis percursa. Antheræ lineares, longæ. Stili apice recurvi. Stigmata lateraliter, scabrida. Nuculæ numerosæ in capitulum oblongum dense collectæ, subsemiorbiculatæ, compressæ, marginatæ, sub vitro minutissime punctulosæ, cæterum glabræ, mucronulatæ rostello brevi, triangulo, compresso, revoluta, aut exquisitè recurvato, maturitate facile diffusæ. Receptaculum fructus cylindraceum, glabrum. Villositas herbæ patens, aut laxiuscula, raro adpressa.

24. *RANUNCULUS illyricus*: incano-lanuginosus; caule erecto, parce ramoso; foliis ternatis, foliolis tripartitis, laciniis anguste lanceolatis, elongatis, integerrimis; calycibus sero reflexis; fructu oblongo, nuculis impresso-punctatis, lævibus, rostro ensiformi.

R. illyricus *Sp. pl.* p. 776. *Smith. in Rees' s Cycl.* v. 29. n. 31. *Jacq. Austr.* 3. p. 13. t. 222. *De Cand. Syst. nat.* 1. p. 259., et *Prodr.* 1. p. 28. n. 19. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 28. n. 7. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 286.* *Ten. Nap.* 1. p. 314., et *Syll.* p. 268. n. 15. *B. Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 46. heft. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 172. *Koch. Syn. ed. 2. tom. 1. p. 17. Reich. Exc.* 3. p. 721. n. 4587., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 10. *Ran. Ran.* t. 8. f. 4587. *Host. Austr.* 2. p. 110.

R. monspeliacus *Ten. Viag. in Abruzz.* p. 72. n. 321.

R. sericeus Willd. *Enum.* 1. p. 589.

Ranunculi species altera flore grandi et simplici; foliis caudidis, et lanuginosis, in partes angustas et oblongas divisas *Casalp. De pl. lib.* 14. cap. 4. p. 546.

Ranunculus grumosa radice III. *Clus. Hist. pl. lib.* 2. p. 240. fig.

R. Illyricus Lob. *Ic.* p. 672.

β foliis ternatis, anguste oblongis, cuneatis, bi-tripartitis, laciniis apice bi-tridentatis, bi-trifidisve.

Ranunculus illyricus *Sang. Cent.* p. 80.* *Willd. En.* 1. p. 589.

R. monspeliacus Reich. *Exo.* 3. p. 721. n. 4588., excl. syn. Balb., et loco natali, et *Io. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 10. *Ran. Ran.* 1. 8. f. 4588. optim.

R. monspeliacus α angustilobus *De Cand. Syst. nat.* 1. p. 260., et *Prodr.* 1. p. 28. sub. n. 20.

R. alter saxatilis Asphodeli radice *Column. Ecphr.* 1. p. 312. descr.

R. saxatilis mont. asphodeli rad. *Column. l. c.* p. 313. fig.

γ adpresse villosus, atrovirens; foliis simplicibus, parvis, primordialibus cordato-ovatis, subtrilobis, succesis trifidis, omnium segmentis obtuse dentatis.

Ranunculus saxatilis *Balb. Misc. bot.* 1. p. 27.* et in *Acad. de Tur. ann. X-XI.* vol. 12. p. 343.* excl. syn. *Morison., et Misc. alt.* p. 19.* et in *Acad. de Tur. ann.* 1805-1808. vol. 16. p. 217.*

R. monspeliacus γ rotundifolius *De Cand. Syst. nat.* 1. p. 260., et *Prodr.* 1. p. 28. sub. n. 20. *Guss. Sup.* 2. p. 185. γ., et *Syn.* 2. p. 44. γ. excl. syn. Reich.

Ital. *Ranuncolo Bambagello.*

Perenn. Habui ex Piceno in *Vettore*, et a Bonacquisto ab Orsino, denuo in *Vettore* a Prof. MAURIO, ex monte *S. Angelo di Castellamare al Piano di Faito* a RAINEIRO, ex rupestribus borealibus Lucania a GASPARRINIO. Varietatem β accepi ex Latio a *Guadagnolo* a Prof. MAURIO, et ab *Woodsto*, ex *Vulture Apulo* a GASPARRINIO, ex *Castel di Sangro*, et ex *Taburno* ab Eq. GUSONIO. Varietatem γ obtinui ex valle Augustana in *Pedemontio* inter *Pollein*, et *Brissogne* a Prof. BALBISIO, ex *Ætna* a Prof. PARLATORE. Floret Majo, Junio.

Radix grumosa, tuberibus parvis, numerosis, oblongis, vel cylindraceis, inferne acutis, et subiinde in fibrillam abeuntibus, queis superimponuntur, aut interjiciuntur fibræ tenues, ramulosæ. Ex hac radice sæpe procedunt flagella tenuia, filiformia, horizontalia, flexuosa,

iterum pari modo radicante, et sobolem novam datura. Caulis teres, fartus, erectus, spithamalis-pedalis, et etiam paulo ultra, modo simplex, uniflorus, modo superne parce ramosus, ramis strictis, inferne nudus, et interdum longo tractu. Folia radicalia longe petiolata, primordialia ludunt indivisa, bipartita, et tripartita, successiva ternata, pinna impari petiolulata, lateralibus sessilibus, omnibus bi-tripartitis. Tam folia radicalia indivisa, quam lacinie reliquorum foliorum sunt anguste lanceolatae, aut lanceolato-lineares, longae, acutae, integerrimae. Petioli supra canaliculati, basi paululum dilatati, amplexicaules. Folia caulina pauca, alterna, vagina petiolari loco petioli suffulta, suprema tantum bi-tripartita, vel indivisa, caeterum foliis radicalibus similia. Pedunculi solitarii, terminales cauli, ramisque, saepe longi. Flos grandis, licet magnitudinis variae. Foliola calycina lanceolata, aut ovato-lanceolata, acuta, concava, e viridi flavescentia, primo patentia, postea reflexa. Corolla saturate flava, calyce duplo, et triplo longior. Petala obovata, obtusa, integra, aut emarginata, venis ramosis percursa, squama unguis obovata, canaliculata. Antherae oblongae. Stili longi, recti, stigmate recurvo. Nuculae numerosae, in capitulum oblongum congestae, subrotundae, marginatae, sub vitro impresso-punctulatae, glabrae, aut uno, alterove pilo adpersae, terminatae rostro ensiformi, medicri, recto, apice recurvulo. Tota planta molliter incano-lanuginosa.

Varietas β differt foliolorum laciniiis cuneato-oblongis, vel cuneato-flabellatis, apice iterum bi-tridentatis, vel bi-trifidis. Caetera omnino eadem.

Varietas γ gaudet foliis multo minoribus, simplicibus, radicalibus primis cordato-ovatis, subtrilobis, lobis obtuse dentatis, reliquis trifidis, aut tripartitis, segmento medio obovato-cuneato, lateralibus obliquato-conneatis, laciniiis apice obtuse dentatis. Corolla ejus paulo minor. Herba atrovirens, villosa, villo brevior, adpresso. Fructus, et nuculae omnino ut in specie. Nullam figuram habemus hujus varietatis, quae rectius forte recipienda in distinctam speciem sub nomine *Ranunculi saxatilis* indito a Balbisio. Pauci hactenus eam cognoverunt.

Ranunculus monspeliacus De Cand. Ic. pl. Gall. rar. fasc. i. p. 16. tab. 50., ejus exemplar obtinui a Cl. Biria lectum Monspelii, valde appropinquat nostram varietatem β , sed distinguitur foliolorum segmentis latioribus, ovatis, grandius dentatis. Haec forma nondum reperta est in Italia.

25. *RANUNCULUS sceleratus*: caule fistuloso, erecto, superne valde ramoso; foliis inferioribus tripartitis, segmentis lobato-crenatis, lateralibus bifidis; floralibus digitatis, laciniis lanceolatis, integris, serratisque; capitulis fructus oblongis; nuculis minutissimis, rugulosis.
- R. sceleratus* *Sp. pl.* p. 776. *Smith. Engl. Fl.* 3. p. 48., et *Engl. bot.* v. 10. t. 681. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 264. *Curt. Lond. ed. Grav.* v. 2. t. 72. *Fl. Dan.* t. 571. *Sv. bot.* v. 6. t. 412. *Plenck. Ic. pl. med.* 5. p. 59. t. 456. *Bull. Pl. ven.* p. 143. t. 47. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 897., et *Syst. nat.* 1. p. 269. *α.*, et *Prodr.* 1. p. 34. n. 66. *α.* *All. Ped.* 2. p. 52. n. 1461. *Balb. Taur.* p. 89. *Re Tor.* 1. p. 290. *Birol. Acon.* 1. p. 189. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 37. n. 34. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 263., et 392. *Comoll. Prodr.* p. 109. *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec.* 2. tom. 10. p. 291. *Pollin. Ver.* 2. p. 231. *Ruch. Ven.* p. 134. *Nacc. Ven.* 3. p. 96. *Suffr. Foroj.* p. 151. *Sav. Bot. Etr.* 4. p. 122. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 183. *Ten. Nap.* 1. p. 314., et *Syll.* p. 270. n. 20. *Ab Ucr. Hort. Pan.* p. 232. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 49., et *Syn.* 2. p. 43. *Presl. Sic.* 1. p. 16. *Moris. Sard.* 1. p. 35. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 186. *Koch. Syn. ed.* 2. tom. 1. p. 20. *Reich. Exc.* 3. p. 723. n. 4598., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 11. *Ran. Ran.* t. 11. f. 4598. *Host. Austr.* 2. p. 109. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 398. *Gaud. Helv.* 3. p. 538. *α.*
- R. sardous* *Bell. App. in Acad. de Tur. ann.* 1790-1791. v. 5. p. 236. *Balb. Cat. stirp. hort. Acad. Taurin. ann.* 1813. p. 64.*
- R. fasciculatus* *Moric. Ven.* 1. p. 238.
- R.* n. 1175. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 74.
- Ranuncolo* I. *Matth. Valgr.* 1585. tom. 1. p. 644. fig.
- Apio riso* *Dur. Herb. ed Rom.* p. 37. fig.
- Ranunculus palustris*, *Apij folio, lævis* *Cup. Hort. Cath.* p. 185. *Segui. Ver.* 1. p. 491. n. 13.
- Ranunculi secunda species* *Fuchs. Hist. pl.* p. 159. fig.
- Ranunculus sylvestris* I. *Dod. Pempt.* p. 426. fig.
- R. palustris rotundi folius* *Ger. em.* p. 962. fig.
- R. palustris flore minimo* *J. Bauh. Hist. pl.* 3. app. p. 858. fig.
- Ital. Appio riso. Erba Sardoia. Erba Sardonio. Ranuncolo di padule. Ranuncolo palustre. Sardonio* *Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 198.
- Ann. Filius attulit ex districtu Bononiensi al Sasso. Habni ex Pedemontio in fossis Morettensibus a Prof. BALBESIO,*

ex districtu Ferrariensi a *Bergantino*, et ex agro Mantuano a *Melara* a FELISIO, Veronâ in vicâ suburbano a *S. Massimo* a MANGANOTTO, ex Tyrolî meridionali a *Girila* in districtu di *Bolzano*, et in *Piemme* prope *Predazzo* a FACCHINIO, Bassano in fossis di *Cittadella*, *Rossano*, et *Godego* a MONTINIO, ex palustribus circa *Monfalcone* a TOMMASINIO, ex aquitrinis ad portum Asculanum ab ORSINO, ex Ducatu Lucensi a *Massaciucoli* a Prof. PUCCINELLIO, ex turfosis agri Pisani supra *Asciano* a Prof. PETRO SAVIO, ex Corsica a *Bastia* a SOLESIOLIO. Floret Majo, Junio.

Radix fibrosa, fibris dense verticillatis, crassinesulis, albis, vix ramulosis, quæ fibræ sæpe prodeunt etiam ex articulis caulinis imis intra aquam immersis. Caulis teres, plerumque crassus, fistulosus, striatus, erectus, superne ramosissimus, paniculatus, a semipede ad duos pedes longus, subinde apice pilosus. Folia caulina tripartita, segmento medio trifido, vel integro, cuneato, lateralibus bifidis, basi obliquis, omnibus obtuse lobato-dentatis; tenuiter nervosis, et reticulato-venosis, inferiora longe petiolata, successiva brevius, superiora ad ramos floriferos subsessilia, aut sessilia, fere digitata, laciniis nunc lanceolatis, nunc superne dilatatis, dentatis, aut inciso-dentatis, vel integris, suprema plerumque simplicia, lanceolata, integra. Petioli latinsculi, supra canaliculati, basi brevi tractu dilatati. Flores paniculati, approximati in apice caulis, et ramorum, admodum parvi, breviter pedunculati, pedunculis sæpe pilosis, nonnullis oppositifoliis. Calycis foliola oblonga, aut ovata, e viridi luteola, reflexa, dorso pilosa. Corolla pallide lutea, calyce paulo longior. Petala obovata, integra, ungue periferò nuda. Stili brevissimi, facti ex apice ovarii compresso-triangulo. Receptaculum fructus elongatum, cylindraceum. Nuculæ exiguæ in capitulum oblongum dense imbricatæ, semiovatæ, compresso-tumidulæ, stilo persistente, recto vix apiculatæ, in plena maturitate obsolete rugulosæ. Calyx, corolla, nuculæ citissime, et facilitate diffluunt. Herba glabra, nitens.

Planta valde acris, caustica, exulcerans. Sunt, qui putent respondere herbæ *Sardonis* Dioscoridis lib. 6. cap. 14., et herbæ *Sardos* Virgilii:

Imo ego Sardois videar tibi amarior herbis

Ecl. 7. v. 11.

cujus succus potus insanire faciebat, et spasmus in musculis faciei ita excitabat, ut risus species in morientibus oriretur, ex quo risus Sardonius pro risu coacto, et simulato nomen duxit. Verum botanici, qui nostris temporibus Sardiniam perlustrarunt, nihil certi comperire potuerunt de hujusmodi herba, et profecto Plinius loquens de Apiastro, quod in confessa damnatione venenatum dicit in Sardinia Nat. hist. lib. 20. cap. 17., videtur referre plantam hanc ad umbellatarum familiam. Coufer ea, quæ hac de re docte scripsit Cl. Eq. Morisius in Fl. Sard. 1. p. 37.

26. *Ranunculus auricomus*: foliis radicalibus longe petiolatis, reniformibus, trifidisque, crenatis, segmentis incis, caulinis sessilibus, digitatis, laciniis linearibus, elongatis, subintegris; floribus paniculatis; nuculis pubescentibus, rostro longiusculo, recurvo.

R. auricomus *Sp. pl.* p. 755. *Smith. Engl. Fl.* 3. p. 47., et *Engl. bot. v. 9. t. 624.*, et in *Rees' s Cycl. v. 29. n. 22.* *Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 264.* *Curt. Lond. ed. Grav. v. 1. t. 71. Fl. Dan. t. 665.* *De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 897. a. β., et Syst. nat. 1. p. 266. a., et Prodr. 1. p. 33. n. 63. a. All. Ped. 2. p. 49. n. 1448. Coll. Herb. Ped. 1. p. 36. n. 32. Noco. et Balb. Tic. 1. p. 262., et 392. Suffr. Foroj. p. 151. Ten. App. 5. p. 15. Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 59. heft. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 173. Koch. Syn. ed. 2. tom. 1. p. 17. Reich. Exc. 3. p. 723. n. 4599., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 11. Ran. Ran. t. 12. f. 1599. macrior, et t. 13. f. 1599. grandiflorus, et t. 14. fol. radio. var. Host. Austr. 2. p. 109. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 397. Gaud. Helv. 3. p. 537.*

R. polymorphus *All. Ped. 2. p. 49. n. 1449. tab. 82. fig. 2.* ex Auctore in *Auct. p. 27.*

R. cassubicus *γ auricomus Barb. Agg. p. 36.**

R. cassubicus *α. β. γ. Pollin. Ver. 2. p. 230.*

R. marsicus *Ten. App. 4. in Fl. Nap. tom. 5. p. 11.*

R. n. 1177. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 76.

Ranunculi prima species sylvestris *Fuchs. Hist. pl. p. 156. fig.*

Ranunculus *I. silvestris* *Fuchs. Lugd. hist. 1. p. 1029. fig.*

R. auricomus. Ranunculus dulcis *Tragi Lob. Ic. 669.*

R. auricomus *Ger. em. p. 954. fig.*

R. rotundifolius vernus sylvaticus *J. Bauh. Hist. pl. 3. app. p. 841. fig.*

Ital. Bottoncini d'oro. Margheritine *Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 198.*

Perenn. Habui Mantuâ in valle *Sermide* a BARBERIO; ex Baldo ai Coltri a RAINERO, et a Prof. VISIANIO, ex Tyroli Italico in *Fassa* in pratis di *Pedaia*, et a *So-reghes*, nec non in *Fiemme* in alpe *Lusia* a FACCHIRIO, ex districtu Bassanensi in sylvis montis *Gloso*, et S. Michaelis d' *Angarano*, tum secus rivulos di *Romano* a MONTINIO, et ab Eq. PAROLINIO, ex Apennino Lucensi al *Prato fiorito* a GIANNINIO, et a Prof. PETRO SAVIO, ex eodem loco, et ex alpe di *Paladina* a Prof. PUCCINELLIO. Floret Martio, Aprili, in editis Junio, Julio.

Rhizoma fusiforme, gracile, transversum, lateraliter dense capillatum fibris ramulosis. Caulis teres, fistulosus, striatus, erectus, vel adscendens, spithamalis-pedalis, inferne longo tractu nudus, superne foliosus, et ramosus. Folia radicalia longe, et subinde longissime petiolata, nunc reniformia, aut cordato-orbiculata, indivisa, inæqualiter crenata, nunc trifida, segmentis crenatis, medio cuneato, lateralibus bi-trifidis, basi obliquis. Petioli supra canaliculati, basi quidquam dilatati. Folia caulina sita sub ramificationibus, sessilia, profunde digitata, laciniis elongatis, linearibus, vel lanceolatis, integerrimis, aut uno, alterove dente, vel incisione insculptis; inferiora subinde gaudent laciniis dentatis. Flores terminales, paniculati, longiuscule pedunculati, pedunculis nudis, pilosis præsertim apice. Flores magnitudinis ludibundæ, sæpe grandes. Foliola calycina oblonga, obtusa, vel acuta, concava, e viridi lutescentia, extus pilosa, patentia, subinde degenerantia in formam petaloideam, petalis veris tunc deficientibus. Corolla luteo-aurea, supra nitida, calyce duplo longior. Petala-obovata, obtusa, integra, aut leviter emarginata, ungue porifero. Antheræ oblongo-lineares. Ovaria pilosa. Stili pilosi, apice recurvi. Nuculæ in capitulum globosum collectæ, numerosæ, grandiusculæ, semirotundæ, tumidæ, pubescentes, stilo longiusculo recurvo rostellatæ. Herba hic illic glabra, aut pilosula, mitior cæteris speciebus, et fere iners.

27. *RANUNCULUS Thomasii*: rhizomate brevi, crasso, cylindraceo, præmorso, lateraliter fibroso; caule erecto, striato, ramoso; foliis ternatis, foliolis sessilibus, flabellato-multipartitis, laciniis linearibus, inciso-dentatis; pedunculis sulcatis; calyce patente; nuculis lævibus, stilo brevissimo, exquisite uncato terminatis.

R. Thomasii Ten. *Nap.* 4. p. 347. tab. 240. fig. 1, * et *Syll.* p. 271. n. 24.*

Ital. *Ranuncolo colombino*.

Perenn. Habui exemplar lectum in Calabria *alla Sile* a Thomasio, et Eq. BIVONA-BERNARDIO ab eodem concessum. Communicatum mihi fuit a Prof. PARLATORE, cui religiose ressitui. Floret Junio.

Rhizoma cylindraceum, breve, crassum, præmorsum, lateraliter vestitum fibris numerosis, crassiusculis, flexuosis. Caules plures ex eadem radice, medius erectus, laterales ascendentes, omnes teretes, striati, pubescentes, spithamam-dodrantem longi, parce ramosi, vel simplices, inferne nudi. Folia radicalia cæspitosa, longiuscule petiolata, ternata, foliolis sessilibus, cuneato-flabellatis, multipartitis, laciniis linearibus, acute inciso-dentatis, pubescentia, supra saturate virentia, subtus pallidiora. Petioli striati, supra canaliculati, pubescentes, basi dilatati. Folia caulina pauca, sita ad ramos, et in pedunculo, vagina petiolari brevi, striata loco petioli suffulta, palmato-tripartita, laciniis linearibus, acuminatis, integerrimis, quandoque duo ex inferioribus opposita, peduncularia subinde indivisa, linearia. Pedunculi uniflori, terminales, sulcati, et exquisitius in fructu, adpresse pubescentes. Flos grandiusculus. Calycis foliola oblonga, apice angustata, apice ipso obtusiusculo, paulo longiora, quam in *Ranunculo bulboso* L., concava, patentia, e viridi lutescentia, dorso villosa, margine membranacea. Corolla luteo-aurea, calyce etiam duplo longior. Petala obovata. Nucula in capitulum globosum, parvum collecta, subsemiorbiculata, compressa, lato marginata, læve, glabra, mucronata stilo brevissimo, vix semilineari, exquisite uncato. Rachis capituli villosa. Pubescentia herbæ brevis, densa, patula.

Species valde proxima *Ranunculo polyanthemo* L., sed minor, insuper distincta calycibus grandioribus, et stilo nucularum exquisite uncato.

28. *RANUNCULUS acris*: adpresse pilosus, villosusve; caule erecto, multifloro; foliis tripartitis, ternatisque, segmentis, foliolisque multifido-flabellatis, superne inciso-dentatis, acuminatis, floralibus palmato-linearibus; pedunculis teretibus; calyce patente; nuculis lævibus, stilo brevissimo, rectiusculo apiculatis.

R. acris *Sp. pl.* p. 779. *Smith. in Rees's Cycl.* v. 29. n. 59., et *Engl. Fl.* 3. p. 51., et *Engl. Bot.* v. 10. t. 652. *Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 265.* *Curt. Lond. ed. Grav. v. 1. tab. 74.* *Bull. Pl. ven. p. 144. t. 109.* *Plenck. Ic. pl. med.* 5. p. 60.

- t. 458. Sv. bot. v. 6. tab. 375. *De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 899.*, et *Syst. nat. 1. p. 277.* cum variet., et *Prodr. 1. p. 36. n. 88.* cum variet. *All. Ped. 2. p. 52. n. 159. Balb. Taur. p. 90. Re Seg. p. 47.*, et *Tor. 1. p. 292. Birol. Acon. 1. p. 191. Coll. Herb. Ped. 1. p. 38. n. 39. Noce. et Balb. Tic. 1. p. 265.*, et 393. *Comoll. Prodr. p. 110. Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec. 2. tom. 10. p. 292. Pollin. Ver. 2. p. 239. Ruch. Ven. p. 135. Moric. Ven. 1. p. 237. Nacc. Ven. 3. p. 98. Suffr. Foroj. p. 151. Rom. in Da Rio Giorn. dell' Ital. lett. tom. 24. p. 287. Ten. Nap. 4. p. 348.* cum variet., et *Syll. p. 271. n. 25.* cum variet. *Guss. Pl. rar. p. 222.* Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 46. heft. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 179. Koch. Syn. ed. 2. tom. 1. p. 13. Reich. 10. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 12. Ran. Ran. tab. 17. f. 4606. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 398. Gaud. Helv. 3. p. 543.*
- R. acer Host. Austr. 2. p. 114.*
- R. Steveni Reich. Exc. 3. p. 724. n. 4605.*, et *1c. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 11. Ran. Ran. 1. 17. f. 4605.*
- R. n. 1169. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 72.*
- Chrisanthemo di Damocrate presso il Fuchsio Pon. Mont. Bald. p. 143.*
- Ranunculus pratensis, erectus, acris Zannich. Ist. p. 223. tab. 108. Segui. Ver. 1. p. 487. n. 5.*
- R. pratensis, erectus dulcis Zannich. Ist. p. 223. Segui. Ver. 1. p. 487. n. 6.*
- R. pratensis erectus, acris et maculatus Segui. Sup. p. 213. n. 3.*
- Chrysanthemum Fuchs. Hist. pl. p. 879. fig.*
- Rannunculus hortensis H. Dod. Pempt. p. 426. fig.*
- R. rectus, non repens flore simplici J. Bauh. Hist. pl. 3. lib. 30. p. 416. fig.*
- Ital. Batrachio Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 197.*
- Perenn. Legi Sarzanæ in pratis al Corso, Bononiam in herbidiis di Zolla predosa. Habui ex Apennino Ligurim orientalis in pratis prope Gambaro a TURIO, ex Pedemontio in sylvaticis ad thermas Valderias a BERTERO, ex Tyroli meridionali a Cardaun prope Bolzano, et ex Tyroli Italico in Fiemme, et Fassa a FACCHINIO, ex pratis Bassanensibus, et ex sylvis d' Angarano a MONTINIO, ex agro Belunensi prope Agordo a PATERNO, ex humentibus circa Zaulle a TOMMASINIO, ex Piceno al Piangrande di Castelluccio ab ORSINO, ex Ducatu Lucensi in olpe di Limane, et a Ghivizzano a Prof. PUCCELLINO, ex agro Pisano ab E. Prof. CAL. SAVIO, ex*

pascuis udis prope *Barga*, et ex Apennino Pistoriensi a Prof. PIERO SAVIO, ex Calabria alla *Sile* ab Eq. GUSONIO. Floret Majo, Junio.

Radix fibrosa, alba, longa, fibris numerosis, stipatis, rhizomate brevissimo, crasso, præmorso. Caulis teres, striatus, fistulosus, erectus, plerumque adpresse pilosus, rarius pilis patentibus, quandoque inferne glabratus, interdum basi maculis purpureis variegatus, alterne ramosus, et, dum ramosior, paniculato-dichotomus, macrior palmaris, luxurians etiam tri-quadripedalis. Folia tripartita, vel ternata, petiolulis brevissimis, segmentis, aut foliolis cuneato-flabellatis, medio tripartito, lateralibus bipartitis, superne inæqualiter, acuteque inciso-dentatis, acuminatis, vel acutis, modo latis, lanceolatis, modo angustis, linearibus, cæterum adpresse pilosa, aut villosa, supra saturate viridia, et subinde ad angulos intrantes macula atrosanguinea picta, subtus pallidiora, nervosa, et laxè reticulato-venosa, inferiora longè petiolata, radicalia cæspitosa. Eorum petioli supra canaliculati, basi longo tractu dilatati, adpresse pilosi. Folia floralia superiora vagina petiolari brevissima loco petioli suffulta, bi-tripartita, laciniis linearibus, integerrimis, suprema interdum indivisa, linearia. Flores paniculati, in caule ramosiore cùm pedunculis alaribus. Pedunculi teretes, uniflori, adpresse pilosi. Calycis foliola ovata, obtusiuscula, concava, patentia, decidua, e viridi flavicantia, dorso pilosa. Corolla luteo-aurea, supra nitida, extus pallidior, calyce duplo longior, aut parum ultra, magnitudinis variæ, et subinde grandiuscula. Petala obovata, integra, vel leviter emarginata. Nucula in capitulum globosum collecta, subsemiorbiculata, compressa, angustè marginata, læves, glabræ, acutata stilo brevissimo, compresso-triangulo, recto, aut vix apice recurvulo. Axis capituli glaber. Herba valde acris, vesicatoria.

29. *RANUNCULUS montanus*: rhizomate cylindraceo, lateraliter fibroso; foliis radicalibus tripartitis, segmentis angustè laciniatis, cuneato-flabellatis, floralibus palmatis, laciniis linearibus, integris; nuculis lævibus, stilo brevi, revolutò, uncatove rostellatis.

R. montanus Willd. Sp. pl. 2. par. 2. p. 1321. Smith. in Rees' s Cycl. v. 29. n. 40. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 895., et Syst. nat. 1. p. 276.,* et Prodr. 1. p. 36. n. 85.* Balb. Misc. bot. 1. p. 26.,* et in Acad. de Tur. an. x-x1*

- tom. 12. p. 342.* *Birol. Acon.* 1. p. 190. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 36. n. 31. *Noecc. et Balb. Tic.* 1. p. 263. *Comoll. Prodr.* p. 109. *Pollin. Ver.* 2. p. 235. α . β . *Bert. Aman. Ital.* p. 375. n. 168. *Bert. fil. It. in Apenn. Bonon.* p. 10.* *Ors. in Cap. Opusc.* p. 286.* *Sang. Cent.* p. 80.* *Ten. Nap.* 4. p. 345., et *Syll.* p. 270. n. 21. *Moris. Sard.* 1. p. 42. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 176. *Koch. Syn. ed.* 2. tom. 1. p. 18. α . β . *Reich. Exc.* 3. p. 723. n. 4604., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 11. *Ran. Ran.* 1. 16. f. 4604. *Host. Austr.* 2. p. 113. *Gaud. Helv.* 3. p. 540. cum varietatib.
- R. nivalis* *Jacq. Austr.* 4. p. 13. tab. 325, 326. non Linn. *Villars. Dauph.* 3. p. 742. *All. Ped.* 2. p. 51. n. 1454. *Re Seg.* p. 47. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 19. heft. *Scop. Carn.* ed. 2. tom. 1. p. 396.
- R. gracilis* *Schl. Pl. sicc.* Reich. Exc.* 3. p. 723. n. 4603., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 11. *Ran. Ran.* 1. 16. f. 4603.
- R. lapponicus* *Villars. Dauph.* 3. p. 743. non Linn.
- R. Villarsii* *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 898., et 5. p. 637. *Ten. Nap.* 4. p. 436. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 177. *Koch. Syn. ed.* 2. tom. 1. p. 18. *Reich. Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. *Ran. Ran.* tab. 18.
- R. Gouani* *Ten. Nap.* 4. p. 346. maxima parte, et *Syll.* p. 270. n. 23. max. par. *Reich. Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 12. *Ran. Ran.* 1. 16. f. 4608. b. non *De Cand.* R. n. 1168. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 71.
- R. tenuifolius montanus* *Segui. Sup.* p. 215. *J. Bauh. Hist. pl.* 3. lib. 30. p. 416. fig. p. 417. possideo etiam hac forma foliorum.
- R. saxatilis* magno flore *Segui. Sup.* p. 213. excl. syn. Lin.
- R. minimus alpinus luteus* *J. Bauh. Hist. pl.* 3. app. p. 861. fig. infer.
- β latifolius, grandiflorus; foliis caulinis palmatis, laciniis latiuscule lanceolatis, inciso-dentatis; integrisve. *Ranunculus Gouani* *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 896.,* et *Syst. nat.* 1. p. 277.,* et *Prodr.* 1. p. 36. n. 87.* *Ten. Nap.* 4. p. 346. minori parte, et *Syll.* p. 270. n. 23. minori parte.
- R. pyrenæus major*, et minor *Gouan. Ill.* p. 33. tab. 17. fig. 2. 3. bonæ.
- \times segmentis foliorum radicalium late connato-stellatis, apice inciso dentatis; caule sæpe elatiore; flore mediocri.
- Ranunculus nemorosus* *De Cand. Syst. nat.* 1. p. 280. α . β ., et *Prodr.* 1. p. 37. n. 94. α . β . *Pollin. Ver.* 2. p. 236. tab. 3. fig. 5.* *Rom. in Da Rio Giorn. dell' Ital. lett.*

- tom. 24. p. 287. n. 47.* Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 46. heft. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 182. Koch. Syn. ed. 2. tom. 1. p. 19. Gaud. Helv. 3. p. 544.*
R. Hornschuchii Hopp. in Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 46. heft. pl. minor.
R. aureus Reich. Exc. 3. p. 724. n. 4608., et 1c. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 12. Ran. Ran. tab. 18. f. 4608.
R. n. 1171. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 73.
δ gracillimus, glabriusculus, flore parvo.
Ranunculus montanus β tenellus Duby. Bot. Gall. ed. 2. tom. 2. p. 1022.
*R. tenellus De Sal. Marschl. in Bot. zeit. ann. 1834. p. 84.**
R. nivalis Lois. Desl. Not. p. 89. non Linn.
R. lapponicus Lois. Desl. Gall. ed. 2. tom. 1. p. 395. non Linn.

Ital. Ranuncolo montano.

Perenn. Legi in alpihus Apnanis Tambura, Sagro, ubi frequens, et mire polymorphus, in Liguria occidua in alpihus della Scaggia. Filius attulit ex Pisanino septentrionali alpium Apuanarum, et ex Apennino Bononiensi in Corno alla scala, et in Cupola di Scaffaiolo. Habui ex eodem Apennino allo Stroffinatoio a Prof. PETRO SAVIO, ex alpihus Pedemontanis a Prof. BALBISTO, ex editis di Vaudier ab Eq. Prof. MORISIO, ex Cenisio a BONJEANNIO, ex montibus vallis Intrasca ad Verbanum a Prof. DE NOTARIS, ex Corni di Canzo ad Larium ab eodem, et a RAINERO, ex monte di Pusiana ab Eq. CESATE, ex Gera alta Brixienisium a ZANTEDESCHIO, ex Baldo a RAINERO, ex Tyroli Italico a FACCHINIO, ex pascuis di Portole in Vicetinis, et ex Grappa Bassanensium a MONTINIO, ex Apennino della Cattra in districtu Urbinati a FEDERICIO, ex monte Birro Maceratensium ab Eq. NARDUCCIO, ex Pietralata Camerinensium a Prof. OCTAVIANO, ex Piceno in montibus De' fiori, Corona, Pelone, et Vettore ab ORSINO, in montibus della Sibilla alla Corona, et a Costa Scarsilla, in Priore, et Vettore a MARZIALETTO, ex Præntiis in monte di Campi, in monte Cornu in pratis di Pietra Camela, et al Pizzo della Cavata ab ORSINO, in montibus Cornu, et Costone ab Eq. GUSSONIO, in monte Velino a Prof. MAURIO, ex Apennino Fivizzanensi, et ex Apennino Lucensi a Coreglia al Fungaio a Prof. PUCCINELLIO, ex pascuis Apennini Pistoriensis præsertim al Teso a Prof. PETRO SAVIO, ex monte Grosso

Corsicæ a SOLERIOLIO. Varietatem β accepi ex pratis, et pascuis alpinis di *Fassa* in Tyrolì Italico a FACCHINIO, ex *Grappa* Bassanensium a BEGGIATO, ex monte Cornu Prætoriorum ab ORSINO. Varietatem α obtinui ex *Vallasco* alpium Valderiarum in Pedemontio a BERTERO, ex monte *Lesima* Apennini Boblensis a PPR. BALSANO-CRIVELLIO, et DE NOTARIS, ex *Presolana* Bergomensium a BERGAMASCHIO, ex montibus Brixien-sibus a POLLINIO, qui habuit a Rev. ROMANO, ex sylvis circa vicum *Marzana* vallis *Pantena* Veronensium a MANGANOTTO, ex Tyrolì meridionali in *Valsugana* prope il *Borgo* a SARTORELLIO, ex Tyrolì Italico in *Fiemme*, et *Fassa* a regione cerealium ad regionem *Pinus Mughus* L. a FACCHINIO, ex districtu Bassanensi in pratis S. Michaelis d' *Angarano*, et in pascuis di *Costansella* prope la *Grappa*, tñm ex *Vette di Feltre* a MONTINIO, ex monte majori Istriæ, et ex vertice montis *Toiano* a TOMMASINIO, ex alpinis Nursim ab Eq. PRUCCIO, ex *Piceno* in monte *Corona*, et in vertice della *Sibilla* a MARZIALETTO, ex Prætorutis in monte di *Campoli al Fonte Grande* ab ORSINO. Varietatem δ habui ex montibus editis Corsicæ a DE SALIS MAR-SCHLINS, et ab Eq. GUSSONIO, ex eisdem montibus, præsertim ex *Coscione* a SOLERIOLIO. Floret a Majo in Augustum.

Rhizoma crassum, cylindraceum, præmorsum, nunc breve, nunc longum, simplex, vel snrsum ramosum, ludens horizontale, transversum, perpendiculare, nigrescens, lateraliter demittens fibras numerosas, crassiusculas, longas, albentes, simplices, vel ramulosas, collo vestitum reliquiis fibrosis petiolorum sphacelatorum. Caulis teres, farctus, in individuis tantum luxuriantibus superne fistulosus, decumbens, adscendens, erectus, interdum inferne flexuosus, plus minus adspersus villo adpresso, rarius patulo, subinde etiam inferne glaber, modo tenuis, modo crassiusculus, simplex, vel bifidus, raro ramosior, a semipollice ad pedem, et quandoque paulo ultra longus, mono-diphyl-lus; dum ramosior poliphyllus. Folia radicalia cæspitosa, petiolata, reniformia sinu baseos aperto, vel orbiculata sinu clauso, firmula, glabra, aut plus minus adpresse pilosa, tripartita, segmentis cuneato-labellatis, medio trifido, lateralibus bifidis, laciniis plerumquo angustis, bi-tri-pluridentatis, dentibus acutis, acutiusculis, aut obtusis; subinde una, alterave lacinia

integra, præsertim media segmenti medii; interdum quoque dentes sunt profundi, et lacinulas referunt; cæterum segmenta, et lacinie nunc inter se divergunt, nunc lateraliter sibi invicem superincumbunt. Petioli sæpe longi, supra canaliculati, glabri, vel pilosi, basi tractu potius longo dilatati, et non raro flexuosi. Folia caulina sessilia, aut subsessilia, palmata, laciniiis linearibus, vel lanceolato-linearibus, integerrimis, raro una, alterave incisione insculptis; cum plura sunt, inter se remota, sita ad ramos, inferioraque sæpe gaudentia laciniiis latioribus, superne acute inciso-dentatis. Pedunculi terminales cauli, ramisque, solitarii, uniflori, nunc breves, nunc elongati, apice adpresse villosi, ludunt toti teretes, vel striati, et fructigeri sulcati, aut superne teretes, inferne striati, vel sulcati. Flos magnitudinis variæ, a diametro quinquelineari ad diametrum pollicarem. Calyx pateus, foliolis oblongis, aut oblongo-lanceolatis, obtusis, concavis, dorso villosis, vel pilosis, margine sæpe glabris, et viridi lutescentibus. Corolla calyce duplo, et ultra longior, supra luteo-aurea, nitidissima, extus pallidior. Petala obovata, obtusa, integra, aut leviter emarginata, ungue instructo squamula exigua. Antheræ lineares, luteæ. Nuculæ in capitulum globosum coadunatæ, subsemiorbiculatæ, compresso-tumidulæ, marginatæ, læves, glabræ, rostellatæ stilo circiter ipsis triplo, aut quadruplo brevioræ, basi latiusculo, apice recurvo-uncato, vel revolutæ. Axis capituli ludit pilosus, aut glaber.

Varietas β plus minus luxuriat herba; essentialiter distinguitur foliis caulinis palmatis, laciniiis longiusculis, latioribus, lanceolatis, inciso-dentatis, vel integris. Cum folia caulina duo, vel plura sunt, inferiora magis appropinquant forma folia radicalia. Flos grandis. Certus sum de planta De Candollei, cum jam ab anno 1809. acceperim ab illo exemplar autopticum lectum in Pyrenæis, quod simillimum nostris.

Varietas α ægre distinguitur a typo speciei luxuriantis. Folia radicalia ejus trisecta in segmenta obovato-cuneata, apice inciso-dentata. Caulis plerumque inter spithamam, et quatuordecim pollices longus, sed vidi etiam bipollicarem, raro simplex, uniflorus, ut plurimum instructus ramis uno-pluribus, ipse quoque in individuis tantum majoribus superne fistulosus. Folia caulina, præsertim superiora, omnino ut in specie.

Pedunculi plerumque longi, hic quoque teretes, striati, aut sulcati. Flos mediocris. Axis fructus subinde apice dense villosus, alias pilosus, aut glaber. Habet nescio quid *Ranunculi lanuginosi* L., dum hic macrior est.

Varietas ♂ est planta in statu gracillimo. Caulis filiformis, decumbens, ascendens, simplex, uniflorus, vel bifidus, biflorus, glaber, aut pilis paucis, raris superne scatens, ad summum palmaris. Folia radicalia parva, glabra, tripartita, segmentis modo latiusculis, modo angustioribus, breviter, et acute inciso-dentatis. Eorum petioli glabri, aut pilis raris more caulis adspersi. Folia caulina nnum, vel duo, inter se remota, palmato-trifida, laciniis lanceolatis, acutis, integris, aut uno, alterove dente apice insculptis. Quandoque prope florem occurrit foliolum exiguum, lanceolatum, integerrimum. Flos parvus, diametri circiter quadrilnearis. Calyx glaber, vel pilis paucis, raris scatens. Petala oblongo-obovata. Axis fructus glaber.

Invitus distinxī speciem in varietates præcipuas; cum dentur individua, quæ varietatem aliam cum alia conjungunt. Si cui lubeat eas obolere, et comprehendere in descriptione generali, id utilius erit pro scientia. Stirps valde polymorpha, copiosissima in Apennino, et in alpibus nostris.

30. *RANUNCULUS lanuginosus*: scabro-hirsutus; radice fibrosa, collo rhizomatoso; caule erecto, basi hirsutis deflexa, multifloro; foliis inferioribus cordatis, tripartitis, segmentis latis, medio trifido, lateralibus bifidis, acute inciso-dentatis, acuminatisve, floralium laciniis lanceolatis, linearibusque, subintegris; nuculis lævibus, rostro longo, revolutis.

R. lanuginosus *Sp. pl.* p. 779. *Smith. in Rees's Cycl.* v. 29. n. 63. *Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr.* 1. p. 383., et *Fl. Græc.* 6. p. 16. tab. 519. *Fl. Dan.* t. 397. *All. Ped.* 2. p. 52. n. 1462. *A. Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 165. *A.*, et 393. *Comoll. Prodr.* p. 110. *Poll. Ver.* 2. p. 237. forte mixtum cum sequente. *Suffr. Foroj.* p. 151. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 46. heft. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 180. *Koch. Syn. ed.* 2. tom. 1. p. 19. *Reich. Exc.* 3. p. 724. n. 4609. *α. β.*, et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. *Ran. Ran.* t. 19. f. 4609. *α. β.* *Host. Austr.* 2. p. 115. *Scop. Carn.* ed. 2. tom. 1. p. 399. *Gaud. Helv.* 3. p. 346.

R. nemorosus *Bert. fil. It. in Apenn. Bon.* p. 20.* *Badar. in Morett. Bot. Ital.* p. 8. n. 12.* *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. dec.* 2. tom. 10. p. 291.* *Guss. Sup.* 2. p. 185.*

- R. neapolitanus Ten. Nap. tab. 148. * I. a. granifolia.
 R. umbrosus Ten. et Guss. Mem. sulle peregr. p. 160. *
 Ten. App. 5. p. 16. * Guss. Syn. 2. p. 45. *
 R. n. 1172. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 73.
 R. montanus lanuginosus foliis ranunculi pratensis repentis C. B. Prodr. p. 96. n. 7. Segui. Sup. p. 215. n. 5.
 R. magnus, valde hirsutus; flore luteo. J. Bauh. Hist. pl. 3. lib. 30. p. 417. fig. b.
 R. nemorosus hirsutus foliis Caryophyllatae Loes. Pruss. p. 220. tab. 71.

Ital. Ranuncolo lanuto.
 Perenn. Legi in Tambura, et Sagro alpium Apuanarum, in monte Goltro Liguria orientalis, et Bononiæ in collibus di Zolla predosa. Habui ex agro Bononiensi in monte Sabbione a MASQUILLIERIO, ex Apennino Bononiensi in sylvis dell'Acero a filio meo, ex Liguria occidua in sylvaticis supra Cornigliano a Prof. DE NOTARIS, a Laigueglia a BADAROO, in monte Gallè a Prof. SASSIO, ex Pedemontio in sylvis ad thermas Valderias a BERTERO, ex Corni di Canzo, et ex valle Intelvi ad Larium a RAINERO, Mantua al Bosco Fontana a BARBIERIO, ex districtu Tridentino in Tyroli meridionali, et ex sylvis di Fiemme, et Fassai in Tyroli Italico a FACCHINIO, ex districtu Bassanensi in Val di Saccon a MONTINIO, ex Vette di Feltre in Vallazza, Valle del ciel, et Morsupian ab Eq. CONTARENO, ex monte Majori Istriæ a BRASOLETTO, ex sylvaticis ad Sentium a BENINIO, et BRUNATTIO, ex ora Veneta prope Campalto a RUCHINGERO, ex Piceno a Montefortino, et in montibus della Sibilla a MARZIALETTO, ex Pretutius in sylvis di Chiarino, et della Maiella all'Orfenta ab Eq. GUSSONIO, et a Monte grande prope Pizzoli a CROCHETTO, ex monte Orsara in Apennino Pontremulensi a Prof. PETRO SAVIO, ex Ducatu Lucensi in sylvis al Bagno, in alpe di Limano, et Casoli a Prof. PUCCINELLO, et in viciniis di Tereglio a GRANINIO, ex Etruria in udibus montis Pisani, et in Apennino Pistoriensi al Teso a Prof. PETRO SAVIO, in eodem Apennino alla Badia a Taona, et in Falterona a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTO, ex pratis circa Romam a Prof. MAURIO, ex sylvaticis umbrosis prope Neapolim ab Eq. Prof. TENORIO, et ab Eq. GUSSONIO, ex monte S. Angelo di Castellamare all'Acqua santa a RAINERO, ex nemoribus Lucanæ a GASPARRINIO, ex monte Taburno ab Eq. GUSSONIO, ex Sicilia in sylvis del Capelliere Flor. Ital. T. V.

alla Ficuzza a Prof. PARLATORE, ex Corsica a Bastia a SOLEIROLIO. Floret Majo, Junio, in editis serins.

Rhizoma breve, crassum, transversum, vestitum fibris numerosis, descendantibus, longis, ramulosis, vel simplicibus, apice subinde ferens reliquias petiolorum in fibras sphacelatorum. Caulis teres, striatus, fistulosus, hirsutus, scaber, hirsutiae longitudinis variae, in parte inferiore ejus plerumque deflexa, rarius patente, in parte superiore patula, aut adpressa, alterne, et saepe valde ramosus, a spithama ad duos pedes longus. Folia inferiora passim, non tamen semper, grandia, cordata, tripartita, segmento medio cuneato, trifido, lateralibus bifidis, omnibus latis, inaequaliter inciso-dentatis, laciniis, dentibusque foliorum primordialium obtusiusculis, reliquorum acutis, aut acuminatis, adpresse hirsuta, aut pilosa, supra saturate viridia, et ad angulos intrantes saepe macula atrosanguinea notata, subtns pallentia, radiata nervosa, et reticulata venosa, radicalia caespitosa, longius petiolata. Petioli supra canaliculati, basi dilatati, tecti hirsutiae deflexa, aut patente more caulis. Folia floralia suffulta vagina petiolarum brevissima loco petioli, palmato-tripartita, suprema laciniis lanceolatis, vel linearibus, subintegris, et quandoque indivisa, integerrima. Pedunculi terminales, uniflori, teretes, adpresse villosi. Flos nunc grandiusculus, nunc minor. Calycis foliola ovato-oblonga, obtusa, aut acutiuscula, patentia, concava, dorso hirsuta, margine membranacea. Corolla luteo-aurea, supra nitida, calyce duplo, et triplo longior. Nuculae in capitulum globosum coadunatae, subsemiorbiculatae, compressae, marginatae, laeves, glabrae, rostratae stilo longo, et saepe longitudinem dimidiam nucularum aequante, circinatim revoluta, aut exquisite recurvo-nucato. Axis capituli apice pilosus, vel hirsutus.

Hae planta cum variet magnitudine partium, et foliis nunc acuminatis, nunc acutis, ideo vexata, et in falsae species, aut inutiles varietates diducta; at nuculae semper terminatae rostro insigni, revoluta eam facile demonstrant.

31. *RAUNCULUS velutinus*: molliter villosissimus; caule erecto, basi villis deflexis, multifloro; foliis inferioribus cordatis, trifidis, segmentis circumscriptione subrotundis, medio trilobo, lateralibus bilobis, omnibus inaequaliter acutiuscule inciso-dentatis; nucula laevibus, apiculo brevissimo, rectiusculo terminatis.

R. velutinus Ten. *Nap.* 4. p. 350. *tab.* 147.,* et *Syll.* p. 272. n. 28.* *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 50.,* et *Sup.* 2. p. 185.,* et *Syn.* 2. p. 45.* *Moris. Sard.* 1. p. 41.*

R. lanuginosus Sebast. et Maur. *Fl. Rom. prodr.* p. 183.* excl. syn.

R. Haarbachii De Not. *Ind. sem. hort. bot. Gen. ann.* 1840. p. 12.*

Ital. Ranuncolo velutino.

Perenn. Copiosus in pratis, et collibus Italiz. Legi Sarzanæ; et Bononiæ a Zolla *predosa*. Habui ex pascuis supra Gennam *Fontaneggi* versus, et Mediolano in muro oppidi a Prof. DE NOTARIS, Mantuâ extra portam *Pradella* a BARNIERIO, ex udis agri Pisani, ubi vulgatissimus, a Prof. PETRO SAVIO, ex locis humentibus circa Romam a PPRI. SEBASTIANO, et MAURIO, Neapoli in pratis ab Eq. Prof. TENORIO, et ab Eq. GUSCONIO, et *al Pascone* prope Sebetum ab ORSINO, ex Sardinia in arvis *d' Iglesias* a Prof. DE NOTARIS. Floret ab Aprili in Junium.

Radix fasciculato-fibrosa, fibris simplicibus, ramulosisque, longis, descendentibus, rhizomate subnullo. Caulis teres, striatus, erectus, fistulosus, alterne ramosus, et dum ramosior dichotomus, inferne villosissimus, villis plerumque retrorsis, rarius patentibus, superne villis brevioribus, adpressis, a spithama ad duos, vel tres pedes longus. Folia inferiora cordata, trifida, segmentis latis, circumscriptione subrotundis, medio trilobo, lateralibus bilobis, omnibus inæqualiter, acutiuscule, ant acute inciso-dentatis, villosa, præsertim in nervis, venisque, supra late, vel saturate viridia, ad angulos intrantes plerumque maculâ atosanguineâ, rarins albâ, notata, subtus pallidiora, nitidula, radiato nervosa, et reticulato-venosa, raro magnitudinem majorem præcedentis speciei attingentia, radicalia cæspitosa, longius petiolata. Petioli eorum semiteretes, supra canaliculati, villosissimi, villis deflexis, vel patentibus more caulis, basi dilatati. Folia floralia vagina petiolarî brevissima loco petioli suffulta, palmato-tripartita, laciniis lanceolatis, vel linearibus, integerrimis, aut subdentatis, supremæque sæpe indivisa, brevia, linearia, integerrima. Pedunculi terminales, uniflori, teretes, in caule ramosiore dichotomo veluti paniculati cum pedunculis alaribus. Calycis foliola ovata, acuta, concava, patentia, pallide flavicantia, apice virenti, vel purpurascente, dorso villosa, villis patulis, sæpe

e tuberculo fusco ortis. Corolla ut in præcedente. Nucula in capitulum globosum congesta, subsemiorbiculata, compressa, marginata, læves, glabræ, apiculatæ stilo brevissimo, plerumque recto, subinde incurvulo, aut recurvulo. Axis fructus glaber. Villus totius herbæ mollis.

Facile distinguitur a præcedente specie villo densiore, molli, foliis paulo minoribus, segmentis circumscriptione subrotundis, nunquam acuminatis, minus profunde sectis, præsertim vero nuculis apiculatis stilo brevissimo, licet id sit plus minus, recto, vel leviter curvulo. In eodem individuo habentur nucula stilo incurvulo, vel recurvulo. *Ranunculus montanus subhirsutus latifolius* C. B. Prodr. p. 96. fig. omnino refert hanc speciem, non præcedentem. Botanici nostri facile confuderunt *Ranunculum velutinum* Ten. cum *Ranunculo lanuginoso* L.; ideo parvus fui in synonymis eorum afferendis defectu archetypi.

3a. *RANUNCULUS palustris* β ; napulis radicalibus fasciculatis; caule subnudo, superne ramoso; foliis inferioribus ample semiorbundatis, cordatis, tripartitis, segmentis latis, sinu rotundato distantibus, medio cuneato-stellato, trifido, lateralibus bifidis, omnibus inæqualiter, acuteque inciso-dentatis; calycibus patentibus; nuculis lævibus, stilo brevissimo subuncato terminatis.

R. palustris β *De Cand. Syst. nat.* 1. p. 295., et *Prodr.* 1. p. 41. β . sub. n. 134.

R. palustris *Moris. Sard.* 1. p. 44.

R. palustris corsicus *De Sal. in Bot. zeit. ann.* 1834. p. 85.*

R. corsicus *Viv. Fl. Cors. diagn.* p. 8. *De Cand. Franç.* 5. p. 637.

Ital. Ranuncolo di padule.

Perenn. Habui ex Corsica a Bonifacio a DE SALIS MAR-SCHLINS, et a Calvi a SOLEIROLIO. Floret Majo, Junio.

Radix e napulis fasciculatis, longis. Caulis teres, decumbens, ascendens, vel erectus, superne ramosus, inferne sæpe nudus, adpresse pilosus, et quandoque etiam villosus, villis inferioribus deflexis, a spithama ad duos pedes longus. Folia inferiora longo petiolata, cordata, ample semiorbundata, tripartita, segmentis latis, sinu rotundato a se recedentibus, medio cuneato-stellato, trifido, lateralibus bifidis, omnibus acute, et inæqualiter inciso-dentatis, adpresse pilosa, supra saturate

viridia, subtus pallentia, radicalia cespitosa, longo petiolata. Petioli supra canaliculati; adpresso pilosi, ant villosi, et magis apice; quandoque glabrati, basi tractu longiusculo dilatati. Folia floralia vagina petiolarum brevissima suffulta, bi-tripartita, laciniis lanceolatis, vel linearibus, subintegerrimis, interdum suprema indivisa, linearia. Pedunculi terminales, uniflori, teretes, apice dense, et adpresso villosi. Flos grandiusculus. Calycis foliola oblongo-lanceolata, acuta, vel obtusiuscula, concava; patentia, e viridi lutescentia, dorso villosa, margine anguste membranacea. Corolla luteo-aurea, supra nitida, extus pallidior, calyce etiam duplo, et triplo longior. Petala obovata, integra. Nuculae in capitulum globosum coadunatae, subovatae, compressae; marginatae; laeves, glabrae, terminatae stilo brevissimo uncato, vel subuncato. Rachis capituli pilosa.

33. *RANUNCULUS spicatus*; caule erecto, paucifloro, laxe lanuginoso, subnudo; foliis radicalibus cordato-rotundatis, trilobis, inaequaliter dentatis, adpresso villosis, floralibus subtrifidis; fructu oblongo; nuculis compressis; marginatis, pilosis, recurvo-rostellatis.

R. spicatus Desf. *Atl.* 1. p. 438. t. 115. *De Cand. Syst. nat.* 3. p. 260. *α.*, et *Prodr.* 1. p. 29. n. 21. *α.* Presl. *Sic.* 1. p. 14.

R. rupestris Guss. *Ind. semin. in Boccadifal. ann.* 1826. p. 8,* et *Fl. Sic. prodr.* 2. p. 48,* et *Sup.* 2. p. 185,* et *Syn.* 2. p. 44.*

Ital. Ranuncolo uncinato.

Perenn. Habui ex Sicilia in montibus Panormitanis, et alla Piana de' Greci ab Eq. Gussone, alla Pizzuta a Tedano, iterum alla Pizzuta, et in pascuis montosis di Busambra a Prof. Parlatoe, ex Ericusa ab Eq. Gussone; Floret Aprili, Majo.

Radix fasciculata, tuberibus numerosis, modo brevibus, modo longiusculis, fusiformibus, deorsum acutis, vel in fibram longam, ramulosam desinentibus, fuscis, quae interjiciuntur fibrae tenues, ramulosae. Caulis teres, fere erectus, vel adscendens, uni-quinqueflorus, spithamalis-pedalis, infra pedunculos lanuginosus, lanugine patula, et quandoque reflexa, inferne longo tractu nudus. Folia radicalia cespitosa, nunc breviter, nunc longe petiolata, cordato-rotundata, tri-quinqueloba, vel tri-quinquesida, segmentis inaequaliter, acutiuscule dentatis, dente impari grossiore, subinde obtuso,

saturato viridia, adpresse villosa. Petioli more caulibus lanuginosi, supra canaliculati, basi dilatati, amplexantes. Folia caulina parva, sita sub pedunculis, et in parte inferiore pedunculorum, breviter petiolata, aut vagina petiolarum tantum suffulta, trifida, segmentis acuto, inaequaliter dentatis, vel acute inciso-dentatis, rarius integris, peduncularia multo minora, saepe fere ramentacea, bi-trifida, laciniis integris, interdum quoque indivisa, lanceolata. Raro omnia folia caulina sunt exigua, ramentacea more peduncularium. Pedunculi adpresse villosi, etiam bipollicares. Flores solitarii, terminales cauli, ramisque, grandes. Calycis foliola oblongo-lanceolata, acutiuscula, vel obtusa, concava, patentia, e viridi lutescentia. Corolla supra luteo-aurea, nitens, extus pallidior, calyce duplo longior, vel paulo ultra. Petala obovata, obtusa, integra, venis ramosis percursa. Antherae oblongo-lineares. Stili longiusculi, apice uncati. Nuculae numerosae, collectae in spicam oblongam, vel cylindraceam, in macrioribus tantum individuis subglobosam, semiovatam, aut semirotundam, compressam, vix in plena maturitate tumidulam, marginatam, hispidulam, pilis interdum basi bulbilosis, sub vitro minute punctulatis, terminatis rostro circiter longitudine ipsius nuculae, recurvo-uncato, basi lato. Receptaculum cylindraceum, gracile, pilosum. Villi plantae albidii.

Exemplar, quod ego vidi ex herbario Desfontainensii, omnino convenit cum meis ex Sicilia. Desfontainensis reperit plantam suam in paludibus Algeriae, dum botanici Siculi reppererunt locis collinis, quod non mirum, cum id contingat etiam aliis Rannunculis, et haec forte ratio est, cur figura exhibita in Flora Atlantica praese ferat spicam multo longiorem, quam in nostris, quia ortam loco humenti, calido; quoad gracilitatem vero ejus puto profectam a statu adhuc immaturo, et incompleto totius fructus. Caeterum Desfontainesius in eadem figura ostendit caulem, et petiolos lanugine omnino patente praeditos, et calycem quoque patentem, non reflexum, quum ultimam notam unde hauserit De Candolleus in Syst. nat. l. c., me latet; ca profecto non est in meis exemplaribus, nec adnotatur a Desfontainesio.

34. *RANUNCULUS brutius*: lanuginosus; caule ramoso, erecto; foliis ternatis, subaequaliter petiolulatis, sessilibusve, medio tripartito, lateralibus bipartitis, omnium

laciniis lanceolatis, acuminatis, incis, crebre, inæqualiter serratis; calyce patente; nuculis nervatis, glabris, stilo longo, revoluti uncinatis.

R. brutus Ten. *Nap.* 1. p. 315. *tab.* 50.,* et *Syll.* p. 272. n. 26.* *De Cand. Syst. nat.* 1. p. 278., et *Prodr.* 1. p. 36. n. 89.

Ital. Ranunculo calabrese.

Perenn. Habni ex Calabria a Cosenza ab Eq. Prof. Tennenio, ad Aspramonte, et alla Sile ab Eq. Gussoneio. Floret Junio.

Rhizoma fusiforme, transversum, fibris lateralibus numerosis, flexuosis. Caulis tores, striatus, ascendens, vel erectus, lanugine molli, alba adpersus, subinde hic illic glabratus, superne ramosus, uni-bipedalis. Folia ternata, foliolis breviter, et fere æqualiter petiolulatis, aut sessilibus, medio tripartito, lateralibus bipartitis cum segmento superiore interdum trifido, inferiore bifido, omnium laciniis lanceolatis, acuminatis, vel acutis, incis, crebre inæqualiter, argute serratis, sæpe fere toto margine, supra late viridia, pilosa, aut glabra, subtus pallidiora, pubescentia, vel tantum pilosa, nervosa, et reticulato-venosa, inferiora longe petiolata, caulina alterna, pauca, ad ramos inferiores vagina petiolari brevissima loco petioli suffulta, ceterum reliquis similia, sed magis acuminata, floralia summa subsessilia, tripartita, laciniis lanceolato-linearibus, vel linearibus, subintegris, aut indivisa, linearia. Petioli supra canaliculati, lanuginosi, basi longo tractu dilatati. Pedunculi solitarii, terminales, uniflori, teretes, pubescentes. Calycia foliola ovata, obtusa, concava, patentia, dorso lanuginosa, margine membranacea. Corolla luteo-anrea, calyce etiam duplo, et triplo longior. Petala obovata, obtusa. Nucula in capitulum globosum collecta, subsemiorbiculata, compressa, marginata, in utraque facie nervata, glabra, rostrata stilo longo, vix basi latiore, revoluti, antequam recurvo-uncato.

Hæc species nullam affinitatem ostendit cum *Ranunculo acri* L., sed habet faciem omnino propriam.

35. *RANUNCULUS repens*: flagellis caulis inferioris repentibus; foliis ternatis, acute inciso-dentatis; calyce patente; nuculis lævibus, stilo brevi, recto, uncatove rostellatis.

R. repens Sp. pl. p. 779. Smith. in Rees' s Cycl. v. 29. n. 54., et Engl. Fl. 3. p. 51., et Engl. bot. v. 8. t. 516.

Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 265. Curt. Lond. ed. Grav. v. 1. tab. 73. Fl. Dan. t. 795. Sw. bot. 6. t. 400. Bull. Pl. ven. p. 146. t. 77. Röm. Fl. Europ. fasc. 12. fig. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 298. et Syst. nat. 1. p. 285. a. γ, et Prodr. 1. p. 38. n. 195. a. γ. d. All. Ped. 2. p. 51. n. 1458. Balb. Taur. p. 90. Re Seg. p. 47. et Tor. 1. p. 292. Birol. Acon. 1. p. 191. Coll. Herb. Ped. 1. p. 393. n. 44. Noct. et Balb. Tio. 1. p. 264. et 393. Comoll. Prodr. p. 109. Lant. Mant. in Conf. e. Brugn. Giorn. dec. 2. tom. 10. p. 292. Pollin. Ver. 2. p. 239. Ruch. Ven. p. 135. Moric. Ven. 1. p. 238. Naec. Ven. 3. p. 98. Ori. in Cap. Opusc. p. 286. Sav. Pis. 2. p. 26. et Bot. Etr. 4. p. 123. Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 183. Ten. Nap. 4. p. 351. A. B. et Syll. app. p. 870. n. 29. bis. Guss. Fl. Sic. prodr. 2. p. 51. et Syn. 2. p. 46. Presl. Sic. 1. p. 17. Sturm. Deuts. Fl. 1. abthl. 46. heft. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 183. Koch. Syn. ed. 2. tom. 1. p. 19. Reich. Exc. 3. p. 725. n. 4610. a. β. et d. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 12. Ran. Ran. 20. f. 4610. Host. Austr. 2. p. 114. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 398. Gaud. Helv. 3. p. 547. a. d. prostratus Lamck. Franç. sec. édit. tom. 3. p. 197. Ten. et Guss. Mem. sulle peregr. p. 38. Ten. Nap. 5. p. 11. Rananthefolius Ten. et Guss. l. o. p. 38. tab. 1. fig. 1. Ten. Nap. 5. p. 11. tab. 137. fig. 1. Ran. Ran. 20. f. 4610. Ran. 1173. var. I. II. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 73. excl. var. III. R. in foveis aquosis nasceus, humi serpens, ex ungulis geniculis radices fibrosas emittens etc. Casalp. De pl. lib. 14. cap. 3. p. 585. R. palustris, sarmentosus, serpens, genuine Apij folio, teglabro, ex geniculis radículas figens Cup. Hort. Cath. p. 185. et Sup. alt. p. 76. R. pratensis, repens, hirsutus Zannich. Ist. p. 224. Segui. Ver. 1. p. 487. n. 7. Bforis. Ox. sect. 4. tab. 28. fig. 18. R. pratensis, etiamquo hortensis Ger. em. p. 951. fig. Ital. Crescione salvatico. Stelletine. Strocione Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 198. Perenn. Prædiligit loca humentia. Legi Bononiæ in collibus inter Roncorio, et Paderno, et a Zolla predosa. Habui ex thermis Porrectanis a PRUAZZOLIO, ex Tyroli Italico in Fiemme, et Fassa a FACCHINIO, ex agro Bassanensi, et ex campis d'Angarano a MONTIGNO, ex viciniis Tergesti a TOMMASINO, ex ora Veneta in pratis di Brondolo a Prof. NACCABIO, ex Piceno prope

Montefortino all' Acqua viva, et in monte Volubrio a Bocca di Foca a MARZIALETTO, ex fossis agri Pisani a Prof. PETRO SAVIO. Floret ab Aprili in Junium.

Rhizoma brevissimum, crassum, cylindraceum, subinde transversum, a quo descendunt fibrae numerosae, fasciculatae, crassiusculae, longae, albae, simplices, vel lateraliter fibrillosae. E collo rhizomatis prodeunt stolones procumbentes, ad nodos ut plurimum radican- tes, et sursum foliosos, modo breves, modo longissimos, etiam bipedales, subinde deficientes. Caulis decumbens, adscendens, vel erectus, teres, striatus, alterno, et parce ramosus, a spithama ad sesquipedem longus, interdum crassus, saepe purpurascens. Folia petiolata, ternata, et quandoque biternata, foliolo impari longius petiolulato, trisecto, lateralibus brevius petiolulatis, vel sessilibus, bi-trisectis, omnium lacinii acute, inaequaliter inciso-dentatis, nunc latis, nunc angustis, ceterum folia supra saturate viridia, ad angulos intrantes, et ad ramificationes venarum maculis parvis, albis plerumque notata, subtus pallidiora. Eorum petioli semiteretes, supra canaliculati, basi dilatati, expansione margini albo-membranaceo, vel ex albo purpurante, radicales longiores. Folia floralia superiora brevissime petiolata, aut sessilia, tripartita, lacinii lanceolatis, aut linearibus, integris, vel subindisis, summa quandoque indivisa, lanceolata, integerrima. Pedunculi solitarii, terminales, uniflori, sulcati. Calycis foliola membranacea, ovata, obtusa, concava, patentia, pallentia, carina dorsali virente, aut e viridi purpurante praesertim apice. Corolla ut in sequente. Nucula in capitulum globosum collecta, subsemiorbiculata, compressa, marginata, laevos, glabra, rostellatis stilo brevi, basi vix, aut parum latiore, apice recto, vel uncato. Herba glabra, pilosa, vel hirsuta. Flores in plantis hortensibus cultis fit plenissimus petalis abbreviatis.

Hae species plurimum ludit magnitudine, foliolis latioribus, vel angustioribus, magis vel minus dissectis, inque locis montanis plerumque gaudet habitu minore. Foliola lateralibus petiolulata, aut sessilia occurrunt in omnibus formis.

36. *RANUNCULUS bulbosus*: caule basi bulboso; radice napuloso-fibrosa; foliis ternatis, simplicibus, tripartitis, inciso-dentatis; calycibus retroflexis; nuculis laevibus, stilo brevissimo, subuncato rostellatis.

- R. bulbosus* *Sp. pl.* p. 778. *Smith. in Rees's Cycl.* v. 29. n. 50., et *Engl. Fl.* 3. p. 49., et *Engl. bot.* v. 8. tab. 515. *Hook. Brit. Fl. ed. 2.* p. 265. *Curt. Lond. ed. Grav.* v. 2. tab. 73. *Bull. Pl. ven.* p. 145. tab. 27. *Plenck. Ic. pl. med.* 5. p. 60. t. 457. *Fl. Dan. tab.* 551. *Sv. bot.* v. 6. tab. 387. *Röm. Fl. Europ. fasc.* 11. fig. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 901., et *Syst. nat.* 1. p. 295. α . β ., et *Prodr.* 1. p. 41. n. 135. α . β . *All. Ped.* 2. p. 51. n. 1457. *Balb. Taur.* p. 90. *Rö Seg.* p. 47., et *Tor.* 1. p. 291. *Birol. Acon.* 1. p. 190. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 40. n. 47. *Nocc. et Balb. Ticin.* 1. p. 264., et 393. *Comoll. Prodr.* p. 109. *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec.* 2. tom. 10. p. 292. *Pollin. Ver.* 2. p. 237. *Ruch. Ven.* p. 134. *Moric. Ven.* 1. p. 239. *Nacc. Ven.* 3. p. 99.* *Suffr. Foroj.* p. 151. *Orsin. in Cap. Opusc.* p. 286. *Bert. Pl. Gen.* p. 70., et *Amæn. Ital.* p. 157. n. 153. *Sav. Pis.* 2. p. 26., et *Bot. Etr.* 4. p. 123. *Seb. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 183. *Ten. Nap.* 4. p. 351., et *Syll.* p. 273. n. 31. *Presl. Sic.* 1. p. 17. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 49. *Moris. Sard.* 1. p. 43. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 46. heft. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 184. *Koch. Syn. ed. 2. tom.* 1. p. 19. *Reich. Exc.* 3. p. 725. n. 4611. α . β ., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 12. α . β . *Ran. Ran.* t. 20. f. 4611., et t. 23. f. 4611. β . *Host. Austr.* 2. p. 113. *Scop. Carn. ed. 2. tom.* 1. p. 400. *Gaud. Helv.* 3. p. 549. α . β .
- R. tuberosus* *Morett. Dec.* 7. p. 9. n. 67.* excl. syn.
- R.* n. 1174. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 74.
- Ranunculo V. Matth. Valgr.* 1585. tom. 1. p. 648. fig., in qua male radix fibrosa supra bulbum.
- Ranunculus radice verticilli modo rotunda* *Casalp. De pl. lib.* 14. cap. 2. p. 544.
- Il bulboso *Ranunculo del Lobelio &c. Pon. Mont. Bald.* p. 188.
- Ranunculo V. del Matthioli &c. Pon. l. c.* p. 237.
- R. pratensis*, radice verticilli modo rotunda *Zannich. Ist. p.* 224. *Segui. Ver.* 1. p. 488. n. 8.
- Ranunculi tertia species* *Fuchs. Hist. pl.* p. 160. fig.
- Ranunculus tuberosus* *Dod. Pempt.* p. 431. fig.
- R. bulbosus* *Lob. Ic.* p. 667. *Ger. em.* p. 953. fig.
- R. tuberosus major* *J. Bauh. Hist. pl.* 3. lib. 30. p. 417. fig.
- Ital. Lappio. Faugello. Ranunculo salvatico. Sedano salvatico. Senero salvatico* *Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 198.
- Perenn. Legi Sarzanæ in pratis al Corso, Genuæ in colibus al Lagazzo, Bononiæ in monte Sabbione, alle Grotte, et a Zolla predosa. Habui ex pratis circa*

Veronam a MANGANOTTO, ex Tyrolis Italico in *Fiemme*, et *Fassa* a FACCHINO, ex pratis, et incultis *Basanensibus* a MONTINIO, ex Istria circa Polam, et *Veruda*, et Tergesto ad sepulchretum S. Annæ a TOMMASINIO, Fossâ Clodiâ a Prof. NACCARIO, ex monte *Mauro* in districtu Faventino a TASSINARIO, Senogalliâ *alla Pergola* a SALVATORIO, ex agro Maseratensi ab Eq. NARDUCCIO, Camerino ad rupes *di Pioraco* a Prof. OCTAVIANO, ex Piceno in monte *De' fiori*, et *Vettore* ab ORSINE, in pratis *di Montefortino* indentem flore pleno, et in monte *Priore* a MARZIALETTO, ex agro Pisano a Prof. PETRO SAVIO. Floret Aprili, Maio, Junio.

Basis caulis turgens in bulbum globosum, vel depressum, subinde colliculosum, aut auctum uno, alterova bulbo laterali, magnitudine varium, et interdum exiguum, e basi demittentem fibras fasciculatas, sæpe crassiusculas, et napulos longos, non valde crassos, fusiformes, collo arctatos, inferne in fibram attenuatos imitatas; interdum quoque habentur napuli isti mixti cum fibris. Caulis teres, striatus, erectus, vel adscendens, villosus, villo patente, vel adpresso, aut tantum pilosus, palmaris-bipedalis, alterne ramosus, et dum ramosior dichotomus, superne fistulosus, basi sæpe purpurascens. Folia inferiora petiolata, modo simplicia, tripartita, segmento medio trifido, lateralibus bifidis, omnibus grosse, inæqualiter, plerumque obtuse, rarius acute, dentatis, modo ternata, foliolo medio, et lateralibus dissectis, et dentatis, ut sunt lobi foliorum simplicium, item foliolo medio petiolulato, aut sessili; cæterum hæc folia ludunt adpresse villosa, aut pilosa, vel etiam glabra, supra saturate viridia, et ad angulos intrantes sæpe albo-maculata, subtus pallidiora, radicalia capitata, longius petiolata. Petioli semiteretes, supra canaliculati, hirsuti, aut pilosi more caulis, basi dilatati, et margine albo-membranacei. Folia floralia sessilia, aut subsessilia, sita ad ramificationes, bi-tripartita, laciniis lanceolatis, vel linearibus, integris, aut una alterave incisione insculptis. Pedunculi terminales, solitarii, uniflori, sulcati, scatentes pilis adpressis, vel erecto-patulis, fructigeri crassiores. Calycis foliola ovata, acuminata, concava, demum retroflexa, flavo-viridula, apice subinde purpurantia, extus pilosa, aut hirsuta. Corolla nunc parum, nunc calyce duplo longior. Petala obovata, integra, vel leviter emarginata, supra luteo-aurea, nitidissima, subtus pallidiora,

ungue instructo squamula obcordata. Nucula in capitulum globosum collecta, subsemierbiculata, compressa, marginata, laevis, glabra, rostellata stilo brevissimo, basi lato, apice subuncato. Rachis capituli ludit pilosa, vel glabra. Radix acris, vesicatoria. Flos ludit plenus, petalis abbreviatis.

Herba in siccis hirsuta, in humentibus fere denudata.

Botanophili caveant, ne decipiantur a lusibus radicis nunc napuliformis, nunc tantum fibrosae, pariter ac a lusibus foliorum nunc simplicium, nunc ternatorum.

Figura veterum botanicorum plerumque exhibent plantam foliis simplicibus.

37. *RANUNCULUS neapolitanus*: adpresse hirsutus; napulis radicalibus fasciculatis, crassis, longis; caule erecto, basi bulbuloso; foliis inferioribus trifidis, acute incisodentatis, superioribus palmatis, laciniis linearibus, subintegris; calycibus retroflexis; nuculis laevibus, stilo brevissimo, recto terminatis.

R. neapolitanus Ten. *App.* 5, p. 16.* non Fl. Neap. Ital. *Ranuncolo Anfodillo*.

Perenn. Habui ex Apulia a *Trechanti*, et ex Inarime ab Eq. Gussone. Floret Aprili, Maji.

Radix e napulis fasciculatis, crassis, longis, collo arctatis, inferne in fibram desinentibus. Caulis basi in bulbulum parvum extuberans. Folia radicalia, et caulina inferiora triseeta, segmentis latis, medio trifido, lateralibus bifidis, omnibus inaequaliter, et acute incisodentatis, floralia superiora sessilia, aut subsessilia, palmata, laciniis linearibus, subintegris. Pedunculi florigeri teretes, fructiferi sulcati. Calyx, flos, nuculae.

Ranunculi bulbosi L.; sed haec terminata stilo brevissimo, triangulo, compresso, recto, aut rectiusculo, vix tertiam lineam partem aequante. Tota planta tecta hirsutis adpressa, rigidula. Radix acris, vesicatoria. Valde proximus *Ranunculo bulboso* L.; cum hic gaudet foliis simplicibus, trisectis. An varietas insignis?

38. *RANUNCULUS Balbisii*: radice crasse fibrosa; caule tenui, parce ramoso, inferne subnudo; foliis radicalibus cordato-orbiculatis, obtuse, grosseque lobato-dentatis, floralibus exiguis, tripartito-linearibus; calyce retroflexo; nuculis laevibus, stilo brevissimo, revolutis uncinatis.

R. Balbisii Moris. *Sard.* 1. p. 40. *tab.* 1. *R. cymbalarifolius* Balb. in *List. ad Moris. Moris. Stirp. Sard.* el. fasc. 1. p. 2.* Spreng. *fil. Tent.* p. 15. n. 53.

Ital. *Ranuncolo Ciombolino*. *Adhuc* ...

Perenn. Habui ex monte *Genargentu* Sardinia ad rivulos ab Eq. Prof. Monaro. Floret a Majo in Julium.

Radix fasciculato-fibrosa, fibris pluribus; crassis, ad formam napuli accedentibus, inferne attenuatis, sepe lateraliter fibrillosis. Caulis tennis, teres, striatus, solitarius, vel plures ex eadem radice, erectus, aut ascendens, inferne nudus, aut uno tantum folio instructus, a palmo ad sesquipedem longus; parvus, et alterne ramosus; subinde tantum bifidus. Folia radicalia caespitosa, longe petiolata, crassiuscula, cordato-orbiculata, triloba, lobis grosse, obtuse; inaequaliter dentatis, supra late viridia, nitida, subtus pallentia; caulinum inferius, dum adest, radicalibus simile, sed minus. Folia floralia subsessilia, aut sessilia, exigua, palmato-tripartita, laciniis lanceolato-linearibus, vel linearibus, subintegris, quandoque summa bipartita, aut indivisa, linearia. Petioli ascendentes, supra canaliculati, basi dilatati. Pedunculi terminales, uniflori, tennes, saepius longi, floriferi teretes, aut vix atriatif, fructiferi sulcati. Flos potius parvus. Calycis foliola ovato-lanceolata, obtusiuscula; margine membranacea, o viridi lutescentia, et interdum purpurantia, dorso pilosa, demum retroflexa, decidua. Corolla flava, supra nitens, calyce nunc parum, nunc duplo longior. Petala obovata, integra, ungue instructo squamula extus convexa, intus concaviuscula, apice subcrenata. Nucula in capitulum parvum, globosum collecta, exigua, suborbiculata; compressa, marginata, laeves, glabrae, terminata stilo brevissimo, vix lineam aemis longo, revoluto, aut saltem exquisite recurvato. Axis capituli pilosus. Herba nudiuscula, sive tantum adpersa pilis raris, adpressis. Folia subinde supra glabra.

39. *RANUNCULUS heucherifolius*: adpresso villosus; napulis radicalibus fasciculatis, crassiusculis, longis; canlo erecto, basi bulboso; foliis inferioribus cordatis, rotundatis, inciso-lobatis, obtuse dentatis, floralibus palmato-tripartitis, laciniis linearibus; calycibus retroflexis; nuculis subgranulato-piliferis, laevibusque; rostro brevi, uncato.

*R. heucherifolius Presl. Sic. 1. p. 15. Guss. Sup. 2. p. 185, et Syn. 2. p. 47.**

R. aconitifolius Ab Ucr. Hort. Pan. p. 232. non Linn.

♂ nuculis in utraque facie totis granulato-piliferis.

Ranunculus heucherifolius b verruculosus *Guss. Sup. 2. p. 185.**

R. pratensis *Guss. Syn. 2. p. 47.** non Presl.

R. Todari *Guss. ex Todar. Pl. sicc.**

Ital. *Ranuncolo malvino*.

Perenn. Habui ex pascuis humentibus, vel montosis Panormitanis a TODARO, et ab Eq. GUSSEONIO. Varietatem β obtinui ex sylvaticis Panormitanis a TODARO.

Radix ut in *Ranunculo neapolitano*. Caulis quoque similis, sed a spithama ad duos pedes longus, basi parvibulbosus. Folia ima cordato-rotundata, trifida, segmento medio trilobo, lateralibus bilobis, omnibus obtuse dentatis, successiva, quo magis ad superiora tendunt, acute inciso-dentata, floralia summa palmato-tripartita, laciniis linearibus, integerrimis. Pedunculi striati, in fructu sulcati, saepe insigniter elongati. Nuculae nunc omnino laeves, nunc adpersae granulis paucis, pilo brevi terminatis, mucronatae stilo ancipiti, dimidiam lineam, aut paulo ultra longo, apice uncato. Tota planta molliter villosa, villa adpresso. Reliqua ut in *Ranunculo neapolitano*. Radix acris, vesicatoria.

Varietas β differt tantum nuculis in utraque superficie totis verrucosis, verrucis terminatis pilo brevi. GUSSEONIUS attribuit huic varietati *Ranunculum pratensem* Presl. Del. Prag. p. 9., et Fl. Sic. 1. p. 18., qui non videtur ad eam pertinere, cum Preslius assignet plantam suae radicem fibrosam, folia glabriuscula, radicalia tripartita, caulem prostratum, vel decumbentem, patenter villosum, nuculas obtuse verrucosas.

40. *RANUNCULUS angulatus*: perennis; caule fistuloso; foliis glabris, nitidis, imis cordato-orbiculatis, lobato-crenatis, superioribus tripartitis, inciso-serratis, petiolo late auriculato; calycibus obtusiusculis, retroflexis; nuculis obovatis, subgranulatis, laevibusque, stilo ancipiti, longiusculo mucronatis.

R. angulatus Presl. Del. Prag. p. 7., et Sic. 1. p. 16. exol. syn. Bocc. *Guss. Fl. Sic. prodr. 2. p. 51. a. b.** et *Syn. 2. p. 47. a. b.* Spr. Syst. veg. 4. par. 2. p. 219.*

R. alpinus, Thapsiae nascentis foliis, nitidis *Cup. Hort. Cath. p. 185.*

R. alpinus Thapsiae latifoliae nascentis foliis lucidis *Bon. Panph. tab. 21.*

Ital. *Ranuncolo lucido*.

Perenn. Habui ex Sicilia in humentibus Nebroden ab Eq. GUSSEONIO, sub la Pizzuta, et al Gargo di Dingoli

a TODARO, et a Prof. PARLATORE. Floret Aprili, Majo.

Radix fibrosa, fibris crassiusculis, longis, sæpe lateraliter fibrillosis. Caulis e tereti obscure angulatus, striatus, fistulosus, crassus, glaber, vel pilosus, pilis raris, adpressis, a spithama ad pedem, et ultra longus, alterne ramosus, et, dum luxuriat, ramosissimus, dichotomus, ramis patulis. Folia radicalia, et caulina ima simplicia, cordato-subrotunda, lobato-crenata, vel profunde trifida, laciniis inæqualiter dentatis, caulina successiva tripartita, aut ternata, acute inciso-dentata, floralia anguste multifido-lacinata; cæterum omnia folia glabra, nitida, crassiuscula, petiolata, sed superiora brevius, radicalia crispitosa. Petioli glabri, aut pilosi more caulis, supra canaliculati, inferiores longo tractu dilatati, supremi tractu brevi, sed auriculis latis, amplexicaulibus, subrotundis, membranaceo-hyalinis, margine ciliatis, aut barbatis. In foliis floralibus summis sola vagina auriculosa vicem petioli gerit. Pedunculi solitarii, alii terminales, alii oppositifolii, uniflori, angulati, striati, fructigeri sulcati, glabri, aut sparsè pilosi, pilis adpressis, subinde in fructu insigniter arcuato-recurvati. Calycis foliola ovata, vel ovato-lanceolata, obtusiuscula, concava, flavida, dorso pilosa, aut hirsuta pilis longis, patentibus, et interdum glabra, demum retroflexa. Corolla luteo-anrea, supra nitida, extus pallidior, calyce duplo longior. Petala oblongo-obovata, vel obovata, ungue squamulifero. Nucula collecta in capitulum globosum, duplo grandius, quam in *Ranunculo Philonoti*, magnitudine ciceris, subsemiobovata, compressa, marginata, passim læves, interdum tamen prope oram externam scatentes granulis obscuris, alias evidentioribus, acutis, rarius uno alterove in reliqua superficie, sub vitro impresso-punctata, rostellata stilo ancipiti, circiter lineam longo, rectiusculo, vel apice subuncato. Axis fructus pilosus. Habitus plantæ grandior, quam in sequente.

Stirps extra Siciliam nondum reperta. Ope culturæ cognovi esse perennem. Si attendamus ad glabritiem, et nitorem foliorum, ad auriculas petiolares foliorum superiorum, ad calycem potius obtusum, ad formam nucularum, ad capitulum fructus magnitudinis duplæ, et ad longitudinem stili, facile videbimus esse speciem diversam a *Ranunculo Philonoti* Retz.

41. *RANUNCULUS Philonotis*: annuus; radice fibrosa; caule erecto; foliis simplicibus, trisectis, superioribusve ternatis, inoiso-dentatis, floralibus anguste laciniatis; calycibus acuminatis, retroflexis; nuculis suborbiculatis, verruculosi, stilo brevissimo.
- R. Philonotis* Retz. Obs. 6. p. 31. Willd. Sp. pl. 2. par. 2. p. 1324. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 901. α . β . γ . et Syst. nat. 1. p. 296. α . β . γ . et Prodr. 1. p. 41. n. 136. α . β . γ . Balb. Taur. p. 90. Re Tor. 1. p. 292. Birol. Acon. 1. p. 191. Coll. Herb. Ped. 1. p. 41. n. 50. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 264. et 393. Pollin. Ver. 2. p. 238. α . β . excl. syn. Bell. Sav. Bot. Etr. 4. p. 125. Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 183. Ten. Nap. 4. p. 351. A. B. C., et Syll. p. 273. n. 32. A. B. C. Guss. Fl. Sic. prodr. 2. p. 54. α . β . γ . δ . excl. var. ϵ . et Suppl. 2. p. 186. ϵ . et Syn. 2. p. 48. α . β . γ . δ . ϵ . Presl. Sic. 1. p. 18. Moris. Sard. 1. p. 46. α . β . * excl. a varietate β synon. Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 82. heft. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 185. α . β . Koch. Syn. ed. 2. tom. 1. p. 19. α . β . Caud. Helv. 3. p. 550. α . β .
- R. agrarius* All. Auct. p. 27. Re Seg. p. 47.
- R. hirsutus* Smith. in Rees' s Cycl. v. 29. n. 51. et Engl. Fl. 3. p. 50. α . β . et Engl. bot. v. 21. tab. 1504. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 265. Curt. Lond. ed Grav. v. 1. tab. 72. Dio. Bern. Cent. 2. p. 48. n. 66. Reich. Exc. 3. p. 725. n. 4617. et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 13. Ran. Ran. t. 23. f. 4617. Host. Austr. 2. p. 114.
- R. verrucosus* Reich. Exc. 3. p. 726. n. 4618. et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 13. Ran. Ran. t. 22. f. 4618.
- R. parvulus* L. Mant. 1. p. 79. pl. macrior.
- R. parviflorus* Gouan. Fl. Monsp. p. 270. n. 10. pl. macrior.
- R. n. 1173.* var. III. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 73.
- R. minimus* Apulus Column. Ecphr. 1. p. 314. fig. p. 316. pl. macrior.
- R. palustris*, Apij folio, lanuginosus, rotundiori ac minori folio, longiorique petiolo Cup. Hort. Cath. p. 185.
- R. dulcis* Cup. Sup. alt. p. 75.
- R. palustris* Apij folio, lanuginosus, rotundiori, ac minori folio Cup. Sup. alt. p. 76.
- R. arvensis* annuus lævis, interdum hirsutus, foliis trilobatis, lobis parum incis, et ad exortum macula nigra notatis, flore luteo splendente, calyce reflexo, capitulo subrotundo, seminibus ad latera subasperis Mich. Cat. hort. Fl. p. 80. n. 44.
- R. rectus* foliis pallidioribus hirsutis J. Bauh. Hist. pl. 3. lib. 30. p. 417. fig.

R. arvensis parvus folio trifido *C. B. P.* p. 179. n. 5. pl. macrior.

R. saxatilis minimus hirsutus *C. B. P.* p. 182. n. 3., et *Prodr.* p. 96. n. 10. pl. macrior.

R. parvo folio trifido *Moris. Ox. sect.* 4. tab. 28. fig. 20. pl. macrior.

β foliis inferioribus subrotundis, obtuse, acuteve lobato-dentatis; pedunculis divaricatis; nuculis utrinque tota superficie verrucosis.

Ranunculus Philonotis γ diffusus *Moris. Sard.* 1. p. 47.*

R. Philonotis δ cordigerus *Dub. Bot. Gall. ed.* 2. tom. 2. p. 1022.

R. cordigerus *Fiv. Fl. Cors. diagn.* p. 8.,* et *App.* p. 2.* *Spreng. Syst. veg.* 2. p. 657. n. 139. *Lois. Desl. Nouv. not.* p. 25., et *Gall. ed.* 2. tom. 1. p. 398.

R. montanus?? *De Sal. Marschl. in Bot. zeit. ann.* 1834. p. 85.*

R. Puzolzii *Soleir. Pl. sicc. ex Cors.**

R. alpinus, *Tribuli aquatici* foliis *Bocc. Mus. di piant.* p. 162. *Lagus. Stor. nat. della Cors.* p. 63.

R. Tribuli aquatici foliis *Bocc. Mus. di piant. tab.* 124. *Ital. Stroscone Targ. Tozz. Diz. bot.* 2. p. 198.

Ann. Legi Sarzanae in palustribus pratorum arenosorum di Marinella. Habui ex agro Clavarensi a TURIO, Niccà a DURANDO, Mediolano alla Cascina Triulza a PPR. BALSAMO-CRIVELLIO, et DE NOTABIS, ex districtu Mantuano secus vias a Suzara, et in finibus Regiensibus a BARBIERIO, ex Tyroli meridionali in *Val-sugana* prope *Telve*, et ex campis inter *Belluno*, et *Agordo* a FACCHINIO, ex districtu Bassanensi in humentibus d' *Angarano*, ex agro Patavino ad thermas Aponis alla *Battaglia* a MONTINIO, et a BEGGIATO, ex agro Tarvisino a *Mogliano* a MAJERO, ex districtu Tergestino in pratis a BIASOLETTO, et a TOMMASINIO, ex aquitrinis portus Asculi ab ORSINO, ex Ducatu Lucensi in alpe de *Gomitelli* a Prof. PUCCINELLIO, ex pratis humentibus agri Pisani ab Eq. Prof. CAJ. SAVIO, ex eisdem locis, et ex pratis d' *Asciano* a Prof. PETRO SAVIO, Florentià alla *Ghiacciaia* inter portam *S. Gallo*, et arcem inferiorem a BARONIO fil., Romà in pratis demissis a Prof. MAURIO, et a FIORINIA-MAZZANTIA, ex agro Pestano a MAJERO, ex Sicilia in arvis Panormitanis ab Eq. GUSSONIO, a Prof. PARLATORE, et a TODARO, ex uliginosis Sardiniae ab Eq. Prof. MORISIO, ex Corsica a Bonifacio a SERRAFINIO, et a SOLEROLIO.

Flor. Ital. T. V.

36

Varietatem β accepi ex udīs Sardiniae ab Eq. Prof. MORISIO, ex monte *Coscione* Corsicae ab Eq. Prof. VIVIANIO, a SOLEIROLIO, et a DE SALIS-MARSCHLIN. Floret Majo, Junio.

Radix fibrosa, fibris brevibus, vel omnibus tenuibus, vel crassiusculis nonnullis interjectis. Caulis teres, striatus, erectus, et dum humilior subinde decumbens, vel adscendens, rarissime basi turgens specie bulbi exigui, alterne ramosus, ludens hirsutus, pilosus, glaber, a digito ad sesquipedem longus. Folia inferiora petiolata, simplicia, subrotunda, cordata, pilosa, vel glabra, rarius hirsuta, alia obtuse lobato-crenata, alia trifida, segmento medio trilobo, lateralibus bilobis, omnium lobis obtuse, aut acutiuscule inciso-dentatis, interdum biternata, foliolis bi-tripartitis, segmentis parvilacinatis, radicalia caespitosa, longius petiolata. Petioli supra canaliculati, hirsuti, aut pilosi, basi nunc tractu brevi, nunc longiusculo dilatati. Folia floralia suprema sessilia, insidentia tantum vaginae petiolarum brevissima, anguste membranaceo-marginata, exauriculata, tripartita, laciniis lanceolatis, aut linearibus, integris, vel parce incis. Pedunculi solitarii, terminales, uniflori, fructigeri striati, vel sulcati. Flores quam in praecedente minores. Calycis foliola ovato-lanceolata, acuminata, vel acuta, margine membranacea, dorso hirsuta, aut pilosa, rarius glabra, demum arcte retroflexa. Petala luteo-aurea, obovata, integra, calyce duplo longiora, ungue squamulifero. Nuculae collectae in capitulum parvum, globosum, vel ovoideum, raro ultra pisi magnitudinem crassum, subsemiorbiculatae, compressae, marginatae, granulis exiguis, acutis vel circulo unico prope marginem, vel circulis duobus, aut tribus ordine quidquam turbato, vel tota facie verruculosae, raro laeves, stilo brevissimo, recto, aut incurvulo apiculatae. Rachis capituli hirsuta, aut pilosa. Hirsuties caulis, et petiolorum patens.

Varietas β distinguitur hisce notis. Caules plerumque plures ex eadem radice, caespitosi, decumbentes, patuli, rarius solitarii, erecti, ab uno ad tres, quatuorve pollices longi, nunc simplices, uniflori, nunc bifidi, et biflori, macriores interdum adeo breves, ut pedunculi videantur fere radicales. Folia inferiora plura simplicia, petiolata, subrotunda, basi truncata, aut subcuneata, alias cordata, triloba, inaequaliter, acute dentata; superiora pauca, brevius petiolata, trifida, laciniis

anguste inciso-dentatis; floralia summa sessilia, aut subsessilia, bi-tripartita, laciniis lanceolato-linearibus, vel linearibus, integerrimis, rarius suprema indivisa. Pedunculi plerumque longi, divaricati, apice tenniores. Nuculæ utrinque tota superficie granulis acutis verruculosæ, et sub vitro impresso-punctatæ. Omnia exemplaria mea ex Corsica, et Sardinia sunt hirsuta; sed Bocconius in Mus. l. c. describit hanc plantam glabram, lectam in eodem monte *Coscione*.

Exemplaria, quæ ex agro Tergestino circa *Zaulle* accepi a Tommasinio sub nomine *Ranunculi verrucosi* Presl., habent caulem, qui reapse basi turget in exiguum tuber, folia ternata, aut biternata, foliolis parvilacinatis, nuculas utrinque tota facie verrucosas; sed caulem ita basi bulbosum vidi etiam in individuis, quorum nuculæ erant verrucosæ solummodo circa oram externam; folia magis, vel minus decomposita occurrunt in quocunque statu nucularum, qui quoad verrucas est certe valde ludibundus. Quare *Ranunculus verrucosus* Tonn. sejungi nequit a *Ranunculo Philonoti* Retz., ut jam observavit Kochius in Syn. ed. 2. p. 20.

42. *RANUNCULUS trilobus*: subglaber; caule ascendente, erectove; foliis primordialibus subrotundis, crenatis, reliquis tripartitis, ternatisve, segmentis, foliolisve cuneatis, superne inciso-dentatis; petalis calyci subæqualibus, oblongis; capitulo fructus ellipsoide; nuculis suborbiculatis, utraque superficie acute muriculatis; stilo brevi, ancipiti.

R. trilobus Desf. *Atl.* 1. p. 437. tab. 113. herb. Willd. *Sp. pl.* 2. par. 2. p. 1315. Sibth. et Smith. *Fl. Græc. prodr.* 1. p. 380. Smith. in Rees' s. *Cycl.* v. 29. n. 25. De Cand. *Franç.* 5. p. 639., et *Syst. nat.* 1. p. 301. excl. syn. Ten., et *Prodr.* 1. p. 42. n. 144. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 40. n. 48. Ten. *Nap.* 4. p. 353.,* et *Syll.* p. 273. n. 36.* Guss. *Fl. Sic. prodr.* 2. p. 55.,* et *Sup.* 2. p. 186.,* et *Syn.* 2. p. 49.* Presl. *Sic.* 1. p. 19. excl. syn. Ten., et Cup. *Moris. et De Not. Capr.* p. 10.* *Moris. Sard.* 1. p. 48.*

Ital. *Ranuncolo stellino*.

Ann. Habui ex Lucania ab Eq. Prof. TENORIO, ex Sicilia al *Gurgo di Dingoli* a TODARO, in humentibus nemoris di *Tordiepi* a Prof. PARLATORE, ad stamna Siciliæ meridionalis, et orientalis, et ex Ustica ab Eq. GUSONIO, ex Capraria ab Eq. Prof. MORISIO, et a Prof. DE NOTARIS, ex insula Accipitrum ad Sardiniam ab eodem Prof. DE NOTARIS. Floret Aprili.

Species præcedentibus duabus proxima, sed habitu minore. Radix fibrosa, brevis, tenuis. Caulis a paucis pollicibus ad pedem longus; dum brevior cæspitosus, decumbens, vel adscendens; dum longior erectus; maior parce, luxurians magis ramosus, et dichotomus. Folia primordialia subovata, inæqualiter crenata, reliqua tripartita, ant ternata, segmentis, vel foliolis cuneatis, superne acute inciso-dentatis, inferiora latio-
 ra, longius petiolata, superiora, et præsertim floralia anguste laciniata. Petioli supra canaliculati, basi dilatati, vaginantes. Vaginæ petiolares supremæ petioli vice fungentes, latiusculæ, amplexicaules, auriculis acutis, ciliatis, aut barbatis. Pedunculi uniflori, solitarii, alii terminales, alii oppositifolii, et quandoque etiam alares, striati, fructigeri sulcati, et subinde recurvo-arcuati. Flos exiguus. Calycis foliola oblonga, obtusa, vel acutiuscula, dorso glabra, aut pilosa, demum retroflexa, et decidua. Petala luteo-aurea, calyci subæqualia, aut paulo longiora, oblonga, obtusa, basi angustiora. Nuculæ collectæ in capitulum ellipsoidenm, rarius globosum, suborbiculatæ, compressæ, marginatæ, in utraque superficie totæ muricatæ verruculis acutis, sub vitro impresso-punctatæ, rostellatæ stilo brevissimo, ancipiti, ad summum lineam semis longo, rectinsculo, aut apice subuncato. Axis capituli pilosus. Caulis, folia, petioli ludunt glabri, aut pilis raris, patulis adpersi.

43. *RANUNCULUS arvensis*: caule erecto, multifloro; foliis tripartitis, ternatisve, anguste dissectis, laciniis lanceolatis, apice subtrifidis; calyce patente; nuculis rostratis, lateraliter echinatis, aculeis subulatis.

R. arvensis *Sp. pl.* p. 780. *Smith. in Rees' s Cycl.* v. 29. n. 59., et *Engl. Fl.* 3. p. 52., et *Engl. bot.* v. 2. tab. 135. *Hook. Brit. Fl. ed. 2.* p. 265. *Curt. Lond. ed. Grav.* v. 1. tab. 75. *Fl. Dan. tab.* 219. *Sw. bot.* v. 8. tab. 537. *Bull. Pl. ven.* p. 145. t. 117. *Brugn. in Acad. de Tur. ann.* 1738-1739. tom. 4. p. 108. tab. 3. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 902., et *Syst. nat.* 1. p. 297. a., et *Prodr.* 1. p. 41. n. 138. a. *All. Ped.* 2. p. 53. n. 1463. *Balb. Taur.* p. 90. *Re Seg.* p. 47., et *Tor.* 1. p. 293. *Birol. Acon.* 1. p. 191. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 42. n. 52. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 266., et 393. *Comoll. Prodr.* p. 110. *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec.* 2. tom. 10. p. 292. *Pollin. Ver.* 2. p. 240. *Nacc. Ven.* 3. p. 100. *Suffr. Foroj.* p. 151. *Ors. in Cap. Opusc.* p. 286. *Sav. Pis.* 1. p. 27.,

- et Bot. Etr. 4. p. 125. Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 184.* Ten. Nap. 4. p. 352., et Syll. p. 273. n. 33. Guss. Fl. Sic. prodr. 2. p. 56.,* et Sup. 2. p. 187.,* et Syn. 2. p. 30.* Presl. Sic. 1. p. 18. Zeraph. Fl. Melit. thes. fasc. 2. p. 65. Moris. Sard. 1. p. 51. Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 82. heft. Röhl. cum Kock. Deuts. Fl. 4. p. 187. a. Koch. Syn. ed. 2. tom. 1. p. 20. a. Reich. Exc. 3. p. 725. n. 4614. a., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 12. a. Ran. Ran. t. 21. f. 4614. Host. Austr. 2. p. 116. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 400. Gaud. Helv. 3. p. 551.
 R. n. 1176. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 75.
 R. arvensis, echinatus Cup. Hort. Cath. p. 185. Zannich. Opusc. posth. p. 24. Segui. Ver. 1. p. 487. n. 4. J. Bauh. Hist. pl. 3. app. p. 859. fig.
 Ranunculi hortensis simplicis prima species Fuchs. Hist. pl. p. 157. fig.
 Ranunculus hortensis I. Fuchs. Lugd. hist. 1. p. 1030. fig.
 R. silvestris III. Dod. Pempt. p. 427. fig.
 R. arborum (err. arurum) Lob. Ic. 665. Ger. em. p. 951. fig.
 Ital. Ranuncolo dei campi. Signorine salvatiche Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 197.

Ann. Copiosissimus inter segetes Italiae. Legi Sarzanæ in arvis, Bononiæ inter sata collina a Zolla predosa. Habui ex Insubria a Buffalora ab Eq. PAROLINIO, Bergomo a Sndorno a BERGAMASCHIO, ex agro Tridentino, et ex Fassa in Tyroli Italico a FACCHINIO, ex arvis Bassanensibus a MONTINIO, ex viciniis Tergesti a S. Maria Maddalena a TOMMASINIO, ex agro Patavino ab Eq. TREVISANO, Fossâ Clodiâ a S. Anna a Prof. NACCARIO, ex Montegrimano in districtu Urbinati ab AZZAROLIO, Maceratâ a Potenza a Prof. UTILI, ex Piceno a Montefortino a MARZIALETTO, ex Etruria prope S. Sepolcro a S. Leo a CLERICO, in Mugello, et in agro Florentino a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, et ab Eq. RICCASOLO, ex Ciminis a Prof. MAURIO, ex satis Panormitanis ab Eq. GUSSONIO, et a TODARO, ex Corsica a Calvi a SOLEIROLIO. Floret Majo, Junio.

Radix fusiformis, alba, brevis, lateraliter fibrosa, vel rhizomate oblitterato, fasciculato-fibrosa. Fibrae aliæ crassiusculæ, aliæ tenues, simplices, aut ramulosæ. Caulis teres, vel e tereti obscure angulatus, erectus, subflexuosus, a semipede ad sesquipedem longus, inferne farctus, glaber, et qua sole tangitur purpurescens, superne pilosus, tenuiter fistulosus, dum macer parce ramosus, luxurians paniculato-dichotomus,

divaricatus. Folia radicalia prima simplicia, cuneato-ovata, vel cuneato-oblonga, flabelliformia, apice tri-quinquedentata, aut breviter trifida, laciniis integris, vel plus minus dentatis, reliqua ternata, aut tripartita, inferiora foliolis, vel segmentis lanceolatis, aut lanceolato-linearibus, medio trifido, lateralibus bifidis, laciniis acutis, aliis integris, aliis apice iterum bi-trifidis, superiora laciniis angustioribus, linearibus, sæpe integris; omnia læte viridia, glabra, aut sparse pilosa, alterna, rarius opposita, ima longius petiolata, suprema suffulta loco pctioli vagina petiolari, brevi. Petioli semiteretes, glabri, vel pilosi, supra canaliculati, basi dilatati, membranacei, sæpe ciliati. Pedunculi uniflori, solitarii, terminales, et alares, teretes, potius tenues. Calycis foliola ovato-lanceolata, concava, pateutia, flavo-viridula, dorso pilosa. Corolla parva, flava, supra non, aut vix nitens, extus pallidior. Petala obovata, ungue ferente squamam latam, brevissimam, semicircularem. Nuculæ paucæ, grandes, in capitulum globosum coadunatæ, semicirculares, compressæ, lato-carinatæ, lateribus eclinatæ subulis apice glochidatis, utrinque in margine carinæ longioribus, terminatæ rostro longo, subulato, recto.

44. *RANUNCULUS muricatus*: caule decumbente, erectove, divaricato; foliis cordato-semirotundatis, inferioribus obtuse lobato-crenatis, superioribus acute dentatis; calycibus retroflexis; nuculis lateraliter muricatis, rostro longo, apice subuncato.

R. muricatus *Sp. pl.* p. 780. *Smith. in Rees's Cycl.* v. 29. n. 77. *Sibth. et Smith. Fl. Græc. prodr.* 1. p. 384., et *Fl. Græc.* 6. p. 18. t. 522. *Lamck. Ill.* 5. tab. 498. fig. 2. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 902., et *Syst. nat.* 1. p. 298. α. excl. syn. *Bocc.*, et *Prodr.* 1. p. 42. n. 139. α. *All. Ped.* 2. p. 53. n. 1464. *Birol. Acon.* 1. p. 191. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 41. n. 51. α. *Sav. Pis.* 2. p. 28., et *Bot. Etr.* 4. p. 126. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 184.* *Ten. Nap.* 4. p. 352., et *Syll.* p. 273. n. 34. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 56., et *Sup.* 2. p. 187., et *Syn.* 2. p. 50. *Presl. Sic.* 1. p. 19. *Zeraph. Fl. Melit. thes. fasc.* 2. p. 65. *Moris. et De Not. Capr.* p. 11.* *Moris. Sard.* 1. p. 50. *Desf. Atl.* 1. p. 440. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 82. heft. *Röhl. cam Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 188. *Koch. Syn. ed.* 2. tom. 1. p. 20. *Reich. Exc.* 3. p. 725. n. 4615., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 13. *Ran. Ran. t.* 22. f. 4615. *Host. Austr.* 2. p. 116.

R. Apulei quibusdam *Clus. Hist. pl. lib. 2. p. 233. fig.*

R. parvus echinatus Ger. em. p. 965. fig.

R. palustris echinatus J. Bauh. Hist. pl. 3. app. p. 858. fig. bona.

Ital. Sedano salvatico. Piè corvino. Piè di Gallo Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 198.

Ann. Legi Sarzanæ in fossis. Habui ex Liguria orientali in agris Clavarensibus a TURIO, ex Liguria occidua ab EQ. RICCASOLO, ex Istria ad Dignanum a TOMMASINIO, Anconâ a MARCHISIA, ex Etruria in fossis agri Pisani a Prof. PETRO SAVIO, Volaterris ad cœnobium Capuccinorum ab AMIDEO, in viciniis veteris Saturniæ a Prof. GIULIO, ex agro Viterbiensi a CAMILLIO, Centumcellis, et ex viciniis Romæ a Prof. MAURIO, Româ in monte Malo a BARBIERIO, ex canalibus Pontinis a FIORINIA-MAZZANTIA, ex humentibus Panormitanis a TODARO, ex Igiliò ab EQ. BARDIO, ex Sardinia supra Pula a Prof. DE NOTARIS, ex Corsica a Bonifacio a SOLEIROLIO. Floret Aprili, Majo.

Radix fibrosa, fibris ramulosis, tenuibus, vel crassiusculis nonnullis interjectis. Caulis teres, crassus, striatus, inferne farctus, superne fistulosus, decumbens, ascendens, vel erectus, alterne ramosus, ramis divaricatis, a pollice ad pedem longus, glaber, vel sparse pilosus, pilis longis, patentibus. Folia inferiora longe petiolata, cordato-semirotundata, trifida, segmentis grosse, obtuse, inæqualiter lobato-crenatis, superiora successively brevius petiolata, subinde basi truncata, acute inciso-dentata, floralia summa cæteris multo minora; omnia nitida, glabra, vel sparse pilosa, vel supra glabra, subtus pilosa, facie superiore læte, aut saturate viridia, inferiore pallidiora. Petioli pilis longis, patentibus, raris adpersi, aut glabri, supra canaliculati, basi dilatati, et margine membranacei. Pedunculi terminales, et oppositifolii, in foliis oppositis axillares, floriferi breves, et subinde brevissimi, fructiferi quidquam elongati, et paulo crassiores, striati, vel sulcati, glabri, aut parce pilosi. Calycis foliola ovato-lanceolata, acuta, vel obtusiuscula, concava, primo patentia, cito retroflexa, demum decidua, margine membranacea, glabra, vel dorso plus minus pilosa, pilis longis, patentibus. Corolla parva, lutea, calyce paulo longior. Petala oblongo-obovata, integra, squamula unguis subrotunda, crenulata. Nuculæ in capitulum globosum collectæ, divaricatæ, grandiusculæ, subovatæ,

compressæ, marginatæ, faciebus utrinque muricatæ aculeis subulatis apice curvulo, vel uncato, inter aculeos impresso-punctatæ, rostratæ stilo longo, compresso-ensiformi, apice subuncato. Axis capituli pilosus.

45. *RANUNCULUS parviflorus*: villosus; radice tenuiter fibrosa; caule decumbente, erectove; foliis cordato-rotundatis, trisectis, inferioribus obtuse crenatis, superioribus acute dentatis; calyce retroflexo; nuculis rostellis brevi, uncato, lateribus muriculatis tuberculis parvis, pilo incurvo terminatis.

R. parviflorus *Sp. pl.* p. 780. *Smith. in Rees's Cycl.* v. 29. n. 79., et *Engl. Fl.* 3. p. 53., et *Engl. bot. v. 2. tab.* 120. *Hook. Brit. Fl. ed. 2. p.* 265. *Fl. Dan. tab.* 1218. *De Cand. Franç. 4. par. 2. p.* 902.,* et *Syst. nat.* 1. p. 300. a.,* et *Prodr.* 1. p. 42. n. 143. a.* *All. Ped.* 2. p. 53. n. 1465. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 40. n. 49. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 266. *Pollin. Ver.* 2. p. 241. *Sav. Pis.* 2. p. 28.,* et *Bot. Etr.* 4. p. 126.* *Ten. Nap.* 4. p. 353. *A. B., et Syll.* p. 273. n. 35. *Guss. Sup.* 2. p. 187.* *Moris. et De Not. Capr.* p. 10.* *Moris. Sard.* 1. p. 48.* *Desf. Atl.* 1. p. 441. *Lois. Desl. Gall.* 1. p. 353.,* et *ed. 2. tom. 1. p.* 398. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 82. heft. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 189. *Koch. Syn. ed. 2. tom. 1. p.* 20. *Reich. Exc.* 3. p. 725. n. 4616., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 13. *Ran. Ran.* 1. 22. f. 4616. *Host. Austr.* 2. p. 117. *R. incrassatus* *Guss. Syn.* 2. p. 50.*

R. hirsutus annuus, flore minimo *Segui. Ver.* 1. p. 489. n. 9. *Pluk. Phyt. tab.* 55. fig. 1. ramulus plantæ luxuriant. *Raj. Syn. ed. 3. p.* 248. *tab.* 12. fig. 1. pl. minor. *R. hirsutus fl. omnium minimo luteo.* *Moris. Oxon. sect.* 4. *tab.* 28. fig. 21.

Ital. Ranuncolo pargoletto.

Ann. Legi Sarzanæ in colle di Sarzanello. Habui ex agro Bononiensi ad ripas di Savena vecchia a PIRAZZOLIO, ex Liguria orientali in districtu Clavarensi in arvis a S. Colombano, et a Carasco a TURIO, ex ora occidentali Benaci inter Gargnano, et Limone a FACCHINIO, ex districtu Bassanensi in Val Soarda d'Angarano a MONTINIO, Tarvisio a Mogliano a MAJERO, ex Istria ab eodem, et a Biasoletto, et circa Albonam a TOMMASINIO, ex agro Fluminensi a BERINIO, et BRUMATINO, ex Ducatu Lucensi in campis a Chiatri a Prof. PUCCINELLIO, ex agro Pisano a Prof. CAJ. SAVIO, ex Impruneta in Etruria a BARONIO fil., ex Cosyra, et ex Insula sacra ab Eq. GUSSONIO, ex Gorgonia a Prof. PETRO

SAVIO, ex Capraria ab Eq. Prof. MORISIO, et a Prof. DE NOTARIS, ex palustribus Sardinie ab Eq. Prof. MORISIO, ex insula Accipitrum ad Sardiniam a Prof. DE NOTARIS, ex Corsica a Calvi a SOLEIROLIO. Floret Aprili, Majo.

Radix fibrosa, fibris tenuibus. Caules sæpe plures e radice, cespitosi, decumbentes, ascendentes, vel erecti, villosi, aut pilosi, pilis patentibus, a pollice ad pedem longi, plus minus ramosi, et dum ramosiores dichotomi, ramis divaricatis. Folia pallide virentia, villosa, aut pilosa, inferiora longius petiolata, cordato-rotundata, trifida, aut triloba, segmentis obtuse crenatis, caulina reliqua tri-septemfida, segmentis integris, vel medio trifido, lateralibus bifidis, omnibus acutis, vel acutiusculis, dentatis, aut integris, interdum basi truncata, floralia summa quandoque indivisa, ovato-lanceolata, vel lanceolata, subintegerrima, vagina petiolarum brevi suffulta. Petioli villosi, aut pilosi more caulibus, supra canaliculati, basi dilatati. Pedunculi terminales, et oppositifolii, plerumque breves, in fructu incrassati, striati, pilosi, vel glabri. Flores exigui. Calycis foliola ovata, apice angustata, tamen obtusa, e viridi flavida, dorso hirsuta, aut pilosa, demum retroflexa. Corolla pallide flava, calyci subæqualis, petalis oblongo-oboatis, integris, nonnullis subinde abortivis. Nuculæ parvæ, in capitulum globosum collectæ, semiovatæ, compressæ, marginatæ, lateribus muriculatæ tuberculis exiguis, apice pilo curvo terminatis, rostellatæ stilo brevi, compresso-triangulo, uncato. Axis capituli glaber.

Exemplaria, quæ habui ex Gallia a De Candolleo, et a Delongchampsio, ex Kent, et Somerset Angliæ ab Woodside omnino conveniunt cum nostris.

46. *RANUNCULUS falcatus*: foliis palmatis, laciniis dissectis, linearibus; scapis radicalibus; nuculis superne bilobis, rostro longo, compresso, sursum falcato.

R. falcatus Sp. pl. p. 781. Jacq. Austr. 1. p. 30. t. 48. De Cand. Franç. 4. part. 2. p. 900. Balb. Misc. bot. alt. p. 19., et in Acad. de Tur. an. 1805-1808. tom. 16. p. 217. Barb. Agg. p. 37.* Host. Austr. 2. p. 117. Lois. Desl. Gall. 1. p. 333.* et ed. 2. tom. 1. p. 398.*

Ceratocephalus falcatus De Cand. Syst. nat. 1. p. 230., et Prodr. 1. p. 26. n. 1. Coll. Herb. Ped. 1. p. 26. n. 1. Sang. Cent. p. 78.* Ten. Syll. p. 162. n. 1. (err. a.). Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 190. Koch. Syn. ed. 2. tom. 1.

- p. 12. *Reich. Exc.* 3. p. 718. n. 4570., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 9. *Ran. Ran.* t. 1. f. 4570.
- Cratægonium pumilum luteum absinthij fol. hisp. Barrel. Ic.* 375.
- C. hisp. Barrel. Ic.* 376. fig. II.
- Ranunculus Alopecuroides Ajugæ foliis Bocc. Sic.* p. 28. tab. 14. fig. III. IV. O.
- R. ceratophyllus seminibus falcatis in spicam addactis Moris. Oxon. sect. 4. tab. 28. fig. 22.*
- Ital. Corno cervino falcato.*
- Ann. Habui ex agro Mantuano ad aggerem Padi prope Governolo a BARBIERO, ex Umbria a Trevi a Prof. MAURIO, ex Apulia prope Foggia alle Croci ab Eq. GUSONIO. Floret Majo.*
- Radix superne simplex, inferne soluta in fibras subfasciculatas, tenues, ramulosas, flexuosas. Scapi solitarii, vel plures ex eadem radice, erecti, aut adscendentes, uniflori, a digito ad duos pollices longi. Folia omnia radicalia, cæspitosa, primordialia linearia, integerrima, vel apice bi-tridentata, reliqua petiolata, palmata, laciniis linearibus, bi-trifidis, et quandoque dichotomis, acutis, breviusculis. Petioli lineares, basi non, aut vix latiores. Flos terminalis, parvus. Calycis foliola oblonga, obtusa, patentia, persistentia, margine membranacea. Corolla lutea, calyce etiam duplo longior. Petala obovata, integra. Nuculæ in spicam cylindraceam, plus minus longam, densam coadunatæ, turgidulæ, superne bilobæ, lanuginosæ, terminatæ rostro compresso, longo, lanceolato, acuminato, sursum falcato, et in nuculis superioribus quandoque recto, pubescente, vel lanuginoso. Tota herba plus minus albo-lanuginosa.*
- Ceratocephalus orthoceras* Germanorum estne vera planta Taurica, et Sibirica sub hoc nomine a De Candolleo descripta *Syst. nat.* 1. p. 231? Profecto non video in planta Pragensi rostrum nucularum subulatum.
47. *RANUNCULUS hederaceus*: caule repente; foliis reniformibus, tri-quinquelobis, lobis integris, lobulatisve; petiolis basi late auriculatis; nuculis transverse rugosis, glabris.
- R. hederaceus Sp. pl.* p. 781. *Smith. Engl. Fl.* 3. p. 54., et *Engl. bot.* v. 28. t. 2003. *Hook. Brit. Fl. ed. 2.* p. 263. *Curt. ed. Grav. v. 1. tab. 76. Fl. Dan. tab. 321. Sv. bot. v. 10. tab. 673. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 894., et Syst. nat.* 1. p. 233., et *Prodr.* 1. p. 26. n. 1. *Ten. Syll.*

p. 266. n. 1. *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 57.* *Desf. Atl.* 1. p. 442. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 67. heft. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 147. *Koch. Syn. ed.* 2. tom. 1. p. 12. *Reich. Exc.* 3. p. 718. n. 4573., et *Io. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 9. *Ran. Ran. t.* 2. f. 4573. *Host. Austr.* 2. p. 117. *Gaud. Helv.* 3. p. 526.

R. omiophyllus *Ten. Nap.* 4. p. 338.

R. cœuosus *Guss. Sup.* 2. p. 187.,* et *Syn.* 2. p. 39.*

R. aquaticus, *Hederaceus* *Cup. Hort. Cath.* p. 186.

Ital. Ranuncolo ederino.

Perenn. Habui ex Sicilia in inundatis, et agnoscis di *Castrogiovanni*, et *Etnæ al Milo* ab Eq. *Gussonio*. Floret Aprili, Majo, et per æstatem.

Caulis teres, striatus, repens, sive ad nodos radicans, simplex, vel ramosus, a paucis pollicibus ad spithamam, et ultra longus. Folia alterna, sita ad nodos caulis, reniformia, sinu interdum divaricato, et recta abscisso, quinqueloba, lobis obtusis, integris, aut iterum lobulatis, in macrioribus individuis triloba, saturate viridia, interdum in disco nigro-maculata, longiuscule petiolata. Petioli basi utrinque aucti auricula lata, brevi, albo-membranacea, amplexicauli. Pedunculi solitarii, uniflori, oppositifolii, crassiusculi, folio, et sæpe ipso petiolo breviores, fructiferi recurvati, aut declinati. Flos admodum parvus. Calycis foliola ovata, concava, obtusa, patentia, albido-membranacea. Petala alba, calyce paulo longiora, oblongo-obovata, obtusa, integra. Stamina alba. Nuculae numerosæ, in capitulum parvum, globosum collectæ, subsemiovatæ, tumidulæ, acute, et anguste carinatæ, in utraque facie transverse rugosæ, rugis flexuosis, subinterruptis, cæterum glabræ, stilo brevissimo, tenui apiculatæ. Tota planta glabra.

Exemplaria in herbario meo ex *Lewes* ab *Woodsio*, et ex *Boren* a *Frölichio* sunt simillima nostris a *Gussonio* tam magnitudine, et forma foliorum, quam lobis eorum quinis, rotundatis, obtusis, et nonnullis lobulatis. Folia triloba occurrunt in individuis macris; lobi foliorum acutiusculi habentur per accidens. Hæ notæ minoris momenti debentur loco.

48. *RANUNCULUS aquatilis*: caule fluitante; foliis emer-sis reniformibus, trifidis, segmentis obtuse crenatis, incisive, immersis dichotomo-capillaceis; nuculis transverse rugosis, glabris, hispidisque.

R. aquatilis *Sp. pl.* p. 781. *α. Smith. in Rees' s Cycl.* v. 29. n. 85., et *Engl. Fl.* 3. p. 54. *α.*, et *Engl. bot.* v. 2.

- tab. 101. *Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 263. α. De Cand. Franc. 4. par. 2. p. 894. β., et Syst. nat. 1. p. 234. α. β., et Prodr. 1. p. 26. n. 3. α. All. Ped. 2. p. 53. n. 1468. Balb. Taur. p. 90. Re Seg. p. 47., et Tor. 1. p. 294. Birol. Acon. 1. p. 191. Coll. Herb. Ped. 1. p. 26. n. 1. Comoll. Prodr. p. 110. Lanf. Mant. in Conf. et Brugn. Giorn. dec. 2. tom. 10. p. 292. Pollin. Ver. 2. p. 241. α. β. Moric. Ven. 1. p. 258. Nacc. Ven. 3. p. 101. A. B. Suffr. Foroj. p. 151. Sav. Bot. Etr. 4. p. 127. Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 284. α.* Ten. Nap. 4. p. 339., et Syll. p. 268. n. 2. Guss. Fl. Sic. prodr. 2. p. 58. a. b., et Syn. p. 40. a. b. Moris. et De Not. Capr. p. 10.* Moris. Sard. 1. p. 25. α.* Desf. Atl. 1. p. 442. Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 67. heft. α. peltatus, β truncatus, γ quinquelobus, δ tripartitus. Reich. Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 9. Ran. Ran. t. 3. f. 4576. β. heterophyllus. Host. Austr. 2. p. 118. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 394. Gaud. Helv. 3. p. 522. R. heterophyllus Ruch. Ven. p. 136. Sav. Pis. 2. p. 30. R. tripartitus Sav. Bot. Etr. 4. p. 127. Guss. Fl. Sic. prodr. 2. p. 58. a.* b.,* et Syn. 2. p. 39. a.* b.* non De Cand. Batrachium peltatum Presl. Sic. 1. p. 10. B. heterophyllum Presl. Sic. l. c. B. tripartitum α. β. Presl. Sic. l. c. Ranunculus n. 1163. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 69. R. utrumque genus foliorum habens, initio quidem integrum, procedente tempore capillaceum Cæsalp. De pl. lib. 14. cap. 2. p. 544. R. aquaticus folio rotundo et capillaceo Cup. Hort. Cath. p. 186. R. lacustris, folio rotundo, minor, flore albo pentaphyllo, unguibus luteis Cup. Hort. Cath. l. c. R. aquat. albus lato et sœniculi fol. Ital. Barrel. Ic. 565. R. aquatilis Dod. Pempt. p. 587. fig. Ger. em. p. 829. fig. R. aquaticus Hepaticæ facie Lob. Ic. 2. p. 35. fig. R. aquatilis albus tenuifolius J. Bauh. Hist. pl. 3. lib. 38. p. 781. fig. β foliis omnibus reniformibus, trifidis, segmentis late lobato-crenatis. Ranunculus aquatilis β Gaud. Helv. 3. p. 523. γ pusillus; foliis superioribus paucis tripartitis, lobatis, reliquis dichotomo-linearibus, vel omnibus dichotomo-linearibus, laciniis crassiusculis, abbreviatis. Ranunculus aquatilis γ terrestris heterophyllus Reich. Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 9. Ran. Ran. t. 3. f. 4576. γ. R. aquatilis * cœnosus Moris. Sard. 1. p. 26.**

R. aquatilis *α* De Cand. *Franç.* 4. par. 2. p. 894. excl. syn. J. Bauh.

R. aquatilis *δ* succulentus Koch. *Syn. ed.* 2. tom. 1. p. 13.

Ital. *Ranuncolo Soldinello* Sav. *Pis.* 1. p. 30.

Perenn. Legi Szranæ in paludibus, fossisque di *Mari-nella*. Habui ex stamnis Vicetinis, et Foro-Juliensibus a Prof. MORETTIO, ex fossis Tergestinis a BIASOLETTO, ex paludibus oræ Venetæ ab Eq. CONTARENO, ex aquosis Picensi, et ai Guazzi prope portum di *Recanati* ab ORSINO, et ab Eq. NARDUCCIO, ex Ducatu Lucensi a *Massacciuccoli* a Prof. PUCCINELLIO, ex aquis stagnantibus Pisanis a Prof. PETRO SAVIO, Viterbio a CAMILLIO, Ostiâ a Prof. SEBASTIANIO, ex paludibus Pontinis a FIORINIA-MAZZANTIA, ex Calabria ulteriore a *Rossarno* a GASPARRINIO, ex stamnis Siciliæ alla *Piana dei Greci*, *Cotrano*, *Nicosia* ab Eq. GUSSONIO, alla *Piana dei Greci*, al *Gurgo di Dingoli*, a *Mondello*, et in monte *Busambra* al *Gurgo de' Palermitani* a Prof. PARLATORE, denuo a *Mondello*, et al *Gurgo di Dingoli* a TODARO, ex Capraria ab Eq. Prof. MORISIO, et a Prof. DE NOTARIS, ex stamnis Sardinie ab Eq. Prof. MORISIO, ex Corsica a *Figari* a SERAFFINIO. Varietatem *β* accepi ex rivulis prope *Uboldo* in provincia Mediolanensi a PPrr. BALSAMO-CRIVELLIO, et DE NOTARIS. Varietatem *δ* obtinui ex Ducatu Lucensi a *Colle di Compito sul Pollino del grotto* a Prof. PUCCINELLIO, ex cœnosis maritimis Sardinie circa *Terralba* ab Eq. Prof. MORISIO. Floret ab Aprili in Junium.

Caulis teres, striatus, fistulosus, ramosus, fluitans, basi, et e nodis inferioribus radicans, glaber, raro in parte suprema pilosus, mire varians longitudine secundam quantitatem aquæ, in qua degit, subinde longissimus. Folia immersa inferne trichotome, superne dichotome capillacea, laciniis divergentibus, sessilia intra vaginam petiolarem late ovatam, membranaceam, amplexicaulem, aut brevissime petiolata cum eadem vagina in basi petioli, alterna, glabra. Folia emersa natantia, longe petiolata, reniformia, trifida, vel tripartita, et quandoque ternata, foliolis brevissime petiolulatis, segmentis, aut foliolis cuneato-flabellatis, plus minus obtuse lobato-dentatis, vel incis, rarissime acutiuscule laciniatis, alia sinu baseos divaricato, recta abscesso, alia peltata, sinu approximato, cæterum glabra, subtus pallidiora, et subinde pilosa. Eorum petioli basi late, et breviter auriculati, interdum pilosi.

Pedunculi in inflorescentia emersi, oppositifolii, aut axillares, solitarii, uniflori, crassiusculi, sulcati, nudi, plerumque longi, quandoque fructiferi recurvati. Flores magnitudine mire ludentes, majores diametri semipollicaris. Calycis foliola ovata, obtusa, concava, patentia, marginæ albo-membranacea. Corolla alba, basi lenteola, dum major calyce triplo longior. Petala obovata, obtusa, integra, aut leviter emarginata, ungue instructo poro tubuloso. Nuculæ numerosæ, in capitulum globosum, parvum collectæ, semiovatæ, vel obovatæ, compresso-tumidulæ, tenuiter, et acute carinatæ, utrinque in lateribus transverse rugosæ, rugis crebris, flexuosis, subinterruptis, nunc totæ hispidæ, nunc tantum hispidæ in carina, et prope carinam, nunc totæ glabræ, stilo brevissimo, cito deciduo terminatæ. Axis capituli hirsutus, pilosus, aut glaber.

Varietas β est planta grandior. Folia omnia longe petiolata, cordato-semirotunda, trifida, segmentis obtuse lobato-crenatis, subtus pilosa. Item pars superior caulibus, stipulæ, petioli, pedunculi pilosi. Nuculæ totæ hispidæ.

Varietas γ est planta pygmea, ex loco cito exsiccato. Caulis uni-tripollicaris; folia omnia petiolata, tripartita, dichotoma, inferiora laciniis angustis, linearibus, crassiusculis, brevissimis, suprema trifida, aut tripartita, segmentis cuneato-labellatis, obtuse inciso-lobulatis; raro omnia laciniis linearibus; flores magnitudinis mediæ, aut parvi; nuculæ, et rachis glabræ.

Ranunculus aquatilis L. α . mire ludit magnitudine, et forma. Nonnulli e botanicis nostris putarunt, individua nuculis glabris, sive gaudeant flore majore, sive minore, pertinere ad *Ranunculum tripartitum* De Cand., alii vero habuerunt pro hoc individua minora, flore parvo, et nuculis pariter glabris pollentia; sed primam assequuti non sunt, cum *Ranunculus tripartitus* α . De Cand. tam ex figura ejus Ic. pl. Gall. rar. fasc. 1. tab. 49, quam ex specimine sicco Parisiis lecto, quod obtinui a Richardo filio, gaudeat præter folia emersa parva petalis oblongis, acutiusculis, vix calyce longioribus. Forte hic quoque est Insus *Ranunculi aquatilis* L., tamen in Italia nondum repertus. Nullus vero dubito, quin *Ranunculus tripartitus* β De Cand. Syst. nat. 1. p. 234. sit forma minor *Ranunculi aquatilis* L., et ideo *Ranunculus tripartitus* quorundam botanicorum Italiæ.

49. *RANUNCULUS pantothrix*; caule aquatili fluitante, terrestri cæspitoso, ascendente; foliis omnibus tri-dichotome capillaceis, erecto-divergentibus, supremis sessilibus, vagina stipulari grandi, oblonga, biloba, nuculis transverso rugosis; glabris, hispidisque.
- R. pantothrix* *De Cand. Syst. nat.* 1. p. 235. α . β . excl. nonnull. syn. *Morett. in Mem.* 1. p. 274. n. 5. β . * pl. terrestr. *Sav. Bot. Etr.* 4. p. 128. *Ten. Syll.* p. 266. n. 3. *Gaud. Helv.* 3. p. 523. α , et $\alpha\alpha$.
- R. aquatilis* *Sp. pl.* p. 782. γ . *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 894. γ .
- R. aquatilis* ζ *Bad. in Morett. Bot. Ital.* p. 8. *
- R. aquatilis* β capillaceus, et γ cæspitosus *De Cand. Prodr.* 1. p. 26. *Smith. Engl. Fl.* 3. p. 54. β . *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 263. β . *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 184. β . *Moris. Sard.* 1. p. 26. β capillaceus, * et ** *peucedanifolius*. * excl. syn.
- R. aquatilis* *Sav. Pis.* 2. p. 29.
- R. aquatilis* *A. Desf. Atl.* 1. p. 442.
- R. aquatilis* ϵ *pantothrix* *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 67. *heft.*
- R. aquatilis* α *pantothrix* *Reich. Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 9. *Ran. Ran. t.* 3. f. 4576. α . flore nimis grandi.
- R. aquatilis* γ terrestriis homophyllus *Reich. Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 9. tab. 3. f. 4576. γ . pl. terrestr. macrior.
- R. peucedanifolius* *All. Ped.* 2. p. 53. n. 1469. herb., excl. syn.
- R. capillaceus* *Ten. Nap.* 4. p. 340. *Parol. et Webb. in Bong. Guid.* p. 11. *
- R. stagnatilis* *Ten. Nap.* 4. p. 340.
- R. fluviatilis* a capillaceus, et b cæspitosus *Guss. Fl. Sic. prodr.* 2. p. 59., * et *Syn.* 2. p. 40. a . b . *
- Batrachium capillaceum* *Presl. Sic.* 1. p. 11. α . β . excl. nonnull. syn.
- Ranunculus* 1162. α . *Hall. Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 69.
- R. alter* foliis in capillaceam tenuitatem scissis, quasi fœniculi *Cæsalp. De pl. lib.* 14. cap. 2. p. 544.
- R. trichophyllon* aquaticus medioluteus *Column. Ecphe.* 1. p. 315.
- R. alter* aquaticus fœniculi folio *τριχόφυλλον* *Column. l. c.* p. 316. fig. plantæ macrior.
- R. aquat. albus* fœniculi folio *Barrel. Ic.* 566.
- R. aquaticus*, capillaceus *Segui. Ver.* 1. p. 492. n. 14.
- R. aquatilis* omnino *J. Bauh. Hist. pl.* 3. lib. 38. p. 781. fig.

Millofolium, sive Maratriphyllon, flore et semine Ranunculi aquatici, Hepaticæ facie *Ger. em. p. 827. fig. Ital. Finocchio d'acqua.*

Perenn. Legi Sarzanæ in fossis di Camponesto, et in paludibus exsiccatis di Marinella, Bononiæ in aquitrinis collium di Gaibolla, et a Casalecchio in fossis villæ Sanpieri, in Insubria Helvetica a Lugano in ora septentrionali lacus. Habui ex valle Andora in Liguria occidua a BADAROO, ex aquosis prope Ticinum a BERGAMASCHIO, Mantuâ in oryzetis di Castellaro a BARBIERIO, ex fossis agri Tridentini, ex lacu orientali S. Pellegrini in alpe di Fiemme Tyrolis Italici, et ex Paese dell'Adige a FACCHINIO, Vicetiâ in marginibus fossarum sub la Rotonda a Prof. MORETTIO, denuo Vicetiâ a RAINERO, ex collibus Bericis, ex districtu Bassanensi a Roman, Marsan, et a Rea di Campese, nec non ex agro Tarvisino prope Campo San Piero a MONTINIO, ex paludosis litoris Veneti a ZANARDINIO, Fossâ Clodiâ prope Ca-Lin a Prof. NACCARIO, Senogalliâ a SALVATORIO, ex Piceno secus viam del Porto d'Ascoli, et ad oras lacus di Castelluccio ab ORSINO, in aquitrinis di Monfalcone a MARZIALETTO, ex Ducatu Lucensi in lacu Blentinæ a Prof. PUCCINELLIO, ex Etruria in paludibus di Pietrasanta, et in agro Pistoriensi a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, in aquis stagnantibus agri Pisani a Prof. PETRO SAVIO, ex fossis Terracinensibus a FIORINIA-MAZZANTIA, et rivulis Siciliæ ab Eq. GUSSONIO, in aquosis di Mondello, et montium di Busambra a TODARO, al Parco prope Panormum a Prof. PARLATORE, in viciniis portus Syracusarum ab Eq. PAROLINIO, ex Sardinia in aquis lente fluentibus, et in torrentibus ab Eq. Prof. MORISIO, ex Corsica a Calvi a SOLEIROLIO. Floret a Martio in Julium.

Planta nunc fluitans in canaliculis, et lacubus, nunc terrestris in marginibus fossarum, et in locis exsiccatis; hinc valde ludit partium magnitudine. Caulis basi, et ad nodos inferiores radicans, in planta terrestri brevissimus, caespitosus, decumbens, ascendens, in planta fluitante longus, et interdum longissimus. Folia valde decomposita, omnia inferne trichotome, superne dichotome capillacea, ad summum vix ultra pollicem sine petiolo longa, sed passim breviora, fluitantia laciniiis parum divergentibus, et veluti in penicillum coadunatis, terretria laciniiis divaricatis, nunquam plano-orbiculata, inferiora petiolata, petiolis basi paulo dilatatis,

dilatatione oblonga, apice angustata, exauriculata, superiora, aut saltem suprema sessilia, utraque sive petiolata, sive non, instructa vagina petiolarum utrinque ample auriculata, amplexicauli, auriculis subrotundis, obtusis. Pedunculi oppositifolii; variant folio longiores, æquales, aut breviores, floriferi tenuiores, fructiferi incrassati, sulcati, demum recurvi, aut declinati. Flores parvi, et semper quam in præcedente minores. Calycis foliola quatuor, vel oblonga, obtusa, aut acuta, albicantia, et subinde apice purpurantia, primo patentia, postea reflexa, demum decidua. Corolla alba, basi luteola, calyce longior. Petala anguste obovata, obtusa, integra, unguibus nectario cyathiformi instructis. Reliqua ut in præcedente, sed nucula sæpius glabra. Herba aquatica luride, et saturate virens, terrestris late virens.

Ranunculus pantothrinx β *cæspitosus* De Cand. Syst. nat. 1. p. 236. ob petiolos basi late vaginanti-auriculatos nequit pertinere ad sequentem speciem, ut quidam putarunt; sed sistit omnino lusum terrestrem *Ranunculi pantothrinx*, ut recte animadvertit Cl. Morettius in Mem. r. p. 274.

50. *RANUNCULUS circinatus*: caule prostrato; foliis sessilibus, parvis, tri-dichotomo-capillaceis, plano-orbiculatis, vaginis petiolaribus brevissimis, exauriculatis; pedunculis folio longioribus.

R. circinatus Sibth. Oxon. p. 175. Reich. Exc. 3. p. 719. n. 4575., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 9. *Ran. Ran. t. 2. f. 4575. fig. optima.*

R. aquatilis β *Sp. pl. p. 781.*

R. aquatilis γ *Smith. Engl. Fl. 3. p. 55. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 263. De Cand. Prodr. 1. p. 27. δ . Guss. Syn. 2. p. 40. c.*

R. stagnalis Wallr. Sch. crit. p. 285. excl. nonnull. syn.

R. divaricatus Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 67. heft. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 152. Koch. Syn. ed. 2. tom. 1. p. 13.

R. n. 1162. β Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 69.

R. aqualis, albus circinatis tenuissimo divisis foliis, florib. ex alis, longis pediculis innixis *Pluk. Phyt. tab. 55. fig. 2.*

Ital. *Ranuncolo a cerchiello.*

Perenn. Observaveram in fossis inter Ticinum, et il Gravello, unde accepi quoque a Prof. MORETTIO. Habui ex aquis stagnantibus prope Mediolanum a PPR. BALSAMO Flor. Ital. T. V.

-CRIVELLIO, et DE NOTARIS, ex districtu Bergomensis in lacu di Gudine a BERGAMASCHIO, Bassano in fossis di S. Anna Morosina a MONTINIO. Floret cum præcedentibus duobus.

Incolit fossas cœnosas, vel fluitat in aqua demissa. Caulis prostratus, aut fluitans, vix ultra pedem longus. Folia parva, inferne trichotome, superne dichotome capillacea, plano-orbiculata, orbiculo diametri transversalis quinque-septem linearum, laciniis divaricatis, numerosis, sessilia, et tantum suffulta vagina petiolari brevissima, angusta, exauriculata, plus minus pilosa, in foliis supremis paulo latiora. Pedunculi oppositifolii, folio insigniter longiores. Calycis foliola oblonga, obtusa, vel acutiuscula, patentia, viridia, margine albo-membranacea. Flos medius inter duas species præcedentes. Nucula terminatæ stilo longiusculo, sygmoideo. Cætera ut in illis.

Nomen specificum a Sibthorpio huic speciei inditum longe exactissimum.

51. *RANUNCULUS fluviatilis*: fluitans; foliis longissimis, tri-dichotome filiformibus, laciniis coadunato-parallelis, trichotomiis inferioribus elongatis, nudis; vaginis petiolaribus brevissimis, superioribus rotunde auriculatis.

R. fluviatilis Willd. Sp. pl. par. 2. p. 1333. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 267.

R. fluitans Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 67. heft. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 153. excl. syn. All. Koch. Syn. ed. 2. tom. 1. p. 13. Reich. Exc. 3. p. 719. n. 4577., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 9. Ran. Ran. t. 2. f. 4577. Gaud. Helv. 3. p. 525.

R. peucedanifolius Ten. Nap. 4. p. 340. non All.

R. peucedanoides Desf. Atl. 1. p. 444. Ten. Syll. p. 266. n. 4.

R. aquatilis Sp. pl. p. 782. ð. Fl. Dan. tab. 376. minus bona. Smith. Engl. Fl. 3. p. 55. ð. De Cand. Prodr. 1. p. 27. ε. Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 184. γ.

R. pantothrix γ De Cand. Syst. nat. 1. p. 236.

R. n. 1161. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 68.

Fœniculus aquaticus Lugd. hist. 1. p. 1023. fig. rud.

Ranunculo sive Polyanthemo aquatili albo affine, Mil-lefolium maratriphyllon fluitans J. Bauh. Hist. pl. 3. lib. 28. p. 782. fig.

Ital. Peucedano acquaiuolo.

Perenn. Habitat in fluminibus nostris rapide fluentibus.

Observavi copiosum in Ticino prope Papiam. Habui ex

flaminibus Insubris, quæ sunt in agro Ticinensi, Mediolanensi, et Laudensi, a Prof. MORETTIO, ex Athesi prope Bolzano ab Eq. DE HEUFLERO. Floret Majo, Junio, et per æstatem.

Caulis longissimus, fluitans, et supernatans. Folia quoque longissima, aquæ cursui obsequentia, inferne ternate, superne dichotome filiformia, laciniiis omnibus coadunato-parallelis, trichotomiis inferioribus elongatis, nudis, petioliformibus, superioribus, æque ac dichotomiis, successive brevioribus, sessilia, aut breviter petiolata, insidentia vaginæ brevi, in foliis inferioribus exauriculatæ, in superioribus latiori, et rotundo-auriculatæ. Cæterum in hac specie lacinie superiores foliorum sunt pauciores, quam in præcedentibus affinis. Pedunculi crassi, apice tantum tenuiores, oppositifolii, folio breviores, aut æquales. Flores sæpe, non semper, grandiores, quam in *Ranunculo aquatili* L. &. Corolla alba, basi lutea, subinde multiplex. Petala obovata, integra, aut leviter emarginata. Nuculæ glabræ, quidquam grandiores quam in affinis, terminatæ stilo brevissimo, crasso, recurvo, stigmate demum evanescente, in cæteris similes.

Auctores fere omnes huc perperam trahunt *Ranunculum peucedanifolium* All., forte decepti ab erroneis synonymis, quæ ipse Allionius attulit ad plantam suam. Jam idem locus natalis plantæ in fossis, et aquis lente fluentibus ab Allionio indicatus monebat de diversitate speciei; hinc est, quod Cl. Morisius, cum vidisset exemplar autopticum in herbario Allionii, suspicatus est, *Ranunculum peucedanifolium* Germanorum esse diversum, et revera est. Conf. Fl. Sard. 1. p. 27., et vide synonyma nostra ad *Ranunculum pantothricem*.

TROLLIUS.

Lin. Gen. p. 282. Juss. Gen. p. 233. Lamck. Ill. 5. tab. 499. Vent. Tabl. 3. p. 59. Gærtn. De fruct. 2. p. 176. t. 118. Smith. Engl. Fl. 3. p. 56. Salisb. in Trans. Lin. Soc. v. 8. p. 302. De Cand. Syst. nat. 1. p. 311., et Prodr. 1. p. 45. Endl. Gen. p. 848. n. 4787. Perigonium liberum, penta-polysepalum, coloratum, deciduum. Nectarothecæ quinque-plures, unilabiatae, lingulatæ, basi tubulosæ. Stamina

numerosa, filamentis subulatis, antheris oblongatis, bilocularibus, erectis. Ovaria plura, fasciculata. Stigma subulatum, breve, acutum. Capsulæ subcylindræ, incurvulæ, fasciculato-capitata, transverse rugosæ, uniloculares, superne latere interne deliscentes, dorso carinata, carina in rostellum breve desinente. Semina numerosa, ex ovali triquetra, hiserialia, suturæ affixa.

Habitus. Plantæ perennes. Caulis erectus, simplex, vel ramosus. Folia palmato-partita, segmentis flabellatis, inciso-serratis, caulina pauca, alterna. Flores grandes, flavi.

Ord. nat. Ut in *Anemone* p. 442.

1. **TROLLIUS europæus:** flore conniventi-globoso; nectarothecis stamina subæquantibus.

T. europæus *Sp. pl.* p. 782. *Smith. Engl. Fl.* 3. p. 56., et *Engl. bot. v. 1. tab.* 28. *Hook. Brit. Fl. ed. 2. p.* 265. *Fl. Dan. tab.* 133. *Svens. bot. v. 6. tab.* 383. *De Cand. Franç. 4. par. 2. p.* 906., et *Syst. nat. 1. p.* 312. *α. β.*, et *Prodr. 1. p.* 45. *n. 1. α. β.* *All. Ped. 2. p.* 170. *n.* 1919. *Re Seg. p.* 47.* *Birol. Acon. 1. p.* 192. *Coll. Herb. Ped. 1. p.* 46. *n. 1. Nocc. et Balb. Tic. 1. p.* 267., et 394. *Comoll. Prodr. p.* 110. *Pollin. Ver. 2. p.* 227. *Suffr. Foroj. p.* 151. *Ors. in Cap. Opusc. p.* 287.* *Bert. fil. It. in Apenn. Bon. p.* 30.* *Sav. Bot. Etr. 2. p.* 119. *Sang. Cent. p.* 82. *Ten. Nap. 4. p.* 355. *C., et Syll. p.* 274. *n. 1. Guss. Pl. rar. p.* 223. *Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 5. heft. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p.* 191. *Koch. Syn. ed. 2. tom. 1. p.* 21. *α. β. Reich. Exc. 3. p.* 745. *n.* 4713. *α. β. γ.*, et *1c. Fl. Germ. et Helv. 3. p.* 25. *Ran. Helleb. t.* 102. *f.* 4713. *α. β. γ. Host. Austr. 2. p.* 103. *Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p.* 401. *Gaud. Helv. 3. p.* 560.

T. sphaericus *Salisb. in Trans. Lin. Soc. v. 8. p.* 302.

T. n. 1189. *α. β. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p.* 83.

Ranuncolo VI. Matth. Valgr. 1585. tom. 1. p. 649. fig.

Ranuncolo glomeroso Pon. Mont. Bald. p. 188.

R. glomeroso alpino del Lobelio, detto dal Gesnero Flos Trollius Pon. l. c. p. 237.

Ranunculus montanus aconiti folio, flore globoso Tit. It. in calce Hort. Maur. p. 7. non num. *Zannich. Opusc. posth. p.* 51., et 76.

R. montanus, Aconiti folio, flore globoso, majore, aureo
Zannich. l. c. p. 59.

Trollius Segui. Ver. 1. p. 513.

Ranunculus flore globoso *Dod. Pempt. p. 430. fig. Lugd. hist. 1. p. 1033. fig.*

R. glomerato flore *Clus. Hist. pl. lib. 2. p. 237. fig.*

R. montanus, *Alpinus*, *glomeratus* *Lob. Ic. p. 675.*

R. globosus *Ger. em. p. 955. fig.*

R. flore globoso, quibusdam *Trollius* nos *J. Bauh. Hist. pl. 3. lib. 30. p. 419. fig.*

Ital. Luparia. Vulparia *Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 229.*

Perenn. Copiosus in pratis humentibus editis Apennini, et alpium nostrarum. Filius attulit ex Apennino Bononiensi *all' Acero*. Habui ex *Mandromini* in Apennino Pistoriensi contermino ab herborario nostro, ex *Cimone di Fananò* in Ducatu Mutinensi a Prof. JANIO, ex Apennino Liguriæ orientalis ad S. Stephanum *d' Aveto* a TURIO, ex monte *Lesime* supra *Bobbio* a GARILLIO, ex Liguria occidua a *Nava* a Prof. SASSIO, ex Pedemontio ad thermas Valderias a BERTERO, ex alpinis Segusien-sibus a Prof. RE, ex Cenisio a VINCENTIO, et a BON-
JEANNIO, ex montibus ad Larium a RAINEO, et præsertim ex montibus prope *Leco* a PPRI. BALSAMO-CRI-
VELLIO, et DE NOTARIS, ex districtu Bergomensis in monte *Barbellino*, in viciniis *d' Albino*, et in sylvis *di Selvico* a BERGAMASCHIO, ex Baldo a MANGANOTTO, et a BARBERIO, ex Tyroli Italico in *Val di Fassa* a RAINERO, in eadem valle, et in *Fiemme* a FACCHINIO, ex montanis Bassanensibus a MONTINIO, ex Prætutiis a *Pietra Camela* ab ORSINO, ex Apennino Lucensi *alla Musceta* a GIANNINIO, et a Prof. PETRO SAVIO.
Floret a Majo in Augustum.

Rhizoma brevissimum, crassum, dense stipatum fibris cras-siusculis, numerosis, simplicibus, vel tenuiter ramu-
losis, fuscis, flexuosis. Caulis teres, striatus, fistulo-
sus, erectus, inferne nudus, a palmo ad duos pedes
longus, nunc simplex, uniflorus, nunc superne parce,
et alterne ramosus, pluriflorus. Folia palmato-quinque-
partita, segmentis cuneato-labellatis, trifidis, vel exte-
rioribus bitidis, omnium laciniis acute inciso-serratis,
supra saturate viridia, nitida, subinde ad angulos in-
trantes albo-maculata, subtus pallentia, et exquisite
nervoso-venosa; variant plurimum magnitudine, et la-
ciniis angustioribus, vel latioribus; radicalia cæspitosa,
plus minus longe petiolata; caulina pauca, alterna,

inferiora breviter petiolata, suprema subsessilia. Petioli supra canaliculati, basi dilatati. Flores solitarii, terminales, speciosi, grandes, odorati, modo pedunculis longis, modo brevibus insidentes. Sepala in globum conniventia, aurea, vel flava, nitentia, a quinque uniseriatis ad quindecim pluriseriata, ovata, obtusa, externa latiora, subinde dorso virentia. Nectarothecæ sepalis concolores, eisque breviores, sed staminibus subæquales, sive paulo breviores. Stamina ovariis longiora, antheris flavis, oblongatis, obtusis, effæctis linearibus. Reliqua generis. Tota planta glabra.

ISOPYRUM.

Lin. Gen. p. 282. Juss. Gen. p. 233. Vent. Tabl. 3. p. 60. Gærtn. De fruct. 1. p. 312. t. 65. Salisb. in Trans. Lin. Soc. v. 8. p. 306. De Cand. Syst. nat. 1. p. 323., et Prodr. 1. p. 48. Endl. Gen. p. 848. n. 4790.

Perigonium liberum, quinquesepalum, coloratum, deciduum. Nectarothecæ quinque, tubulosæ, ore bilabiato, labio externo bilobo, brevior, interno integro. Stamina numerosa, filamentis filiformibus, antheris ovatis, aut subrotundis, obtusis, bilocularibus, erectis. Ovaria duo-plura, fasciculata, erecta. Stili longi. Stigmata obtusa, sublateralia in apice stili. Capsulæ tot, quot ovaria, uniloculares, oblongo-compressæ, extus carinatæ, carina in rostrum, sive stilum persistentem continuata, latere interno a superioribus ad inferiora dehiscentes. Semina pauca, parva, utrinque suturæ affixa.

Habitus. Plantæ annuæ, vel perennes, graciles, teneræ. Caulis erectus, inferne nudus. Folia ternate composita, et decomposita, foliolis inciso-lobatis, radicalia longe petiolata, caulina stipulata. Flores solitarii, pedunculati albi.

Ord. nat. Ut in *Anemone* p. 442.

1. *ISOPYRUM thalictroides*: radice repente, dense fibrosa; sepalis obtusis; capsulis paucis.

I. thalictroides *Sp. pl. p. 783. Jacq. Austr. 2. p. 3. tab. 105. De Cand. Syst. nat. 1. p. 327., et Prodr. 1. p. 48. n. 1.*

Birel. Acon. 1. p. 192. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 49. n. 1.
Pollin. Ver. 2. p. 212. *Suffr. Foroj.* p. 151. *Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr.* p. 185.* *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 192. *Koch. Syn. ed.* 2. tom. 1. p. 22. *Reich. Exc.* 3. p. 747. n. 4728., et *1c. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 26.
Ran. Helleb. 1. 113. f. 4728. *Host. Austr.* 2. p. 77. *Scop. Carn. ed.* 2. tom. 1. p. 402. *Gaud. Helv.* 3. p. 561.

I. thalictrifolium *Salisb. in Trans. Lin. Soc.* v. 8. p. 306.

I. aquilegioides *Sp. pl.* p. 783. excl. syn. *Bauhinorum.*

Helleborus thalictroides *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 909.

Thalictrum Batrachoides minus flore albo *Ital. Barrel. Ic.* 480. *Boec. Mus. di piant.* p. 84. tab. 79. fig. 1. ex Barrel.

Aquilegia fol. *thalictri* flore. minutissimis albis *Apenn. montis Mentz. Pugill.* tab. 8.

A. parvo flore *Thalictri folio* *Moris. Oxon. sect.* 12. tab. 1. fig. 5. ex Mentz.

Ranunculus præcox II. *Thalictri fol.* *Clus. Hist. pl. lib.* 2. p. 233. fig.

R. Thalictri folio *Moris. Oxon. sect.* 4. tab. 28. fig. 12.

Ital. Anemolo aquilegino.

Perenn. Legi Bononiæ in sylvaticis prope la Crovara alla Buca di Spipla. Habui ex Baldo a *BARBIERIO*, ex districtu *Bassanensi* in sylvis umbrosis S. *Michaelis d' Angarano* a *MONTINIO*, *Tergesto* in humentibus, umbrosis a *BIASOLETTO*, et in montanis circa *Prosecco* a *TOMMASINIO*, ex agro *Forojuliensi* a *Prof. BRIGNOLIO*, a *BERINIO*, et a *BRUMATTIO*, *Romæ* in *Lucretili* a *Prof. MAURIO*. Floret Majo.

Rhizoma horizontale, stipatum fibris lateralibus, numerosissimis, aliis crassiusculis, aliis tenuibus, inferne ramulosas, lateraliter sæpe emittens surculos repentis, apice terminatos tubere parvo, deorsum fasciculato-fibroso. *Caulis* teres, striatus, erectus, palmaris-semipedalis, inferne longo tractu nudus, basi cinctus squamis membranaceis, late ovatis, obtusis, subinde comitatus uno, vel duobus foliis radicalibus, quæ bitermata, longe petiolata, foliolis tri-bipartitis, segmontis modo subcuneatis, angustis, modo latis, ovatis, utriusque tri-bifidis, laciniis obtuse inciso-dentatis. Eorum petioli supra canaliculati, basi dilatati. Folia caulina sita in caule superiore, pauca, alterna, breviter petiolata, et suprema brevissime, radicalibus similia, sed minora, suprema quandoque foliolis integerrimis prædita, aut tripartita, vel indivisa, integerrima. Eorum

petioli basi utrinque auriculati stipula albo-membranacea, inferne adnata, ovata, obtusa, nunc grandi, nunc exigua, obsoleta. Omnia folia supra late viridia, subtus glauca. Pedunculi tenues, filiformes, solitarii, uniflori, terminales, et axillares foliis caulinis. Perigonium album. Nectarotheca staminibus multo breviores. Stamina perigonio breviora. Ovaria unum-duo, vix ultra, sive tria-quatuor. Capsula totidem, oligospermia, supra curvo-marginata, subinde recurva, et voluti falcata. Reliqua generis. Tota planta glabra, aut caulis interdum inferne pilosus.

Dum gaudet foliolis latioribus cum stipulis obsoletis, prout est exemplar meum ex Lucretili, Linneus videtur habuisse pro diversa specie, quam nomine *Isopyri aquilegioidis* salutavit; sed certe non est; stipulae enim obsoletae habentur etiam cum foliolis angustioribus. Caetera utrique formae communia.

ERANTHIS.

Salisb. in Trans. Lin. Soc. v. 8. p. 303. De Cand. Syst. nat. 1. p. 314., et Prodr. 1. p. 46. Endlich. Gen. p. 848. n. 4788.

Helleboroides Adans. Famill. 2. p. 458.

Hellebori species Lin. Gen. p. 282.

Perigonium liberum, involuocratum, subhexasepalum, coloratum, deciduum. Nectarotheca quinque-septem, sita circa stamina, eisque breviores, stipitatae, tubulosae, ore bilabiato. Stamina numerosa, perigonio breviora, filamentis filiformibus, antheris oblongis, bilocularibus, erectis. Ovaria quatuor-septem, fasciculata, erecta, pedicellata. Stili subulati, longiusculi. Stigmata supra canaliculata, simplicia. Capsulae totidem quot ovaria, compressae, leguminiformes, carinatae, rostratae, uniloculares, margine superiore dehiscentes, oligospermiae, initio erectae, postea stellatim patentes, suffultae stipite communi soluto in stipites partiales. Semina pauca, grossiuscula, ovalia, laevia, suturae alerne affixa, uniserialia.

Habitus. Plantæ perennes. Radix tuberosa. Folia radicalia hysteroanthia, raro unum, alterumve synanthium, longe petiolata, orbiculata, peltata, multipartita. Scapus uniflorus. Involucrum monophyllum, sessile, orbiculatum, multipartitum. Flos luteus.

Ord. nat. Ut in *Anemone* p. 442.

1. *ERANTHIS hyemalis*: sepalis oblongis; capsulis thecaphoro communi abbreviato.

E. hyemalis *Salisb. in Trans. Lin. Soc. v. 8. p. 304. De Cand. Syst. nat. 1. p. 314., et Prodr. 1. p. 46. n. 1. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 194. Koch. Syn. ed. 2. tom. 1. p. 21. Reich. Exc. 3. p. 745. n. 4714., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 25. Ran. Helleb. t. 101. f. 4714. Host. Austr. 2. p. 85. Gaud. Helv. 3. p. 563.*

Helleborus hyemalis *Sp. pl. p. 783. Jacq. Austr. 3. p. 1. tab. 202. Plenck. Ic. pl. med. 5. p. 55. t. 448. Curt. Bot. mag. 1. tab. 3. Bull. Pl. ven. p. 122. tab. 35. All. Ped. 2. p. 65. n. 1511. Birol. Acon. 1. p. 192. Coll. Herb. Ped. 1. p. 47. n. 1. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 267., et 394. Pollin. Ver. 2. p. 213. Ors. in Cap. Opusc. p. 283. Sav. Bot. Etr. 1. p. 157.* Ten. Nap. 4. p. 353., et Syll. p. 273. n. 2. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 909.*

H. n. 1191. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 84.

Elleborina Cæsalp. De pl. lib. 15. cap. 30. p. 584.

Aconito II. del Dalecampio Pon. Mont. Bald. p. 240.

Helleborus niger tuberosus Ranunculi folio, flore luteo *Targ. Tozz. in Mich. Cat. hort. Flor. app. p. 142. n. 6. Segui Sup. p. 210.*

Aconitum hyemale Belgarum. Aconitum Batrachoides Belgarum Lob. Ic. p. 676.

A. III. A. hyemale Camer. Epit. p. 328. fig.

A. hyemale Ger. em. p. 968. fig.

Ranunculus cum flore in medio folio, radice tuberosa

J. Bauh. Hist. pl. 3. lib. 30. p. 414. fig.

Helleborus ranunculoides præcox unifolius tuberosus *Moris. Ox. sect. 12. tab. 2. fig. 4.*

Ital. Piè di gallo Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 115.

Perenn. Copiosissima in planitie, et in collibus Bononiensibus, ubi legi in marginibus viarum extra portam di *Saragozza*. Etiam Joannes Bauhinus olim observaverat in agro Bononiensi. Habui ex Liguria occidua in campis di *Gareccio* a Prof. GHERARDIO, ex Pedemontio

ad Albam Pompejam a BERTERO, ex agro Regiensi sub monte *Bibbianello* a BARBIERO, Veronâ a RAINERO, et a MANGANOTTO, ex districtu Vicetino in monte Summano, et *Portole* a MONTINIO, Cæsenâ in pratis a BARBIERO, ex campis Pisauensibus, et Urbinatibus ab Eq. PAROLINIO, ex arvis circa Florentiam, ubi communis, ab Eq. Prof. CAJ. SAVIO, a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTO, a REBOULIO, a CIONIO, et ab Eq. RICCASOLO. Floret Martio.

Radix tuberosa, alte sepulta, facta veluti tuberibus parvis, subrotundis, coacervato-connatis, apice gemmiferis, modo paucis, modo valde numerosis, epidermide fusca obductis, intus carnosis, albis, superficie adpersis fibris tenuibus, simplicibus, flexuosis. Ex apice horum tuberculorum prodit vel scapus, vel folium radicale. Scapus teres, erectus, inferne intra terram alte sepultus, et albus, basi tenuior, supra terram virens, aut e viridi purpurascens, a duobus-tribus pollicibus ad spithamam longus, apice ferens involucrium monophyllum, sessile, orbiculare, horizontale, vel patenti-deflexum, tripartitum, segmentis profundo palmatifidis, in reliquis folio radicali simillimum. Flos in involucrio sessilis. Perigonium hexasepalum, cito deciduum, involucrio subæquale, aut paulo brevius. Sepala oblonga, obtusa, et subinde apice erosula, basi angustata, striata, lutea, sæpe extus luride rubida præsertim in striis. Nectarothecæ, et stamina sepalis concoloria. Nectarothecæ labio interiore brevissimo, integerrimo, aut leviter emarginato, exteriori oblongo, obtuse, breviter bifido. Thecaphorum fructus, licet magis productum, tamen semper breve, crassum, inferne simplex, superne solutum in tot pedicellos, quot sunt capsulæ. Capsulæ quatuor-septem, primo erectæ, maturitate appropinquante stellatim patentes. Reliqua generis. Folia radicalia sejuncta a scapis, raro cum scapo, ideo passim hysterantia, solitaria, aut gemina ex eadem gemma, longo petiolata, orbiculata, peltata, centro depresso, concavo, tripartita, segmentis cuneato-flabellatis, profunde, inæqualiter plurifidis, laciniis lato-linearibus, acutiusculis, vel obtusis, utrinque nitentia, supra saturate viridia, subtus pallidiora. Petioli e tereti compressiusculi, basi tenuiores, albi, et alte intra terram sepulti, longitudinem scaporum fructiferorum in plena evolutione attingentes. Totâ planta glabra.

HELLEBORUS.

Lin. Gen. p. 282. Tourn. Inst. 2. tab. 144. Juss. Gen. p. 233. Lamck. Ill. 5. t. 499. Vent. Tabl. 3. p. 60. Gærtn. De fruct. 1. p. 310. t. 65. Smith. Engl. Fl. 3. p. 57. Salisb. in Trans. Lin. Soc. v. 8. p. 304. De Cand. Syst. nat. 1. p. 315., et Prodr. 1. p. 46. Endl. Gen. p. 848. n. 4789.

Perigonium liberum, quinquesepalum, persistens, coloratum, vel herbaceum, sepalis subrotundis, grandibus. Nectarothecæ plures, sitæ circa stamina, eisque breviores, brevissime pedicellatæ, cyathiformi-compressæ, ore truncato. Stamina plura, perigonio breviora, aut æqualia, filamentis subulatis, antheris oblongis, obtusis, bilocularibus, erectis, loculis margine externo dehiscentibus. Ovaria duo-sedecim, fasciculata, erecta. Stili subulati, longi. Stigmata subrotunda, obtusa, recurvula, supra puberula, et canaliculata. Capsulæ tot, quot ovaria, insidentes thecaphoro communi, brevi, crasso, demum a delapsis nectarothecis, et staminibus alveolato, erectæ, compressæ, uniloculares, leguminiformes, utrinque carinatæ, carina exteriori recta, in rostrum longum producta, interiore curva, a superioribus dehiscente. Semina plura, oblonga, placentæ suturali, utrinque dentatæ seriebus duabus alterne affixa, raphe longitudinali prominente instructa.

Habitus. Plantæ perennes, fœtentes, suspectæ, et præsertim radice cathartica. Rhizoma teres, sursum ramosum, et gemmiferum, deorsum crasse fibrosum. Scapus subsimplex, vel caulis bifidus, aut dichotomus, aut paniculatus. Folia coriacea, pedata, vel superiora palmata, aut omnia ternata; floralia subinde indivisa, bracteiformia. Flores solitarii, aut paniculati. Perigonium album, roscum, purpurascens, pallide virens, et senio intense virens.

Ord. nat. Ut in Anemone p. 442.

1. *HELLEBORUS niger*: scapo subunifloro, apice bracteato; folio radicali crasso coriaceo, pedato, subserrato, glaberrimo.
- H. *niger* Sp. pl. p. 783. Jacq. Austr. 3. p. 1. t. 201. Plenck. Ic. pl. med. 5. p. 53. t. 446. Curt. Bot. mag. 1. tab. 8. Bull. Pl. ven. p. 122. t. 33. De Cand. Franc. 4. par. 2. p. 908., et Syst. nat. 1. p. 316. a., et Prodr. 1. p. 46. n. 1. All. Ped. 2. p. 66. n. 1512. Birol. Acon. 1. p. 193. Coll. Herb. Ped. 1. p. 47. n. 2. Comoll. Prodr. p. 110.* Pollin. Ver. 2. p. 214. Suffr. Foroj. p. 152. Sav. Mat. med. p. 43. t. 55.,* et Bot. Etr. 1. p. 158.* Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 195. Koch. Syn. Fl. Germ. et Helv. ed. 2. tom. 1. p. 21. Reich. Exc. 3. p. 747. n. 4726., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 26. Ran. Helleb. t. 111. f. 4726. Host. Austr. 2. p. 85. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 403. Gaud. Helv. 3. p. 564.
- H. *grandiflorus* Salisb. in Trans. Lin. Soc. v. 8. p. 304.
- Helleboro nero Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 1280. fig., sed partim minus vera. Dur. Herb. ed. Rom. p. 167. fig.
- Ellebori alterum genus in alpinis Pistoriensibus nascens Casalp. De pl. lib. 15. cap. 28. p. 581.
- Helleborus niger, legitimus Zannich. Opusc. posth. p. 77.
- H. niger, angustioribus foliis Segui. Ver. 1. p. 479. n. 3.
- Elleborus niger legitimus Clus. Hist. pl. lib. 2. p. 274. fig.
- Elleborum nigrum Cam. Epit. p. 940. fig.
- Helleborus niger verus Ger. em. p. 976. fig.
- Elleborus niger flore albo, interdum etiam valde rubente J. Bauh. Hist. pl. 3. lib. 34. p. 635. fig.
- Ital. *Elabro nero. Elleboro. Elleboro nero. Erba Nocca. Fava di lupo. Nocca. Piè di diavolo. Tortelli di lupo* Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 115.
- Offic. *Hellebori nigri radix* Lin. Mat. med. p. 96. n. 273.
- Perenn.* Legi in Insubria Helvetica a Lugano ad radices montis S. Salvatoris, in oris Larii a Bellaggio in sylva Serbelloni. Habui pariter ex oris Larii in montibus proximis Como a Prof. COMOLLIO, in Corni di Canzo a RAINENO, ex viciniis Bergomi a BEUGAMASCHIO, ex Summano Vicetinarum ab Eq. PAROLINIO, ex Summano, ex monte Oro prope la Grappa in districtu Bassanensi, et ex provincia Tarvisina a Mofuno a MONTINIO, ex Apennino Pistoriensi ab Eq. Prof. CAS. SAVIO. Floret Januario.
- Rhizoma breve, crassum, ceterum generis. Folium radicale synanthium, longe petiolatum, pedatum, crasso coriaceum, glaberrimum, nitens, supra atrovirens,

subtus pallidius, segmentis quinque-novem, oblongis, vel oblongo-lanceolatis, vel lanceolatis, obtusis, aut acutiusculis, raro acuminatis, superne nunc obiter, et leviter serratis, nunc evidentius, et argutius, reliquo margine integerrimis. Petiolus crassus, teres, supra anguste, et leviter canaliculatus, basi dilatatus, auriculis membranaceis, scapum amplexantibus. Scapi solitarii, vel duo-tres simul, teretes, erecti, folio radicali breviores, plerumque simplices, uniflori, raro bifidi, biflori, basi obvallati squamis membranaceis, late ovatis, concavis, obtusis. Bractea sita prope florem, vel immediate sub flore, et in scapo bifido etiam ad bifurcationem, ovata, acuta, aut obtusa, integerrima, sessilis. Flos grandis, albus, vel roseus, praesertim extus. Sepala late ovata, obtusa, vel acuta, patentia. Nectarotheca brevissime bilabiata, aut oblique truncata. Ovaria sex-septem. Capsulae totidem. Reliqua generis.

Usus. Linnæus in Mat. med. l. c. laudat radicem ut emenagogam in mania, melancholia, chlorosi &c., veluti si esset succedanea *Hellebori nigri* Diosc. Hic enim pertinet ad diversam speciem, sive ad *Helleborum officinalem* Salisb. in Trans. Lin. Soc. v. 8. p. 305., ejusque exemplaria possideo ex insulis Joniis. De hoo veteres intellegebant, cum mittebant dementes curatum Anticyram:

Danda est hellebori multo pars maxima avaris:

Nescio an Anticyram ratio illis destinet omnem.

Hort. Sat. lib. 2. sat. 3. v. 82. 83.

2. *HELLEBORUS viridis*: caule bifido, dichotomove; folio radicali pedato, caulinis digitatis, omnibus argute serratis, segmentis indivisis, varieve dissectis; sepalis obtusis.

H. viridis Sp. pl. p. 784. Smith. Engl. Fl. 3. p. 57., et Engl. bot. v. 3. tab. 200. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 266.* Curt. Lond. ed. Grav. v. 2. tab. 74. Salisb. in Trans. Lin. Soc. v. 8. p. 304. Jacq. Austr. 2. p. 4. t. 106. Plenck. Ic. pl. med. 5. p. 54. t. 447. De Cand. Franç. 4. par. 2. p. 908., et Syst. nat. 1. p. 318., et Prodr. 1. p. 47. n. 5. All. Ped. 2. p. 67. n. 1513. Balb. Taur. p. 91. Re Tor. 1. p. 294. Birol. Acon. 1. p. 193. Coll. Herb. Ped. 1. p. 47. n. 3. Nocc. et Balb. Tic. 1. p. 268., et 394. Comoll. Prodr. p. 110. Poll. Ver. 2. p. 215. Suffr. Foroj. p. 152. Ors. in Cap. Opusc. p. 283.* Bert. Pl. Gen. p. 70., et Aman. Ital. p. 158.

- n. 154. *Sav. Mat. med. p. 43. tab. 12., et Pis. 2. p. 30.; et Bot. Etr. 1. p. 159. Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. p. 185.* Ab Ucr. Hort. Pan. p. 233. Presl. Sic. 1. p. 22. Röhl. cum Koch. Deuts. Fl. 4. p. 196. Koch. Syn. ed. 2. tom. 1. p. 21. Reich. Exc. 3. p. 746. n. 4718., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 26. Ran. Helleb. t. 105. f. 4718. Host. Austr. 2. p. 86. Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 403. Gaud. Helv. 3. p. 565.*
- H. Bocconi *Ten. Nap. 4. p. 354. tab. 150., et Syll. p. 274. n. 3. Guss. Pl. rar. p. 244.,* et Sic. prodr. 2. p. 62.,* et Syn. 2. p. 31.* Reich. Exc. 3. p. 746. n. 4717., et Ic. Fl. Germ. et Helv. 3. p. 26. Ran. Hell. t. 103. f. 4717.*
- H. intermedius *Guss. Pl. rar. p. 224. tab. 41.*
- H. multifidus *Vis. Pl. rar. Dalm. p. 13. n. 18.**
- H. angustifolius *Host. Austr. 2. p. 190.*
- H. n. 1142. *Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 84.*
- Un altro Elleboro nero *Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 1281. fig.*
- Elleborum nigrum vulgare *Casalp. De pl. lib. 15. cap. 28. p. 581.*
- Elleboro nero di foglie laciniate *Camp. Spicil. bot. p. 33.*
- Helleborus niger laciniatis foliis *Ambr. Nov. pl. hist. p. 89. fig. p. 88.*
- H. niger foliis, Phyllitidis instar, divisis *Ambr. Phyt. p. 270. fig. ead.*
- H. niger, sanguineo folio *Bocc. Mus. di piant. p. 26. tab. 111.*
- H. niger, foliis dissectis *Bocc. l. c. p. 26. tab. 11.*
- H. niger hortensis flore viridi *Cup. Hort. Cath. p. 93. Mich. Cat. hort. Fl. p. 48. n. 2.*
- H. niger, flore viridi, folio aspero, profundius inciso, et Idem asperiori, minorique folio pallente *Cup. Sup. alt. p. 35.*
- H. niger hortensis, flore viridi alter *Mich. Cat. hort. Fl. p. 48. n. 3., et App. p. 142. n. 3.*
- H. niger foliis dissectis *Mich. l. c. p. 48. n. 4.*
- Veratrum nigrum, secundum Zannich. *Opusc. posth. p. 82.*
- Helleborus niger vulgaris, flore viridi vel herbaceo, radice dinturna *Segui. Ver. 1. p. 479. n. 2. J. Bauh. Hist. pl. 3. lib. 34. p. 636. fig.*
- H. niger *Cord. Hist. p. 102. versa. fig.*
- Elleborus niger adulterinus hortensis *Fuchs. Hist. pl. p. 274. fig.*
- Elleborum nigrum alterum *Camer. Epit. p. 941. fig.*
- Veratrum nigrum II. *Dod. Pempt. p. 385. fig.*
- Helleborastrum *Lob. Ic. p. 680. Ger. em. p. 976. fig.*

Ital. *Cavolo di lupo. Cavolo di lupo femmina. Elleboro. Elleboro verde. Erba Nocca. Nocca. Nocca da denti. Nocco* Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 115.

Perenn. Communis in sylvaticis Italiæ. Legi Sarzanæ, Genuæ, Bononiæ in umbrosis collium. Habui ex radicibus montium di Laveno ad Verbanum a Prof. Dz NOTARIS, ex monte Bibbianello in districtu Regiensi, Mantuâ alla Volta, et a Boarno, et ex viciniis di Garda a BARBIERIO, ex pratis collinis districtus Bassanensis a MONTINIO, ex monte Spaccato, et Lipizza agri Tergestini a TOMMASINIO, Tergesto, et ex Istria a BIASOLETTO, Maceratâ ab Eq. Prof. NARDEUCCIO, ex Piceno a Sarnano a Ponte di Rivo a MARZIALETTO, in monte Corona ab ORSINO, ex Prætutiis in sylvis del Monte grande a CECCHETTO, ex Etruria in monte Pisano a Prof. PETRO SAVIO, alla Tana ab Eq. RICCA-SOLO, Volaterris in vallibus suburbanis ab AMIDEO, ex Canino in sylva secus il Timone a Rev. Fratre MAURITIO DE BRIJIA, ex Latio in sylvaticis prope Albanum a Prof. MAURIO, ex montibus Siciliæ ab Eq. GUSONIO, et alla Pizzuta prope Panormum a TODARO. Floret a solstitio hyemali in Martium incohans Kalendarium Floræ nostræ.

Radix gentis. Caulis e tereti obtuse angulatus, erectus, etiam bipedalis, basi squamosus, squamis inferioribus ovatis, membranaceis, albescentibus, supremis lanceolatis, apice virescentibus, omnibus acutis, amplexantibus, bifidus, vel dichotomus, supra divisionem evidentius angulatus, inferne nudus. Folium radicale e gemma propria juxta basim caulis, aut seorsum a caule, hysteranthium, raro synanthium, saltem in plantis præcocioribus; longe petiolatum, pedatum, segmentis oblongo-lanceolatis, vel lanceolatis, et quandoque valde angustis, sive linearibus, cæterum indivis, bi-trifidis, vel palmato-multifidis, aut multipartitis, acuminate, vel acutis, multa parte acute, et crebre serratis, serraturis nunc parum, nunc valde profundis, et tunc sæpe iterum serratis, nitidum, subcoriaceum, supra saturate, aut late viride, subtus nitidius, et pallidius, ad nervos primarios sæpe puberulum, reticulato-venosum, idque exquisitius in plantis natis loco montano, aspero. Petiolus teres, crassus, supra anguste, et leviter canaliculatus, basi obvallatus squamis gemmalibus more caulis, inferne glaber, superne puberulus. Folia caulina sita ad bifurcationem caulis, inferiora

solitaria, suprema ad flores terminales geminata, ex adverso floris-versa, folio radicali minora, digitata, inferiora quinquepartita, superiora tripartita, vel cuncta tripartita, in petiolum brevem, late alatum decurrentia, in reliquis folio radicali similia. Cuncta folia tam radicalia, quam caulina mirimode ludunt segmentis indivis, parce fissis, vel partitis, vel apice pluri-palmatifidis, subinde supra maculis sanguineis notata. Flores solitarii, terminales, sæpe cum alari, et subinde cum floribus extrafoliaceis, aut oppositifoliis in longitudine bifurcationum, breviter pedunculati, et interdum brevissime, pedunculo crasso, ruguloso, in anthesi ex albedo virentes, grate, sed brevi tempore olentes, in fructu saturate virides, inodori. Perigonium grande, rarius mediocre, sepalis ovatis, obtusis, integris, aut apice erosulis, crebre ramoso-venosis. Nectarothecæ numerosæ, virides, ore truncato, patenti-adscedentes, facie dorsali convexæ, facie superiore concavæ. Filamenta ex albo viridula. Antheræ pallidissime albo-flavidæ. Pollen flavum. Capsule quinque, latæ, glabræ, virides, longe rostratæ. Reliqua generis. Herba fœtens.

In locis frigidioribus segmenta foliorum plerumque sunt indivisa, in sylvis calidioribus plus minus scinduntur in lacinias, nunc omnia ita sunt in eodem folio, nunc quædam indivisa habentur mixta cum paucisectis, aut multisectis. Hinc hisce lusibus non esse fidendum facile discit, qui stirpem in loco natali late observavit. Nec mihi satis liquet, quo pacto *Helleborus graveolens* Reich. Ic. Fl. Germ. et Helv. Ran. Helleb. tab. 104. fig. 4716., *Helleborus dumetorum* Reich. l. c. tab. 106. fig. 4719., *Helleborus laxus* Reich. l. c. tab. 107. fig. 4720., et *Helleborus odorus* Reich. l. c. tab. 108. fig. 4721. essentialiter differant ab *Helleboro viridi* L.

3. *HELLEBORUS fœtidus*: caule superne paniculato; foliis pedatis, segmentis lanceolatis, leviter serratis; bracteis ovato-oblongis; perigoniiis concavo-conniventibus.

H. fœtidus *Sp. pl.* p. 784. *Smith. Engl. Fl.* 3. p. 58., et *Engl. bot.* v. 9. t. 613. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 266. *Salisb. in Trans. Lin. Soc.* v. 8. p. 305. *Plenck. Ic. pl. med.* 5. p. 55. t. 449. *Bull. Pl. ven.* p. 121. t. 71. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 907., et *Syst. nat.* 1. p. 320., et *Prodr.* 1. p. 47. n. 8. *All. Ped.* 2. p. 67. n. 1514. *Re Seg.* p. 47. *Birol. Acon.* 1. p. 193. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 48. n. 4. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 268., et 394. *Comoll. Prodr.* p. 111. *Pollin. Ver.* 2. p. 215. *Ors. in Cap. Opusc.*

- p. 283. Bert. *Pl. Gen.* p. 70., et *Amæn. Ital.* p. 158. n. 155.
 Bert. *fil. It. in Apenn. Bonon.* p. 20.* Sav. *Mat. med.*
 p. 43. tab. 13., et *Fl. Pis.* 2. p. 31., et *Bot. Etr.* 1. p. 159.
 Sebast. et Maur. *Fl. Rom. prodr.* p. 185. Ten. *Nap.* 4.
 p. 354., et *Syll.* p. 273. n. 1. Röhl. cum Koch. *Deuts.*
Fl. 4. p. 199. Koch. *Syn. ed.* 2. tom. 1. p. 22. Reich.
Exc. 3. p. 745. n. 4715., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3.
 p. 25. Ran. *Helleb.* t. 103. f. 4715. Host. *Austr.* 2. p. 90.
Gaud. Helv. 3. p. 566.
 H. n. 1193. Hall. *Hist. stirp. ind. Helv.* 2. p. 87.
 Enneaphyllon *Cæsalp. De pl. lib.* 15. cap. 29. p. 583.
 Helleborus niger fetidus Mich. *Cat. hort. Flor.* p. 48.
 n. 1., et *App.* p. 141. n. 1. Segui. *Ver.* 1. p. 478. n. 1.
Hort. Rom. 1. tab. 27.
 Elleborus niger adulterinus sylvestris Fuchs. *Hist. pl.*
 p. 275. fig.
 Veratrum nigrum III. Dod. *Pempt.* p. 386. fig.
 Helleborus maximus, flore et semine prægnans Lob.
Ic. 679. *Lugd. hist.* 2. p. 1638. fig.
 Helleboraster maximus Ger. *em.* p. 976. fig.
 Ital. Cavolo di lupo. Cavolo di lupo maschio. Elabro nero.
 Elabro puzzolente. Erba Nocca bastarda Targ. Tozz.
 Diz. bot. 2. p. 115.
 Perenn. Legi Sarzanæ, Genus in canalibus, et in sylvis.
 Filius attulit ex Apennino Bononiensi inter *Vidiccia-*
tico, et l' *Acero*. Habui Bergamo, et ex via inter Ber-
 gemonum, et Brixiam, ubi valde frequens, a RAINERO,
 Veronâ ad radices montis *Pastello* prope *Cavalo* a MAN-
 GANOTTO, ex Tyroli austro-occidentali prope *Riva* a
 FACCHINIO, ex collibus Vicetinis a MONTINIO, ex monte
Bibbianello in districtu Regiensi a BARBIERIO, ex agro
 Maceratensi ab Eq. NARDUCCIO, ex Piceno a Monte-
fortino al Rivo a MARZIALETTO, ex Apennino Umbro
alla Somma a BARBIERIO, Interamnâ ad cataractam
 Naris a FIORINIA-MAZZANTIA, ex Etruria in monte Pi-
 sano a Prof. PETRO SAVIO, *alla Tana* ab Eq. RICCA-
 SOLO. Floret cum præcedente.
 Radix gentis. Caulis teres, crassus, erectus, vel adscen-
 dens, etiam tripedalis, inferne simplex, superne pa-
 niculato-ramosus, raro jam a basi ramosus. Folia co-
 riacea, petiolata, pedata, segmentis septem-novem,
 lanceolatis, vel lanceolato-linearibus, utrinque angu-
 statis, acuminatis, laxè, et leviter serratis, basi in-
 tegris, supra atroviridia, subtus pallidiora, radicalia
 pauca, caulina numerosa, crebra, sparsa, patentia,
Flor. Ital. T. V.

suprema minora, inferiora decidua. Petioli longi, supra canaliculati, margine cartilaginei, basi dilatati. Flores cernui, in panicula terminali, ramosa, angulosa. Sub divisionibus paniculæ bracteæ amplæ, ovatæ, aut ovato-oblongæ, sessiles, pallide virentes, margine tenui albo-membranaceo, inferiores sæpe apice palmato-laciniatæ, laciniis brevibus, lanceolatis, subintegerrimis, acutis, superiores indivisæ, acutæ. Pedicelli terminales, solitarii, uniflori, rugosi, perigonio æquales, vel longiores. Perigonium multo minus quam in præcedente, concavo-connivens, pallide virens, et plerumque apice rubido-purpurascens. Sepala ovata, obtusa, integra, aut emarginata, subinde subcrenata. Nectarothecæ quinque-septem, compressiusculæ, ore oblique truncato, hiantes, crenulato, extus fere bilobo. Stamina perigonio subæqualia, filamentis crassiusculis, compressis, albidis, antheris luteolo-virentibus. Ovaria duo-quatuor. Stili primo recurvati, peractis nuptiis erecti. Reliqua generis. Tota planta fœtida. Panicula, perigonium extus, ovaria, stili scatent pilis brevissimis, apice glanduliferis, sive glandulis pedicellatis. Reliqua herba glabra.

Usus. Radix, et caulis adhibentur a veterinariis pro setaceo.

4. *HELLEBORUS lividus*: caule superne paniculato; foliis caulinis ternatis, argute dentato-spinulosis, integrisve; bracteis oblongis; perigonio patente.

H. lividus *Curt. Bot. mag.* 1. tab. 72. *Ait. Kew. ed.* 1. v. 2. p. 272., et *ed.* 2. v. 3. p. 361. *Salisb. in Trans. Lin. Soc.* v. 8. p. 305. *Bot. reg.* v. 24. tab. 54. *Willd. Sp. pl.* 2. par. 2. p. 1338. *Spr. Syst. veg.* 2. p. 659. n. 10. *Bert. Misc. bot.* 3. p. 6. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 48. n. 5. *Moris. Sard.* 1. p. 53. tab. 3.* *De Sal. Marschl. in Bot. zeit.* ann. 1834. p. 85. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 907., et *Syst. nat.* 1. p. 321., et *Prodr.* 1. p. 47. n. 9. *Lois. Desl. Gall.* 1. p. 336.,* et *ed.* 2. tom. 1. p. 406.* *Cambess. Baléar. in Mém. du Mus.* tom. 14. p. 204.

H. argutifolius *Viv. Fl. Cors. diagn.* p. 8.,* et *App. alt.* p. 7.*

H. fœtidus β *Sp. pl.* p. 784.

H. triphyllus *Lamck. Enc. méth. bot. éd. de Pad.* tom. 3. p. 93. n. 5.

H. niger trifolius *Ald. Hort. Farn.* p. 93. fig. p. 92. *Moris. Ox. sect.* 12. tab. 4. fig. 7. *Tourn. Inst.* 1. p. 272. *Boerh. Ind. alt.* p. 297.

Elleboraster indicus trifolius *Barrel. Ic.* 1143.

Helleboraster alter trifolius spinosus *Parkins. Theatr. p.* 213. *n.* 3. (fig. folior. in *p.* 212. ad latus figuræ *Hellebori viridis* L.) *Raj. Hist.* 1. *p.* 698. *n.* 4.

Ital. *Elabro trifogliato*.

Perenn. Habui ex Sardinia ab Eq. Prof. MORISIO, ex Corsica prope *Figari* ab Eq. Prof. VIVIANO, et a SERAFINIO, et ex montibus meridionalibus Corsicæ a SOLEIROLIO, et a LOISELEURIO-DESLONGCHAMPSIO. Floret cum *Helleboro fatido* L.

Radix, et caulis præcedentis. Folia radicalia prima simplicia, cordata, caulina ternata, foliolis sessilibus, ovato-oblongis, oblongo-lanceolatis, aut tantum lanceolatis, medio basi cuneato, lateralibus oblique cordatis; omnia crasse coriacea, petiolata, acuta, aut acuminata, argute, et inæqualiter dentato-spinulosa, ludunt vel tota, vel partim integra, aut dentibus obsolete, muticis instructa, supra læte viridia, nitida, subtus glauca, et reticulato-venosa. Petioli teretes, crassi, supra anguste, et leviter canaliculati, basi dilatati, superiores successive breviores. Panicula terminalis, ramosa. Bractem ad divisiones paniculæ grandes, ovato-oblongæ, aut oblongo-lanceolatæ, acutæ, pallide virentes, plerumque argute serrulatæ, inferiores rarius apice breviter laciniatæ. Pedicelli inferiores perigonio longiores, supremi breviores. Flores cernui, grandes ut in *Helleboro viridi* L., ejusdemque formæ, et coloris. Perigonium patens. Nectarothecæ decem-duodecim, oblique truncatæ. Capsulæ quatuor-sex. Cætera generis. Tota planta glabra.

CALTHA.

Lin. Gen. p. 283. *Juss. Gen. p.* 234. *Lamck. Ill.* 5. *tab.* 500. *Vent. Tabl.* 3. *p.* 64. *Gærtn. De fruct.* 2. *p.* 176. *tab.* 118. *Smith. Engl. Fl.* 3. *p.* 59. *De Cand. Syst. nat.* 1. *p.* 306., et *Prodr.* 1. *p.* 44. *Endl. Gen. p.* 847. *n.* 4786..

Populago *Tourn. Inst. rei. herb.* 2. *tab.* 145.

Ovarium liberum, penta-polysepalum, coloratum, patens, deciduum, raro persistens. Nectarothecæ nullæ. Stamina valde numerosa, perigonio breviora, filamentis filiformibus, antheris oblongis,

erectis, bilocularibus, loculis margine externo dehiscentibus. Ovaria quinque-quindecim, fasciculata, erecta, terminata stilo brevi, conico, stigmate obtuso, sæpe recurvo. Capsulæ tot, quot ovaria, sessiles, e tereti compressæ, uniloculares, anguste bicarinatæ, carina exteriori recta, desinente in rostrum breve, carina interiori curva, seminifera, a superioribus dehiscente. Semina plura, biserialia, oblonga, raphe longitudinali extante, et apice in chalazam rotundam prominulam incurvato.

Habitus. Plantæ aquaticæ, perennes. Caulis erectus, vel decumbens, aut natans, subinde ad nodos radicans, foliosus, parce ramosus. Folia cordata, subrotunda, reniformia, aut lanceolata, crenata, vel dentata, radicalia longe petiolata, caulina stipulata. Pedunculi uniflori. Perigonium luteum, vel album cum levi rubedine.

Ord. nat. Ut in *Anemone* p. 442.

1. *CALTHA palustris*: caule ascendente, erectove; foliis cordato-subrotundis, obtusis, crenatis.
C. palustris *Sp. pl.* p. 784. *Smith. Engl. Fl.* 3. p. 59. α . β ., et *Engl. bot.* v. 8. t. 506. *Hook. Brit. Fl. ed.* 2. p. 266. α . *Curt. Lond. ed. Grav.* v. 1. tab. 77. *Forst. in Trans. Linn. Soc.* v. 8. p. 323. n. 1. *Fl. Dan. tab.* 668. *Sv. bot.* v. 3. tab. 200. *Plenck. Ic. pl. med.* 5. p. 56. tab. 451. *De Cand. Franç.* 4. par. 2. p. 918. α . β ., et *Syst. nat.* 1. p. 308. α . β ., et *Prodr.* 1. p. 44. n. 3. α . β . *All. Ped.* 2. p. 67. n. 1515. *Balb. Taur.* p. 91. *Re Seg.* p. 47., et *Tor.* 1. p. 295. *Biol. Acon.* 1. p. 193. *Coll. Herb. Ped.* 1. p. 45. n. 1. *Nocc. et Balb. Tic.* 1. p. 269., et 394. *Comoll. Prodr.* p. 111. *Lanf. Mant. in Conf. e Brugn. Giorn. dec.* 2. tom. 10. p. 292.* *Pollin. Ver.* 2. p. 216. *Ruch. Ven.* p. 136. *Moric. Ven.* 1. p. 240. *Nacc. Ven.* 3. p. 93.* *Suffr. Foroj.* p. 152. *Bert. fil. It. in Apenn. Bon.* p. 12.* *Sav. Bot. Etr.* 2. p. 118.* *Fior. in Giorn. Arc.* tom. 18. p. 165.* *Ten. Nap.* 4. p. 356. *A. B.*, et *Syll.* p. 358. n. 1. *Guss. Pl. rar.* p. 226. *Sturm. Deuts. Fl.* 1. abth. 8. heft. *Röhl. cum Koch. Deuts. Fl.* 4. p. 200. *Koch. Syn. ed.* 2. tom. 1. p. 21. *Reich. Exc.* 3. p. 744. n. 4712., et *Ic. Fl. Germ. et Helv.* 3. p. 25. *Ran. Hell.* t. 101. f. 4712. *Host. Austr.* 2. p. 104. *Gaud. Helv.* 3. p. 567.

- Populago palustris Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 404.*
Caltha n. 1188. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 2. p. 82.
Farfarugio Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 895. fig.
Chameleuco Anguill. Sempl. p. 212.
Populago major præcox, Cacalim foliis dilute virentibus,
flore luteo non splendente, petalis uncialibus subro-
tundis Mich. Cat. hort. Flor. p. 76. n. 1., et app. p. 163.
n. 1.
P. flore minore Mich. l. c. p. 76. n. 3.
P. flore majore Segui. Ver. 1. p. 481.
Caltha Vergilii Trag. Hist. p. 142. fig.
Chelidonia palustris Cord. Hist. p. 122. fig.
Caltha palustris Gesn. Op. bot. ed. Schmid. p. 123. ic. lign.
tab. 21. fig. 189. superior. Dod. Pempt. p. 598. utraque
fig. Lob. Ic. p. 594. Lugd. hist. 1. p. 1049. fig. J. Bauh.
Hist. pl. 3. lib. 30. p. 470. fig.
Tussilago altera, sive Farfugium Camer. Epit. p. 594. fig.
Caltha palustris major, et minor Ger. em. p. 817. utra-
que fig.
Populago major, et minor Tabernæm. Ic. p. 750. utra-
que fig.
Ital. Caltha palustre. Farferugine. Farferugio. Marghe-
rittine gialle Targ. Tozz. Diz. bot. 2. p. 42.
Perenn. Planta apud nos mire ludens magnitudine, et
æque incolens aquosa planities, quam edita montium.
Filius attulit ex Apennino Bononiensi in rivulis ad
Cornu scalarum. Habui ex Apennino Ligurim orienta-
lis ad S. Stephanum d' Aveto a TURIO, ex nemoribus
Ticinensibus a PPrr. BALSAMO-CRIVELLIO, et DE NO-
TARIS, et ex fossis circa Ticinum ab Eq. PAROLINIO,
Mantuâ a Castellaro a BARBIERIO, ex Tyroli Italico
in Fiemme, et Fassa, ubi copiosa, a FACCHINIO, ex
oryzetis di Simonzo prope Bassanum a MONTINIO, ex
pratis paludosis circa Monfalcone a TOMMASINIO, ex
ora Veneta a Prof. NACCARIO, ex Apennino Lucensi al
Rondinaio a GIANNINIO, ex Etruria in palude Blenti-
nensi ab Eq. Prof. CAJ. SAVIO, et a Prof. PETRO SAVIO,
in rivulis Apennini Pistoriensis ab eodem, in Falte-
rona a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO, ex
Pontinis a FIORINIA-MAZZANTIA. Floret Mar-
li, in editis Julio, Augusto.
Rhizoma breve, crassum, unde descendunt fib-
rosæ, subfasciculatæ, crassiusculæ, longæ, alb-
plices, vel ramulosæ. Caulis teres, sulcatus,
erectus, vel adscendens, a palmo ad

etiam ultra longus, parce, et alterne ramosus, foliosus. Folia cordato-subrotunda, obtusa, obtuse, aut acutiuscule crenata, nitida, supra læte viridia, subtus pallidiora, mire ludentia magnitudine; radicalia longe petiolata, et subinde amplissima. Eorum petioli crassi, supra canaliculati, basi dilatati, auriculis longis, angustis, acuminatis. Squamæ membranacæ, longæ, acuminatæ amplexantur basim petiolorum, et caulis. Folia caulina minora, pauca, alterna, sita ad ramos, vix unum, alterumve infra ramos, brevius petiolata, et suprema fere sessilia; eorum petioli utrinque auriculati stipula membranacea, brevior, lata, acuta, vel obtusa. Pedunculi uniflori, sulcati, longiusculi, terminales, sæpe geminati. Perigonium ut plurimum quinquesepalum, luteo-aureum, subinde extus cum virore, deciduum, amplitudinis mire variantis, a diametro quinque-sex linearum ad diametrum pollicarem. Sepala subrotundo-ovalia, obtusa, venis ramosis percurra. Capsulæ a quinque ad quindecim, maturescentes paulatim recurvantur, et demum stellatim divergunt. Semina matura nigra, nitida. Reliqua generis. Tota planta glabra.

Usus. Flores in alabastro edules, ut alabastra Capparidum.

FINIS VOLUMINIS QUINTI.

CURÆ POSTERIORES.

Additamenta ad volumen primum.

- p. 15. n. 1. *SALICORNIA herbacea.*
Ex Etruria a Orbetello ab Eq. RICCASOLO, Panormo a Mondello a TODARO.
- p. 17. n. 2. *SALICORNIA fruticosa.*
Panormo a Mondello a TODARO.
Exemplaria ex hoc loco alia erant sterilia, *Salicornia fruticosa* Guss., alia in fructificatione, *Salicornia macrostachya* Moric.
- p. 68. n. 5. *VERONICA aphylla.*
Ex alpibus Apuanis ab WOODSIO, ex Piceno alla Corona a MARZIALETTO.
- p. 86. n. 19. *VERONICA saxatilis.*
Ex Apennino Lucensi al Rondinaio a GIANNINIO.
- p. 110. n. 2. *PEDEROTA Ageria.*
Ex agro Forojulienſi in monte Matajur a TOMMASINIO.
- p. 126. n. 4. *LEMNA gibba.*
Legi Bononiæ in aquis stagnantibus collium di Zolla predosa.
- p. 132. n. 1. *ZIZIPHORA capitata.*
Ex agro Maceratensi ab Eq. NARDUCCIO, Florentiâ alle Cascine ab Eq. RICCASOLO.
- p. 138. n. 3. *SALVIA viridis.*
Ex Adriano, et Trani ab Eq. GUSSONIO.
- p. 149. n. 12. *SALVIA multifida.*
S. multifida Puccin. Syn. pl. Luc. p. 21. cum tab.
Ex Etruria a Colle di Valdelsa ab AMIDEO, a Vignale, et Grosseto ab Eq. RICCASOLO, iterum ex Grosseto, et ex Argentario a Prof. PARLATORE.
- p. 165. n. 4. *VALERIANA Calcitrapa.*
Ex Argentario alla Torre della punta ab Eq. RICCASOLO.
- p. 175. n. 11. *VALERIANA Saliunca.*
Ex Vettore in Piceno a MARZIALETTO.
- p. 180. n. 15. *VALERIANA saxatilis.*
Ex monte Calbege, ex monte di Nose, ex valle Bergami, et ex Corni di Canzo a LAGGERO.

- p. 182. n. 1. *FEDIA Cornucopiæ.*
Ex arvis Panormitanis a TODARO.
- p. 184. n. 1. *VALERIANELLA echinata.*
Ex agro Maceratensi agli *Elci* ab Eq. NARDECCIO,
Florentiâ a *S. Maria a Montrii* ab Eq. RICCASOLO.
- p. 196. n. 1. *CNEORUM tricoccum.*
Nicaâ a DURANDO, ex Liguria occidua in collibus
prope *Finale* ab Eq. RICCASOLO.
- p. 225. n. 1. *GLADIOLUS triphyllus.*
Ex Tyroli australi in monte *Ritten* prope *Bolzano*,
et ex viciniis di *Belluno* a FACCHINIO.
- p. 235. n. 4. *IRIS pumila.*
Ex Liguria occidua a *Caprazoppa*, a *Verezzi*, et
a *Tovo di Pietra* a Prof. GHERARDIO, ex Tyroli
australi in monte *Cengialte* prope *Roveredo* a
FACCHINIO.
- p. 240. n. 8. *IRIS graminea.*
Ex sylvis di *Nembro* in districtu Bergomensi a BER-
GAMASCHIO.
- p. 242. n. 10. *IRIS tuberosa.*
Ex Liguria occidua a *Toirano* prope Albingaunum
a Prof. GHERARDIO, ex viciniis Veronæ a MAN-
GANOTTO.
- p. 251. n. 1. *RYNCHOSPORA alba.*
Ex districtu Tridentino ad orientem lacus di *Pinè*
a FACCHINIO.
- p. 856. n. 3. *RYNCHOSPORA fusca.*
Ex uliginosis Apennini Lucensis a Prof. PUCCINEL-
LIO, ex turfaccis ad paludem Blentinensem, ubi
copiosissima, a Prof. PETRO SAVIO.
- p. 313. n. 1. *POGONOSTYLIS squarrosus.*
P. squarrosus Puccin. Syn. pl. Lucens. p. 37.* cum tab.
Ex Etruria ad *Altopasso al Poggio del cerro* a
Prof. PUCCINELLIO.
- p. 314. n. 1. *ERIOPHORUM vaginatum.*
Ex Tyroli australi in montibus di *Valsugana*, a
BARTORELLIO, a *Montalon*, et ex Palù di *Mar-
cesina* in Vicetinis a MONTINIO.
- p. 316. n. 2. *ERIOPHORUM capitatum.*
Ex Apennino Lucensi al *Lago Braccio* prope il
Rondinaio a GIANNINIO.
- p. 317. n. 3. *ERIOPHORUM alpinum.*
Ex *Montalon* in *Valsugana* a MONTINIO.
- p. 318. n. 4. *ERIOPHORUM pubescens.*
Bassano in collibus di *Roman* a MONTINIO.

- p. 856. n. 4. *ERIOPHORUM polystachyon*.
Ex *Montalon in Valsugana* ad vallem di *Cadino di Fiemme* a MONTINIO.
- p. 326. n. 2. *ANTHOXANTHUM gracile*.
Panormo al *Caputo* a TODARO.
- p. 363. n. 1. *CRYPsis aculeata*.
Ex maritimis Liguriæ occidentis inter *Pietra*, et *Loano* a Prof. GHERARDIO.
- p. 365. n. 2. *CRYPsis schœnoides*.
Cum præcedente a Prof. GHERARDIO.
- p. 375. n. 5. *ALOPECURUS utriculatus*.
Ex Etruria a *Orbetello* ab Eq. RICCASOLO.
- p. 381. n. 2. *POLYPOGON maritimus*.
P. maritimus *Moris. et De Not. Capr. p. 140.**
Ex Capraria ab Eq. Prof. MORISIO, et a Prof. DE NOTARIS.
- p. 383. n. 1. *MILIUM effusum*.
Ex Tyroli meridionali in *Val di sole*, in *Falle Venosta*, et ex *Comelico* Belunensium a FACCHINIO.
- p. 386. n. 4. *MILIUM multiflorum*.
Inter Nicæam, et *Villafranca* a DURANDO, ex vicinis Benaci a *Monte Brion*, et a *Ponal*, et ex finibus Brixienaisibus a *Campione* a FACCHINIO.
- p. 390. n. 6. *MILIUM lendigerum*.
M. lendigerum *Moris. et De Not. Capr. p. 141.**
Ex Capraria ab Eq. Prof. MORISIO, et a Prof. DE NOTARIS.
- p. 395. n. 3. *AGROSTIS pallida*.
Ex inundatis Panormitanis al *Piano della Stuppa* a TODARO, alla *Piana de' Greci*, et al *Gurgo di Dingoli* a Prof. PARLATORE.
- p. 398. n. 5. *AGROSTIS alpina*.
Ex Apennino Lucensi al *Rondinaio* a GIANNINIO.
- p. 856. n. 5. *AIRA hirsuta*.
Ex districtu Belunensi in monte *Malgonera* prope *Agordo* a MONTINIO.
- p. 442. n. 6. *AIRA aquatica*.
Panormo ad rivulos a TODARO.
- p. 441. n. 5. *AIRA minuta*.
Ex Lucania a *Castelgrande* a GASPARRINIO.
- p. 443. n. 7. *AIRA agrostidea*.
Panormo al *Gurgo di Dingoli* a TODARO.
- p. 460. n. 1. *HETEROPOGON Allionii*.
Ex ora occidentali Benaci prope *Limone*, et *Toscanelano* a FACCHINIO.

- p. 468. n. 1. *ANDROPOGON hirtum*.
Ex Campania felici ai Ponti Maddaloni a Prof. PAR-
LATORE, et a Caserta ab Eq. GUSSONIO.
- p. 491. n. 4. *MELICA uniflora*.
Ex districtu Brixienti a Tremosine, ex Tyroli au-
strali alle Giudicarie prope Lodron a FACCHINIO.
- p. 493. n. 5. *MELICA nutans*.
Ex Apennino Lucensi al Solco di Biagio prope il
Rondinaio a GIANNINIO.
- p. 494. n. 6. *MELICA pyramidalis*.
Ex monte Anconitano ab Eq. NARBUCCIO.
- p. 497. n. 8. *MELICA minuta*.
Ex Igilio ab Eq. RICCASOLO.
- p. 520. n. 4. *POA divaricata*.
Mantfredoniâ ab Eq. GUSSONIO.
- p. 525. n. 7. *POA dura*.
Legi Bononiæ in collibus di Gaibolla, et Zolla pre-
dosa in areis, ubi copiosa.
- p. 527. n. 8. *POA alpina*.
Ex montibus di Busambra in Sicilia ab Eq. GUSSONIO.
In exemplaribus ex hoc loco nonnullæ valvæ corol-
linæ erant inferne in nervis submarginalibus, et
carinali sericæ, nonnullæ vero tantum ciliatæ.
- p. 532. n. 10. *POA laxa*.
Ex valle Venosta Tyrolis australis a FACCHINIO.
- p. 540. n. 14. *POA fertilis*.
Ex fossis prope Athesim a Siegmundskron di Bol-
zano a FACCHINIO.
- p. 548. n. 17. *POA compressa*.
Ex viciniis di Marano prope Castel Tirola a FAC-
CHINIO.
- p. 554. n. 20. *POA Eragrostis*.
Legi Bononiæ in collibus di Zolla predosa al Gu-
glielmino. Habui ex cultis di Bolzano ab Eq. DR
HEUFLERO.
- p. 577. n. 1. *BECKMANNIA erucaformis*.
Massa Ducali in litore a S. Giuseppe a CELIO.
- p. 581. n. 1. *DACTILOCTENIUM ægyptiacum*.
Messanâ a Prof. PARLATORE, Panormo ex pratis sub
monte Pellegrino a TODARO.
- p. 593. n. 1. *PENNISSETUM distylum*.
P. cenchroides Parl. Pl. nov. vel. min. not. p. 42.
Panormo ad radices montis Pellegrino a TODARO.
Quidquid sit iu barbario Linnæi, hoc certe non est
Cenchrus ciliaris descriptus in Mant. p. 302.

- p. 611. n. 6. *FESTUCA spadicea*.
F. spadicea Puccin. Syn. pl. Lucens. p. 65. n. 10.*
 Ex Apennino Lucensi ad Rondinaio a GIANNINIO.
- p. 614. n. 9. *FESTUCA calamaria*.
 Ex Apennino Lucensi a Prof. PUCCINELLIO.
- p. 621. n. 13. *FESTUCA serotina*.
 Legi Bononiæ in collibus di Zolla predosa supra la
Ca-bianca.
- p. 623. n. 14. *FESTUCA cærulescens*.
 Panormo alla Scala del Mesagno a TODARO.
- p. 624. n. 15. *FESTUCA cristata*.
F. cristata Moris. et De Not. Capr. p. 149.*
 Nicæa a DURANDO, ex viciniis Benaci ad septen-
 trionem di Limone a FAGGINIO, ex Capraria
 ab Eq. Prof. MORISIO, et a Prof. DE NOTARIS.
- p. 631. n. 19. *FESTUCA ligustica*: locustis hirtis.
 Ex Etruria a Orbetello ab Eq. RICCASOLO.
- p. 683. n. 20. *FESTUCA geniculata*.
F. incrassata Salz. in Lois. Desl. Gall. ed. 2. tom. 1.
 p. 85. Duby. Bot. Gall. ed. 2. tom. 2. p. 1013.
Vulpia incrassata Parl. Observ. p. 7. n. 5.* et Pl.
 nov. vel min. not. p. 56.*
 Vidi exemplar autpticum *Festucæ incrassatæ* Salz.
 apud Prof. Parlatorem, qui illud obtinuit a De
 Candolleo, et diligenter examinavi. Idem omnino
 conveniebat cum mea *Festuca geniculata*, sed
 erat in statu macro, et habebat valvam calyci-
 nam majorem paulo brevior, quam in exem-
 plari, quod est in meo herbario.
- p. 634. n. 21. *FESTUCA uniglumis*.
 Ex litore Pisaurensi ab Eq. RICCASOLO.
- p. 636. n. 22. *FESTUCA myuros*.
F. ciliata Moris. et De Not. Capr. p. 149.* exel.
 syn.
 Ex Capraria ab Eq. Prof. MORISIO, et a Prof. DE
 NOTARIS.
 Exemplar missum ex Capraria sub nomine *Festucæ*
ciliatæ quam certissime pertinet ad *Festucam*
Myurum locustis evidentius hirtis.
- p. 642. n. 25. *FESTUCA incrassata*.
Vulpia tenuis Parl. Observ. p. 8. n. 6., et Pl. nov.
 vel min. not. p. 57.
 Dele sub hac specie synonymon Salzmanni, et Bo-
 tanicorum Galliæ, quod pertinet ad *Festucam*
geniculatam, ut jam dixi.

- p. 664. n. 7. *BROMUS lanceolatus*.
Serrafalcus lanceolatus *Parl. Rar. pl. fasc. 2. p. 18., et Pl. nov. vel min. cogn. p. 80.*
Bromus macrostachys *Desf. Atl. 1. p. 96. tab. 19. f. 2.*
 Ex Sicilia alla *Bagheria* a *TODARO*.
 Olim putaveram plantam *Desfontainesii*, quam nunc affero, non pertinere ad hanc speciem; sed postea didici a Cl. *Parlatore*, qui eam vidit in herbario *Desfontainesii*, esse omnino hujus loci, et sistere formam luxuriantem in locustis.
- p. 669. n. 10. *BROMUS asper*.
 Ex Tyrolis australi in valle di *Vestino* in *Giudicarie*, in valle di *Noana*, a *Genesio* supra *Bolzano*, et ex districtu *Belunensi* supra *Agordo* a *FACCHINIO*. Florentiâ alle *Cascine* ab *Eq. RICCASOLO*.
- p. 688. n. 4. *STIPA tortilis*.
 Nicrâ in monte *Baron* a *DURANDO*, ex *Igilio* a *Capelrosso* ab *Eq. RICCASOLO*.
- p. 698. n. 4. *AVENA sempervirens*.
 Ex *Vette di Feltre* a *MONTINIO*.
- p. 702. n. 7. *AVENA pubescens*.
 Ex *Apennino Lucensi* al *Rondinaio* a *GIANNINIO*.
- p. 704. n. 8. *AVENA pratensis*.
 Ex *Grappa Bassanensium* a *MONTINIO*, ex *Apennino Lucensi* al *Rondinaio* a *GIANNINIO*.
- p. 713. n. 14. *AVENA condensata*.
A. neglecta *Moris. et De Not. Capr. p. 144.* excl. syn.*
 Ex *Capraria* ab *Eq. Prof. MORISIO*, et a *DE NOTARIS*.
- p. 718. n. 16. *AVENA argentea*.
 Ex monte *Bondon* Tyrolis australis a *FACCHINIO*.
- p. 732. n. 1. *ARUNDO Donax*.
 In præruptis ad *Benacum* tam in ditione Tyrolensi, quam in *Brixienti* a *FACCHINIO*.
- p. 738. n. 4. *ARUNDO Ampelodesmos*.
 Ex monte *Argentario* ab *Eq. RICCASOLO*.
- p. 743. n. 6. *ARUNDO epigejos*.
 Ex ripis præruptis *Athesis* ultra vicum *Tomba* a *MANGANOTTO*.
- p. 745. n. 7. *ARUNDO litorea*.
A. calamagrostis *Pollin. Ver. 1. p. 85.*
 Ex ripis *Athesis* ultra vicum *Tomba* a *MANGANOTTO*.
- p. 787. n. 2. *ÆGILOPS neglecta*.
 Ex *Etruria* ab *Eq. RICCASOLO*.

- p. 817. n. 13. *TRITICUM loliaceum*.
 Ex portu di *Recanati* ab Eq. NARDUCCIO, ex monte
Argentario alla Torre della punta ab Eq. RIC-
 CASOLO, Manfredoniâ ab Eq. GUSSONIO.
- p. 630. n. 1. *MONTIA fontana*.
 Ex Tyroli meridionali in valle *Cadino*, et *Venosta*
alla Torscher alpe a FACCHINIO, ex Igilio ab
 Eq. RICCASOLO.
- p. 832. n. 1. *HOLOSTEUM umbellatum*.
 Ex Tyroli meridionali in marginibus agrorum prope
Brixinam ab Eq. DE HEUFLERO.
- p. 834. n. 1. *POLYCARPON tetraphyllum*.
 Ex Igilio ab Eq. RICCASOLO.
- p. 837. n. 3. *POLYCARPON peploides*.
 Ex montibus Siciliæ a Prof. PARLATORE.
- p. 838. n. 1. *TILLEA muscosa*.
 Ex Etruria in monte *Ceceri* prope *le Due cave* a
 BARONIO fil., ex Igilio ab Eq. RICCASOLO.

Additamenta ad volumen secundum.

- p. 4. n. 1. *GLOBULARIA Alypum*.
 Inter Nicæam, et Monæcium a DURANDO, ex Ar-
gentario alla Torre della punta ab Eq. RICCASOLO.
- p. 7. n. 3. *GLOBULARIA incanescens*.
G. incanescens Puccin. Syn. pl. Lucens. p. 76. tab.
 Ex monte *Ovolo* in districtu Bononiensi a PIRAZ-
 ZOLIO, ex Apennino Lucensi al *Rondinaio* a
 GIANNINIO.
- p. 11. n. 5. *GLOBULARIA nudicaulis*.
 Copiosa in finibus Italicis Tyrolensibus, unde a
 FACCHINIO.
- p. 21. n. 1. *CEPHALARIA transylvanica*.
 Legi Bononiæ in collibus di *Zolla predosa alla Ca-*
-bianca, ubi copiosa. Habui ex districtu Vero-
 nensi in montibus di *valle Pantena*, et in agris
 circa vicum *Beccarinetta* a MANGANOTTO.
- p. 41. n. 3. *SCABIOSA columbaria* β.
 Ex Apennino Lucensi al *Rondinaio* a GIANNINIO.
- p. 50. n. 7. *SCABIOSA crenata*.
 Ex Sicilia alla *Pizzuta* a Prof. PARLATORE.
- p. 55. n. 9. *SCABIOSA maritima* α.
 Ex Etruria in viciniis di *Gerfalco* ab AMIDEO.
- p. 66. n. 15. *SCABIOSA cretica*.
 Panormo a S. Maria di Gesu a TODARO.

- p. 69. n. 17. *SCABIOSA graminifolia*.
Veronà in vertice montis *Pastello* a MANGA-
NOTTO.
- p. 74. n. 1. *ASPERULA odorata*.
Ex finibus Italicis Tyrolensibus, ubi copiosa, a FAC-
CHINIO, ex Etruria secus il *Vicano* prope cœno-
bium Vallumbrosanum a BARONIO fil.
- p. 77. n. 3. *ASPERULA taurina*.
Ex viciniis di *Lugano* a LACGERO, ex Tyroli au-
strali in *Valsugana alla Rocchetta*, et ex fini-
bus Tyrolensibus cum Feltrinis a Schener a FAC-
CHINIO, ex nemoribus montis de' *Cavalli* supra
Cagli a FEDERICIO, ex Etruria in *Canipale al-*
l'Alvernia a CLERICO.
- p. 80. n. 6. *ASPERULA cynanchica*.
Nicaea in monte *Boron* a DURANDO, ex Apennino
Lucensi al *Rondinaio* a GIANNINIO, ex Etruria
ab Eq. RICCASOLO.
- p. 94. n. 2. *GALIUM vernum*.
Fesulis ab Eq. RICCASOLO.
- p. 101. n. 6. *GALIUM erectum* α.
G. erectum *Moris. et De Not. Capr. p. 65.**
- p. 102. var. β.
Habui speciem ex Capraria ab Eq. Prof. MORISIO,
et a Prof. DE NOTARIS, varietatem β ex colli-
bus di *Bolzano* ab Eq. DE HEUFLERO, ex Ar-
gentario ai *Ronconali* ab Eq. RICCASOLO.
- p. 105. n. 8. *GALIUM pusillum*.
Ex *Rondinaio* a GIANNINIO.
- p. 108. n. 9. *GALIUM rupicola*.
Ex *Bondon Tyrolis australis al Dosso d'Abramo* a
FACCHINIO.
- p. 110. n. 14. *GALIUM Soleirolii*.
G. rubrum pumilum *Moris. Sard. 2. p. 301.**
Ex Sardinia ab Eq. Prof. MORISIO.
Cl. Morisius in Fl. Sard. 2. p. 301. putat esse varie-
tatem *Galii rubri* L.; sed ego nondum vidi *Gal-*
ium rubrum tam pusillum, et pollens tanta
pubescentia. Res ulterius examinetur.
- p. 119. n. 17. *GALIUM rubrum* β.
Ex Apennino Lucensi al *Rondinaio* a GIANNINIO.
- p. 121. n. 18. *GALIUM purpureum*.
Ex Etruria ab Eq. RICCASOLO.
- p. 123. n. 19. *GALIUM saccharatum*.
G. saccharatum *Moris. et De Not. Capr. p. 65.**

- Niccià a DURANDO, ex Igilio ab Eq. RICCASOLO,
ex Capraria ab Eq. Prof. MORISIO, et a Prof. DE
NOTARIS.
- p. 127. n. 22. *GALIUM boreale*.
Ex monte *Althas* prope *Bolzano* ab Eq. DE HEUFLERO.
- p. 138. n. 1. *VALANTIA muralis*.
Ex Argentario ab Eq. RICCASOLO, Manfredonià ab
Eq. GUSSONIO.
- p. 143. n. 3. *CRUCIANELLA maritima*.
Ex Etruria a Orbetello in Istmo di Feniglia ab
Eq. RICCASOLO.
- p. 145. n. 1. *RUBIA tinctorum*.
Ex colle S. Leonardi prope Veronam a MANGANOTTO.
- p. 150. n. 1. *EXACUM filiforme*.
Ex Sicilia in monte di Cani a Prof. PARLATORE.
- p. 151. n. 2. *EXACUM Candollei*.
E. Candollei *Puccin. Syn. pl. Luc. p. 89.**
Ex Ducatu Lucensi alla Badia di Pozzeveri al
Poggio del cerro a Prof. PUCCINELLIO.
- p. 163. n. 8. *PLANTAGO alpina*.
Ex monte *Bondon* districtus Tridentini, et supra
Sardagna a FACCHINIO.
- p. 164. n. 9. *PLANTAGO Lagopus*.
Ex litore Pissurensi, et ex Igilio ab Eq. RICCASOLO.
- p. 166. n. 10. *PLANTAGO albicans*.
Ex Apulia a Castel Trinità ab Eq. GUSSONIO.
- p. 178. n. 17. *PLANTAGO Psyllium*.
Ex Igilio ab Eq. RICCASOLO.
- p. 181. n. 19. *PLANTAGO Cynops*.
Niccià ad pontem Vari a DURANDO, ex Liguria oc-
cidua ab Eq. RICCASOLO.
- p. 184. n. 1. *CENTUNCULUS minimus*.
C. minimus *Puccin. Syn. pl. Lucens. p. 89.**
Ex Ducatu Lucensi a Vorno in Rio di Valle a Prof.
PUCCINELLIO.
- p. 193. n. 1. *EPIMEDIUM alpinum*.
Veronà in sylva del Mantico a MANGANOTTO.
- p. 195. n. 1. *CORNUS mas*.
Ex sylvis di Bolzano ab Eq. DE HEUFLERO, ex Etru-
ria in Maremma ab Eq. RICCASOLO.
- p. 199. n. 1. *AMMARIA verticillata*.
Ex oryzeto di Brigafatta prope Vigasio in districtu
Veronensi a MANGANOTTO.
- p. 204. n. 1. *ALCHEMILLA vulgaris*.
Ex Piceno in montibus della Sibilla prope la Co-
rona a MARZIALETTA.

- p. 207. n. 2. *ALCHEMILLA alpina*.
A. alpina Puccin. Syn. pl. Lucens. p. 92.*
 Ex Apennino Lucensi al Rondinaio a GIANNINIO.
- p. 209. n. 3. *ALCHEMILLA pentaphyllea*.
 Ex alpe *Pisgana di Valcamonica* in districtu Bergomensi, et ex *Orteler Tyrolis austro-occidentalis*, ubi copiosa, a FACCHINIO.
- p. 215. n. 3. *PARIETARIA Soleirolii*.
P. Soleirolii Moris. et De Not. Capr. p. 119.*
 Ex Capraria ab Eq. Prof. MORISIO, et a Prof. DE NOTARIS.
- p. 218. n. 1. *HYPERCUM procumbens*.
 Ex Liguria occidua, et ex Igilio ab Eq. RICCASOLO.
- p. 219. n. 2. *HYPERCUM glaucescens*.
 Manfredoniâ ab Eq. GUSSONIO.
- p. 226. n. 3. *POTAMOGETON perfoliatum*.
 Ex Benaco, et ex lacubus di *Toblino*, *Sta Masenza*, et *Caldonazzo* a FACCHINIO.
- p. 228. n. 4. *POTAMOGETON densum*.
 Ex fossis di *Riva*, et *Arco Tyrolis* a FACCHINIO.
- p. 233. n. 9. *POTAMOGETON crispum*.
 Mediolano in fossis ab Eq. RICCASOLO.
- p. 236. n. 11. *POTAMOGETON pusillum*.
P. pusillum Puccin. Syn. pl. Lucens. p. 95. cum tab.
*P. panormitanum Biv. fil. Nouv. plant. ined. p. 6.**
 Ex valle *Venosta*, ex viciniis lacuum di *Pinè*, ex fossis, et stamnis d' *Ascher* supra *Bolzano* a FACCHINIO. *Panormo* in *Oreto* a TODARO.
- p. 242. n. 1. *SAGINA procumbens*.
S. procumbens Bert. fil. It. in Apenn. Bon. p. 17.*
 Filius attulit ex pratis spongiosis dell' *Acero* in Apennino Bononiensi. Habui Bassano in *Vullerana* prope *Rubbio* a MONTINIO, ex Apennino Pistoriensi a Prof. PETRO SAVIO.
- p. 245. n. 1. *MÆNCHIA erecta*.
 Ex Etruria Fesulis, a *Careggi*, et in monte *Sinario* a BARONIO fil., ex Igilio ab Eq. RICCASOLO.
- p. 260. n. 3. *MYOSOTIS micrantha*.
 Ex Sicilia al *Gurgo di Dingoli* a TODARO, et a Prof. PARLATORE.
- p. 276. n. 5. *LITHOSPERMUM rosmarinifolium*.
L. rosmarinifolium Bot. reg. v. 20. tab. 1736.
Panormo a *Monte Gallo* a TODARO.
 Ludit flore albo, vel carneo.

- p. 281. n. 9. *LITHOSPERMUM apulum*.
Ex Etruria in planitie del Mugnone alla Cipressa a BARONIO fil., et in Argentario a Prof. PARLATORE, ex Igilio ab eodem, et ab Eq. RICCASOLO.
- p. 282. n. 10. *LITHOSPERMUM tinctorium*.
Ex Liguria occidua a Capo S. Spirito al Borghetto a Prof. GHERARDIO.
- p. 294. n. 7. *ANCHUSA Barrelieri*.
A. Barrelieri *Puccin. Syn. pl. Luc. p. 103.**
Ex Piceno a Montefortino a MARZIALETTO, ex Ducatu Lucensi a Tereglio a Prof. PUCCINELLIO.
- p. 297. n. 1. *CYNOCLOSSUM officinale*.
Ex Umbria in monte De' Cavalli a FEDERICIO.
- p. 319. n. 1. *CERINTHE aspera*.
C. gymnandra Gaspar. in *Rendicont. dell' Accad. delle scienz. di Nap. 1. p. 72.**
Ex viciniis Cajetæ, et Neapolis a GASPARRINIO.
Tubus corollæ basi angustior, hinc gibbus solemnibus omnibus formis. Filamenta antheris paulo breviora, vel æqualia res ludibunda.
- p. 321. n. 2. *CERINTHE minor*.
Ex Etruria prope l'Impruneta al Fosso di Cocci-brengoli a BARONIO fil.
- p. 326. n. 1. *ONOSMA montana*.
Ex Petra pertusa (Furlo) a Prof. OCTAVIANO, Panormo alla Portella di S. Anna a TODARO.
- p. 335. n. 1. *LYCOPSIS arvensis*.
Ex Etruria ab Eq. RICCASOLO.
- p. 344. n. 3. *ECHIUM plantagineum*.
Nicaea a DURANDO, ex olivetis Albingaunensibus in Liguria occidua a Prof. GHERARDIO, ex Igilio ab Eq. RICCASOLO.
- p. 348. n. 5. *ECHIUM vulgare* s.
Ex Apulia a Trani ab Eq. GUSSONIO.
- p. 353. n. 8. *ECHIUM calycinum*.
Ex Igilio ab Eq. RICCASOLO.
- p. 357. n. 2. *ARETIA tomentosa*.
Ex alpe Tokò Tyrolis austro-orientalis a FACCHINIO.
- p. 364. n. 5. *ANDROSACE obtusifolia*.
Ex alpinis prope Vipitenum ab Eq. DE HEUFLERO.
- p. 368. n. 1. *VITALIANA primulæflora*.
Ex monte Bondon districtus Tridentini a FACCHINIO.
- p. 375. n. 4. *PRIMULA suaveolens*.
Ex Piceno in montibus della Sibilla, et Priore a MARZIALETTO.
- Flor. Ital. T. V.*

- p. 380. n. 8. *PRIMULA villosa*.

Ex *Braulio*, et *Stelvio* in *Valtellina*, ex *Valzotto di Tesino*, ex valle *Venosta*, et ex *Orteler Tyrolis australis* a *FACCHINIO*, ex summitate montis *Orsaro* in *Apennino Pontremulensi* a *Prof. Pietro SAVIO*.

- p. 388. n. 14. *PRIMULA Auricula*.

Ex monte *Selvino* in provincia *Bergomensi* a *Bergamaschio*, ex valle d' *Ampola* in *Val di Ledro* a *FACCHINIO*.

- p. 391. n. 15. *PRIMULA glaucescens*.

Ex monte di *Nose* in *Insubria* a *Laccerio*, ex valle *Seriana* supra *Costrone* in provincia *Bergomensi* a *Bergamaschio*.

- p. 392. n. 16. *PRIMULA spectabilis*.

Ex alpe *la Spora* vallis *Ananiam*, ex finibus *Tyrolensibus*, et *Brixiensibus*, ex montibus ad occidentem *Benaci*, ex *Tyroli Italico* in *Folgaria*, in *Vallarsa*, in montibus d' *Ala*, et in finibus *Vicetinis* a *FACCHINIO*.

Ludit margine cartilagineo foliorum minute denticulato.

- p. 395. n. 1. *CORTUSA Matthioli*.

Ex alpe di *Kaas* in valle *Venosta*, et ex *Vette di Feltre* a *FACCHINIO*.

- p. 397. n. 1. *SOLDANELLA alpina*.

S. alpina Bert. Misc. bot. 3. p. 4.

Ex vertice di *Portole* supra *Assiago* a *MONTINIO*, et ab *Eq. PAROLINIO*.

Dele in *Fl. Ital. l. c.* synonymon *Hoppii*, et *Reichenbachii*, non figuram *Sturmii*. Confer hac de re *Misc. bot. l. c.*

- p. 399. n. 2. *SOLDANELLA pusilla*.

S. pusilla Bert. Misc. bot. 3. p. 5.

S. minima Hoppe. Reich. Exc. 3. p. 206. n. 2735.

Ex *Castellazzo di Panereggi* in *Fiemme*, ex *Seiser alpe* in *Fassa* a *FACCHINIO*, ex *Tyroli australi* a *Montalon* in *Valsugana*, et ex *Vette di Feltre* a *MONTINIO*, ex *Cimon di Fanano* supra *Fiumalbo* in *Ducatu Mntinensi* ab *Eq. PAROLINIO*.

Dele in *Fl. Ital. l. c.* locum natalem in vertice di *Portole* supra *Assiago*, qui pertinet ad *Soldanellam alpinam* in statu macriore.

- p. 405. n. 4. *CYCLAMEN vernum*.

Senogallia in *sylva delle Grazie* a *SALVATORIO*, ex *Sicilia* a *Prof. PARLATORE*.

- Descripti in Fl. Ital. l. o. colorem floris ex plantis in umbra natis, sed postea vidi alias plantas natas in aprico, in quibus tota corolla erat coloris saturate rubro-persicei, intensioris in fauce ejus.
- p. 412. n. 1. *HOTTONIA palustris*.
Ex Etruria in fossis di Pietrasanta a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO.
- p. 417. n. 3. *LYSIMACHIA Linum stellatum*.
Ex Etruria in monte Pisano supra thermas S. Juliani a Prof. PETRO SAVIO, Fesulis in via delle Salairole, et prope la Doccia, in vertice montis Ceceri, et in Pian di Mugnone a BARONIO fil., a Careggi a BARBIERIO, ex Argentario alla Cala grande, et ex Igilio ab Eq. RICCASOLO.
- p. 418. n. 4. *LYSIMACHIA nemorum*.
Ex Liguria occidua in sylvis della Bormida a Prof. GHERARDIO.
- p. 439. n. 4. *CONVOLVULUS althæoides*.
C. althæoides Moris. et De Not. Capr. p. 93.*
Ex Capraria ab Eq. Prof. MORISIO, et a Prof. DE NOTARIS.
- p. 442. n. 6. *CONVOLVULUS sabatius*.
Ex olivetis del Cervo in Liguria occidua a Prof. GHERARDIO.
- p. 447. n. 11. *CONVOLVULUS pentapetaloides*.
Ex olivetis del Cervo a Prof. GHERARDIO, et ex arvis Apuliæ ab Eq. GUSSONIO.
- p. 471. n. 9. *CAMPANULA persicifolia*.
Ex monte Nerone a FEDERICIO, ex Etruria alla Cornata di Gersalco ab AMIDEO.
- p. 476. n. 12. *CAMPANULA Alpini*.
Ex districtu Brixienti a Bagolino a FACCHINIO.
- p. 483. n. 17. *CAMPANULA bononiensis*.
Ex collibus prope Brixinam ab Eq. DE HEUFLERO.
- p. 488. n. 19. *CAMPANULA graminifolia*.
Ex Petra pertusa (Furlo) a Prof. OCTAVIANIO.
- p. 491. n. 21. *CAMPANULA spicata*.
Ex viciniis di Codudriana in pago Ticinensi a LAGGERO, et ex Apennino Lucensi al Rondinaio a GIANNINIO.
- p. 500. n. 26. *CAMPANULA petraea*.
Ex montibus vallis Pantena, di Cologne, et di Stalavena in districtu Veronensi a MANGANOTTO, et alla Madonna della Corona ad dexteram Athesis a FACCHINIO.

- p. 510. n. 33. *CAMPANULA Erinus*.
C. Erinus *Moris. et De Not. Capr. p. 89.**
Nicaea a DURANDO, ex Capraria ab Eq. Prof. MORISIO, et a Prof. DE NOTARIS.
- p. 513. n. 35. *CAMPANULA fragilis* β.
C. fragilis *Lindl. in Bot. reg. v. 20. tab. 1738.*
- p. 515. n. 36. *CAMPANULA garganica*.
C. garganica *Lindl. in Bot. reg. v. 22. tab. 1768.*
- p. 518. n. 39. *CAMPANULA Lorey*.
Veronâ ad Mincium, et in via prope Valeggio a MANGANOTTO.
- p. 532. n. 2. *PHYTEUMA hemispharica*.
Ph. hemispharica *Puccin. Syn. pl. Lucens. p. 114.**
Ex Apennino Lucensi al Rondinaio a GIANNINIO.
- p. 535. n. 5. *PHYTEUMA orbicularis*.
Ph. orbicularis *Puccin. Syn. pl. Lucens. p. 114.**
Ex monte Selvino in districtu Bergomensis a BERGAMASCHIO, ex Ducatu Lucensi al Rondinaio a GIANNINIO.
- p. 538. n. 6. *PHYTEUMA Michelii*.
Ex montibus inter Lugano, et Comum a LAGGERO, Como al Ponte Molinello a RAINERO, ex sylvis Massæ Ducalis ab WOODSIO.
- p. 542. n. 7. *PHYTEUMA Scheuchzeri*.
Ex monte Cenere, et S. Salvatore prope Lugano a LAGGERO.
- p. 543. n. 8. *PHYTEUMA spicata*.
Ex montibus di Primiero in Tyrolis austro-orientali a FACCHINIO.
- p. 553. n. 1. *LOBELIA Laurentia*.
L. Laurentia *Puccin. Syn. pl. Lucens. p. 115.**
Ex ducatu Lucensi alla Badia di Pozzeveri a Prof. PUCCINELLIO.
- p. 554. n. 2. *LOBELIA tenella*.
Panormo a Prof. PARLATORE.
- p. 559. n. 3. *LONICERA implexa*.
L. implexa *Moris. et De Not. Capr. p. 64.**
Ex Capraria ab Eq. Prof. MORISIO, et a Prof. DE NOTARIS.
- p. 563. n. 6. *LONICERA nigra*.
Ex sylvis di Ritten supra Bolzano, et ex montibus di Piemme a FACCHINIO.
- p. 565. n. 8. *LONICERA alpigena*.
Ex Apennino Lucensi al Soleo di Biagio prope il Rondinaio a GIANNINIO.

- p. 566. n. 9. *LONIGERA caerulea*.
Ex alpinis, et subalpinis di *Fiemme*, et *Fassa* a
FACCHINIO.
- p. 582. n. 11. *VERBASCUM viminalis*.
Manfredonià ad S. Leonardum ab Eq. GUSSONIO.
- p. 587. n. 15. *VERBASCUM phœniceum*.
Ex *Vallonga* prope *Roveredo* a FACCHINIO, ex Etru-
ria in *Val di Macina* a BARONIO fil.
- p. 595. n. 18. *VERBASCUM longifolium*.
Ex Piceno in monte *Priore* a MARZIALETTO.
- p. 624. n. 1. *ATROPA Belladonna*.
Ex sylvis supra *Camposilvano*, in *Vallarsa*, et ex
sylvis orientalibus di *Primiero* a FACCHINIO.
- p. 646. n. 2. *ERYTHREA maritima*.
Ex Etruria a *Careggi all'Impruneta* a BARONIO fil.
- p. 654. n. 3. *RHAMNUS saxatilis*.
Ex Insubria Helvetica prope *Lugano* in montibus
S. Salvatore, *Calbege*, et *Castellano* a LACGE-
RO, ex *Petra pertusa (Furlo)* a Prof. OCTAVIANO.
- p. 661. n. 9. *RHAMNUS Alaternus*.
Ex Etruria a *Ansionia* ab Eq. RICCASOLO.
- p. 667. n. 1. *PAERUS australis*.
Ex Tyroli australi in colle *S. Martini* supra *Arco*,
et ex agro *Brixien*, et *Mantuan* in sepibus
inter *Salò*, et *Peschiera* a FACCHINIO.
- p. 695. n. 2. *VIOLA hirta*.
Ex *Sudorno* prope *Bergomum* a BERGAMASCHIO.
- p. 697. n. 3. *VIOLA palustris*.
Ex Tyroli Italico in alpinis di *Tesino* a *Valciotto*,
a *Copolà*, et alle *Viose*, ex districtu *Belunensi*
in finibus di *Fassa* a FACCHINIO.
- p. 701. n. 5. *VIOLA canina* β.
Ex sylvis di *Fassa* ad lavam *Avisii* a FACCHINIO.
- p. 705. n. 6. *VIOLA montana*.
Ex vicinis di *Ora nel Paese dell'Adige* a FACCHINIO.
- p. 707. n. 7. *VIOLA Allionii*.
Viola bianca, che nasce in luoghi più frigidì, ed
è senza alcuno odore, e che in copia nasce
nella valle *Anania* della giurisdittione di *Trento*
Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 1240. senza fig.
Ex valle *Anania*, ubi valde copiosa, et ex toto
Tyroli Italico, et provinciis Italicis finitimis a
FACCHINIO.
Corolla, dum in *Cenisio* est violacea, in valle *Ana-*
nia, et in Tyroli Italico est alba, calcare tantum

prope apicem caerulecente. In reliquis nulla diversitas. Diligens Facchinus me monuit de synonymo Matthioli.

p. 710. n. 10. *VIOLA cenisia*.

Ex monte *Vettore* Piceni a MARZIALETTO.

ibid. var. β .

Ex *Tremals di Val di Ledro*, et ex montibus di *Turano* ad meridiem vallis di *Lorina* a FACCHINIO.

p. 712. n. 11. *VIOLA calcarata*.

V. calcarata Puccin. Syn. pl. Lucens. p. 129.*

Ex Apennino Lucensi al *Rondinaio* a GIANNINIO;
ex Etruria al *Poggio di Montieri* ab AMIDEO.

ibid. var. β .

Ex summis montibus Catrim a FEDERICIO, ex Apennino Maceratensi in monte *Birro* ab Eq. NARDUCCIO, ex Piceno in *Sibilla alla Corona* a MARZIALETTO.

p. 715. n. 13. *VIOLA heterophylla*.

Ex Apennino Lucensi al *Rondinaio* a GIANNINIO.

p. 721. n. 15. *VIOLA mirabilis*.

Ex Tyroli australi in sylvis d' *Ora*, *Egna*, *S. Paolo* nel *Paese dell' Adige* a FACCHINIO.

p. 723. n. 16. *VIOLA biflora*.

V. biflora Puccin. Syn. pl. Lucens. p. 129.*

Ex Apennino Lucensi al *Rondinaio* a GIANNINIO.

p. 728. n. 1. *ILLECEBRUM verticillatum*.

I. verticillatum Puccin. Syn. pl. Lucens. p. 135.*

Ex Ducatu Lucensi alla *Badia di Pozzeveri*, et a *Forno* a Prof. PUCCINELLIO.

p. 729. n. 2. *ILLECEBRUM echinatum*.

Ex *Igilio a Capelrosso* ab Eq. RICCASOLO, et a Prof. PARLATORE.

p. 735. n. 7. *ILLECEBRUM serpyllifolium*.

Ex Piceno in montibus della *Sibilla* a MARZIALETTO.

p. 745. n. 4. *THESIUM alpinum*.

Th. alpinum Puccin. Syn. pl. Lucens. p. 135.*

Ex Ducatu Lucensi in alpe di *Limano* a Prof. PUCCINELLIO.

p. 751. n. 3. *VINCA acutiflora*.

Ex sylva di *Portici* ab Eq. GUSSONIO.

Boissierius in Voy. bot. en Esp. p. 409. n. 1131. male conjungit hanc cum *Vinca media* Hoffmans. et Link. Fl. Port. 1. p. 377. tab. 70., quæ habet folia, et flores dimidio minores, et reapse est media inter *Vincam majorem* L., et *Vincam minorem* L.

Additamenta ad volumen tertium.

- p. 4. *STAPELIA europæa*.
S. europæa Guss. Notiz. sulle is. *Lampi. e Lampad.*
 p. 87. cum fig. optima *De Cand. Sept. not. p. 23.*
S. Gussoneana Lindl. in *Bot. reg. v. 20. tab. 1731.*
Apteranthes Gussoneana Mik. in *Nov. act. Acad.*
Cesar. Leop. tom. 17. par. 2. p. 594. tab. 41.
- p. 10. n. 2. *CYNANCHUM Vincetoxicum*.
C. Vincetoxicum Moris. et *De Not. Capr. p. 91.**
 Ex Capraria ab Eq. Prof. MORISIO, et a Prof. DE
 NOTARIS.
- p. 27. n. 3. *CHENOPodium rubrum*.
 Ex valle *Venosta* a FACCHINIO, ex humentibus di
Bolzano ab Eq. DE HEUFLERO.
- p. 32. n. 7. *CHENOPodium opulifolium*.
 Ex ora meridionali Benaci in ditione Mantuana a
 FACCHINIO.
- p. 38. n. 13. *CHENOPodium glaucum*.
 Ex ruderalis di *Bolzano* ab Eq. DE HEUFLERO.
- p. 52. n. 1. *SALSOLA Kali*.
 Ex litore *Fanensi* a FEDERICIO.
- p. 54. n. 3. *SALSOLA Soda*.
 Ex *Apulia* a *Tresanti* ab Eq. GUSSONIO.
- p. 71. n. 4. *CUSCUTA planiflora*.
C. planiflora Koch. *Syn. ed. 1. p. 405.**
 Ex radicibus montium di *Bolzano*, quo loco legit
Elsmannus apud *Kochium l. c.*, a FACCHINIO,
 et ab Eq. DE HEUFLERO.
- p. 72. n. 1. *SWERTIA perennis*.
 Ex editis *del Comelico* in districtu *Belunensi* a
 FACCHINIO.
- p. 76. n. 2. *GENTIANA purpurea*.
 Ex *Apennino Lucensi al Solco di Biagio* prope il
Rondinaio a GIANNINIO.
- p. 80. n. 6. *GENTIANA asclepiadea*.
 Ex sylvis alpinis di *Bolzano* ab Eq. DE HEUFLERO.
- p. 82. n. 7. *GENTIANA cruciata*.
 Ex radicibus montium *Tyrolis Italici* a FACCHINIO,
 ex *Etruria alla Vernia* ab Eq. RICCASOLO.
 Nunc laudatur ad *hydrophobiam*. Utinam valeat!
- p. 88. n. 10. *GENTIANA verna*.
 Ex monte *Peiterskofe* prope *Brixinam* ab Eq. DE
 HEUFLERO, ex *Apennino Lucensi al Rondinaio*
 a GIANNINIO.

- p. 91. n. 11. *GENTIANA bavarica*.
Ex montibus ad Vipitenum ab Eq. DE HEUFLERO;
ex Vettore Piceni a MARZIALETTO.
- p. 99. n. 16. *GENTIANA campestris*.
Ex pratis montis dei Cavalli supra Cagli a FEDERICIO.
- p. 113. n. 9. *ERYNGIUM dilatatum*.
Ex Etruria in Casentino secus flumen Rassina ab Eq. RICCASOLO.
- p. 121. n. 1. *SANICULA europæa*.
Ex Piceno in sylvis di Montefortino a MARZIALETTO.
- p. 127. n. 3. *ASTRANTIA minor*.
Ex alpe di Val Gavia in Valtellina, ex alpe di Pisgana in Valcamonica, ex Tyroli meridionali in montibus Bondon, et Spinale, in alpe di Pelugo nelle Giudicarie a FACCHINIO.
- p. 132. n. 2. *BUPLEURUM protractum*.
Inter Nicæam, et Villafranca a DURANDO, Senogalliâ prope Castellone a SALVATORIO.
- p. 133. n. 3. *BUPLEURUM stellatum*.
Ex Tyroli australi in montibus dell' Agnelezza di Primiero, a Cazzorga di Fiemme, a Cima d'Asta di Tesino, et in valle di Breguzzo nelle Giudicarie a FACCHINIO.
- p. 134. n. 4. *BUPLEURUM graminifolium*.
Ex Corni di Canzo ad Larium a RAINERO, ex Tyroli australi in monte Campobruno a FACCHINIO.
- p. 135. n. 5. *BUPLEURUM ranunculoides*.
Ex Baldo alla Corona, ex Tyroli australi in Primiero, in Giudicarie, et in Val di Ledro, ex Vette di Feltre a FACCHINIO, ex Cimone di Fannano a GIANNINIO.
- p. 137. n. 6. *BUPLEURUM falcatum* β foliis omnibus angustis, linearibus.
B. falcatum Bert. fil. It. in Apenn. Bon. p. 13.* Bert. Fl. Ital. 3. p. 605. n. 8.
B. cernuum Bert. Fl. Ital. 2. p. 136. cum omnibus synonymis, et locis natalibus.
Ex alpibus Apuanis inter il Pisanino, et Pizzo d'uccello, et ex Apennino Fivizzanensi ab Eq. NARDUCCIO, et a Prof. PETRO-SAVIO, ex Apennino Bononiensi in Corno alla scala a filio, et a GENNARIO, ex Apennino Lucensi al Rondinaio a GIANNINIO, et al Prato fiorito a Prof. PETRO SAVIO, ex Apennino Aretino in alpe della Luna ab AMIDEO.

Bupleurum cernuum Ten. est tantum lusus *Bupleuri falcati* L. foliis omnibus angustis; sed vidi individua, quæ habebant folia ima paulatim latiora, sive lanceolata, et quæ ostendebant transitum in typum speciei. In reliquis, et præsertim in fructu nulla diversitas.

p. 154. n. 2. *ECHINOPHORA tenuifolia*.

Ex Apulia inter *Cerignole*, et *S. Cassano* ab Eq. GUSSONIO.

p. 159. n. 3. *DAUCUS parviflorus*.

D. parviflorus Puccin. Syn. pl. Lucens. p. 148.*

Non solum observavi copiosissimum in toto agro Sarzanensi, sed etiam in Ducatu Massensi, in Ducatu Lucensi, et in Etruria.

In Fl. Ital. descripsi fructum adhuc immatrum; sed postea vidi maturum, et perfectum in campis Sarzanensibus, et Lucæ in muro oppidi decedente Julio, et Augusto, aliaque animadverti, quæ in descriptione mea emmendanda. Umbella universalis, cum fructus perficitur, contrahitur, et fit concavo-convexus modo nidi avium. Flos sterilis fungosus in centro umbellæ sæpe deest. Flores radii gaudent petalo exteriore paulo majore. Diachenium perfectum ovato-oblongum, aculeis costarum paululum elongatis, patentibus, crassiusculis, sæpius purpurantibus, hirsutiem vallecularum superantibus. Reliqua, ut in descriptione data.

p. 207. n. 1. *MYRRHIS odorata*.

Ex Tyroli meridionali in montibus *di Costabella*, *Agnerola di Primiero*, *Campogrosso* in *Vallarsa*, *Lenzumo* in *Val di Ledro* a FACCHINIO.

p. 244. n. 1. *CICUTA virosa*.

Ex paludibus Vipitini ab Eq. DE HEUFLERO.

p. 266. n. 4. *PIMPINELLA alpina*.

P. alpina Puccin. Syn. pl. Lucens. p. 156.*

Ex Baldo *alla Corona*, ex districtu Vicetino a *Rivolta di Recoaro*, ex Tyroli australi a FACCHINIO, ex Ducatu Lucensi a *Casoli di Valdilima* a Prof. PUCCINELLIO.

p. 278. n. 4. *Sium inundatum*.

Ex Sicilia *al Gurgo di Dingoli* a Prof. PARLATORE.

p. 304. n. 1. *PTYCHOTIS heterophylla*.

Ex ripa *Athesis S. Zengi* nuncupata a MANCOTTO.

- p. 311. n. 2. *MEUM Mutellina*.
Ex alpe *Flavona* in valle *Anania*, ex alpe *la Pieza* in *Livinalongo*, ex *Comelico Belunensium* a *FACCHINIO*.
- p. 313. n. 3. *MEUM carvifolium*.
Ex Apennino *Lucensi* al *Rondinaio* a *GIANNINIO*, ex valle *Tiberina* in alpe *della Luna* ab *AMIDEO*.
- p. 320. n. 3. *LIBANOTIS Matthioli*.
Ex Tyroli australi in monte *Para* nelle *Giudicarie* a *FACCHINIO*.
- p. 329. n. 6. *SESELI annuum*.
Ex sylvis prope *Bolzano* ab Eq. *DE HEUFLERO*.
- p. 354. n. 1. *PALIMBIA Chabraei*.
Ex pratis di *Beluno* prope *Longaron* a *FACCHINIO*.
- p. 369. n. 6. *SELINUM rablense*.
Ex Tyroli australi a *Mendola*, *Beluno* prope *Alloghe* a *FACCHINIO*.
- p. 372. n. 1. *FERULA nodiflora*.
F. nodiflora Moris. et De Not. Capr. p. 62.
Ex Tyroli australi *alla Sega di Roveredo*, et ex montibus ad *Benscum* prope *ecclesiam di Tremosine* a *FACCHINIO*, ex *Capraria* ab Eq. *Prof. MORISIO*, et a *Prof. DE NOTARIS*.
- p. 380. n. 1. *THAPSIA garganica*.
Ex *Etruria* a *Portercole* ab Eq. *RICCASOLO*.
- p. 393. n. 3. *LASERPITIUM prutenicum*.
Ex sylvis di *Bolzano* ab Eq. *DE HEUFLERO*.
- p. 400. n. 8. *LASERPITIUM siculum*.
Ex *Nebrodis* a *Prof. PARLATORE*.
- p. 401. n. 9. *LASERPITIUM nitidum*.
Ex Tyroli australi in montibus di *Molveno*, di *Lanciada*, et di *Turichio* nelle *Giudicarie* a *FACCHINIO*.
- p. 417. n. 1. *TROCHISCANTHES nodiflorus*.
Ex Tyroli australi in sylva supra *Camposilvano* a *FACCHINIO*.
- p. 429. n. 3. *HERACLEUM elegans*.
Ex *Vette di Feltre* prope *Malga Pietena* a *FACCHINIO*.
- p. 431. n. 5. *HERACLEUM Panaces*.
Ex Tyroli australi in alpinis *della Beca* a *FACCHINIO*.
- p. 433. n. 6. *HERACLEUM Pollinianum*.
H. palmatum Baumg. En. stirp. Trans. 1. p. 215.
Fisch. Ind. septim. in animad. bot. p. 49.

Ex Tyroli Italico in alpinis di *Fiemme*, et *Fassa*,
et ex *Vette di Feltre* a FACCHINIO, iterum ex
Vette di Feltre a MONTINIO, ex Apennino Lu-
censi al *Solco di Biagio* prope il *Rondinaio* a
GIANNINIO.

p. 445. n. 3. *TORDYLIUM apulum*.

Ex monte Pisano inter sata a Prof. PUCCINELLIO,
ex arvis circa Florentiam ab Eq. RICCASOLO.

p. 469. n. 1. *HLADNIKIA golacensis*.

Ex alpe *Campogrosso di Vallarsa* Tyrolis australis
a FACCHINIO.

p. 473. n. 1. *MOLOPOSPERMUM cicutarium*.

Ex Tyroli australi in valle di *Breguzzo* nelle *Giu-
dicarie* a FACCHINIO.

p. 496. n. 2. *TAMARIX africana*.

Ex Argentario a Prof. RICCASOLO, ex Igilio a Prof.
PARLATORE.

p. 499. n. 1. *TELEPHIUM Imperati*.

Ex valle *Venosta* supra castrum di *Castelbel* a
FACCHINIO.

p. 501. n. 1. *CORRIGIOLA litoralis*.

Ex olivetis *Albingsunensibus* in Liguria occidua a
Prof. GHERARDIO.

p. 514. n. 6. *STATICE Limonium*.

Ex *Apulia a Tresanti* ab Eq. GUSSONIO.

p. 524. n. 15. *STATICE echioides*.

Ex maritimis *Intemelii* in Liguria occidua a Prof.
GHERARDIO.

p. 560. n. 1. *ALDROVANDA vesiculosa*.

Ex fossis circa arcem di *Legnago* a ROCCHETTIO.

p. 565. n. 1. *SIRBALDIA procumbens*.

Ex *Speluga* in *Rhætis* a RAINERO.

p. 609. n. 1. *IRIS Chamæiris*.

I. *Chamæiris Sav. Pietr. in Notiz. storic. dell' Accad.
Valdarn. p. 51. tab. 1.**

Ex Ducatu Lucensi a Prof. PUCCINELLIO.

Iris lutescens Lamck. est species diversa. Eam obti-
nui ex horto regio Parisiensi, et bis floruit in
horto Bononiensi. Gaudet statura *Iridis pumilæ*
L., habet ovarium cum tubo perigonii florentis
brevius spathis, et ipsum perigonium pallidis-
sime ochroleuco-albens.

p. 611. n. 6. *SESLERIA tenella*.

Ex *Val furva* prope *Bormio* supra *S. Caterina* in
Valtellina a DE SALIS, ex alpe dei *Monzoni* in
Fassa a FACCHINIO.

- p. 612. n. 9. *SAGINA maritima*.
S. maritima Guss. Syn. 1. p. 209.*
 Ex Sicilia in arenosis, et viis ab Eq. GUSSONIO.
- p. 612. n. 11. *ARETIA helvetica*.
 Ex monte *Bondon* districtus Tridentini a FACCHINIO.
- p. 613. n. 12. *ULMUS major*.
 Ex Piceno in radicibus montis *Sibilla*, et a *Rubiano* prope *Montefortino* a MARZIALETTO.

Additamenta ad volumen quartum.

- p. 5. n. 2. *GALANTHUS Imperati*.
 Ex Apennino Lucaniae a GASPARRINIO.
- p. 28. n. 1. *ALLIUM Ampeloprasum*.
A. multiflorum Ten. Syll. p. 164. n. 4.*
A. adscendens Ten. Syll. p. 164. n. 5.*
 Ex regno Neapolitano, et ex insula Caprearum ab Eq. Prof. TENORIO.
 Utrumque exemplar Tenoreanum est in statu macro. Scapus superne scaber, vel glaber, radii laterales umbellæ erecti, vel adscendentes sunt lusus obvii in hac specie. Archetypum *Allii adscendentis* fideliter restitui Cl. Tenorio.
- p. 29. n. 2. *ALLIUM sphaerocephalon*.
 Legi in insula Palmaria portus Lunæ. Habui ex Etruria in valle Tiberina ab AMIDEO, ex arvis Prætutiorum, et Samnii ab Eq. Prof. TENORIO.
- p. 30. var. β .
 Ex collibus Neapolitanis ab Eq. Prof. TENORIO.
- p. 33. n. 5. *ALLIUM vineale*.
A. lineare Ten. Nap. 1. p. 154.,* et Syll. p. 164. n. 3. *A.** pl. florifera.
 Ex sylvis Calabriae ab Eq. Prof. TENORIO.
- p. 36. n. 8. *ALLIUM pallens*.
 Ex agro Volaterrano, et ex valle Tiberina ab AMIDEO, ex herbis Prætutiorum, et Gargani ab Eq. Prof. TENORIO.
- p. 43. n. 13. *ALLIUM Schanoprasum*.
 Ex Cenisio tam flore roseo, quam albo a BONJEANNIO.
- p. 47. n. 18. *ALLIUM subhirsutum*.
 Ex Etruria a Grosseto, et in Argentario ab Eq. RICCASOLO.
- p. 49. n. 20. *ALLIUM suaveolens*.
A. suaveolens Puccin. Syn. pl. Lucens. p. 182.* tab.

Veronà in monte *Pastello* a MANGANOTTO, ex districtu Brixienti a Tremosine, et ex valle di Cherle in Vallarsa Tyrolis australis a FACCHINIO, ex Petra pertusa (*Furlo*) a FEDERICIO, ex Apennino Lucensi al Rondinaio a GIANNINIO.

p. 51. n. 21. *ALLIUM fallax*.

A. fallax Puccin. Syn. pl. Lucens. p. 184.*

A. angulosum Ten. Syll. p. 168. n. 22.*

A. senescens Ten. Nap. 1. p. 166.,* et Syll. p. 168. n. 23.*

Ex paludosis di Mezzotedesco Tyrolis a FACCHINIO, ex Apennino Lucensi al Rondinaio a GIANNINIO, ex montibus Pratutiorum, Apuliæ, et Calabriae ab Eq. Prof. TENORIO.

p. 53. n. 22. *ALLIUM roseum*.

A. roseum Moris. et De Not. Capr. p. 129.*

p. 54. var. β .

Habui speciem sub nomine *Alii majalis* ex Apulia ab Eq. Prof. TENORIO, ex Igilio ab Eq. RICCASOLO, ex Capraria ab Eq. Prof. MORISIO, et a Prof. DE NOTARIS, varietatem β ex arvis Neapolitanis ab Eq. Prof. TENORIO.

p. 61. n. 28. *ALLIUM siculum*.

Trigonea sicula Parl. in Diar. l'Occhio ann. 1839. n. 22. p. 162.

Nectaroscordum siculum Lindl. in Bot. reg. v. 22. tab. 1913. Parl. Pl. nov. vel min. not. p. 28.

p. 61. n. 29. *ALLIUM nigrum*.

A. Cyrilli Ten. Nap. 3. p. 364.,* et Syll. p. 165. n. 7.*

Ex Liguria occidua a Diano ad Niczam a Prof. GHERARDIO, ex campis Apuliæ ab Eq. Prof. TENORIO, et ab Eq. GUSONIO.

p. 65. n. 31. *ALLIUM ursinum*.

Ex Liguria occidua in montanis di Cogoletto, Arenzano, et Sporotino a Prof. GHERARDIO, ex Superga prope Augustam Taurinorum ab Eq. RICCASOLO.

p. 70. n. 3. *LILIUM Pomponium*.

Ex alpinis maritimis circa Sospello a Prof. GHERARDIO.

p. 82. n. 4. *TULIPA Clusiana*.

Ex agro Maceratensi ab Eq. NARDUCCIO, Florentiâ a Poggio Imperiale ab Eq. RICCASOLO.

p. 95. n. 6. *ORNITHOGALUM umbellatum*.

O. contortum Ten. Syll. app. p. 595.*

Senogallià a SALVATORIO, ex Piceno a Montefortino, et a Capo di Tenna a MARZIALETTO, ex regno Neapolitano a Fojo di Potenza ab Eq. Prof. TENORIO.

p. 105. n. 2. *SCILLA hyacinthoides*.

Volaterris in marginibus agrorum ad occidentem ab AMIDEO.

p. 116. n. 1. *ASPHODELUS luteus*

Ex Andria, et Barletta in Apulia ab Eq. GUSSONIO.

p. 122. n. 5. *ASPHODELUS albus*.

Observavi copiosissimum in Apennino Florentino in viciniis del Covigliaio. Habui ex Tyroli australi alla Beca contra Roveredo, et a Costabella di Primiero a FACCHINIO, ex Piceno a Castel Marnardo all' Ara del re a MARZIALETTO.

p. 131. n. 1. *BULBINE planifolia*.

Ex Etruria in collibus d' Orbetello, et Ansidonia, et in monte Argentario a Ronconali a Prof. PARLATORE, et ab Eq. RICCASOLO.

p. 148. n. 2. *ASPARAGUS officinalis*.

Ex Tyroli australi in viciniis di Marano, Bolzano, et supra Egna a FACCHINIO.

p. 158. n. 3. *HYACINTHUS ciliatus*.

Ex Apulia inter sata prope Foggia ab Eq. GUSSONIO.

p. 167. n. 6. *MUSCARI parviflorum*.

Ex maritimis Panormitanis a TODARO.

p. 169. n. 1. *APHYLLANTHES monspeliensis*.

Ex Liguria occidua ab Eq. RICCASOLO.

p. 184. n. 10. *JUNCUS trifidus*.

Ex Piceno in montibus della Sibilla alla Corona a MARZIALETTO.

p. 188. n. 12. *JUNCUS capitatus*.

Ex Etruria a Careggi a BARONIO fil.

p. 212. n. 6. *LUZULA spadicea*.

Ex Tyroli australi in Valsugana, et ex Vette di Feltre a MONTINIO.

p. 214. n. 7. *LUZULA lutea*.

L. lutea Puccin. Syn. pl. Lucens. p. 199.*

Ex alpinis maritimis al Col delle Finestre ab Eq. Prof. MORISIO, ex Apennino Lucensi al Rondinaio a GIANNINIO.

p. 225. n. 1. *LORANTHUS europæus*.

Ex quercetis Porrectanis in provincia Bononiensi a PIRAZZOLIO.

- p. 227. n. 1. *FRANKENIA laevis*.
*F. laevis Moris. et De Not. Capr. p. 19.**
 Manfredoniâ ab Eq. GUSONIO, ex Capraria ab Eq.
 Prof. MORISIO, et a Prof. DE NOTARIS.
 In plagis calidioribus immo Italim folia fiunt cras-
 siora, tamen glabra.
- p. 229. n. 3. *FRANKENIA pulverulenta*.
 Genuâ inter saxa al *Molo vecchio*, ubi ego quoque
 olim legeram, a Prof. DE NOTARIS, Manfredo-
 niâ ab Eq. GUSONIO.
- p. 231. n. 1. *PEPLIS Portula*.
 Ex Etruria a Prof. PETRO SAVIO.
- p. 244. n. 9. *RUMEX bucephalophorus*.
 Ex Igilio ab Eq. RICCASOLO.
- p. 265. n. 1. *TRIGLOCHIN palustre*.
*T. palustre Puccin. Syn. pl. Lucens. p. 203.**
 Ex Apennino Lucensi prope *S. Pellegrino* a Prof.
 PUCCINELLIO.
- p. 266. n. 2. *TRIGLOCHIN laxiflorum*.
 Panormo a Prof. PARLATORE.
- p. 267. n. 3. *TRIGLOCHIN Barrelieri*.
 Ex Etruria ad stamnum d' *Orbetello* ab Eq. RIC-
 CASOLO.
- p. 276. n. 2. *COLCHICUM Bivona*.
 Panormo a Prof. PARLATORE.
- p. 304. n. 10. *EPILOBIUM trigonum*.
 Ex valle di *Portole* in Vicetinis a MONTINIO, ex
Vette di Feltre a Pietena a FACCHINIO.
- p. 307. n. 13. *EPILOBIUM alpinum*.
 Ex Tyroli australi a *Montalon* in *Valsugana*, et ex
 lacu delle *Buse di Fiemme* a MONTINIO.
- p. 316. n. 3. *VACCINIUM Vitis Idæa*.
V. sive Vitis Idæa Girard. De Uva urs. p. 17. tab. 2.
 Ex Cenisio a BONJEANNIO, ex *Corno alla scala* in
 Apennino Bononiensi a PIRAZZOLIO.
- p. 321. n. 1. *ERICA arborea*.
 Ex Tyroli australi prope *Castello Lodron nelle Giu-
 dicarie* a FACCHINIO, ex Etruria in *Maremma*,
 et ex Ilva in monte *Orello* prope *Portoferraio*
 ab Eq. RICCASOLO.
- p. 323. n. 2. *ERICA scoparia*.
 Ex Ilva ab Eq. RICCASOLO.
- p. 324. n. 3. *ERICA multiflora*.
 Ex Etruria in *Maremma*, et in *Argentario* ab Eq.
 RICCASOLO.

- p. 332. n. 1. *DAPHNE Mezereum*.
D. mezereum Puccin. *Syn. pl. Lucens.* p. 211.*
 Ex Piceno a Capo di Tenna a MARZIALETTO, ex Ducatu Lucensi al Rondinaio a GIANNINIO.
- p. 337. n. 4. *DAPHNE glandulosa*.
 Ex Prætutius in monte Intermesole ab Eq. GUSSONIO.
- p. 338. n. 5. *DAPHNE Cneorum*.
 Ex montibus di Lugano in Insubria Helvetica a LAGGERO.
- p. 340. n. 6. *DAPHNE collina*.
 Ex Etruria in collibus di Piombino, et in Argentario ab Eq. RICCASOLO, et a Prof. PARLATORE.
- p. 341. n. 7. *DAPHNE Gnidium*.
 Niccà inter Torretta, et Contes a DURANDO, ex Igilio ab Eq. RICCASOLO.
- p. 344. n. 1. *PASSERINA hirsuta*.
P. hirsuta Moris. et De Not. *Capr.* p. 116.*
 Ex Etruria in litore di Piombino ab Eq. RICCASOLO, ex Capraria ab Eq. Prof. MORISIO, et a Prof. DE NOTARIS.
- p. 351. n. 1. *ACER Pseudo-Platanus*. Adde
 β samaris convergentibus, alis latioribus, superimpositis.
Acer macropterum Guss. *Pl. sicc.**
 Habui hanc varietatem ex regno Neapolitano ab Eq. GUSSONIO.
 Samararum alæ semiobovatae, pollicem longæ, superne octo-decem lineas latæ, sibi invicem superimpositæ.
- p. 354. n. 3. *ACER Lobelii*. Adde.
 β foliis cordatis, subtus pubescentibus.
 Habui hanc varietatem ex udis, umbrosis, et ex apricis saxosis Lucanis prope Castelgrande a GASPARRINIO.
- p. 363. n. 3. *MOHRINGIA papulosa*.
 Ex Petra pertusa (*Furlo*) a Prof. OCTAVIANIO, et a FEDERICIO.
- p. 383. n. 15. *POLYGONUM controversum*.
 Ex arvis ad Barium a DE NICCOLO.
- p. 386. n. 19. *POLYGONUM alpinum*.
P. alpinum Puccin. *Syn. pl. Lucens.* p. 215.*
 Ex Insubria Helvetica in valle Colla pagi Ticinensis a LAGGERO, ex pratis di Novena prope la Speluga in Rhætis a RAINERO, ex Apennino Lucensi al Rondinaio a GIANNINIO.

- p. 393. n. 1. *ADOXA Moschatellina*.
Mediolano socus torrentem *Seveso* ab Eq. RICCASOLO, ex sylvis editioribus Catriz a FEDERICIO, ex Etruria in monte *Sinario* prope cœnobium a BARONIO fil., et alla *Falterona* a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO.
- p. 407. n. 1. *CERCIS Siliquastrum*.
Ex *Rivalta* in districtu Veronensi, et ex monte *Brion* Tyrolis australis ad septentrionem Benaci a FACCHINIO, ex Argentario ab Eq. RICCASOLO.
- p. 409. n. 1. *DICTAMNUS albus*.
Sarzanâ in sylvis di *Camisano* a LUCCABINIO.
- p. 412. n. 1. *Ruta graveolens*.
Ex montibus ad oram occidentalem Benaci in districtu Brixienti, et ex Tyroli australi in districtu di *Riva* a FACCHINIO, Manfredoniâ ab Eq. GUSSONIO.
- p. 414. n. 2. *Ruta chalepensis*.
A Nicmâ ad Monœcium a DURANDO, ex radicibus montis Anconitani ad maq. ab Eq. NARBUCCIO.
- p. 422. n. 1. *TRIBULUS terrestris*.
T. terrestris *Moris. et De Not. Capr. p. 30.**
Ex arenosis ad Fossam Clodium ai *Bozzatini* a Prof. NACCARIO, ex Capraria ab Eq. Prof. MORISIO, et a Prof. DE NOTARIS.
- p. 424. n. 1. *MOXOTROPA Hypopitys*.
Ex Spinali Tyrolis australis a FACCHINIO. Ex Etruria a *Monte Sinario* ab Eq. RICCASOLO.
- p. 432. n. 1. *ARBUTUS Unedo*.
Ex Etruria in sylvis del *Chianti* ab Eq. RICCASOLO.
- p. 436. n. 3. *ARBUTUS Uva ursi*.
Uva nrsi *Girard. De Uv. urs. p. 12. tab. 1. optim.*
- p. 447. n. 1. *CHRYSOSPLENIUM alternifolium*.
Ex viciniis Mediolani ad fossas ab Eq. RICCASOLO.
- p. 452. n. 2. *SAXIFRAGA Aizoon*.
Ex montibus Bergomensibus, ubi copiosissima, a Prof. MORETTIO, ex *Primiero* Tyrolis, et ex finibus Tyrolensibus, Belunensibus, et Feltrinibus a FACCHINIO, ex Etruria all' *Alvernia* a CLERICO.
- Folia rosularum dantur etiam tripollicaria, pro ut sunt in exemplari Tyrolensi a FACCHINIO.
- p. 456. n. 4. *SAXIFRAGA cochlearis*.
Ex Col di *Tenda* in editis a Prof. MORETTIO.
- Flor. Ital. T. V.*

- p. 458. n. 6. *SAXIFRAGA mutata*.
Ex Tyroli Italico orientali, et occidentali a FACCHINIO.
- p. 464. n. 10. *SAXIFRAGA squarrosa*.
Ex Tyroli australi in alpe di Tesin in Valsugana,
et in alpe di Cimonega prope le Vette di Feltre
a MONTINIO, in finibus Tyrolis cum alpinis
Carnicis a FACCHINIO.
Calyx ludit glaber, et pilosulus.
- p. 468. n. 13. *SAXIFRAGA burseriana*.
Ex summo monte Bondon in districtu Tridentino
a FACCHINIO.
- p. 471. n. 16. *SAXIFRAGA aspera*.
Ex Apennino Lucensi al Rondinaio a GIANNINIO.
- p. 478. n. 20. *SAXIFRAGA cuneifolia* β .
S. cuneifolia β Bert. fil. It. in Apenn. Bon. p. 19.
tab. 2. fig. 2.*
Ex Col di Tenda, et ex monte Lesimo Apennini
Placentini a Prof. MORETTIO.
- p. 482. n. 22. *SAXIFRAGA rotundifolia*.
Ex districtu Urbinati alla Pergola a SALVATORIO,
ex Etruria all' Alvernia a CLERICO.
- p. 486. n. 25. *SAXIFRAGA granulata*.
Ex Etruria all' Alvernia a CLERICO.
- p. 490. n. 27. *SAXIFRAGA cernua*.
Ex Sempronio ad nivem deliquescentem a Prof.
MORETTIO.
- p. 491. n. 28. *SAXIFRAGA petræa*.
Ex Tyroli meridionali prope Castel Cornò contra
Roveredo a FACCHINIO.
- p. 494. n. 30. *SAXIFRAGA tridactylites*.
p. 495. var. β .
Ex Etruria circa Florentiam, et in Argentario ab
Eq. RICCASOLO, in plebe S. Stephani, et all' Al-
vernia a CLERICO. Varietatem β habui ex Ty-
roli australi in monte Bondon, et Colsanto a
FACCHINIO.
- p. 498. n. 31. *SAXIFRAGA arachnoidea*.
Ex valle d' Ampola Tyrolis australis a FACCHINIO.
Corolla recens pallide citrina, sicca alba. Petala
ludunt integra, insigniter emarginata, et fere
obcordata, rarius tridentata. Debeo hæc dili-
gentissimo Facchinio.
- p. 500. n. 33. *SAXIFRAGA Seguierii*.
Ex Tyroli australi in alpe Colern inter Val di so-
le, et Val d' Ulten a FACCHINIO.

p. 501. n. 34. *SAXIFRAGA sedoides*.

p. 502. var. β .

Ex alpe *Contrin*, *Vael di Fassa*, et *Plattkofel della Seiseralpe* Tyrolis Italici a FACCHINIO, ex alpe di *Cimones* prope *le Vette di Feltre* a MONTINIO. Varietatem β habui ex pascuis di *Costabella* in Baldo a MANGANOTTO.

Quam plantam ex *Plattkofel* Kochius in Syn. ed. 2.

p. 303. indicat sub nomine *Saxifragæ planifolia* β , videtur pertinere ad *Saxifragam sedoidem* L. Facchinus hanc tantum ibi reperit.

p. 503. n. 35. *SAXIFRAGA stenopetala*.

Ex monte *Rosa* in vertice *Ollen* dicto, et ex *Speluga* in Rætis a Prof. MORETTIO, ex *Stelvio* in *Valtellina* supra *Franzenshoehe* a FACCHINIO.

p. 505. n. 37. *SAXIFRAGA moschata*.

S. moschata Puccin. Syn. pl. Lucens. p. 225.*

Ibid. var. β .

Ex *Stelvio*, et *Braulio* in *Valtellina*, et ex valle *Venosta* Tyrolis anstralis a FACCHINIO, ex *Montalon*, et *Tesin* in *Valmugana*, et ex *Vette di Feltre* a MONTINIO, ex Apennino Lucensi al *Rondinaio* a GIANNINIO. Varietatem β ex pascuis di *Montalon* a MONTINIO.

p. 510. n. 39. *SAXIFRAGA oppositifolia*.

S. oppositifolia Puccin. Syn. pl. Lucens. p. 225.*

Ex Apennino Lucensi al *Rondinaio* a GIANNINIO.

p. 515. n. 1. *SCLERANTHUS annuus*.

Ex Etruria all' *Impruneta*, et in prato d' *Arno* prope Florentiam a BARONIO fil.

p. 519. n. 1. *GYPHOPHYLA Vaccaria*.

Ex districtu Tridentino supra *Sardagna*, ex viciniis di *Roveredo*, et ex finibus Tyrolensibus cum districtu Brixienti, et Veronensi a FACCHINIO, ex Etruria all' *Impruneta* a BARONIO fil.

Ad hanc speciem, ni fallor, pertinet figura sub nomine *Ephemero* Matth. Valgr. 1585. tom. 2. p. 1169., quæ videtur ab alio intrusa, cum *Ephemerum* vallis Ananiz, sive *Giglio matto*, de quo Matthiolus loquitur in hoc capite, sat evidenter spectet ad *Iridem tuberosam* L.

p. 526. n. 7. *GYPHOPHYLA saxifraga*.

p. 527. var. β .

Nicisâ in monte *Boron* a DURANDO, ex agro Basanensi in muris vetustis a MONTINIO, ex Etruria

a *Rocca di Cecina* ab AMIDEO. Varietatem β ex Etruria ab Eq. RICCASOLO, ex collibus asperis Lucanis a GASPARRINIO.

p. 530. n. 1. *SAPONARIA ocymoides*.

Filius attulit ex collibus Bononiensibus di *Zolla predosa*. Habni Niccà in valle *Magnan* a DURANDO, ex Liguria occidna, et ex viciniis Augustæ Taurinorum ab Eq. RICCASOLO, ex Etruria all' *Alvernia* a CLEBICO.

Ludit flore albo, ut erant exemplaria Bononiensia a filio allata.

p. 539. n. 1. *VELEZIA rigida*.

Ex Etruria a *Monte Ceceri*, et all' *Impruneta* a BARONIO fil.

p. 542. n. 2. *DIANTHUS Carthusianorum*.

p. 543. var. π .

Ex omni Tyroli Italico a FACCHINIO, ex Etruria ab Eq. RICCASOLO. Varietatem π ex Tyroli australi ad sepes prope il *Borgo di Valsugana* a MONTINIO.

p. 547. n. 3. *DIANTHUS Armeria*.

Ex Lucania prope *Castelgrande* a GASPARRINIO.

p. 549. n. 4. *DIANTHUS prolifer*.

Ex Tyroli meridionali in districtu di *Trento, Bolzano*, et *Roveredo* a FACCHINIO, ex Etruria ab Eq. RICCASOLO, ex siccis Lucanis a GASPARRINIO.

p. 559. n. 11. *DIANTHUS monspessulanus*.

Ex subalpinis di *Primiero*, et alle *Tre croci* in *Ampezzo* prope fines Belunenses a FACCHINIO, ex Etruria in monte *Sinario*, et alla *Vernia* ab Eq. RICCASOLO.

p. 562. n. 13. *DIANTHUS superbus*.

Ex montibus di *Tesin* in *Valsugana* a MONTINIO.

p. 571. n. 1. *SILENE gallica*.

Venetis a *S. Niccolò di Lio* a Prof. NAOCARIO, ex Igilio ab Eq. RICCASOLO.

p. 580. n. 7. *SILENE sericea*.

Ex Etruria a *Orbetello* a Prof. PARLATORE, et ab Eq. RICCASOLO.

p. 593. n. 18. *SILENE nutans*.

Ex Piceno in *Vettore* ab ORSINO.

p. 596. n. 20. *SILENE Catholica*.

Ex Lucania in umbrosis prope *Castelgrande* a GASPARRINIO.

- p. 599. n. 22. *SILENE italica*.
Ex districtu Veronensi prope Grezzana à MANGANOTTO, ex Piceno in Vettore ab ORSINO, ex Etruria all' Alvernia a CLERICO.
- p. 601. n. 23. *SILENE Salzmanni*.
S. italica Moris. et De Not. Capr. p. 20.*
Ex Capraria ab Eq. Prof. MORISIO, et a Prof. DE NOTARIS.
- p. 602. n. 24. *SILENE paradoxa*.
Ex Piceno in adscensu di Pomaro supra l' Acquasanta ab ORSINO.
- p. 607. n. 29. *SILENE conica*.
Ex litore Pisaurensi ab Eq. RICCASOLO.
- p. 612. n. 35. *SILENE cretica*.
Ex Piceno in cultis prope portum S. Elpidii ab Eq. NARDUCCIO, ex Etruria a Poggio a Caiano inter linum a BARONIO fil.
- p. 616. n. 39. *SILENE saxifraga*.
Ex rupestribus vallis Frigidæ Baldi a MANGANOTTO, ex Apennino della Cattria a FEDERICIO, ex Apennino Lucensi al Rondinaio a GIANNINIO.
- p. 619. n. 41. *SILENE rupestris*.
S. rupestris Puccin. Syn. pl. Luc. p. 231.*
Ex Apennino Lucensi al Rondinaio a GIANNINIO.
- p. 620. n. 42. *SILENE alpestris*.
Ex alpinis Tridentinis, et Roboretanis, et ex alpinis di Fassa a FACCHINIO, ex alpe Cimonega prope le Vette di Feltre a MONTINIO.
- p. 621. n. 43. *SILENE quadrifida*.
S. quadrifida Puccin. Syn. pl. Luc. p. 231.*
Ex vertice Baldi supra vallem Delle ossa a MANGANOTTO, ex alpe di Tesin in Valsugana, et ex alpe Cimonega a MONTINIO, ex Apennino Lucensi alla Lamaccia a GIANNINIO.
- p. 630. *SILENE inflata* β.
Ex Etruria ab Eq. RICCASOLO.
- p. 634. n. 51. *SILENE lanuginosa*.
Ex Ducatu Lucensi alle Grotte supra Cardoso prope Palodina a GIANNINIO.
- p. 640. n. 56. *SILENE acaulis*.
Ex Baldo a Costa bella a MANGANOTTO.
- p. 647. n. 3. *STELLARIA Holostea*.
S. Holostea Puccin. Syn. pl. Luc. p. 232.*
Ex Apennino Lucensi al Solco di Biagio a GIANNINIO.

- p. 650. n. 5. *STELLARIA uliginosa*.
Ex *Montalon* in *Valsugana* a MONTINIO.
- p. 653. n. 8. *STELLARIA saxifraga*.
S. *saxifraga* Puccin. *Syn. pl. Luc. p. 233.**
Ex *Apennino Lucensi al Rondinaio* a GIANNINIO.
- p. 658. n. 3. *ARENARIA trinervia*.
Ex *Argentario* ab Eq. RICCASOLO.
- p. 670. n. 13. *ARENARIA verna*.
Ex *Apennino Lucensi al Rondinaio* a GIANNINIO.
- p. 679. n. 18. *ARENARIA polygonoides*.
Ex *Tyroli Italico* in *alpinis di Crespeina* in *Gardena* a FACCHINIO.
- p. 682. n. 21. *ARENARIA rubra*.
A. *rubra* Bert. *Mant. Fl. Apuan. p. 30. n. 47.*
- p. 685. n. 22. *ARENARIA marina* β .
Ex *Liguria occidua* ab Eq. RICCASOLO.
- p. 688. n. 1. *CHELERIA sedoides*.
Ex *Baldo a Coval* sesto a MANGANOTTO.
- p. 691. n. 1. *COTYLEDON Umbilicus*.
Ex *Etruria* in *muris*, et *tectis* ab Eq. RICCASOLO.
- p. 692. n. 2. *COTYLEDON horizontalis*.
Ex *Igilio* ab Eq. RICCASOLO.
Non est varietas præcedentis, ut habet Ill. Morisius in *Fl. Sard. 2. p. 132*. Nimis multa sunt, quæ speciem hanc distinguunt. Confer descriptionem nostram l. c.
- p. 704. n. 11. *SEDUM reflexum*.
Ex *Caserta prope la Cascata* ab Eq. GUSSONIO.
- p. 705. n. 12. *SEDUM albescens*.
Ex *montibus di Castellamare* ab Eq. GUSSONIO.
- p. 717. n. 22. *SEDUM villosum*.
Ex *Tyroli Italico* a FACCHINIO.
- p. 719. n. 24. *SEDUM saxatile*.
Ex *Montalon* in *Valsugana*, et ex *Portole Vicetina* a FACCHINIO.
- p. 727. n. 2. *OXALIS corniculata*.
Ex *Etruria* in *Chianti* ab Eq. RICCASOLO.
- p. 762. n. 10. *CERASTIUM alpinum*.
Ibid. var. β .
Ex *Baldo* in *valle delle Busette* a MANGANOTTO.
Varietatem β ex *collibus Veronæ* proximis, et ex *Baldo* in *valle delle Busette* ab eodem.
- p. 772. n. 1. *SPERGULA arvensis*.
Ex *Igilio* ab Eq. RICCASOLO.

- p. 776. n. 5. *SPERGULA subulata*.
Ex viciniis Mediolani a RAINERO, ex Etruria in
humantibus prope Pisciam a Prof. PETRO SAVIO.
- p. 777. n. 7. *SPERGULA glabra*.
Ex Apennino Pistoriensi a Prof. PETRO SAVIO.
- p. 779. n. 1. *ROMULEA Linaresii*.
Dele, et transfer ad *Romuleam Bulbocodium* π
nostram.
Habui Panormo alla *Vergine Maria*. Diligens To-
darus me monuit, se interdum deprehendisse in
Romulea Linaresii Parl. stilum staminibus lon-
giorem, ex quo patet esse varietatem *Romuleam*
Bulbocodii.
- p. 779. n. 2. *ELEOCHARIS multicaulis*.
Ex turfaccis ad paludem Blentinensem, ubi copio-
sissima, a Prof. PETRO SAVIO.

Additamenta ad volumen quintum.

- p. 22. n. 1. *AREMONIA agrimonoides*.
Ex Piceno in monte della *Sibilla alla Valloria* a
MARZIALETTO, ex Etruria alla *Falterona*, et a
Camaldoli a Prof. ANT. TARGIONIO-TOZZETTIO,
et in semita, quæ ducit ad Camaldulenses, a BA-
RONIO fil., in provincia Aretina in sylvis di Straz-
zano a CLERICO.
- p. 316. n. 1. *PAPAVER hybridum*.
Ex monte Pisano inter segetes a Prof. PETRO SAVIO.
- p. 341. n. 2. *CISTUS incanus*.
Ex collibus maritimis Etruriæ a Prof. PETRO SAVIO,
ex Igilio ab Eq. RICCASOLO.
- p. 345. n. 4. *CISTUS albidus*.
Nicaea a DURANDO.
- p. 352. n. 1. *HELIANTHEMUM halimifolium*.
Ex maritimis Etruriæ prope Bonoratico a Prof. PE-
TRO SAVIO.
- p. 353. n. 2. *HELIANTHEMUM lavipes*.
Ex Argentario a Prof. PARLATORE, et ab Eq. RIC-
CASOLO.
- p. 358. n. 4. *HELIANTHEMUM alpestre*.
Ex Etruria in collibus calcariis prope Campiglia a
Prof. PETRO SAVIO.
- p. 362. n. 6. *HELIANTHEMUM rubellum*. Adde
 β foliis superioribus utrinque cano-tomentosis, ra-
cemo breviter pedunculato.

- Helianthemum nebrodense* Guss. Syn. 2, p. 18.
Heldr. in Ann. degli Aspir. nat. tom. 1, p. 284.
Suffr. Habui hanc varietatem ex Nebrodibus a
Queccedda a Prof. PARLATORE.
- p. 365. n. 8. *HELIANTHEMUM Tuberaria*.
 Ex radicibus montis Pisani a Prof. PETRO SAVIO.
- p. 366. n. 9. *HELIANTHEMUM guttatum*.
 Ex Ansidonia, et Igilio ab Eq. RICCASOLO.
- p. 370. n. 11. *HELIANTHEMUM salicifolium*.
 Ex Etruria a Orbetello ab Eq. RICCASOLO.
- p. 375. n. 15. *HELIANTHEMUM thymifolium*.
 Ex Etruria in tumulis arenosis prope Bonoratico
 a Prof. PETRO SAVIO, ex Argentario ab Eq. RICCASOLO, ex eodem monte, et ex insula Caprea-
 rum a Prof. PARLATORE.
- p. 378. n. 16. *HELIANTHEMUM Savii*.
 Ex Argentario alla Torre della punta ab Eq. RICCASOLO.
- p. 380. n. 19. *HELIANTHEMUM vulgare*.
- p. 381. var. β .
 Ex insula Caprearum a Prof. PARLATORE, varietatem β ex Vesuvio ab eodem, Niccà a DURANDO.
- p. 392. n. 1. *PEONIA officinalis*.
 Ex Ducatu Lucensi in pratis di Palodina a GIANNINIO.
- p. 415. n. 1. *ACONITUM Anthora*.
 Veronà in monte Pastello a MANGANOTTO, ex Tyroli meridionali in monte Broccon di Valsugana a FACCHINIO.
- p. 417. n. 2. *ACONITUM Lycoctonum*.
 Ex Tyroli occidentali supra Molven, et ex Tyroli Italico in Fassa, et Gardena a FACCHINIO.
- p. 420. n. 3. *ACONITUM Napellus*.
 Ex Tyroli Italico in montanis di Fassa a FACCHINIO.
- p. 423. n. 4. *ACONITUM variegatum*.
 Ex Tyroli australi in Valsugana prope Rezze, et ex Glochner in Pusteria orientali Tyrolis Italici a FACCHINIO.
- p. 426. n. 6. *ACONITUM cernuum*.
 Ex Tyroli Italico in Fiemme prope Moena a FACCHINIO.
- p. 431. n. 2. *AQUILEGIA alpina*.
 Ex Apeunino Lucensi al Rondinaio a GIANNINIO.
- p. 443. n. 1. *ANEMONE Hepatica*.
 Veronà in sylva del Mantico a MANGANOTTO.

- p. 450. n. 5. *ANEMONE ranunculoides*.
Ex valle *Novesa* montis Baldi a MANGANOTTO.
- p. 455. n. 8. *ANEMONE coronaria*.
Ex collibus ad Benacum a FONTANA, ex campis
prope Urbinum a FEDERICIO.
- p. 463. n. 13. *ANEMONE Pulsatilla*.
Veronâ in sylva del *Mantico* a MANGANOTTO.
- p. 465. n. 14. *ANEMONE alpina*.
Ex Baldo a Costabella a MANGANOTTO.
- p. 469. n. 1. *ATRAGENE alpina*.
Ex valle *Novesa* montis Baldi a MANGANOTTO.
- p. 475. n. 4. *CLEMATIS Flammula*.
Ex sylva Pisana, et ex *Montecarlo* a Prof. PETRO
SAVIO.
- p. 482. n. 3. *THALICTRUM minus*.
Ex Apennino Lucensi al *Prato fiorito* a DURANDO.
- p. 486. n. 6. *THALICTRUM flavum* β .
Nicmâ in pratis ad Varum a DURANDO, ex fossis
agri Pisani a Prof. PETRO SAVIO.
- p. 499. n. 2. *RANUNCULUS ophioglossifolius*.
R. ophioglossifolius *Engl. bot. Sup. 3. tab. 2833*.
- p. 503. n. 6. *RANUNCULUS gramineus*.
Ex Piceno al *Pian grande di Castelluccio* ab ORSINO.
- p. 510. n. 11. *RANUNCULUS Thora*.
Ex valle *Novesa* montis Baldi a MANGANOTTO.

SPECIES ADDENDÆ.

1. *FIMBRISTYLIS Cioniana*: puberula; calamo, foliisque filiformibus; umbella subsimplici, pauciradiata; locustis ovatis, centrali sessili; stilo trifido, basi bulboso; nuculis triquetris, transverse rugosis.
F. Cioniana Sav. Petr. Descr. p. 3. cum tab.*
Ann. Habui ex humentibus sylvæ Pisanæ a Palazzetto a Prof. PETRO SAVIO. Floret Julio.
2. *TARTICUM tuberculosum*: locustis alternis, spicatis; valva corollina externa trinervi, granulata.
*Catapodium tuberculosum Moris. in Att. della terz. riun. degli Scienz. Ital. p. 481.**
Ann. Habui ex Sardinia ab Eq. Prof. MORISIO. Floret Aprili, Majo.
3. *SAGINA urceolata*: foliis brevibus, lineari-filiformibus, basi vagina ciliata connatis; floribus apetalis.
*S. urceolata Viv. Fl. Cors. diagn. p. 3.**
Ann. Habui ex montibus Corsicæ australis de herbario Eq. Prof. VIVIANII. Floret Aprili, Majo.
4. *TRACHELIUM lanceolatum*: foliis lanceolatis, acutis, leviter obtusiuscule serratis, basi cuneatis; corymbo terminali, composito, bracteis linearibus.
*T. lanceolatum Guss. Syn. 1. p. 252., et 277.**
Perenn. Habui ex Sicilia in *Val d'Avola*, et *Val di Noto* ab Eq. GUSSONIO. Floret Julio.
5. *THESIUM rostratum*: foliis linearibus; racemo simplici; bracteis monophyllis; perigoniiis quinquefidis, drupa multo longioribus.
Th. rostratum Mert. et Koch. Deuts. Fl. 2. p. 787. Reich. Cent. 5. p. 34. t. 458. f. 650. Spreng. Syst. veg. 4. par. 2. p. 109.
Perenn. Habui ex Tyroli austro-orientali a Primiero in pratis di Fedai a FACCHINIO. Floret Junio, Julio.

6. *GENTIANA nana*: pusilla; foliis obovatis, laciniis calycinis subæqualibus; corollis tubulosis, fauce barbatis.

G. nana Wulf. in Jacq. Misc. 1. p. 161. t. 18. f. 3. Sturm. Deuts. Fl. 1. abth. 22. heft.

Ann. Habui ex *Glockner* Tyrolis in saxis graniticis ad meridiem a *FACCHINIO*. Floret Julio, Augusto.

7. *CUSCUTA Epilinum*: floribus capitatis; tubo corollæ globoso, laciniis limbi longiore; squamis hipostaminicis adpressis, bipartitis, segmentis palmatis.

C. Epilinum *Veihe* in Arch. der Apothek. 8. p. 51. Reich. Cent. 5. p. 64. t. 500. f. 693. Engl. bot. Sup. 3. tab. 2850.

Ann. Habui ex Tyrolis Italico in *Fiemme*, et *Primiero* parasiticam supra *Linum usitatissimum* L. a *FACCHINIO*. Floret Junio.

8. *NARCISSUS cupularis*: scapo ancipiti; spathis plurifloris; perigonii laciniis ovato-oblongis, apiculatis, flavis, nectarotheca scutellata, crocea, integra triplo longioribus.

N. cupularis Röm. et Schult. Syst. veg. 7. par. 2. p. 970.*
*Puccin. Syn. pl. Lucens. p. 179. cum tab.**

Perenn. Habui ex Ducatu Lucensi a *Montebenelli* a Prof. *PUCCINELLO*, et a Prof. *PETRO SAVIO*. Floret Aprili, Maio.

Folia angusta. Spatha bi-sexiflora.

9. *TULIPA apula*: humilis; foliis inferioribus oblongo-lanceolatis, superioribus lanceolato-linearibus, caule altioribus; sepalorum macula baseos late rhombeo-ovata; antheris longissimis.

T. apula Guss. Pl. sicc.* Ten. App. 5. p. 12.*

Perenn. Habui ex Apulia a *Barletta* ab Eq. *GUSSONIO*. Floret Aprili.

Bulbus fulve eriophorus. Caulis supra terram vix semipedalis. Flos grandis, intus saturate rubro-kermesinus, sepalis tribus externis dorso diu rubro-virentibus, sero rubescentibus, omnium macula baseos grandi, late rhombeo-ovata, e nigro-purpureo cærulescente. Filamenta brevissima, purpureo-cærulea. Antheræ longissimæ, in anthesi plerumque pistillum superantes, flavæ, sæpe in parte superiore polline cassæ, et appendicem lingulatam referentes.

10. *JUNCUS pygmaeus*: calamo, foliisque tenuibus; umbella pauciradiata; involucri inæqualiter diphylo; capitulis subsexfloris, centrali sessili; perigonii acuminatis, striatis, capsula longioribus.

J. pygmaeus Thuill. Paris. ed. 2. tom. 1. p. 178. De Cand. Franc. 3. p. 168. Spr. Syst. veg. 2. p. 104. n. 11.

Ann. Habui ex maritimis Etruriæ prope Populonium a Biserno a Prof. PÉTRO SAVIO. Floret Junio.

Spatha diphylla, foliolo altero brevi, altero elongato. Capitula tri-septemflora. Proximus, sed in omnibus minor *Junco bicephalo* Viv., in quo capitula sunt duotria tantum, duplo grandiora, prædita floribus duplo numerosioribus, et paulo longioribus.

11. VACCINIUM *Oxycoccus*: caule tenui, inferne repente; foliis ovatis, margine revolntis, subtus glaucis; corymbo terminali, paucifloro; corolla retroflexa, quadripartita.

V. *Oxycoccus* Sp. pl. p. 500. Smith. Engl. Fl. 2. p. 221., et Engl. bot. v. 5. t. 319. Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 178. Fl. Dan. tab. 80. Sv. bot. v. 1. tab. 12.

V. n. 1023. Hall. Hist. stirp. ind. Helv. 1. p. 437.

Suffr. Habui ex Tyroli Italico a Bellamonte in Fiemme a FACCHINIO, ex Etruria ad paludem Blentinensem a Pollino d'Orentano, ubi primus omnium in Italia reperit CHIOSTRUS, a Prof. PUCCINELLIO, et a Prof. PÉTRO SAVIO. Floret Majo, Junio.

12. SAXIFRAGA *patens*: foliis rosularum coriaceis, obverse lanceolatis, planis, patentibus, margine poriferis, caulinis alternis, linearibus, ciliatis; floribus breviter pedunculatis, congestis, calycibus basi pilosis.

S. *patens* Gaud. Helv. 3. p. 92.

Perenn. Habui ex monte Rosa, qua descenditur in vallem Gressonei, et ex Sempronio Italico supra Gundo a Prof. MORETTIO. Floret Julio.

Proxima *Saxifragæ casie* L., sed diversa foliis rosularum planis, patentibus, obverse lanceolatis, virentibus, non crustatis, caulinis inter se quam in illa proximioribus, floribus paucis, corymbosis, breviter pedunculatis, congestis, subinde solitariis, calycibus basi tantum pilosis, petalis ochroleucis.

13. SEDUM *nebrodense*: dense hirtum, viscosum; caule cespitoso, ramoso; foliis pulposis, oblongo-spathulatis; floribus corymbosis; stilibus elongatis.

S. *nebrodense* Gasparr. in Rendic. dell' Accad. delle scienz. di Nap. tom. 1. p. 49.* Guss. Syn. 1. p. 518.*

Perenn. Habui ex præruptis Nebrodum a Montesalone a GASPARRINIO. Floret Julio.

Proximum *Sedo dasyphylo* L. Differt, quia totum dense hirtum, et viscosum, gaudet caule ramosiore, foliis

formæ diversæ, basi non solutis, ideo in planta sicca persistentibus, calycibus acutis, stilibus duplo longioribus.

14. *ARENARIA norvegica*: glanduloso-hirtula; caule cæspitoso; foliis sessilibus, lanceolatis, decussatis, numerosis, internodio longioribus; panicula abbreviata.

A. norvegica Engl. bot. Sup. v. 3. tab. 285a.

Stellaria dichotoma Sav. *Due cent. p. 112.** non Linn.

Perenn. Habni ex Etruria a Montieri de herbario Eq. Prof.

CAJ. SAVII a Prof. PETRO SAVIO. Floret Majo.

Caules humiles, cæspitosi, ramosi. Folia sessilia, lanceolata, acuta, uninervia, prope basim sæpe paululum angustata, numerosa, crebra, decussata, internodio longiora. Panicula terminalis, breviter dichotoma, cum pedunculo alari, demum refracto. Foliola calycina nervo mediano conspicuo, lateralibus etiam in sicco obsoletis. Tota planta hirtula, pilis apice glanduliferis.

Arenaria multicaulis Wulf. in Jacq. Collect. 1. p. 248. tab. 17. fig. 1. hujus loci mihi non videtur, licet in Engl. bot. l. c. afferatur ut synonymon. Facies certo diversa, neque ea stirps dissocianda ab *Arenaria ciliata* L.

INDEX

GENERUM, SPECIERUM, et VARIETATUM

QUÆ IN HOC QUINTO VOLUMINE

COMPREHENDUNTUR.

(*Characteres italici habentur synonyma*).

- | | | |
|--|--|--|
| <p>A
 ACKER
 Lobelii β.
 pag. <u>624</u>.
 <i>macropterum</i>
 624.
 PseudoPlatanus
 β <u>624</u>.
 ACONITUM 414.
 <i>acutum</i> <u>420</u>.
 <i>angustifolium</i>
 <u>420</u>.
 Anthora <u>415</u>. 632.
 <i>autumnale</i> <u>421</u>.
 <i>callibotryon</i>
 <u>421</u>. <u>426</u>.
 <i>Cammarum</i> <u>424</u>.
 <i>Cammarum</i> <u>425</u>.
 <i>Cammarum</i> β
 425.
 <i>cernuum</i> <u>426</u>. 632.
 <i>commutatum</i>
 <u>421</u>.
 <i>eulopum</i> <u>416</u>.
 <i>Funkianum</i> <u>420</u>.
 <i>Hoppeanum</i>
 420.
 <i>Jacquini</i> <u>416</u>.
 <i>Jacquinianum</i>
 418.
 <i>Kœleanum</i> <u>420</u>.
 <i>laxum</i> <u>420</u>.</p> | <p>ACONITUM
 <i>Lycoctonum</i>
 <u>417</u>. 632.
 <i>Napellus</i> <u>420</u>. 632.
 <i>Napellus</i> <u>421</u>.
 <i>Napellus Bau-</i>
 <i>hini</i> 421.
 <i>Napellus</i> β 421.
 <i>nasutum</i> <u>425</u>.
 <i>neapolitanum</i> 417.
 <i>neomontanum</i>
 <u>421</u>.
 <i>Neubergense</i> 421.
 <i>paniculatum</i> α.
 β. <u>426</u>.
 <i>paniculatum</i> α
 <i>penninum</i> <u>426</u>.
 <i>pyrenaicum</i> <u>417</u>.
 <i>ranunculifolium</i>
 <u>417</u>.
 <i>taurericum</i> <u>420</u>.
 <u>421</u>.
 <i>tauricum</i> <u>420</u>.
 <u>421</u>.
 <i>Theliphonum</i>
 <u>417</u>.
 <i>variegatum</i>
 <u>425</u>. 632.
 <i>vulgare</i> <u>420</u>.
 ACTEA 305.
 <i>spicata</i> 306.</p> | <p>ADONIS <u>491</u>.
 <i>æstivalis</i> <u>492</u>.
 <i>ambigua</i> <u>493</u>.
 <i>annua</i> <u>492</u>.
 <i>autumnalis</i> <u>492</u>.
 <i>Cupaniana</i> <u>493</u>.
 <i>dentata</i> <u>493</u>.
 <i>distorta</i> <u>495</u>.
 <i>flammea</i> <u>492</u>.
 <i>miniata</i> <u>492</u>.
 <i>pyrenaica</i> <u>495</u>.
 ADOXA
 <i>Moschatellina</i>
 <u>625</u>.
 ÆGILOPS
 <i>neglecta</i> <u>604</u>.
 AGRIMONIA <u>17</u>.
 <i>Agrimonoïdes</i>
 22.
 <i>Eupatoria</i> 18.
 <i>Eupatorium</i>
 19.
 <i>odorata</i> <u>19</u>.
 AGROSTIS
 <i>alpina</i> 601.
 <i>pallida</i> 601.
 AIRA
 <i>agrostidea</i> 601.
 <i>aquatica</i> 601.
 <i>hirsuta</i> 601.
 <i>minuta</i> 601.</p> |
|--|--|--|

- AIZOON** 175.
hispanicum 176.
ALCHEMILLA
alpina 608.
pentaphyllea
608.
vulgaris 607.
ALDROVANDA
vesiculosa 619.
ALLIUM
adscendens 620.
Ampeloprasum
620.
angulosum 621.
Cyrilli 621.
fallax 621.
lineare 620.
multiflorum 620.
nigrum 621.
pallens 620.
roseum 621.
roseum β 621.
Schoenoprasum
620.
senescens 621.
siculum 621.
sphærocephalon
620.
sphærocephalon
 β 620.
suaveolens 620.
subhirsutum 620.
ursinum 621.
vineale 620.
ALOPECURUS
utriculatus 601.
Amelanchier
vulgaris 159.
AMMANIA
verticillata 607.
AMYGDALUS 124.
communis 125.
incana 137.
ANCHUSA
Barrelieri 609.
ANDROROGON
hirtum 602.
ANDROSACE
obtusifolia 609.
ANEMONE 442.
alpina 465. 632.
alpina 454.
alpina β 466.
alpina δ 466.
alpina γ 454.
alpina $\gamma. \epsilon. \xi.$ 466.
apennina 499.
apiifolia 466.
baldensis 454.
baldensis β 453.
Bogenhardiana
463.
burseriana 465.
coronaria 455. 633.
dubia 453.
fragifera 454.
fulgens 458.
Hackelii 462.
Halleri 462.
Hepatica 443. 632.
hortensis 457.
hortensis β 458.
millefoliata 466.
montana 463.
narcissiflora 452.
nemorosa 447.
Oenanthe 455.
palmata 460.
pavonina 458.
pratensis 455.
468.
Pulsatilla 463.
633.
ranunculoides
450. 633.
stellata 457.
sulphurea 461.
466.
trifoliata 445.
vernalis 461.
ANTHOXANTHUM
gracile 601.
APHYLLANTHES
monspeliensis
622.
Apteranthes
Gussoneana
615.
AQUILEGIA 427.
alpina 431. 632.
alpina 432.
atrata 429.
nigricans 429.
pyrenaica 431.
pyrenaica β
432.
viscosa 429.
432.
vulgaris 428.
ARABUTUS
Unedo 625.
Uva ursi 625.
AREMONIA 21.
Agrimonoidea
22. 631.
ARENARIA
marina β 630.
norvegica 637.
polygonoides
630.
rubra 630.
trinervia 630.
verna 630.
ARETIA
helvetica 620.
tomentosa 609.
Argemone
pyrenaica 319.
ARIA
Chamamespilus
161.
nivea 140.
Armeniaca
brigiatiaca
131.

- Aronia**
Amelanchier
 159.
Chamaespilus
 161.
cretica 159.
rotundifolia 159.
- ARUNDO**
Ampelodesmos
 604.
calamagrostis
 604.
Donax 604.
epigejos 604.
litorea 604.
- ASARUM** 3.
enopæum 3.
- ASPARAGUS**
officinalis 622.
- ASPERULA**
cynanchica 606.
odorata 606.
taurina 606.
- ASPHODELUS**
albus 622.
lutens 622.
- ASTRANTIA**
minor 616.
- ASTROCARPUS**
sesamoides 34.
sesamoides 35.
sesamoides β 34.
- ATRAGENE** 468.
alpina 469. 633.
austriaca 469.
- ATROPA**
Belladonna 613.
- AVENA**
argentea 604.
condensata 604.
neglecta 604.
pratensis 604.
pubescens 604.
sempervirens
 604.
- Batrachium**
capillaceum
 575.
heterophyllum
 572.
peltatum 572.
tripartitum a.
 β 575.
- BECKMANNIA**
eruceformis 602.
- BROMUS**
asper 604.
lanceolatus 604.
macrostachys
 604.
- BULBINE**
planifolia 622.
- BUPLEURUM**
cernuum 616.
falcatum 616.
falcatum β 616.
graminifolium
 616.
protractum 616.
ranunculoides
 616.
stellatum 616.
- Callianthemum**
coriandrifolium
 519.
rutafolium 519.
- CALTHA** 595.
palustris 596.
- CAMPANULA**
Alpini 611.
bononiensis 611.
Erinus 612.
fragilis β 612.
garganica 612.
graminifolia
 611.
Lorey 612.
persicifolia 611.
petraea 611.
spicata 611.
- CAPPARIS** 300.
Fontanesii
 304.
orientalis 303.
ovata 304.
peduncularis
 303.
rupestris 302.
sicula 304.
spinosa 301.
spinosa 304.
spinosa β 303.
spinosa inermis
 302.
- Caryophyllata**
montana 292.
reptans 294.
rivalis 290.
urbana 288.
- CENTUNCULUS**
minimus 607.
- CEPHALARIA**
transylvanica
 605.
- CERASTIUM**
alpinum 630.
alpinum β 630.
- Cerasus**
avium 132.
humilis 132.
Mahaleb 129.
Padus 128.
prostrata 137.
- Ceratocephalus**
falcatus 569.
- CERCIS**
Siliquastrum
 625.
- CERINTHE**
aspera 609.
gymnandra
 609.
minor 609.
- Cheiropsis**
cirrhusa 472.

- CHELIDONIUM** 308.
corniculatum 314.
Glaucium 313.
laciniatum 310.
majus 309.
majus β 310.
CHENOPODIUM
glaucum 615.
opulifolium 615.
rubrum 615.
CHEHLERIA
sedoides 630.
CHRISOSPLENIUM
alternifolium 625.
CICUTA
virosa 617.
CISTUS 338.
acuminatus 367.
aegyptiacus 372.
affinis 339.
albidus 345. 631.
alpestris 358.
anglicus 361.
arabicus 379.
barbatus 381.
calycinus 356.
canus 361.
Clusii 350.
complicatus 348.
corbariensis 347.
creticus 343.
crispus 346.
croceus 385.
ericoides 356.
379.
eriocephalus 341.
fastigiatus 349.
ferrugineus 379.
florentinus 339.
Fumana 356.
Fumana $\frac{1}{2}$ *sicu-*
lus 356.
Flor. Ital. T. V.
CISTUS
garganicus 344.
glutinosus 376.
grandiflorus 381.
guttatus 367.
halimifolius 352.
Helianthemum
381. *bis.*
Helianthemum
 $\frac{1}{2}$ *canescens*
385.
hirsutus 381.
incanus 341. 631.
incanus β 341.
italicus 358.
laevipes 354.
laevis 376.
ledifolius 369.
Libanotis 350.
lunulatus 364.
marifolius 361.
mousseliensis
339.
nummularius
363.
alandicus 358.
ovatus 381.
paniculatus 363.
pilosus 388. 389.
pilosus *fl. luteo*
385.
polifolius 388.
pulverulentus
388.
roseus 386.
rosmarinifolius
350.
salicifolius 371.
salviaefolius 347.
salvifolia 347.
salvifolius 346.
Savii 378.
serratus 367.
sessiliflorus 380.
sideritis 347.
CISTUS
thymifolius
376.
tomentosus 381.
Tuberaria 365.
undulatus 344.
villosus 341. *bis.*
villosus β 342.
vinealis 361.
CLEMATIS 470.
alpina 469.
caspitosa 476.
cirrosa 472.
cirrosa β 472.
erecta 478.
Flammula 475.
633.
Flammula 478.
Flammula β
476.
Flammula *va-*
riet. maritima
476.
fragrans 475.
maritima 475.
476.
polymorpha,
472.
recta 478.
semitriloba 472.
Vitalba 474.
Viticella 471.
CNEORUM
triccoccum 600.
COLCHICUM
Bivona 623.
COMMARUM 299.
fragarioides
269.
palustre 299.
CONVOLVULUS
althaeoides 611.
pentapetaloides
611.
sabatius 611.
41

- CORNUS**
mas 607.
- CORRIGIOLA**
litoralis 619.
- CORTUSA**
Matthioli 610.
- Cotoneaster**
tomentosa 162.
tomentosus 162.
vulgaris 162.
- COTYLEDON**
horizontalis 630.
Umbilicus 630.
- CRATEGUS** 138.
Amelanchier
159.
Aria 139.
Chamaespilus
161.
florentina 142.
hirtostyla 145.
laciniata 149.
monogyna 145.
orientalis 149.
Oxyacantha 145.
Oxyacantha 148.
oxyacanthoides
148.
polyacantha 145.
Pyracantha 157.
terminalis 143.
- CRUCIANELLA**
maritima 607.
- CRYPsis**
aculeata 601.
schœnoides 601.
- CUSCUTA**
Epilinum 635.
planiflora 615.
- CYCLAMEN**
vernum 610.
- Cydonia**
communis & 171.
europæa 171.
vulgaris 171.
- CYNANCHUM**
Vincetoxicum
615.
- CYNOCLOSSUM**
officinale 609.
- DACTYLOTENIUM**
ægyptiacum 602.
- DAPHNE**
collina 624.
Cneorum 624.
glandulosa 624.
Gnidium 624.
Mezereum 624.
- DAUCUS**
parviflorus 617.
- DELPHINIUM** 397.
Ajacis 400.
alpinum 410. bis.
Clusianum 410.
confertum 403.
Consolida 398.
Consolida 399.
Consolida β 398.
Consolida β di-
varicatum 398.
elatum 410.
elatum 402. 410.
elatum α 412.
elatum β 410.
emarginatum
409.
fissum 407.
gracile 405.
gracile 403.
halteratum 403.
halteratum 406.
hirsutum 407.
hybridum 407.
intermedium
410.
intermedium β
alpinum 410.
intermedium III.
amethystinum
412.
- DELPHINIUM**
juncceum 402.
403. 405.
longipes 404.
longipes 403.
montanum 412.
paniculatum
399.
pentagynum
409.
peregrinum 402.
peregrinum 403.
405.
pictum 414.
Staphisagria
412.
Staphisagria
414.
velutinum 406.
- DIANTHUS**
Armeria 628.
Carthusianorum
628.
Carthusianorum
 π 628.
monsessulanus
628.
prolifer 628.
superbus 628.
- DICTAMNUS**
albus 625.
- DRYAS** 295.
octopetala 296.
- ECHINOPIPHORA**
tennisfolia 617.
- ECHIUM**
calycinum 609.
plantagineum
609.
vulgare ϵ . 609.
- ELEOCHARIS**
multicaulis 631.
- EPILOBIUM**
alpinum 623.
trigonum 623.

EPIMEDIUM

alpinum 607.ERANTHIS 584.hyemalis 585.

ERICA

arborea 623.multiflora 623.scoparia 623.

ERIOPHORUM

alpinum 600.capitatum 600.polystachyon
601.pubescens 600.vaginatum 600.

ERYNGIUM

dilatatum 616.

ERITHREA

maritima 613.

EXACUM

Candollei 607.filiforme 607.EUPHORBIA 36.acuminata 48.akenocarpa 45.aleppica 80.

amygdaloides

97.

androsæmifolia

38.Apios 58.Barrelieri 50.Baselicis 77.bialata 44.biglandulosa 72.biumbellata 77.brachiata 94.cæspitosa 64.canescens 39.carniolica 86.carniolica 60.ceratocarpa 75.Chamæsyce 39.Characias 100.Characias 101.

EUPHORBIA

Characia B. 101.102. 103.coralloides 88.

coralloides C.

glabrata 91.cuneifolia 45.Cupani 70.Cyparissias 81.dendroides 73.denudata 91.diffusa 54.divaricata 73.dulcis 60.dulcis 62.

epithymioides

59.

epithymioides

59. 60.eriocarpa 101.Esula 83.Esula 50. 81.Esula β 84.esuloides 81.exigua 54.falcata 48.flavicoma 60.fragifera 59.fruticosa 74.fruticosa β 74.Gayi 53.Gayi β 53.Gayi γ 51.Gerardiana 79.glareosa 76.helioscopia 46.hyberna 88.hybernica 88.hypericifolia 38.italica 50.Japygica 76.lanuginosa 89.Lathyris 95.linifolia 64.maculata 38.

EUPHORBIA

melapetala 102.micrantha 92.muricata 46.Myrsinites 71.neapolitana 50.nicæensis 76.nicæensis 50.nicæensis β 77.nicæensis β pan-nonica 77.nicæensis α 77.nicæensis δ 77.obscura 48.orientalis 75.palustris 94.palustris 90.pannonica 77.papillaris 74.Paralia 69.Paralias 68.Peplis 40.peploides 43.Peplus 42.Peplus β 43.perforata 39.pilosa 89.pilosa 89.Pinea 64.Pinea 80.Pithyusa 67.Pithyusa 64.platyphylla 92.platyphylla 90.platyphylla β 90.platyphylla β 92.platyphyllos 92.portlandica 64.Preslii 38.procera β tri-chocarpa 89.provincialis 60.pterococca 44.

EUPHORBIA

- pteriococca* 44.
pubescens 90.
purpurea 56.
purpurata 62.
ragusana 64.
retusa 54.
rigida 46. 71.
rotundifolia 43.
saxatilis 63.
segetalis 66.
segetalis 64.
Seguierii 79.
semiperfoliata 99.
serotina 76.
serrata 85.
solissequa 62.
sphaerococca 46.
spinosa 56.
spinosa 74.
stellulata 44. 45.
stricta 92.
sylvatica 97. 101.
tanaicensis 70.
taurinensis 52.
terraccina 50.
terraccina 52.
Tommasiniana 78.
trinervis 37.
Triumfetti 85.
valentina 50.
variabilis 51.
veneta 103.
verrucosa 45.
verrucosa 60. 90.
Wulfenii 103.

FEDIA

- Cornucopia* 600.

FERULA

- nodiflora* 618.

FESTUCA

- calamaria* 603.
ciliata 603.
cærulescens 603.

FESTUCA

- cristata* 603.
geniculata 603.
incrassata 603.
incrassata 603.
ligustica 603.
Myuros 603.
serotina 603.
spadicea 603.
uniglumis 603.

Ficaria

- calthæfolia* 508.
ranunculoides 508.
verna 508.

FIMBRISTYLIS

- Cioniana* 634.

FRAGARIA

- collina* 239.
collina 237.
sterilis 269.
sylvestris 237.
vesca 236.
vesca 239.
vesca & *collina* 239.

FRANKENIA

- lævis* 623.
pulverulenta 623.

GALANTHUS

- Imperati* 620.

GALIUM

- boreale* 607.
erectum α 606.
erectum β 606.
purpureum 606.
psillum 606.
rubrum β 606.
rubrum pumilum 606.
rupicola 606.
saccharatum 606.
Soleirolii 606.
vernum 606.

GENTIANA

- asclepiadea* 615.
bavarica 616.
campestris 616.
cruciata 615.
nana 635.
purpurea 615.
verna 615.

GEUM

- intermedium* 288.
micropetalum 291.
montanum 292.
reptans 294.
rivale 290.
rivale 292.
urbanum 288.

GLADIOLUS

- triphyllus* 600.

GLAUCIUM

- corniculatum* 314.
flavum 312.
luteum 312.
phœniceum 314.
rubrum 314.

GLINUS

- lotoides* 104.

GLOBULARIA

- Alypum* 605.
incanescens 605.
nudicaulis 605.

GYPSOPHYLLA

- saxifraga* 627.
saxifraga β 627.
Vaccaria 627.

HELIANTHEMUM

- 351.*
egyptiacum 372.
alpestre 358.
631.

HELIANTHEMUM
apenninum 388.
arabicum 379.
arabicum B 378.
arcuatum 380.
Barrelieri 375.
Berterianum 387.
canum 360.
ciliatum 374.
cinereum 361.
croceum 385.
denticulatum
 370.
ericoides 355.
Fumana 355.
glaucum 385.
glutinosum 375.
grandiflorum
 381.
guttatum 366.,
 632.
halimifolium
 352. 631.
hirtum 385.
intermedium
 370.
italicum 358.
 360.
juniperinum 375.
laeve 376.
laevipes 353.
 631.
ledifolium 369.
lunulatum 364.
marifolium 360.
Morisianum 374.
mutabile 389.
nebrodense 632.
niloticum 369.
nummularium
 363.
obscurum 381.
oelandicum 358.
oelandicum β
 361.

HELIANTHEMUM
pilosum 388.
plantagineum
 367.
polifolium 387.
polifolium β 389.
polifolium γ 389.
procumbens 356.
pulverulentum
 388. 389.
retrofractum
 370.
rhodanthum 387.
roseum 386.
rotundifolium
 363.
rubellum 362.
 631.
rubellum β 631.
salicifolium 370.
 632.
sanguineum 370.
Savii 378. 632.
Seguierii 381.
semigladium
 373.
semigladium
 374.
serpyllifolium
 381.
sessiliflorum 379.
stellatum 385.
thymifolium
 375. 632.
tomentosum 385.
Tuberaria 365.
 632.
umbellatum 350.
vineale 361.
viride 375.
Vivianii 367.
vulgare 380. 632.
vulgare β 381.
 632.
vulgare ε 385.

HELLEBORUS 587.
angustifolius
 590.
argutifolius
 594.
Bocconi 590.
fœtidus 592.
fœtidus β 594.
grandiflorus
 588.
hyemalis 585.
intermedius
 590.
lividus 594.
multifidus 590.
niger 588.
thalictroides
 583.
triphyllus 594.
viridis 589.
Hepatica
nobilis 444.
triloba 444.
HERACLEUM
elegans 618.
palmatum 618.
Panaces 618.
Pollinianum
 618.
HETEROPOGON
Allionii 601.
HLADNIKIA
golacensis 619.
HOLOSTEUM
umbellatum
 605.
HORTONIA
palustris 611.
HYACINTHUS
ciliatus 622.
HYPERICUM
glaucescens
 608.
procumbens
 608.

- ILLECEBRUM**
 echinatum 614.
 serpyllifolium 614.
 verticillatum 614.
- IRIS**
 Chamæ Iris 619.
 graminea 600.
 pumila 600.
 tuberosa 600.
- ISOPYRUM** 582.
aquilegioides 583.
thalictrifolium 583.
thalictroides 582.
- JUNCUS**
 capitatus 622.
 pygmaeus 635.
 triidus 622.
- LASERPITIUM**
 nitidum 618.
 prutenicum 618.
 siculum 618.
- LEMNA**
 gibba 599.
- LIBANOTIS**
 Matthioli 618.
- LILIUM**
 Pomponium 621.
- LITHOSPERMUM**
 apulum 609.
 rosmarinifolium 608.
 tinctorium 609.
- LOBELIA**
 Laurentia 612.
 tenella 612.
- LONICERA**
 alpigena 612.
 caerulea 613.
 implexa 612.
 nigra 612.
- LORANTHUS**
 europæus 622.
- LUZULA**
 lutea 622.
 spadicea 622.
- LYCOPIS**
 arvensis 609.
- LYSIMACHIA**
 Linum stella-
 tum 611.
 nemorum 611.
- LYTHRUM** 9.
acutangulum 13.
alatum 13.
dibracteatum 16.
geminiflorum 16.
 Graefferi 12.
 Gussonii 13.
 Hyssopifolia 14.
hyssopifolium 14.
 Salicaria 10.
 Thymifolia 15.
thymifolium 15.
tribracteatum 16.
- MALUS**
communis 169.
communis & syl-
vestris 169.
- MELICA**
 minuta 602.
 nutans 602.
 pyramidalis 602.
 uniflora 602.
- MESEMBRIANTHEMUM** 173.
crystallinum 175.
glaciale 175.
nodiflorum 174.
- MESPILUS** 154.
 Amelanchier 158.
 Aria 140.
aucuparia 151.
 Chamæmepilus 161.
- MESPILUS**
 Cotoneaster 162.
domestica 153.
eriocarpa 162.
florentina 142.
germanica 155.
laciniata 149.
maroccana 146.
monogyna 145.
Oxyacantha 145. 148.
oxyacanthoides 148.
polyacantha 146.
pubescens 149.
Pyracantha 157.
 tomentosa 162.
 torminalis 143.
 triloba 146.
 vulgaris 156.
- MEUM**
 carvifolium 618.
 Mutellina 618.
- MILIUM**
 effusum 601.
 lendigerum 601.
 multiflorum 601.
- MOERHINGIA**
 papnosa 624.
- MOENCHIA**
 erecta 608.
- MOLOSPHERMUM**
 cicutarium 619.
- MONOTROPA**
 Hypopitys 625.
- MONTIA**
 fontana 605.
- MUSCARI**
 parviflorum 622.

- MYROSOTIS**
 micrantha 608.
MYRRHIS
 odorata 617.
MYRTUS 116.
 communis 117.
 communis *a* ita-
 lica 118.
 communis *A. b.*
 tarentina 120.
 communis β 118.
 communis β leu-
 cocarpa 118.
 communis β ta-
 rentina 120.
 communis *C* 120.
 tarentina 120.
NARCISSUS
 cupularis 635.
Nectaroscordum
 siculum 621.
NIGELLA 433.
 arvensis 436.
 arvensis 437.
 arvensis β glau-
 rescens 436.
 arvensis β glau-
 rescens 437.
Catena 436.
 damascena 434.
 divaricata 437.
 divaricata 436.
NUPHAR 330.
 lutea 331.
 luteum 331.
NYMPHÆA 328.
 alba 329.
 lutea 331.
ONOSMA
 montana 609.
ORNITHOGALUM
 confortum 621.
 umbellatum 621.
OXALIS
 corniculata 630.
- Padus**
 vulgaris 128.
PAEONIA 391.
 bannatica 393.
 corallina 395.
 corallina 393.
 396.
 flavescens 396.
 officinalis 392.
 officinalis 395.
 396. 632.
 officinalis β 395.
 paradoxa 393.
 peregrina 393.
 promiscua 393.
 pubens 393.
 rosea 393.
 Russi 396.
- PALIMBIA**
 Chabreii 618.
PALIURUS
 australis 613.
PAPAYER 315.
 alpinum 319.
 apulum 317.
 Argemone 318.
 argemonoides
 316.
 aurantiacum 319.
 dubium 322.
 dubium 322.
 dubium β 322.
 dubium β 322.
 dubium α 322.
 dubium δ 322.
 frentanum 322.
 hybridum 316.
 631.
 integrifolium
 325.
 obtusifolium
 322.
 pinnatifidum
 322.
 pyrenaicum 319.
- PAPAYER**
 Rhoëas 324.
 Rhoëas β strigo-
 sum 322.
 Rhoëas γ 325.
 Rhoëas λ 325.
 setigerum 326.
 somniferum
 327.
PAEDEROTA
 Ageria 599.
PARIETARIA
 Soleirolii 608.
PASSERINA
 hirsuta 624.
PEGANUM 5.
 Harmala 6.
PENNISSETUM
 cenchroides 602.
 distylum 602.
PEPLIS
 Portula 623.
PHILADELPHUS
 114.
 coronarius 115.
PHYTEUMA
 hemisphærica
 612.
 Michellii 612.
 orbicularis 612.
 Scheuchzeri
 612.
 spicata 612.
PIMPINELLA
 alpina 617.
PLANTAGO
 albicans 607.
 alpina 607.
 Cynops 607.
 Lagopus 607.
 Psyllium 607.
Poa
 alpina 602.
 compressa 602.
 divaricata 602.

POA

- dura 602.
 Eragrostis 602.
 fertilis 602.
 laxa 602.

POGONOSTYLIS

- squosus 600.

POLYCARPON

- peploides 605.
 tetraphyllum 605.

POLYGONUM

- alpinum 624.
 controversum 624.

POLYPOGON

- maritimus 601.

Populago

- palustris 597.

PORTULACA

- oleracea 8.

POTAMOGETON

- crispum 608.
 densum 608.
 panormitanum 608.

- perfoliatum 608.

- pusillum 608.

POTENTILLA

- alba 260.
 alpestris 275.
 anserina 241.
 apennina 263.
 argentea 253.
 argentea 7 *calabra* 254.
 aurea 276.
 aurea 275. 279.
 Bocconi 263.
 Brauniana 282.
 calabra 254.
 canescens 251.
 caulescens 257.
 cinerea 266.
 collina 255.

POTENTILLA

- Comarum 299.
 crassinervia 259.
 crocea 275.
 Dethomasi 255.
 Fantolii 256.
 Fragaria 269.
 Fragariastrum 269.
 Fragarioides 269.
 frigida 281.
 frigida β 282.
 glacialis 281.
 glauca 259.
 grammopetala 256.
 grandiflora 273.
 grandiflora 266.
 Halleri 277.
 hirta 249.
 hirta β 249.
 hirta ϵ *recta* 247.
 hirta ζ *obscura* 248.
 inclinata 251.
 intermedia 252.
 laeta 249.
 micrantha 269.
 minima 282.
 multifida 243.
 nemoralis 285.
 his.
 nitida 264.
 nitida 260.
 nivea 268.
 norvegica 272.
 obscura 248.
 opaca 266. 279.
 bis.
 palustris 299.
 pedata 249.
 petiolulata 257.
 pilosa 247. 249.

POTENTILLA

- recta 247.
 recta 249. 251.
 reptans 271.
 rubens 249.
 rubra 299.
 rupestris 244.
 sabauda 275.
 salisburgensis 275.
 subacaulis 266.
 subacaulis 265.
 supina 245.
 sylvestris 284.
 terglensis 265.
 Thomasii 255.
 Tormentilla 283.
 Tormentilla
 erecta 284.
 valderia 262.
 velutina 266.
 verna 278.
 verna 275. 279.
 verna β *cinerea* 266.
 verna β *hirsuta* 281.
 verna β *pilosissima* 279.
 verna δ *cinerea* 266.
 vesca 237.

PRIMULA

- Auricula 610.
 glaucescens 610.
 spectabilis 610.
 snaveolens 609.
 villosa 610.

PRUNUS

- Avium 132.
 brigantia 131.

PRUNUS

- Cerasus* 131.
Cerasus β 132.
Cerasus γ *avium*
132.
Cocomilia 134.
domestica 133.
domestica β 133.
humilis 138.
insititia 135.
Mahaleb 129.
Padus 128.
prostrata 137.
spinosa 136.
spinosa b *macrocarpa* 135.

PYTHOTIS

- heterophylla*
617.

PULSATILLA

- alba* 465.
Bugenhardiana
463.
Burseriana 465.
466.
montana 463.
pratensis 463.
vernalis 461.
vulgaris 463.

PUNICA

- Granatum* 122.

PYRUS

- acerba* 169.
Achras 166.
Agrimolea 169.
Amelanchier
158.
amygdaliformis
167.
Aria 139.
aucuparia 151.
153.
Chamaespilus
161.
communis 165.

PYRUS

- communis* β 166.
communis b 166.
cratagifolia 142.
cuneifolia 168.
cuneifolia 167.
Cydonia 171.
domestica 153.
eryostyla 169.
florentina 142.
intermedia 140.
Malus 169.
Malus *var.* *eryostyla* 169.
nebrodensis 162.
parviflora 167.
praemorsa 151.
Pyraster 166.
Sinai 168.
Sinica 168.
Sorbus 153. *bis.*
terminalis 143.
terminalis B 142.

RANUNCULUS

- acer* 538.
aconitifolius 517.
aconitifolius 557.
acris 537.
Agerii 524.
agrarius 560.
alpestris 515.
alpestris β 514.
anemonoides 519.
angulatus 558.
aquatilis 571.
aquatilis α 571.
573.
aquatilis α *pan-*
tothrix 575.
aquatilis β 572.
aquatilis β 577.
aquatilis β *cap-*
illaceus 575.
bis.
aquatilis δ 578.

RANUNCULUS

- aquatilis* δ *suc-*
culentus 573.
aquatilis ϵ *pan-*
tothrix 575.
aquatilis γ 572.
aquatilis γ 575.
577.
aquatilis γ *ca-*
spitosus 575.
aquatilis γ *ter-*
restris *homo-*
phyllus 575.
aquatilis ζ 575.
aquatilis A 575.
aquatilis $*$ *coe-*
nosus 572.
aquatilis $**$ *peu-*
cedanifolius
575.
arvensis 564.
aureus 541.
auricomus 535.
Balbisii 556.
brachyphyllus
512.
brevifolius 512.
brevifolius β
512.
brutius 550.
bulbosus 553.
bullatus 507.
capillaceus 575.
cassubicus α . β .
 γ . 535.
chaerophyllos
525.
chaerophyllos β
525.
chaerophyllos γ
525.
chaerophyllos C
525.
chaerophyllus
529.

RANUNCULUS

circinatus 577.
 coenosus 571.
 Columna 523.
 cordigerus 561.
 corsicus 548.
 crenatus 514.
 cymbalariaefolius 556.
 divaricatus 577.
 erinifolius 501.
 falcatus 569.
 fasciculatus 533.
 Ficaria 508.
 fistulosus 499.
 flabellatus 526.
 Flammula 497.
 Flammula 499.
 Flammula β 497.
 fluitans 578.
 fluviatilis 578.
 fluviatilis a capillaceus 575.
 fluviatilis b capitosus 575.
 fontanus 500.
 garganicus 527.
 glacialis 521.
 Gouani 540. bis.
 gracilis 540.
 gramineus 503. 633.
 Haarbachii 547.
 hederaceus 570.
 heucherifolius 557.
 heucherifolius β 557.
 heucherifolius b verruculosus 558.
 heterophyllus 572.
 Hornschuchii 541.

RANUNCULUS

hirsutus 560.
 hybridus 512.
 incrassatus 568.
 illyricus 530.
 illyricus 531.
 illyricus β 531.
 illyricus γ 531.
 insularis 525.
 lanuginosus 544.
 lanuginosus 547.
 lapponicus 540. 541.
 lateriflorus 501.
 Lingua 502.
 magellensis 513.
 marsicus 535.
 millefoliatus 528.
 monspeliacus 530. 531.
 monspeliacus a angustilobus 531.
 monspeliacus γ rotundifolius 531.
 montanus 539.
 montanus?? 561.
 montanus β 540.
 montanus β tenellus 541.
 montanus α 540.
 montanus δ 541.
 muricatus 566.
 neapolitanus 556.
 neapolitanus 545.
 nemorosus 540. 544.
 nivalis 514.
 nivalis 540. 541.
 nodiflorus 501.
 oenanthesfolius 552.

RANUNCULUS

omiophyllus 571.
 ophioglossifolius 499. 633.
 ophioglossoides 499.
 palustris 548.
 palustris corsicus 548.
 palustris β 548.
 pantothrix 575.
 pantothrix γ 578.
 parnaseifolius 506.
 parviflorus 568.
 parviflorus 560.
 parvulus 560.
 pedunculatus 525.
 peucedanifolius 575. 578.
 Philonotis 560.
 Philonotis β 561.
 Philonotis δ cordigerus 561.
 Phthora 512. bis.
 plantagineus 505.
 platanifolius 517.
 polymorphus 535.
 pratensis 558.
 prostratus 552.
 Pseudo-Thora 512.
 Puzolzii 561.
 pyrenaicus 504.
 pyrenaicus 505.
 repens 551.

RANUNCULUS

- reptans* 498.
rupestris 549.
rutaefolius 519.
sardous 533.
saxatilis 531.
sceleratus 533.
scutatus 510.
Seguieri 522.
sericeus 530.
spicatus 549.
stagnalis 575.
 577.
Stevani 538.
tenellus 541.
Thomasii 536.
Thomasii 527.
Thora 510. 633.
Thora 512.
Todari 558.
trilobus 563.
tripartitus 572.
tuberosus 554.
uliginosus 501.
umbrosus 545.
velutinus 546.
verrucosus 560.
Villarsii 540.
 REAUMURIA 438.
vermiculata 439.
 RESEDA 22.
alba 29.
crispata 26.
gracilis 29.
lutea 26.
Luteola 24.
Luteola β 26.
mucronata 27.
mucronulata 27.
myriophylla 30.
Phyteuma 33.
sesamoides 34.
sesamoides β 35.
suffruticulosa 29.
undata 30.

RHAMNUS

- Alaternus* 613.
saxatilis 613.

RHYNCHOSPORA

- alba* 600.
fusca 600.

ROMULEA

- Bulbocodium* α
 631.
Linaresii 631.

ROSA

- agrestis* 197.
alpina 207.
alpina β 208.
alpina δ ru-
 bella 208.
arvensis 205.
arvensis 187.
arvensis ovata 205.
atro-virens 213.
bradycarpa 193.
canina 201.
canina β colli-
 na 200.
cerea 189.
collina 200.
dumetorum 197.
 200. 205.
Eglanteria 188.
Eglanteria 197.
foetida 189.
gallica 211.
gallica pumila
 211.
gentilis 208.
glandulosa 207.
glutinosa 193.
Heckeliana 193.
Heckeliana 193.
hybrida 211.
inermis 207.
leucantha 200.
livida 204.
lutea 189.
parvifolia 194.

ROSA

- pendulina* 207.
pimpinellifolia
 187.
pimpinellifolia
 Marieburgen-
 sis 187.
pimpinellifolia
 pumila 187.
Polliniana 197.
 210.
Pollinii 210.
pomifera 190.
pomifera β 190.
pulverulenta
 195.
pumila 210.
pustulosa 195.
pyrenaica 207.
repens 205.
rubella 208.
rubiginosa 197.
rubiginosa 193.
 194.
rubiginosa flore
 albo 197.
rubiginosa se-
 pium 197.
rubiginosa β
 197.
rubiginosa η
 199.
rubiginosa C
 197.
rubrifolia 203.
sempervirens
 213.
semper virens
 205.
sempervirens
 globosa 213.
sempervirens la-
 tifolia 213.
Seraphini 194.
sepium 197.

ROSA

- sepium myrti-*
folia 197.
sepium rosea
 197.
sicula 194.
sistyla 197.
spinosissima 187.
spinosissima re-
versa 187.
suavifolia 197.
Swartzii 202.
tomentosa 192.
villosa 190. 192.
villosa α 190.
villosa β 190.
villosa δ *nuda*
 190.
viscosa 200.
- RUBIA
tinctorum 607.
- RUBUS 216.
acherunticus
 229.
Bellardi 225.
caesioides 228.
caesioides γ *pseu-*
docaesioides 229.
collinus 221.
corylifolius 227.
corylifolius 229.
discolor 218.
fruticosus 217.
fruticosus β *ca-*
nus 218.
fruticosus β
glandulosus
 224.
fruticosus γ . δ .
 221.
fruticosus $\frac{1}{4}$ *hy-*
poleucus 121.
glandulosus 224.
glandulosus β
 225.

RUBUS

- glandulosus* δ ?
eglandulosus
 121.
glandulosus γ
incanescens
 223.
hirtus 225. bis.
hybridus 224.
idæus 233.
incanescens 223.
Koehleri α 224.
præcox 220.
saxatilis 231.
siculus α 221.
siculus δ 221.
tomentosus 221.
tomentosus β 221.
tomentosus β
hypoleucus
 221.
triphyllus 221.
villosus α *glan-*
dulosus 224.

RUMEX

- bucephaloforus*
 623.

RUTA

- chalepensis* 625.
graveolens 625.

SAGINA

- maritima* 620.
procumbens 608.
urceolata 634.

SALICORNIA

- herbacea* 599.
fruticosa 599.

SALSOLA

- Kali* 615.
Soda 615.

SALVIA

- multifida* 599.
viridis 599.

SANICULA

- europæa* 616.

SAPONARIA

- ocymoides* 628.

SAXIFRAGA

- Aizoon* 625.
arachnoidea
 626.
aspera 626.
burseriana 626.
cernua 626.
cochlearis 625.
cuneifolia β
 626.
granulata 626.
moschata 627.
moschata β 627.
mutata 626.
oppositifolia
 627.
patens 636.
petraea 626.
rotundifolia
 626.
sedoides 627.
sedoides β 627.
Seguierii 626.
squarrosa 526.
stenopetala
 627.
tridactylites
 626.
tridactylites β
 626.
- SCABIOSA
columbaria β
 605.
crenata 605.
cretica 605.
graminifolia
 606.
maritima α 605.
- SCILLA
hyacinthoides
 622.
- SCLERANTHUS
annuus 627.

SEDUM

- albescens 630.
 nebrodense 636.
 reflexum 630.
 saxatile 630.
 villosum 630.

SELINUM

- rablense 618.

SEMPERVIVUM 105.

- arachnoidenm

III.

- arborescens 106.
 arenarium 112.
 Clusianum 109.
 globiferum 109.

112.

- hirtum 113.
 hirtum β 113.
 hirsutum 113.
 montanum 109.
 montanum var.

Clusianum

109.

- pumilum 111.
 tectorum 107.
 Wulfenii 112.

Serrafalcus

- lanceolatus 604.

SESELI

- annuum 618.

SESLERIA

- tenella 619.

SIBBALDIA

- procumbens 619.

SIEVERSIA

- montana 292.

- reptans 294.

SILENE

- acaulis 629.
 alpestris 629.
 Catholica 628.
 conica 629.
 cretica 629.
 gallica 628.
 inflata β 629.

SILENE

- italica 629.
 lanuginosa 629.
 nutans 628.
 paradoxa 629.
 quadrifida 629.
 rupestris 629.
 Salzmanni 629.
 saxifraga 629.
 sericea 628.

SIUM

- inundatum 617.

SOLDANELLA

- alpina 610.
 minima 610.
 pusilla 610.

SORBUS 150.

- Aria 140.

- aucuparia 151.

- aucuparia 151.

153.

- aucuparia β 151.

- aucuparia B 151.

- Chamæmespilus

161.

- domestica 152.

- domestica β 153.

- torminalis 143.

Spallanzania

- agrimonoides 22.

SPERGULA

- arvensis 630.

- glabra 631.

- subulata 631.

SPIREA 177.

- Aruncus 180.

- decumbens 178.

- denudata 184.

- flabellata 179.

- flexuosa 178.

- Filipendula 181.

- Ulmaria 183.

- Ulmaria 184.

- Ulmaria α 184.

- Ulmaria β 184.

SPIREA

- Ulmaria γ 184.

- Ulmaria var.

184.

- ulmifolia 178.

STAPELIA

- europæa 615.

- Gussoneana

615.

STATICHE

- echioides 619.

- Limonium 619.

STELLARIA

- dichotoma 637.

- Holostea 629.

- saxifraga 630.

- uliginosa 630.

STIPA

- tortilis 604.

STRATIOTES 440.

- aloides 441.

SWERTIA

- perennis 615.

TAMARIX

- africana 619.

TELEPHIUM

- Imperati 619.

THALICTRUM 479.

- alpinum 480.

- angustifolium

486.

- aquilegifolium

489.

- aquilegifolium

488.

- aquilegifolium

 $\frac{1}{2}$

- calabriculum 488.

488.

- atropurpureum

489.

- Bauhini 486.

- calabriculum 488.

- calabrum 488.

- collinum 482.

- elatum 485.

- THALICTRUM**
flavum 485.
flavum β 486.
 633.
flexuosum 482.
foetidum 481.
gallioides b. b.
 β c. 486.
lucidum 486.
majus 484.
majus 489.
minus 482. 633.
nigricans 486.
 bis.
THAPSEA
garganica 618.
THESIUM
alpinum 614.
rostratum 634.
TILLEA
muscosa 605.
TILIA 333.
crispissima 336.
europaea 334.
europaea 335.
 336.
grandifolia 335.
intermedia 334.
microphylla
 334. 336.
mollis 335.
parvifolia 336.
platyphylla 335.
platyphyllos
 335.
triflora 335.
ulmifolia 336.
syloestris 336.
Tithymalus
Cyparissias 81.
dulcis 62.
helioscopius 47.
Lathyrus 96.
Paralias 79.
Peplis 41.
Tithymalus
pilosus 87.
Pithyusa 59.
platyphyllus 92.
Seguierii 76.
sylvaticus 97.
verrucosus 69.
TORDYLIUM
apulum 619.
TORMENTILLA
 282.
erecta 283.
officinalis 283.
reptans 285.
reptans β 285.
TRACHELIUM
lanceolatum
 634.
TRIBULUS
terrestris 625.
TRIGLOCHIN
Barrelieri 623.
laxiflorum 623.
palustre 623.
Trigonea
sicula 621.
TRITICUM
lohiaceum 605.
tuberculosum
 634.
TROCHISCANTHES
nodiflorus 618.
TROLLIUS 579.
europaeus 580.
sphaericus 580.
TULIPA
apula 635.
Clusiana 621.
ULMUS
major 620.
VACCINIUM
Oxycoccus 636.
Vitis Idæa 623.
VALANTIA
muralis 607.
VALERIANA
Calcitrapa 599.
Saliunca 599.
saxatilis 599.
VALESIANELLA
echinata 600.
VELLEZIA
rigida 628.
VERRASCUM
longifolium
 613.
phoeniceum
 613.
viminale 613.
VERONICA
aphylla 599.
saxatilis 599.
VINCA
acutiflora 614.
VIOLA
Allionii 613.
biflora 614.
calcarata 614.
calcarata β 614.
canina β 613.
cenisia 614.
cenisia β 614.
heterophylla
 614.
hirta 613.
mirabilis 614.
montana 613.
palustris 613.
VITALIANA
primulaeflora
 609.
Fulpia
incrassata 603.
tenuis 603.
Xolantha
racemosa 367.
ZIZIPHORA
capitata 599.



In hoc volumine V. describuntur

GENERA 58.

SPECIES 364.

BONONIÆ

EX TYPOGRAPHÆO HÆRED. RICHARDI MASII

SUMPTIBUS AUCTORIS.

Impressio finita est VI. Kal. Jul. ann. MDCCCXLIV.

ERRATA

CORRIGE

pag.	lin.		
446	5	<i>Pl. Gen. p. 69. n. 150. . . .</i>	<i>Pl. Gen. p. 68. n. 149.</i>
483	10	<i>ex agro Nicænsi</i>	<i>(dele hunc locum natalem).</i>



IMPRIMATUR FR. P. CAJ. FELETTI O. P. Inq. S. O.
 IMPRIMATUR JOSEPH ARCHIP. PASSAPONTI Pro-Vic. Gen.







